

*Enterobacteriaceae*  
Subgroups/Author(s)

Trait–Species    NDM Gene(s)    Weight% Pr[95% CI]


Naive Isolates

Aslam et al., 2020	KP	NDM-1	10.36%	0.00 [–0.00, 0.01]
Baloch et al., 2019	EC	NDM-5, 7	4.26%	0.15 [–0.06, 0.37]
Qamar et al., 2019a	EC	NDM	8.51%	0.18 [ 0.10, 0.26]
Heinz et al., 2019	KSp	NDM-1	9.73%	0.10 [ 0.05, 0.14]
Masseron et al., 2019	En	NDM-1	5.17%	0.52 [ 0.35, 0.70]
Ur Rahman et al., 2019	ESBL-EC	NDM-1	6.37%	0.18 [ 0.04, 0.32]
Lomonaco et al., 2018	KP	NDM-1	1.10%	0.70 [ 0.18, 1.22]
Ahmad et al., 2018	MDR-EC	NDM-1	9.45%	0.04 [–0.02, 0.10]
Humayun et al., 2018	KP	NDM-1	9.91%	0.04 [ 0.00, 0.08]
Pesesky et al., 2015	En	NDM-1	7.00%	0.22 [ 0.09, 0.34]
Kathryn M. Day et al., 2013	En	NDM-1	9.24%	0.19 [ 0.13, 0.25]
K. M. Day et al., 2013	En	NDM-1	9.58%	0.10 [ 0.05, 0.15]
Perry et al., 2011	En	NDM-1	9.32%	0.18 [ 0.13, 0.24]

RE Model for All Studies

(T<sup>2</sup> = 0.0083, df = 12, Q = 182.05, p < .0001; H<sup>2</sup> = 15.2, I<sup>2</sup> = 93.4%)

100.00%    0.15 [ 0.06, 0.23]



Incidence Rate