

Vacunas para Bebés...

Una guía para los padres iÉstos son las vacunas que necesitan sus bebés!

Al nacer	НерВ
2 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
4 meses	HepB ² + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
6 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib³ + Polio + RV + Influenza 6-18 meses¹ 6-59 meses¹.4
12 meses o más	MMR + DTaP + PCV + Hib + Varicela + HepA + Influenza 12–15 meses ¹ 15–18 meses ^{1,5} 12–15 meses ¹ 12–15 meses ¹ 12–18 meses ¹ 12–23 meses ¹ 6–59 meses ^{1,4}

Verifíque con su médico or su enfermera para asegurarse que su bebé esté siendo vacunado(a) a tiempo. Ya existen varias vacunas combinadas con lo que se reduce el número de inyecciones necesarias. No deje de pedir que le den un registro de vacunas con todas las fechas de las vacunas de su bebé; llévelo a cada visita al consultorio o clínica.

Aquí está una lista de las vacunas y las enfermedades que pueden prevenir:

HepB: hepatitis B, una enfermeda seria del hígado

DTaP: difteria, tétanos, y tos ferina

PCV: la vacuna neumocócica conjugada protege contra una infección de la sangre, los pulmones, y el cerebro

Hib: Haemophilus influenzae tipo b—una infección seria del cerebo, la garganta, y la sangre

Polio: polio—una enfermedad grave que causa paralisis

RV: la vacuna rotavirus protege contra una enfermedad de diarrea severa

Influenza: también conocida como la gripe—una enfermedad que puede causar infección seria de los pulmones

MMR: sarampión, paperas, y rubéola (sarampión alemán)

HepA: hepatitis A, una enfermeda seria del hígado **Varicela:** vacuna varicela zoster—protección contra

varicela

Notas:

- 1. Éste es el rango de edad en que se debe dar esta vacuna.
- 2. Dependiendo del tipo de vacuna que use su proveedor de salud, es posible que su bebé no necesite la dosis de Hepatitis B a los 4 meses de edad.
- 3. Dependiendo del tipo de vacuna que use su proveedor de salud, es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses de edad.
- 4. Todos los niños de 6 a 59 meses deben recibir la vacuna contra la influenza cada año en el otoño; niños que reciben la vacuna por primera vez deben recibir 2 dosis esperando por lo menos 4 semanas entre una y otra dosis.
- 5. La vacuna DTaP puede darse lo más temprano como a los 12 meses de edad si 6 meses han pasado desde la dosis previa y si es posible que el niño no regrese a los 18 meses de edad.

Translated by the California Department of Health Services

www.immunize.org/catg.d/p4010-01imm.pdf • Item #P4010-01 (5/06)