

Analytická geometrie



Jaroslav Drobek

jaroslav.drobek@goa-orlova.cz

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

10. Parabola, příklady

GOA –
ORLOVA.CZ



Parabola s vrcholem $V = [m; n]$ a s ohniskem $F = [m; n \pm \frac{p}{2}]$... $o \parallel o_y$

► **Vrcholová rovnice:** $(x - m)^2 = 2p(y - n)$ („údolíčko“) $(x - m)^2 = -2p(y - n)$ („kopeček“)

Příklad 10.1 Najděte vrcholovou rovnici paraboly určené ohniskem $F = [2; 4]$ a řídicí přímkou $q : y = -2$.

Orientace:

- $q \parallel o_x \implies o \parallel o_y$
- $y_F = 4 > -2 \implies F$ leží nad přímkou $q \implies$ parabola leží nad přímkou q , jde o „údolíčko“

Najdeme souřadnice vrcholu:

- V leží na ose o , stejně jako ohnisko $F \implies m = 2$
- $p = |qF| = 6$
- V leží přesně uprostřed mezi ohniskem F a přímkou $q \implies n = y_F - \frac{p}{2} = 4 - 3 = 1$

Nyní lze sestavit vrcholovou rovnici:

$$(x - 2)^2 = 2 \cdot 6 \cdot (y - 1)$$

$$(x - 2)^2 = 12 \cdot (y - 1)$$

a odvodit obecnou rovnici:

$$x^2 - 4x + 4 = 12y - 12$$



$$\underline{\underline{x^2 - 4x - 12y + 16 = 0}}$$

$$\underline{\underline{x^2 + 2rx + 2sy + t = 0}}$$

Domácí úkol (zdroj: [Hledání parabol na realistically.cz](https://hledani-parabol-na-realistically.cz))

Najděte rovnici paraboly, která má

- vrchol v počátku a ohnisko $F = [-2; 0]$,
- vrchol $V = [-2; -1]$ a řídicí přímkou $q : y = -2$.



Příklad 10.2 Najděte vrchol, ohnisko a řídící přímku paraboly, která je dána rovnicí $x^2 - 4x - 4y + 16 = 0$.

Najít vrcholovou rovnici:

$$x^2 - 4x - 4y + 16 = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) - 4 - 4y + 16 = 0$$

$$(x - 2)^2 - 4y + 12 = 0$$

$$(x - 2)^2 = 4y - 12$$

vrcholová rovnice: $(x - 2)^2 = 4(y - 3)$

$$m = 2, n = 3, p = 2$$

$$V = [m; n] = [2; 3]$$

$$F = [m; n + \frac{p}{2}] = [2; 3 + \frac{2}{2}] = [2; 4]$$

Najdeme řídící přímku:

► její body budou mít y-ovou souřadnici $n - \frac{p}{2} = 3 - \frac{2}{2} =$

► musí tedy být $q: y = 2$.

Příklad 10.3 Najděte vrchol, ohnisko a řídící přímku paraboly, která je dána rovnicí $(y + 1)^2 = 8(x - 2)$.

$$m = 2, n = -1, p = 4$$

$$V = [m; n] = [2; -1]$$

$$F = [m + \frac{p}{2}; n] = [2 + \frac{4}{2}; -1] = [4; -1]$$

Najdeme řídící přímku:

► její body budou mít x-ovou souřadnici $m - \frac{p}{2} = 2 - \frac{4}{2} = 0$

► musí tedy být $q: x = 0$.

Vrchol $V = [m; n]$, **ohnisko** $F = [m; n \pm \frac{p}{2}]$... $o \parallel o_y$

Vrcholová rovnice: $(x - m)^2 = 2p(y - n)$ (U)


Vrchol $V = [m; n]$, **ohnisko** $F = [m \pm \frac{p}{2}; n]$... $o \parallel o_x$

Vrcholová rovnice: $(y - n)^2 = 2p(x - m)$ (C)

Domácí úkol (zdroj: [Rovnice paraboly na realisticky.cz](https://www.realisticky.cz))

Najděte vrchol, ohnisko a řídící přímku paraboly

a) $x^2 - 4x + 6y + 4 = 0$, b) $y^2 - 6x - 10 = 0$, c) $y^2 + y + 4x + 3 = 0$.



Jestliže pro přímku p a parabolu k platí

- ▶ $p \cap k = \emptyset$, přímka p **leží vně** paraboly k a nazývá se **vnější přímka** paraboly.
- ▶ $p \cap k = \{P\}$,
 - ▶ přímka p **se dotýká** paraboly k v bodě P a nazývá se **tečna** paraboly k .
 - ▶ přímka p je rovnoběžná s osou paraboly k , **protíná** parabolu k v jednom bodě P a nazývá se **sečna** paraboly k .
- ▶ $p \cap k = \{P, Q\}$, přímka p **protíná** parabolu k v bodech P a Q a nazývá se **sečna** paraboly k .

Příklad 10.4 Určete vzájemnou polohu přímky $2x - y + 5 = 0$ a paraboly $(y - 3)^2 = -2(x - 1)$.

$$\begin{aligned} 2x - y + 5 = 0 & \implies y = 2x + 5 \\ (y - 3)^2 = -2(x - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2x + 5 - 3)^2 &= -2(x - 1) \\ (2x + 2)^2 &= -2x + 2 \end{aligned}$$

$$4x^2 + 8x + 4 + 2x - 2 = 0$$

$$4x^2 + 10x + 2 = 0$$

$$2x^2 + 5x + 1 = 0$$

$$D = (5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 25 - 8 > 0 \implies 2 \text{ řešení} \implies 2 \text{ společné body}$$

\implies přímka je sečnou paraboly (protíná ji ve dvou bodech)

... **dopočítejte průsečíky!**

Příklad 10.5 Určete vzájemnou polohu přímky $2x - y + 5 = 0$ a paraboly $(y - 3)^2 = 2(x - 1)$.

$$\begin{aligned} 2x - y + 5 = 0 & \implies y = 2x + 5 \\ (y - 3)^2 = 2(x - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2x + 5 - 3)^2 &= 2(x - 1) \\ (2x + 2)^2 &= 2x - 2 \end{aligned}$$

$$4x^2 + 8x + 4 - 2x + 2 = 0$$

$$4x^2 + 6x + 6 = 0$$

$$2x^2 + 3x + 3 = 0$$

$$D = (3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 9 - 24 < 0$$

$\implies \nexists$ řešení $\implies \nexists$ společné body \implies vnější přímka paraboly

Příklad 10.6 Určete vzájemnou polohu přímky $p : x - y - 4 = 0$ a paraboly $k : (x - 3)^2 = 12(y - 2)$.

$$x - y - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = y + 4$$

$$(x - 3)^2 = 12(y - 2)$$

$$(y + 4 - 3)^2 = 12(y - 2)$$

$$(y + 1)^2 - 12(y - 2) = 0$$

$$y^2 + 2y + 1 - 12y + 24 = 0$$

$$y^2 - 10y + 25 = 0$$

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 100 - 100 = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ řešení} \Rightarrow 1 \text{ společný bod}$$

Tečna nebo sečna?

Rozhodne vzájemná poloha o a p . (Jsou-li rovnoběžné \Rightarrow sečna)

Lze zjistit ze vzájemné polohy normálových vektorů:

- ▶ podle vrcholové rovnice je $o \parallel o_y \Rightarrow \vec{n}_o = (1; 0)$ je normálový vektor přímky-osy o
- ▶ podle obecné rovnice p je $\vec{n}_p = (1; -1)$ normálový vektor přímky p
- ▶ je $\vec{n}_o \parallel \vec{n}_p$? Tj. existuje číslo $k \neq 0$ tak, že $(1; 0) = k(1; -1)$? **Neexistuje!**, tj. $\vec{n}_o \nparallel \vec{n}_p$

$\Rightarrow o \nparallel p \Rightarrow$ **Nejde o sečnu.** \Rightarrow p je tečna paraboly k .

Domácí úkol (zdroj: [Parabola a přímka na realisticky.cz](http://Parabola.a.přímka.na.realisticky.cz))

Určete vzájemnou polohu přímky $x - y - 3 = 0$ a paraboly $x^2 - 4x - y + 1 = 0$.

Příklad 10.7 Najděte rovnici tečny t paraboly $k : (y + 1)^2 = 8(x - 1)$ v jejím bodě $T = [9; 7]$.

$$k : (y - n)^2 = 2p(x - m) \implies t : (y_T - n)(y - n) = p(x_T - m) + p(x - m)$$

$$t : (y_T + 1)(y + 1) = 4(x_T - 1) + 4(x - 1)$$

$$(7 + 1)(y + 1) = 4(9 - 1) + 4(x - 1)$$

$$8(y + 1) = 32 + 4(x - 1)$$

$$-4(x - 1) + 8(y + 1) - 32 = 0$$

$$-4x + 8y - 20 = 0$$

$$t : \underline{\underline{x - 2y + 5 = 0}}$$

Domácí úkol (zdroj: [Parabola a přímka na realisticky.cz](#))

Napište rovnici tečny paraboly v jejím daném bodě (nejdříve dopočítejte jeho chybějící souřadnici):

a) $(x + 1)^2 = 4(y + 2)$, $T = [1; y_T]$, b) $y^2 = -x$, $T = [x_T; 2]$.

Příklad 10.8 Najděte tečny k parabole $k : y^2 - 2y + 4x + 1 = 0$ z bodu $B = [4; 1]$.

Vrcholová rovnice:

$$y^2 - 2y + 4x + 1 = 0$$

$$(y^2 - 2y + 1) - 1 + 4x + 1 = 0$$

$$(y - 1)^2 = -4x$$

$$k : (y - n)^2 = -2p(x - m) \implies t : (y_T - n)(y - n) = -p(x_T - m) - p(x - m)$$

$$t : (y_T - 1)(y - 1) = -2x_T - 2x$$

$$[4; 1] \in t \implies (y_T - 1)(1 - 1) = -2x_T - 2 \cdot 4$$

$$0 = -2x_T - 8 \implies x_T = -4$$

$$[x_T; y_T] \in k \implies \underline{\underline{y_T^2 - 2y_T + 4x_T + 1 = 0}}$$

$$y_T^2 - 2y_T + 4 \cdot (-4) + 1 = 0$$

$$y_T^2 - 2y_T - 15 = 0$$

$$(y_T - 5)(y_T + 3) = 0 \implies y_T = \begin{cases} 5 \\ -3 \end{cases} \implies T = \begin{cases} [-4; 5] \\ [-4; -3] \end{cases}$$

$$T_1 = [-4; 5]$$

$$T_2 = [-4; -3]$$

$$t_1 : (5 - 1)(y - 1) = (-2) \cdot (-4) - 2x$$

$$4y - 4 = 8 - 2x$$

$$2x + 4y - 12 = 0$$

$$\underline{\underline{x + 2y - 6 = 0}}$$

$$t_2 : (-3 - 1)(y - 1) = (-2) \cdot (-4) - 2x$$

$$-4y + 4 = 8 - 2x$$

$$2x - 4y - 4 = 0$$

$$\underline{\underline{x - 2y - 2 = 0}}$$

Domácí úkol (zdroj: [Parabola a přímka na realisticky.cz](#))

Najděte tečny k parabole $k : (y - 2)^2 = 2(x - 1)$ z bodu $B = [-3; 1]$.

Příklad 10.9 Pro jakou hodnotu parametru q je přímka $p : y = x + q$ tečnou paraboly $k : y^2 = 6x$?

Tj. pro jaké q mají jediný společný bod?

Tj. kdy bude mít následující soustava jediné řešení?

$$\begin{aligned} y &= x + q \\ y^2 &= 6x \\ (x + q)^2 &= 6x \\ x^2 + 2qx + q^2 - 6x &= 0 \\ x^2 + (2q - 6)x + q^2 &= 0 \end{aligned}$$

...bude-li diskriminant této kvadratické rovnice nulový, tj. $(2q - 6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot q^2 = 0$

$$4q^2 - 24q + 36 - 4q^2 = 0$$

$$-24q + 36 = 0$$

$$-24q = -36$$

$$q = \frac{3}{2}$$

Nejde o sečnu? (Sečna může mít s parabolou také jediný společný bod.)

To by muselo platit $p \parallel o$. Ale $\vec{n}_p = (1; -1)$ jistě není rovnoběžný s $\vec{n}_o = \vec{n}_x = (0; 1)$. \implies **Nejde o sečnu!**

Příklad 10.10 Okamžitá poloha šikmo vzhůru vrženého tělesa je v homogenním gravitačním poli Země popsána rovnicemi:

$$x = v_0 t \cdot \cos \alpha,$$

$$y = v_0 t \cdot \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2.$$

V případě, že pohyb není brzděn odporovými silami, je jeho trajektorie část paraboly. Určete rovnici paraboly, po jejíž části se pohybuje těleso, které je vrženo pod úhlem $\alpha = 45^\circ$ počáteční rychlostí $v_0 = 10$ m/s. Tíhové zrychlení zaokrouhlete na hodnotu $g = 10$ m/s².

$$x = v_0 t \cdot \cos \alpha = 10 \cdot t \cdot \cos 45^\circ = 10 \cdot t \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} t$$

$$y = v_0 t \cdot \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2 = 10 \cdot t \cdot \sin 45^\circ - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$$

$$= 10 \cdot t \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 5t^2 = 5\sqrt{2} t - 5t^2$$

$$x = 5\sqrt{2} t \implies t = \frac{x}{5\sqrt{2}}$$

$$y = 5\sqrt{2} t - 5t^2$$


$$y = 5\sqrt{2} \cdot \frac{x}{5\sqrt{2}} - 5 \left(\frac{x}{5\sqrt{2}} \right)^2$$

$$y = x - 5 \cdot \frac{x^2}{25 \cdot 2}$$

$$y = x - \frac{x^2}{10}$$

$$10y = 10x - x^2$$

$$\underline{\underline{x^2 - 10x + 10y = 0}} \quad (\text{obecná rovnice})$$



Domácí úkol

- Za jak dlouho vržené těleso dopadne?
- Jak daleko vržené těleso dopadne?

Příklad 10.11 Určete typ kuželosečky

- a) $y^2 + 8x - 4y - 20 = 0$ b) $2x^2 - 3y^2 - 4x - 6y - 1 = 0$
 c) $4x^2 + 4y^2 - 24y + 35 = 0$ d) $4x^2 + y^2 - 8x - 4y + 6 = 0$

a) bez počítání – parabola

b)

$$2x^2 - 3y^2 - 4x - 6y - 1 = 0$$

$$2x^2 - 4x - 3y^2 - 6y - 1 = 0$$

$$2(x^2 - 2x + 1^2) - 2 - 3(y^2 + 2y + 1^2) + 3 - 1 = 0$$


$$2(x - 1)^2 - 3(y + 1)^2 = 0 \quad | : 6$$

$$\frac{(x - 1)^2}{3} - \frac{(y + 1)^2}{2} = 0$$


⇒ Nejde o známou (probranou) kuželosečku

Poznámky ke kuželosečkám**Probrané učivo**

- vybrané kuželosečky – pozor, průnikem roviny a kuželové plochy může být např. bod, přímka, dvě různoběžky...




- vybrané orientace osy (kromě kružnice): buď $o \parallel o_x$ nebo $o \parallel o_y$.
 – hyperbolou je také křivka popsána rovnicí $y = \frac{1}{x}$ (graf lomené funkce)



- problematika kuželoseček je mnohem rozsáhlejší

Uplatnění

- astronomie – pohyb planet po elipse kolem slunce–ohniska, pohyb některých komet po hyperbole
 ► vrh tělesa, rovnoměrně zrychlený pohyb, zakřivení satelitních přijímačů – parabola
 ► nepřímá úměrnost, izotermický děj – hyperbola



Konec
(10. Parabola, příklady)