

Planimetrie

Jaroslav Drobek

jaroslav.drobek@goa-orlova.cz

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

1. Základní geometrické útvary

GOA –
ORLOVA.CZ

Úvod do planimetrie

Planimetrie

- ▶ matematická disciplína zaměřená na studium geometrických útvarů v rovině.

Dva geometrické útvary jsou

- ▶ **různé** (\neq), pokud nesplývají (nepokrývají totéž místo),
- ▶ **totožné** ($=$), pokud splývají (pokrývají totéž místo),
- ▶ **shodné** (\cong), pokud je lze přemístěním ztotožnit.

Přímka a její části

Bod

Bod je idealizované, bezrozměrné místo.

- modelujeme jako průsečík dvou čar
- značíme velkým písmenem
- body A, B jsou
 - a) různé (A nesplývá s B),

$$A \neq B$$

- b) totožné A splývá s B),

$$A = B$$



A^x

B^x

$A = B$
 x

Přímka

Přímka je idealizovaná nekonečná čára.

- ▶ modelujeme jako čáru
- ▶ značíme malým písmenem
- ▶ přímky p, q jsou

a) různé (p nesplývá s q),

$$p \neq q$$

b) totožné (p splývá s q),

$$p = q$$



Bod a přímka


- bod A a přímka p jsou

a) **incidentní** (A leží na p , p prochází A),

$$A \in p$$

b) **neincidentní** (A neleží na p , p neprochází A),


$$A \notin p$$



Dvěma různými body prochází jediná přímka.

- přímku p procházející body $A \neq B$ označujeme také $\leftrightarrow AB$, tj.

$$p \leftrightarrow AB$$




Polopřímka

- ▶ Bod ležící na přímce rozděljuje tuto přímku na dvě navzájem **opačné polopřímky** a je jejich společným **počátkem**
- ▶ Libovolný jiný bod ležící na uvažované přímce je **vnitřním bodem** jedné z těchto polopřímek.

- ▶ bod $P \in p$ je společným počátkem dvou polopřímek
- ▶ bod $A \in p$, $A \neq P$ je vnitřním bodem jedné z těchto polopřímek
- ▶ polopřímku s počátkem P a vnitřním bodem A označujeme

$\mapsto PA$



Úsečka

- ▶ část přímky mezi dvěma jejími různými body, včetně těchto bodů, se nazývá **úsečka**
- ▶ tyto dva různé body se nazývají **krajní body** úsečky
- ▶ všechny ostatní body úsečky se nazývají **vnitřní body** úsečky a tvoří **vnitřek** úsečky.

- ▶ úsečku s krajními body A, B označujeme

AB



- ▶ platí: $AB = (\vec{AB}) \cap (\vec{BA})$.


Délka úsečky

Délka úsečky je vzdálenost jejích krajních bodů.

- délku úsečky AB označujeme

$|AB|$

- jestliže $|AB| > |CD|$, říkáme, že úsečka AB je **větší** než úsečka CD nebo že úsečka CD je **menší** než úsečka AB



Sčítání a odčítání úseček


- ▶ **součet** dvou úseček o délkách a, b je libovolná úsečka o délce $a + b$
- ▶ **rozdíl** dvou úseček o délkách $a, b (a > b)$ je libovolná úsečka o délce $a - b$

- ▶ úsečka EF je součtem úseček AB a CD , protože

$$|EF| = |AB| + |CD|$$

- ▶ úsečka AB je rozdílem úseček EF a CD , protože

$$|AB| = |EF| - |CD|$$



Rovina a úhel

Polorovina

- ▶ Přímka dělí rovinu na dvě navzájem **opačné poloroviny** a je jejich společnou **hranicí** neboli **hraniční přímkou**.
- ▶ Libovolný bod, který **neleží** na hraniční přímce dvou polorovin, je **vnitřním bodem** jedné z těchto polorovin.

- ▶ přímka p je společnou hranicí dvou polorovin
- ▶ bod $M \notin p$ je vnitřním bodem jedné z těchto polorovin
- ▶ polorovinu s hranicí p (popř. $\leftrightarrow AB$) a s vnitřním bodem M označujeme

$\mapsto pM$ (popř. $\mapsto ABM$)

- ▶ polorovinu opačnou k polorovině $\mapsto pM$ (popř. $\mapsto ABM$) označujeme

$\nleftrightarrow pM$ (popř. $\nleftrightarrow ABM$)

Konvexita

- ▶ Geometrický útvar se nazývá **konvexní**, jestliže úsečka s krajními body ležícími v tomto geometrickém útvaru, je částí tohoto útvaru.
- ▶ Geometrický útvar se nazývá **nekonvexní**, jestliže není konvexní.

Všechny doposud uvedené geometrické útvary s výjimkou bodu jsou konvexní.

Úhel

Dvě polopřímky se společným počátkem jednoznačně určují dvojici podmnožin roviny s těmito vlastnostmi:

1. sjednocením těchto podmnožin je celá rovina,
2. průnikem těchto podmnožin jsou právě obě určující polopřímky.

Uvažujme dvě polopřímky se společným počátkem.

- ▶ Každá z dvojice podmnožin určených těmito přímkami se nazývá **úhel**.
- ▶ Uvažované polopřímky se nazývají **ramena** (obou) těchto úhlů.
- ▶ Společný počátek ramen se nazývá **vrchol** (obou) těchto úhlů.
- ▶ Libovolný bod, který neleží na ramenech, je **vnitřním bodem** jednoho z těchto úhlů.

Všimněme si, že ramena jsou součástí každého z dvojice jimi určených úhlů.

Velikost úhlu

Délka oblouku, který je průnikem úhlu a jednotkové kružnice se středem v jeho vrcholu, se nazývá **velikost úhlu**.

Velikost úhlu o hodnotě

1 se nazývá **radián**, označuje se rad ,

$\frac{\pi}{180}$ se nazývá **úhlový stupeň**, označuje se 1° ,

$\frac{\pi}{180} \cdot \frac{1}{60}$ se nazývá **úhlová minuta**, označuje se $1'$,

$\frac{\pi}{180} \cdot \frac{1}{60} \cdot \frac{1}{60}$ se nazývá **úhlová vteřina**, označuje se $1''$.

- ▶ Velikost úhlu se označuje zápisem úhlu ve svislicích, např. $|\sphericalangle AVB|$.
- ▶ Úhel se často ztotožňuje s jeho velikostí a k jeho označení se používá malých písmen řecké abecedy, např. α, β, γ .
- ▶ Úhly lze mezi sebou porovnávat podle velikosti.

Nechť $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha + \beta \leq 2\pi$. Potom **Součtem** dvou úhlů o velikostech α, β rozumíme libovolný úhel o velikosti $\alpha + \beta$.

Nechť $\alpha, \beta \geq 0$, $0 \leq \alpha - \beta \leq 2\pi$. Potom **Rozdílem** dvou úhlů o velikostech α, β (v tomto pořadí) rozumíme libovolný úhel o velikosti $\alpha - \beta$.

Speciální úhly

Každý z dvojice úhlů určených dvěma opačnými přímkami se nazývá **přímý** úhel.

Jeden z dvojice úhlů, které jsou určeny dvěma totožnými polopřímkami, je s těmito polopřímkami totožný a druhý je totožný s celou rovinou.



Úhel totožný se svými rameny se nazývá **nulový**. Úhel totožný s rovinou se nazývá **plný**.

- ▶ Opačné nebo totožné polopřímky určují vždy dvojici konvexních úhlů; tj. přímý, nulový a plný úhel jsou konvexní.
- ▶ Ve všech ostatních případech je jeden z dvojice úhlů konvexní a druhý nekonvexní.

Polopřímka s počátkem ve vrcholu úhlu, která úhel rozděluje na dva shodné úhly, se nazývá **osa** úhlu.

Dva úhly se nazývají

- ▶ **styčné**, mají-li společné jedno rameno, které je zároveň jejich průnikem,
- ▶ **vedlejší**, mají-li jedno rameno společné a jsou-li zbývající ramena opačné polopřímky.

- ▶ vedlejší úhly jsou styčné.
- ▶ každé dva konvexní úhly, nejsou-li oba současně přímé, lze přemístit tak, aby byly styčnými.
- ▶ Každé dva vedlejší úhly jsou konvexní.
- ▶ Ke každému konvexnímu úhlu existuje jiný konvexní úhel tak, že tyto dva úhly jsou vedlejší.

Dva úhly, pro které platí, že ramena jednoho jsou polopřímkami opačnými k ramenům úhlu druhého, se nazývají **vrcholové**.

Vrcholové úhly jsou shodné.

Úhel, který je shodný se svým vedlejším úhlem, se nazývá **pravý**.

Všechny pravé úhly jsou shodné.

Konvexní úhel se nazývá


- ▶ **ostrý**, je-li menší než pravý úhel,
- ▶ **tupý**, je-li větší než pravý úhel,
- ▶ **kosý**, je-li ostrý nebo tupý.

Vzájemná poloha dvou přímek

Dvě přímky jsou **různoběžné**, mají-li jediný společný bod, tzv. **průsečík**.

Je-li P průsečíkem přímek p, q , píšeme

$$P \in p \cap q \quad \text{nebo} \quad p \cap q = \{P\} .$$



Dvě přímky jsou **rovnoběžné**, nejsou-li různoběžné.

Jsou-li přímky p, q rovnoběžné, píšeme $p \parallel q$.



- a) Jsou-li dvě přímky **rovnoběžné různé**, nemají společné body.
- b) Jsou-li dvě přímky **rovnoběžné totožné**, mají všechny své body společné.

- ▶ O polopřímkách a úsečkách ležících na rovnoběžných přímkách říkáme, že jsou **rovnoběžné**.
- ▶ Rovnoběžnost je **reflexivní**, tj.

$$p \parallel p .$$

- ▶ Rovnoběžnost je **symetrická**, tj.

$$p \parallel q \iff q \parallel p .$$

- ▶ Rovnoběžnost je **tranzitivní**, tj.

$$p \parallel q \wedge q \parallel r \implies p \parallel r .$$

Daným bodem lze vést k dané přímce právě jednu rovnoběžku.

Odchylka přímek

Odchylka přímek

- ▶ různoběžných je velikost nejmenšího ze čtyř úhlů, na které tyto různoběžky rozdělují rovinu;
- ▶ rovnoběžných je nula.

- ▶ Dvě přímky jsou **kolmé** (též **kolmice**), je-li jejich odchylka $\frac{\pi}{2}$ (90°).
- ▶ Průsečík kolmých přímek se nazývá **pata kolmice**.
- ▶ Jsou-li přímky p, q kolmé, píšeme $p \perp q$.
- ▶ Význam pojmu kolmice je stejný, uvažujeme-li místo přímky úsečku nebo polopřímku na ní ležící.

Daným bodem lze vést k dané přímce právě jednu kolmici.

The background image shows a modern, multi-story building with a light-colored facade and large windows. The building has a complex, angular design with several protruding sections. In the foreground, there is a paved area and some greenery. A red rectangular box is superimposed over the center of the image, containing white text.

Konec
(1. Základní geometrické útvary)