

# Analytická geometrie

Jaroslav Drobek

[jaroslav.drobek@goa-orlova.cz](mailto:jaroslav.drobek@goa-orlova.cz)

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová


## 8. Elipsa

GOA –  
ORLOVA.CZ

# Rovnice elipsy

**Elipsa** je množina všech bodů v rovině, které mají stejný součet vzdáleností od dvou daných bodů, tzv. **ohnisek** elipsy.

- ▶ Bod  $S$  je **střed** elipsy.
- ▶ Body  $E, F$  jsou **ohniska** elipsy.
- ▶ Body  $A, B$  jsou **hlavní vrcholy** elipsy.
- ▶ Přímka  $AB$  je **hlavní osa** elipsy.
- ▶ Vzdálenost  $|AS|$  ( $= |BS|$ ) je **hlavní poloosa** elipsy; označuje se  **$a$** .
- ▶ Body  $C, D$  jsou **vedlejší vrcholy** elipsy.
- ▶ Přímka  $CD$  je **vedlejší osa** elipsy.
- ▶ Vzdálenost  $|CS|$  ( $= |DS|$ ) je **vedlejší poloosa** elipsy; označuje se  **$b$** .
- ▶ Vzdálenost  $|ES|$  ( $= |FS|$ ) je **výstřednost (excentricita)** elipsy; označuje se  **$e$** .



## Platí

- ▶  $|DE| = |DF| = a$
- ▶  $a^2 = b^2 + e^2$

**Elipsa o středu  $S = [m; n]$  a poloosách  $a, b$** 

► **Středová** rovnice:

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1,$$

je-li  $AB \parallel o_x$ ,

$$\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1,$$

je-li  $AB \parallel o_y$ .

► **Obecná** rovnice:  $px^2 + qy^2 + 2rx + 2sy + t = 0,$

$$\text{kde } \begin{cases} p = b^2, q = a^2, r = -b^2m, s = -a^2n, t = m^2b^2 + n^2a^2 - a^2b^2, & \text{je-li } AB \parallel o_x, \\ p = a^2, q = b^2, r = -a^2m, s = -b^2n, t = m^2a^2 + n^2b^2 - a^2b^2, & \text{je-li } AB \parallel o_y. \end{cases}$$

# Rovnice elipsy

**Příklad 8.1** Najděte středovou a obecnou rovnici elipsy se středem  $S = [2; 1]$ , hlavním vrcholem  $A = [2; 6]$  a ohniskem  $E = [2; -3]$ .

Jak je elipsa orientovaná?  $\dots x_A = 2 = x_S \implies AS \parallel o_y \implies \underline{AB \parallel o_y}$

$$S = [2; 1] \implies m = 2, n = 1,$$

$$a = |AS| = \sqrt{(2-2)^2 + (1-6)^2} = \sqrt{5^2} = 5,$$

$$e = |ES| = \sqrt{(2-2)^2 + (1-(-3))^2} = \sqrt{4^2} = 4,$$

$$b = \sqrt{a^2 - e^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3,$$

► středová: 
$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1$$

► obecná – upravíme středovou:

$$25(x-2)^2 + 9(y-1)^2 = 25 \cdot 9$$

$$25(x^2 - 4x + 4) + 9(y^2 - 2y + 1) = 225$$

$$25x^2 + 9y^2 - 100x - 18y + 100 + 9 - 225 = 0$$

$$\underline{\underline{25x^2 + 9y^2 - 100x - 18y - 116 = 0}}$$

► **Středová** rovnice elipsy pro  $AB \parallel o_y$ :

$$\frac{(x-m)^2}{b^2} + \frac{(y-n)^2}{a^2} = 1,$$

► Výstřednost a poloosy:

$$a^2 = b^2 + e^2$$

► **Obecná** rovnice elipsy:

$$px^2 + qy^2 + 2rx + 2sy + t = 0.$$

## Rovnice elipsy

**Příklad 8.2** Určete střed, ohniska a poloosy elipsy dané rovnicí  $4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0$ .

Zjistíme středovou rovnici – výraz na levé straně upravíme (dvojitým) **doplněním na čtverec**:

$$\begin{aligned}
 4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 &= 0 \\
 4(x^2 + 4x) + 9(y^2 - 2y) - 11 &= 0 \\
 4(x^2 + 4x + 2^2) - 4 \cdot 2^2 &+ 9(y^2 - 2y + (-1)^2) - 9(-1)^2 - 11 = 0 \\
 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 - 16 - 9 - 11 &= 0 \\
 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 &= 36 \\
 \frac{(x + 2)^2}{3^2} + \frac{(y - 1)^2}{2^2} &= 1,
 \end{aligned}$$

odkud  $m = -2$ ,  $n = 1$ ,  $S = [-2; 1]$ ,  $a = 3$ ,  $b = 2$ ,

**Ohniska:** Protože  $AB \parallel o_x$ , platí  $E = [-2 - e; 1]$ ,  $F = [-2 + e; 1]$ ,

kde  $e = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$ , tj.  $E = [-2 - \sqrt{5}; 1]$ ,  $F = [-2 + \sqrt{5}; 1]$ .

► **Středová** rovnice elipsy pro  $AB \parallel o_x$ :

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1,$$

► **Středová** rovnice elipsy pro  $AB \parallel o_y$ :

$$\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1,$$

► **Výstřednost** a poloosy:

$$a^2 = b^2 + e^2$$

## Rovnice elipsy

**Příklad 8.3** Určete střed, ohniska a poloosy elipsy dané rovnicí  $x^2 + 3x + 3y^2 + 3 = 0$ .

Zjistíme středovou rovnici – výraz na levé straně upravíme (dvojitým) **doplněním na čtverec**:

$$x^2 + 3x + 3y^2 + 3 = 0$$

$$\left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3y^2 + 3 = 0$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + 3y^2 - \frac{9}{4} + 3 = 0$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + 3y^2 = -\frac{3}{4}$$

$$-\frac{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2}{\frac{3}{4}} - \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1$$

$$-\frac{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} - \frac{y^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1$$

► **Středová** rovnice elipsy pro  $AB \parallel o_x$ :

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1,$$

► **Středová** rovnice elipsy pro  $AB \parallel o_y$ :

$$\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1,$$

... nelze upravit do středového tvaru elipsy  
 $\Rightarrow$  nejde o elipsu

# Přímka a elipsa

Jestliže pro přímku  $p$  a elipsu  $k$  platí

- ▶  $p \cap k = \emptyset$ , přímka  $p$  **leží vně** elipsy  $k$  a nazývá se **vnější přímka** elipsy.
- ▶  $p \cap k = \{P\}$ , přímka  $p$  **se dotýká** elipsy  $k$  v bodě  $P$  a nazývá se **tečna** elipsy  $k$ .
- ▶  $p \cap k = \{P, Q\}$ , přímka  $p$  **protíná** elipsu  $k$  v bodech  $P$  a  $Q$  a nazývá se **sečna** elipsy  $k$ .

**Příklad 8.4** Určete vzájemnou polohu přímky  $p : x - 3y + 1 = 0$  a elipsy  $k : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ .

- ▶ Vyšetřujeme množinu  $p \cap k$ , tj. hledáme body  $[x; y]$  takové, že  $[x; y] \in p \wedge [x; y] \in k$ .
- ▶ Bod patří do nějakého objektu, splňují-li jeho souřadnice rovnici tohoto objektu:

$$[x; y] \in p \iff x - 3y + 1 = 0$$

$$[x; y] \in k \iff \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

- ▶ Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých ... má dvě řešení.

$\implies$  Přímka  $p$  je sečnou elipsy  $k$ .

## Tečna elipsy

**Tečna elipsy o středu  $S = [m; n]$  a poloosách  $a, b$  v bodě  $T = [x_T; y_T]$**

$$\frac{(x_T - m)(x - m)}{a^2} + \frac{(y_T - n)(y - n)}{b^2} = 1, \quad \text{je-li } AB \parallel o_x,$$

$$\frac{(x_T - m)(x - m)}{b^2} + \frac{(y_T - n)(y - n)}{a^2} = 1, \quad \text{je-li } AB \parallel o_y.$$


**Příklad 8.5** Najděte rovnici tečny  $t$  elipsy

$$k: \frac{(x - 2)^2}{10} + \frac{(y - 3)^2}{40} = 1 \quad \text{v bodě } T = [3; 9].$$

$$\frac{(3 - 2)(x - 2)}{10} + \frac{(9 - 3)(y - 3)}{40} = 1$$

(dopočítejte)  $\vdots$

$$\underline{\underline{t: 2x + 3y - 33 = 0}}$$





## Tečna elipsy

**Příklad 8.6** Napište rovnici tečny k elipse  $k: \frac{(x+1)^2}{32} + \frac{(y-2)^2}{2} = 1$ , která je kolmá k přímce  $p: 4x - y + 5 = 0$ .

- Označíme-li  $T = [x_T, y_T]$  bod dotyku, má tečna rovnici

$$\frac{(x_T + 1)(x + 1)}{32} + \frac{(y_T - 2)(y - 2)}{2} = 1$$

$$(x_T + 1)(x + 1) + 16(y_T - 2)(y - 2) = 32$$

$$(x_T + 1)x + x_T + 1 + 16(y_T - 2)y - 32(y_T - 2) = 32$$

$$(x_T + 1)x + (16y_T - 32)y + c = 0$$

s normálovým vektorem  $\vec{n}_t = (x_T + 1; 16y_T - 32)$ .

- Protože  $\vec{n}_p = (4; -1)$  je normálovým vektorem přímky  $p$ , musí platit  $\vec{n}_t \perp \vec{n}_p$ , tj.

$$\vec{n}_t \cdot \vec{n}_p = 0$$

$$(x_T + 1; 16y_T - 32) \cdot (4; -1) = 0$$

$$4x_T + 4 - 16y_T + 32 = 0$$

$$x_T - 4y_T + 9 = 0$$

- Současně platí  $T \in k$ , tj.

$$(x_T + 1)^2 + 16(y_T - 2)^2 = 32$$

- Souřadnice bodu  $T$  lze tedy najít jako řešení soustavy

$$x_T - 4y_T + 9 = 0$$

$$(x_T + 1)^2 + 16(y_T - 2)^2 = 32$$

$$\dots T = [-5; 1], T' = [3; 3]$$

- Parametrická rovnice hledané tečny je  $-4x - 16y - 4 = 0$

$$t: x + 4y + 1 = 0$$

$$4x + 16y - 60 = 0$$

$$t': x + 4y - 15 = 0$$

# Tečna elipsy

**Příklad 8.7** Najděte tečny k elipse  $k : 5x^2 + 9y^2 - 45 = 0$  z bodu  $Z = [0; -3]$ .

- Označíme-li  $T = [x_T, y_T]$  bod dotyku, má tečna rovnici

$$t : 5x_T x + 9y_T y - 45 = 0.$$

- Protože  $Z \in t$ , platí  $5x_T \cdot 0 + 9y_T \cdot (-3) - 45 = 0$

$$y_T = -\frac{5}{3}$$

- Současně platí  $T \in k$ , tj.  $5x_T^2 + 9y_T^2 - 45 = 0$

- Souřadnice bodu  $T$  lze tedy najít jako řešení soustavy

$$y_T = -\frac{5}{3}$$

$$5x_T^2 + 9y_T^2 - 45 = 0$$

$$\dots T = [2; -\frac{5}{3}], T' = [-2; -\frac{5}{3}]$$

- Parametrická rovnice hledané tečny je

$$5 \cdot 2 \cdot x + 9 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot y - 45 = 0$$

$$\underline{\underline{t : 2x - 3y - 9 = 0}}$$

$$5 \cdot (-2) \cdot x + 9 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot y - 45 = 0$$

$$\underline{\underline{t' : 2x + 3y + 9 = 0}}$$



**Konec**  
(8. Elipsa)