

Extremální úlohy

Diferenciální počet


Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D.

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Bakalářská matematika I




Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.


$$n_d = 2n_p$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$


$$n_d = 2n_p$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$\begin{aligned} N &= N_d + N_p \\ &= S_d \cdot n_d \end{aligned}$$


$$n_d = 2n_p$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$\begin{aligned} N &= N_d + N_p \\ &= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p \end{aligned}$$

$$n_d = 2n_p$$




Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \quad \cdot n_d + \quad \cdot n_p$$




Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + \quad \cdot n_p$$

$$n_d = 2n_p$$




Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.


$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot$$

$$n_d = 2n_p$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.


$$N = N_d + N_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot 2n_p$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.


$$N = N_d + N_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$


$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$


$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$


$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2}$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$


$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$


$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$


$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$


$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$


$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$

$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$


$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$


$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$

Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$


$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$


$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$


$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$

0		$\sqrt[3]{16}$	
x x x		-	+

Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$


$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$


$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$


$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$


$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$



Funkce N nabývá lok. min. pro $r = \sqrt[3]{16}$;

Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$


$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$

$$n_d = 2n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$v = \frac{32}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$

0	↘	$\sqrt[3]{16}$	↗
x	x	x	x
	-		+

Funkce N nabývá lok. min. pro $r = \sqrt[3]{16}$; tomu odpovídá $v = \frac{32}{r^2} = \dots = 4\sqrt[3]{2}$.

Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$


$$v = \frac{32}{r^2}$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$

$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$

0			↘		↗
x x x			-		+
					$\sqrt[3]{16}$

Funkce N nabývá lok. min. pro $r = \sqrt[3]{16}$; tomu odpovídá $v = \frac{32}{r^2} = \dots = 4\sqrt[3]{2}$.

\implies Náklady budou minimální při rozměrech $\underline{\underline{r = \sqrt[3]{16} \doteq 2.5, v = 4\sqrt[3]{2} \doteq 5.}}$

Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$


$$v = \frac{32}{r^2}$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$

$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$

$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$

	0	\searrow	$\sqrt[3]{16}$	\nearrow
x	x	x		-
				+

Funkce N nabývá lok. min. pro $r = \sqrt[3]{16}$; tomu odpovídá $v = \frac{32}{r^2} = \dots = 4\sqrt[3]{2}$.

\implies Náklady budou minimální při rozměrech $r = \sqrt[3]{16} \doteq 2.5$, $v = 4\sqrt[3]{2} \doteq 5$.

(... pro $n_p = 100$, - je $N(\sqrt[3]{16}) = 11\,969$, - ,)



Příklad 1.1: Válcový sud má mít objem $32\pi \text{ m}^3$. Náklady na výrobu 1 m^2 pláště jsou poloviční ve srovnání s náklady na výrobu 1 m^2 dna sudu. Navrhněte rozměry sudu tak, aby náklady na jeho výrobu byly minimální.

$$N = N_d + N_p$$

$$n_d = 2n_p$$

$$= S_d \cdot n_d + S_p \cdot n_p$$

$$= \pi r^2 \cdot n_d + 2\pi r v \cdot n_p$$

$$32\pi = \pi r^2 v$$

$$N(r) = \pi r^2 \cdot 2n_p + 2\pi r \frac{32}{r^2} \cdot n_p$$


$$v = \frac{32}{r^2}$$

$$= 2\pi n_p (r^2 + 32r^{-1})$$


$$N'(r) = 2\pi n_p (2r - 32r^{-2})$$

$$= 4\pi n_p \frac{r^3 - 16}{r^2}$$

$$= 4\pi n_p \frac{(r - \sqrt[3]{16}) \overbrace{(r^2 + \dots)}^{>0}}{r^2}$$



$$N'(r) = 0 \iff r = \sqrt[3]{16}$$



Funkce N nabývá lok. min. pro $r = \sqrt[3]{16}$; tomu odpovídá $v = \frac{32}{r^2} = \dots = 4\sqrt[3]{2}$.

\implies Náklady budou minimální při rozměrech $r = \sqrt[3]{16} \doteq 2.5$, $v = 4\sqrt[3]{2} \doteq 5$.


(... pro $n_p = 100$, - je $N(\sqrt[3]{16}) = 11\,969$, - , $N(2) = 12566$, -)

Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .


Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .



Příklad 1.2:


Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .



Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .


$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 v$$



Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 v$$




$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

Příklad 1.2:

Navrhňte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 v$$




$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v$$




$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$


Příklad 1.2:

Navrhňte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2)$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$


Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:


Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$

$$V'(v) = 0$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:


Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$

$$V'(v) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:



Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:

Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .


$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$

$$\begin{array}{ccccccc} & 0 & & \frac{4}{3}R & & 2R & \\ \times & \times & \times & | & + & | & - & | & \times & \times & \times \end{array}$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:



Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:


Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$


$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$

$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



Funkce V nabývá lok. max. pro $v = \frac{4}{3}R$.



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.2:


Navrhněte výšku kužele s největším objemem vepsaného do koule o poloměru R .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$V(v) = \frac{1}{3}\pi(2vR - v^2)v = \frac{1}{3}\pi(2Rv^2 - v^3)$$


$$V'(v) = \frac{1}{3}\pi(4Rv - 3v^2) = \frac{1}{3}\pi v(4R - 3v)$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



Funkce V nabývá lok. max. pro $v = \frac{4}{3}R$.

\implies Objem bude největší při výšce $\underline{\underline{v = \frac{4}{3}R}}$.



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$


Příklad 1.3:

Navrhnete výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

Příklad 1.3:

Navrhňte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .


$$P = \pi rs$$



Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$




$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \end{aligned}$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$


$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$


$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$


$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2}$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$


$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$\begin{aligned}
 P &= \pi r s \\
 &= \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR}
 \end{aligned}$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$


$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi r s$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR}$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$


$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi r s$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$


Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$P'(v) = \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2)$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$


Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$


Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:


Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$

$$V'(v) = 0$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:


Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$

$$V'(v) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:



Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi r s$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:

Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .


$$P = \pi rs$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$

$$\begin{array}{ccccccc} & 0 & & \frac{4}{3}R & & 2R & \\ \times & \times & \times & | & + & | & - & | & \times & \times & \times \end{array}$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:



Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi r s$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$

$$V'(v) = 0 \iff v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



$$r^2 = R^2 - (v - R)^2$$

$$= 2vR - v^2$$

$$r = \sqrt{2vR - v^2}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:


Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi rs$$


$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$

$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$

$$V'(v) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



Funkce P nabývá lok. max. pro $v = \frac{4}{3}R$.



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \\ r &= \sqrt{2vR - v^2} \end{aligned}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.3:


Navrhněte výšku kužele s největším obsahem pláště vepsaného do koule o poloměru R .

$$P = \pi r s$$

$$P(v) = \pi \sqrt{2vR - v^2} \cdot \sqrt{2vR} = \pi \sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}$$


$$\begin{aligned} P'(v) &= \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4R^2 v^2 - 2Rv^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (8R^2 v - 6Rv^2) \\ &= \frac{\pi(8R^2 v - 6Rv^2)}{2\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} = \frac{\pi Rv(4R - 3v)}{\sqrt{4R^2 v^2 - 2Rv^3}} \end{aligned}$$

$$V'(v) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v_1 = 0 \quad \vee \quad v_2 = \frac{4}{3}R$$



Funkce P nabývá lok. max. pro $v = \frac{4}{3}R$.

\Rightarrow Obsah pláště bude největší při výšce $\underline{\underline{v = \frac{4}{3}R}}$.



$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (v - R)^2 \\ &= 2vR - v^2 \\ r &= \sqrt{2vR - v^2} \end{aligned}$$

$$s^2 = r^2 + v^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} = \sqrt{2vR}$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$a = 10 - 2c$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádru má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$= (10 - 2c)(10 - 2c)c$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kváдру má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádra má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$


$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$



Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádru má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & \frac{5}{3} & & 5 \\ & & | & & | & & | \\ \times & \times & \times & | & + & | & - & | & \times & \times & \times \end{array}$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádra má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$


$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$



Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádru má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$


$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$



Funkce V nabývá lok. max. pro $c = \frac{5}{3}$.

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádru má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$


$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$



Funkce V nabývá lok. max. pro $c = \frac{5}{3}$.

$$\dots b = a = 10 - 2 \cdot \frac{5}{3}$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádra má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$


$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$



Funkce V nabývá lok. max. pro $c = \frac{5}{3}$.

$$\dots b = a = 10 - 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{20}{3}$$

Příklad 1.4:

Plášť nahoře otevřené krabičky ve tvaru kvádru má být pořízen ze čtvercového listu papíru o straně 10 cm odstraněním čtverců v jeho rozích. Navrhněte rozměry krabičky tak, aby její objem byl maximální.

$$V = a \cdot b \cdot c$$


$$2c + a = 10$$

$$b = a = 10 - 2c$$

$$V(c) = (10 - 2c)(10 - 2c)c = 4c^3 - 40c^2 + 100c$$

$$V'(c) = 12c^2 - 80c + 100 = 12\left(c - \frac{5}{3}\right)(c - 5)$$

$$V'(c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 = \frac{5}{3} \quad \vee \quad c_2 = 5$$



Funkce V nabývá lok. max. pro $c = \frac{5}{3}$.

$$\dots b = a = 10 - 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{20}{3}$$

\implies Objem krabičky bude největší při rozměrech $a = b = \frac{20}{3}$ cm, $c = \frac{5}{3}$ cm.

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$= \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$\dots \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$

$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$

$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$

$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$

$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\alpha_0 = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$


$$d'(\alpha) = 0$$

$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\alpha_0 = \arctg \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$



Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$


$$d'(\alpha) = 0$$

$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\alpha_0 = \arctg \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$



Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$


$$d'(\alpha) = 0$$

$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\alpha_0 = \arctg \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$



Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$


$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\alpha_0 = \arctg \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

Funkce d nabývá lok. min. pro $\alpha = \alpha_0$.



Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$


$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\alpha_0 = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

Funkce d nabývá lok. min. pro $\alpha = \alpha_0$.



$\implies d(\alpha_0)$ je největší délka trámu,

Příklad 1.5:

Z kanálu šířky a vychází pod pravým úhlem kanál šířky b . Zjistěte největší délku d trámu, který je možno splavit z jednoho kanálu do druhého.

$$d = d_a + d_b$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{d_a} \implies d_a = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{d_b} \implies d_b = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$d(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha} = a \sin^{-1} \alpha + b \cos^{-1} \alpha \quad \dots \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$d'(\alpha) = -a \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + b \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{b \sin^3 \alpha - a \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$d'(\alpha) = 0$$


$$\sqrt[3]{b} \sin \alpha - \sqrt[3]{a} \cos \alpha = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

$$\alpha_0 = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

Funkce d nabývá lok. min. pro $\alpha = \alpha_0$.



$$\implies d(\alpha_0) \text{ je největší délka trámu, tj. } \underline{\underline{a \sin^{-1} \left(\operatorname{arctg} \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \right) + b \cos^{-1} \left(\operatorname{arctg} \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \right)}}$$



Příklad 1.6:

Ponorka pluje směrem na východ, loď pluje směrem na jih. Ponorka i loď směřují k bodu ○. Rychlost ponorky je 30 km/h a rychlost lodi je 40 km/h. V okamžiku vyplutí byla ponorka od bodu ○ vzdálena 200 km a loď byla od bodu ○ vzdálena 150 km. Dostřel torpéd ponorky je 3 km. Má ponorka šanci zasáhnout loď?

... ne, jejich nejmenší vzdálenost bude 70 km

Příklad 1.7:

Muž plující ve člunu na jezeře je od přímé části břehu jezera vzdálen 1 km. Nejbližší pobřežní bod je od bodu Q ležícího na stejné části pobřeží vzdálen 10 km. Muž je schopen plout rychlostí 3 km/h a jít rychlostí 5 km/h. Navrhněte trasu, po které se muž dostane k bodu Q za nejkratší dobu.

Lomená čára VPQ , (kde V je výchozí poloha muže a P je bod na přímé části břehu vzdálený $\frac{37}{4}$ km od bodu Q a $\frac{5}{4}$ km od bodu V).

Konec
(Extremální úlohy)