

Analytická geometrie



Jaroslav Drobek

jaroslav.drobek@goa-orlova.cz

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

8. Elipsa, příklady

GOA –
ORLOVA.CZ



Příklad 8.1 Najděte středovou a obecnou rovnici elipsy, je-li $F = [5; 6]$, $A = [5; -2]$, $B = [5; 8]$.

$$x_A = 5 = x_B \implies AB \parallel o_y \implies \frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1$$

$$a = |AS| = \frac{1}{2} |AB| = \frac{1}{2} \sqrt{(5 - 5)^2 + (-2 - 8)^2} = 5$$

$$S = \frac{1}{2}(A + B) = [5; 3] \implies m = 5, n = 3$$

$$e = |FS| = \sqrt{(5 - 5)^2 + (6 - 3)^2} = 3$$

$$b = \sqrt{a^2 - e^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

$$\ell \quad \frac{(x - 5)^2}{4^2} + \frac{(y - 3)^2}{5^2} = 1 \quad | \cdot 4^2 \cdot 5^2$$

$$25(x - 5)^2 + 16(y - 3)^2 = 16 \cdot 25$$

$$25(x^2 - 10x + 25) + 16(y^2 - 6y + 9) = 400$$

$$25x^2 + 16y^2 - 250x - 96y + 625 + 144 = 400$$

$$\underline{\ell \quad 25x^2 + 16y^2 - 250x - 96y + 369 = 0}$$


$$px^2 + qy^2 + 2rx + 2sy + t = 0$$

Domácí úkol (zdroj: [Středová rovnice elipsy na realisticky.cz](#))

Napiš středovou rovnici elipsy,

a) jejíž osy jsou rovnoběžné se souřadnými osami a $C = [2; -1]$, $E = [1; 1]$.

b) která je shodná s elipsou $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ a má $S = [2; -1]$.



Příklad 8.2 Najděte střed, poloosy, výstřednost, ohniska, a vrcholy elipsy $9x^2 + 16y^2 - 54x + 64y + 1 = 0$.

Najít středovou rovnici:

$$\begin{aligned}
 & (9x^2 - 54x) + (16y^2 + 64y) + 1 = 0 \\
 & 9(x^2 - 6x + 3^2) + (16y^2 + 64y) + 1 = 9 \cdot 3^2 \\
 & 9(x^2 - 6x + 3^2) + 16(y^2 + 4y + 2^2) + 1 = 9 \cdot 3^2 + 16 \cdot 2^2 \\
 & 9(x - 3)^2 + 16(y + 2)^2 = 9 \cdot 3^2 + 16 \cdot 2^2 - 1 \\
 & 9(x - 3)^2 + 16(y + 2)^2 = 144 \quad | : 144 \\
 & \frac{9(x - 3)^2}{144} + \frac{16(y + 2)^2}{144} = 1 \\
 & \frac{(x - 3)^2}{16} + \frac{(y + 2)^2}{9} = 1 \\
 & \frac{(x - 3)^2}{4^2} + \frac{(y + 2)^2}{3^2} = 1
 \end{aligned}$$

$$AB \parallel o_x, m = 3, n = -2$$

$$S = [3; -2], a = 4, b = 3$$

$$e = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{7}, E = [3 - \sqrt{7}; -2], F = [3 + \sqrt{7}; -2]$$

$$A = [3 - 4; -2] = [-1; -2], B = [3 + 4; -2] = [7; -2]$$

$$C = [3; -2 - 3] = [3; -5], D = [3; -2 + 3] = [3; 1]$$

středová: $\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1, \quad (AB \parallel o_x)$

Domácí úkol (zdroj: [Obecná rovnice elipsy na realisticky.cz](#))

Najděte střed, poloosy, výstřednost, ohniska, a vrcholy elipsy,

- a) $4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0$.
- b) $9x^2 + 4y^2 - 18x - 8y + 14 = 0$.
- c) $25x^2 + 16y^2 - 100x + 32y + 115 = 0$.

Zápis z online hodiny 26.3.2021

Příklad 8.3 Určete vzájemnou polohu přímky $p: x + y = 0$ a elipsy $\ell: \frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$.

$$\begin{aligned} x + y &= 0 && \Rightarrow y = -x \\ \frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{16} &= 1 \end{aligned}$$


$$\frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(-x-2)^2}{16} = 1$$

$$\begin{aligned} 16(x+1)^2 + 25(-x-2)^2 &= 16 \cdot 25 \\ 16(x^2 + 2x + 1) + 25(x^2 + 4x + 4) &= 400 \\ 41x^2 + 132x + 116 &= 400 \\ 41x^2 + 132x - 284 &= 0 \end{aligned}$$

$$D = 132^2 - 4 \cdot 41 \cdot (-284) = 132^2 + 4 \cdot 41 \cdot 284 > 0 \Rightarrow 2 \text{ řešení} \Rightarrow 2 \text{ společné body} \Rightarrow p \text{ je sečna } \ell$$

Domácí úkol (zdroj: [Elipsa a přímka na realisticky.cz](#))

Určete vzájemnou polohu přímky $p: x + y - 1 = 0$ a elipsy $\ell: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.



Příklad 8.4 Najděte rovnici tečny t elipsy

$$\ell : \frac{(x-2)^2}{10} + \frac{(y-3)^2}{40} = 1 \quad v \text{ bodě } T = [1; -3].$$

$$\Rightarrow t : \frac{(x_T - m)(x - m)}{b^2} + \frac{(y_T - n)(y - n)}{a^2} = 1,$$

$$\frac{(1-2)(x-2)}{10} + \frac{(-3-3)(y-3)}{40} = 1 \quad | \cdot 40$$

$$-4(x-2) - 6(y-3) = 40$$

$$-4x + 8 - 6y + 18 = 40$$

$$-4x - 6y - 14 = 0$$

$$\underline{\underline{t : 2x + 3y + 7 = 0}}$$

Domácí úkol (zdroj: [Elipsa a přímka na realisticky.cz](#))

1. Urči rovnici tečny elipsy $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-4)^2}{16} = 1$ v bodě $T = [0; \frac{36}{5}]$
2. Urči rovnici tečny elipsy $5x^2 + 9y^2 - 45 = 0$ procházející bodem $A = [0; -3]$.

Zápis z online hodiny 30.3.2021

Příklad 8.5 Najděte tečny k elipse $\ell : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ z bodu $B = [-6; -2]$.

$$\Rightarrow t : \frac{(x_T - m)(x - m)}{a^2} + \frac{(y_T - n)(y - n)}{b^2} = 1,$$

$$m = n = 0, a^2 = 9, b^2 = 4 \Rightarrow t : \frac{x_T x}{9} + \frac{y_T y}{4} = 1$$

$$t : 4x_T x + 9y_T y = 36$$

$$[-6; -2] \in t \Rightarrow 4x_T \cdot (-6) + 9y_T \cdot (-2) = 36$$

$$-24x_T - 18y_T = 36$$

$$\underline{-4x_T - 3y_T = 6} \quad \Rightarrow 3y_T = -4x_T - 6$$

$$[x_T; y_T] \in \ell \Rightarrow \frac{x_T^2}{9} + \frac{y_T^2}{4} = 1$$

$$\underline{4x_T^2 + 9y_T^2 = 36}$$

$$4x_T^2 + (3y_T)^2 = 36$$

$$4x_T^2 + (-4x_T - 6)^2 = 36$$

$$4x_T^2 + 16x_T^2 + 48x_T + 36 = 36$$

$$20x_T^2 + 48x_T = 0$$

$$4x_T(5x_T + 12) = 0$$

$$x_T = \begin{cases} 0 \\ -\frac{12}{5} \end{cases} \Rightarrow y_T = \frac{1}{3}(-4x_T - 6) = \begin{cases} -2 \\ \frac{6}{5} \end{cases} \Rightarrow T = \begin{cases} [0; -2] \\ [-\frac{12}{5}; \frac{6}{5}] \end{cases}$$

$$T = [0; -2] :$$

$$t_1 : 4 \cdot 0 \cdot x + 9 \cdot (-2) \cdot y = 36$$

$$-18y = 36$$

$$\underline{y = -2}$$

$$T = [-\frac{12}{5}; \frac{6}{5}] :$$

$$t_2 : 4 \cdot (-\frac{12}{5}) \cdot x + 9 \cdot \frac{6}{5} \cdot y = 36 \quad | \cdot 5$$

$$-48x + 54y = 180 \quad | : (-6)$$

$$\underline{8x - 9y + 30 = 0}$$

Konec

(8. Elipsa, příklady)