

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Yasmin Tavares Aguiar

10.5 / 20

REPROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	1.5	Parcial (75%)
2	2.0	1.0	Insuf. (50%)
3A	2.0	1.5	Parcial (75%)
3B	2.0	1.0	Insuf. (50%)
3C	2.0	1.5	Parcial (75%)
4	2.0	1.5	Parcial (75%)
5	2.0	0.5	Insuf. (25%)
6	2.0	0.5	Insuf. (25%)
7	2.0	0.5	Insuf. (25%)
8	2.0	1.0	Insuf. (50%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Identificou nucleo definido (eucariotico)
- Mencionou que nao produzem proprio alimento (heterotrofico)
- Relacionou heterotrofismo com necessidade de invadir hospedeiro

O que estava incorreto:

- Organizacao estrutural simples e incorreto - fungos sao complexos por serem eucarioticos

O que faltou:

- Mencionar organelas membranosas
- Explicitar que semelhanca celular com humanos limita alvos terapeuticos seletivos

Feedback: Resposta com os conceitos basicos corretos sobre eucarioto e heterotrofo. Porem, afirmar que possuem organizacao estrutural simples contradiz a classificacao eucariotica. Faltou vincular a semelhanca celular a escassez de alvos terapeuticos.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Identificou ergosterol como componente da membrana plasmatica
- Mencionou estabilidade e fluidez
- Diferenciou do colesterol humano e mencionou seletividade

O que estava incorreto:

- Afirmacao de que ergosterol contribui para resistencia e sobrevivencia dos fungos e imprecisa neste contexto

O que faltou:

- Citar mecanismos de acao: azolicos inibem sintese, polienicos ligam-se ao ergosterol
- Explicar consequencia: perda de integridade da membrana e morte celular

Feedback: Identificou corretamente a funcao estrutural e a seletividade terapeutica. Contudo, faltou detalhar os mecanismos de acao dos antifungicos e a consequencia da ausencia de ergosterol na membrana.

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esteroide da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Identificou leveduras como unicelulares
- Mencionou formato oval ou esferico
- Citou reproducao por brotamento
- Mencionou pseudomicelio

O que estava incorreto:

- Afirmou no final que sao fungos filamentosos - contradicao direta com o restante da resposta

Feedback: Resposta com todos os elementos morfologicos corretos, porem a frase final afirmando que sao fungos filamentosos contradiz toda a resposta anterior. Cuidado com contradicoes que comprometem a coerencia.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Definiu micelio como conjunto de hifas
- Mencionou corpo vegetativo dos fungos filamentosos
- Citou rede ramificada e absorcao de nutrientes

O que faltou:

- Mencionar hifas septadas ou cenocíticas
- Diferenciar micelio vegetativo de micelio aereo/reprodutivo

Feedback: Definicao basica correta. Faltou mencionar os tipos de hifas (septadas/cenocíticas) e a organizacao em micelio vegetativo e reprodutivo com suas funcoes distintas.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Definiu dimorfismo como alternancia entre levedura e micelio
- Relacionou com mudancas ambientais como temperatura
- Mencionou forma leveduriforme como invasiva no hospedeiro
- Citou adaptacao e sobrevivencia

O que faltou:

- Especificar temperaturas (25C ambiente, 37C hospedeiro)
- Mencionar evasao do sistema imune
- Citar dificuldade diagnostica

Feedback: Boa resposta com os conceitos fundamentais do dimorfismo. Para nota maxima, faltou especificar as temperaturas de transicao e detalhar mecanismos de evasao imune e impacto no diagnostico.

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Identificou que KOH dissolve células epiteliais
- Mencionou visualização de estruturas fúngicas ao microscópio
- Citou método rápido e de baixo custo

O que estava incorreto:

- Afirmacao de que é geralmente utilizado em infeccoes com alta carga fungica e imprecisa - KOH é usado em qualquer suspeita

O que faltou:

- Explicar que a parede celular fungica (quitina) resiste ao KOH
- Mencionar dissolucao especifica de queratina

Feedback: Resposta adequada no principio geral. Faltou o mecanismo de preservacao das estruturas fungicas pela resistencia da quitina ao meio alcalino. O KOH nao se limita a infeccoes com alta carga fungica.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencionou baixa gravidade

O que estava incorreto:

- Definiu micose superficial pela quantidade elevada de fungos (carga fungica) - isso nao e criterio definidor
- Transmissibilidade em ambientes coletivos nao e caracteristica definidora de micose superficial

O que faltou:

- Definir como infeccao restrita a camada cornea da epiderme
- Mencionar ausencia de invasao de tecidos vivos
- Mencionar ausencia de resposta inflamatoria significativa
- Citar exemplos (pitiríase versicolor, piedra)

Feedback: Resposta incorreta no conceito principal. Micose superficial nao se define pela carga fungica ou transmissibilidade, mas pela restricao a camada cornea sem invasao tecidual e sem inflamacao significativa.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitiríase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencionou que cutaneas tem maior gravidade que superficiais

O que estava incorreto:

- Afirmou que cutaneas sao menos transmissiveis - nao e criterio de diferenciacao correto
- Disse que cutaneas sao menos comuns na pratica clinica - na verdade sao muito comuns

O que faltou:

- Diferenciar pela localizacao anatomica: superficiais (camada cornea) vs cutaneas (epiderme/derme)
- Mencionar presenca/ausencia de resposta inflamatoria
- Citar agentes etiologicos (Malassezia vs dermatofitos)
- Mencionar sintomas das cutaneas (prurido, descamacao, lesoes ativas)

Feedback: Resposta muito incompleta e com informacoes incorretas. A diferenciacao deve ser feita pela profundidade de acometimento, presenca de inflamacao e agentes etiologicos, nao por transmissibilidade ou frequencia clinica.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como *Malassezia* e *Piedraia*, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (*Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencionou indiretamente que aproveitam condicoes do hospedeiro

O que estava incorreto:

- Definiu oportunismo pela transmissibilidade em ambientes coletivos - isso nao define oportunismo
- Associou a umidade e falta de higiene como fatores de oportunismo - impreciso

O que faltou:

- Explicar que Candida faz parte da microbiota normal humana
- Mencionar que em condicoes normais nao causa doenca (equilibrio)
- Citar fatores de quebra de defesas: imunossupressao, antibioticos, dispositivos invasivos

Feedback: Resposta com conceito equivocado de oportunismo. O fundamental e que Candida e comensal da microbiota normal e so causa doenca quando ha quebra das defesas do hospedeiro, nao pela transmissibilidade ambiental.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: **1.0** / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Mencionou que existem fungos beneficos ao organismo
- Deu exemplo da Candida como parte do organismo sem necessariamente indicar infeccao

O que faltou:

- Mencionar possibilidade de contaminacao da amostra
- Explicar necessidade de correlacao clinica
- Diferenciar claramente colonizacao, contaminacao e infeccao ativa

Feedback: Resposta parcial. O exemplo da Candida e pertinente, mas faltou abordar a contaminacao da amostra e a necessidade de correlacao clinica para diferenciar colonizacao de infeccao ativa.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como Candida na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

UNIPAC / FUPAC – Ciências da Saúde – Micologia Clínica

Prof.: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Yasmim T. Aguiar Nota:

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- Caracterize morfologicamente as leveduras.**
- Defina micélio e relacione sua organização.**
- Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.**

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Respostas:

- 1) Eles são classificados como eucarióticos heterotróficos pois eles possuem núcleo individualizado em sua estrutura celular - e não possuem seu próprio alimento. E isso impacta na sua patogenicidade pois eles dependem de outro ser vivo para sobreviver. Também sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes aumentando sua patogenicidade.
- 2) O ergosterol está presente na membrana celular fúngica. Ela contribui para a adaptação e no desenvolvimento de fungos seletivos. Essa estrutura é o principal alvo pois ela quem permite a resistência e a sobrevivência dos fungos.
- 3) a) São fungos filamentosos.
b) São estruturas que permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos.
c) A capacidade de alterar sua forma de crescimento e sua adaptação aumentando sua virulência e sua arquitetura influenciando na sua patogenicidade.

Shirley de Souza

Na saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

UN
Cli
Prc
Alu
—
Na
sig
em
em
iml
mo
apri
infl
difi
adi
am
des
fun
inf
est
inte
cel
enf
1. l
eu
pai
A e
cor
esj
pri
lim
afe
cel
difi
de:
mu
me
esl
res
ca:
es
da
me
2.
ex
an
Os
qu
ele
na
pri
da
eti
es
ad
de
Nc
co
As
tai

Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados e superinfecções.

Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapêias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

4) O uso de KOH no exame micológico direto deve-se devido ao seu baixo custo e rapidez nos resultados do uso clínico. Além de ser executado de forma simples o que permite sua aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. O uso de KOH é importante pois ajuda na visualização e foco nas estruturas fúngicas. Geralmente utilizadas em infecções onde a quantidade de fungos é alta. (micoses superficiais), as quais afetam grande parte da população.

5) Micose superficial são micose onde a quantidade de fungos naquela infecção é elevada (carga fúngica). Geralmente apresentam baixa gravidade, porém são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos.

6) As micose cutânea são menos transmissíveis em ambientes coletivos e são menos comuns na prática clínica. Apresentando uma gravidade maior do que as micose superficiais.

→ continuação 5:

5) Sendo associadas a umidade, calor e condições de higiene. Ex. Condição.

7) São considerados oportunistas pois são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos como hospitais. Aproveitando de condições como umidade, falta de higiene para se hospedar. Apresenta alta capacidade de invasão e colonização.

8) Pois existem fungos benéficos ao nosso organismo, e nem sempre apresentam uma ameaça. Por exemplo a candida está presente em nosso organismo (mulheres e men) e nem sempre representa uma infecção fúngica (candidíase).