

# Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Mariana Viana Santos

14.5 / 20

APROVADO(A)

| Questao | Valor | Nota | Status        |
|---------|-------|------|---------------|
| 1       | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |
| 2       | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |
| 3A      | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |
| 3B      | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |
| 3C      | 2.0   | 2.0  | Bom (100%)    |
| 4       | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |
| 5       | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |
| 6       | 2.0   | 0.5  | Insuf. (25%)  |
| 7       | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |
| 8       | 2.0   | 1.5  | Parcial (75%) |

## Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

### O que voce acertou:

- Eucariótico: núcleo definido e organelas membranosas
- Heterotrófico: não produz próprio alimento, obtém nutrientes de outros organismos
- Impacto: precisam invadir e se alimentar do hospedeiro favorecendo infecção

### O que estava incorreto:

- Segunda parte confusa: afirmou que são 'células extremamente simples' - fungos eucarióticos têm células complexas
- Menção a 'agentes fermentadores e decompositores' não explica adequadamente a heterotrofia no contexto clínico

### O que faltou:

- Semelhança com células humanas limita alvos terapêuticos
- Explicação clara de como heterotrofia leva à colonização tecidual

**Feedback:** A primeira parte está correta, mas a segunda contém contradição ao chamar células eucarióticas de 'extremamente simples'. Faltou o impacto clínico da semelhança celular na limitação terapêutica.

---

### Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

## Questão 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

### O que voce acertou:

- Ergosterol como componente da membrana celular fúngica
- Azóis e polienos atuam sobre ele
- Inibição ou ligação danifica a membrana
- Morte celular como consequência
- Bloqueio do ergosterol inativa crescimento

### O que faltou:

- Papel na fluidez e integridade da membrana
- Comparação com colesterol humano (seletividade)
- Exclusividade nos fungos como base da seletividade terapêutica

**Feedback:** Resposta que aborda mecanismos de ação corretamente, mas faltou explicar o papel fisiológico do ergosterol (fluidez/integridade) e a razão da seletividade (exclusivo dos fungos vs colesterol humano).

---

### Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esterol da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 $\alpha$ -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

### Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

#### O que voce acertou:

- Unicelulares
- Formato oval ou esférico
- Reprodução por brotamento
- Podem formar pseudomicélio ou verdadeiro micélio

#### O que estava incorreto:

- Segunda parte vaga: 'unidades fúngicas de vida livre' não é caracterização morfológica adequada

**Feedback:** Elementos principais corretos na primeira parte. A segunda parte é vaga e não acrescenta informação morfológica relevante.

---

#### Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

### Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

#### O que voce acertou:

- Micélio como conjunto de hifas
- Corpo vegetativo dos fungos filamentosos
- Rede ramificada para absorção de nutrientes
- Hifas se conectam formando a estrutura

#### O que estava incorreto:

- Comparação com 'grande raiz' é imprecisa

#### O que faltou:

- Hifas septadas ou cenocíticas
- Organização em micélio vegetativo e aéreo/reprodutivo

**Feedback:** Definição básica correta. Faltou a classificação das hifas e a distinção funcional entre micélio vegetativo e reprodutivo.

---

#### Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

### Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

#### O que voce acertou:

- Capacidade de alternar entre levedura e filamentoso
- Dependendo de condições ambientais (temperatura)
- Forma leveduriforme infecta o hospedeiro
- Evasão imune: mascaramento e dificuldade de diagnóstico/cura
- Adaptação ao meio hostil

#### O que faltou:

- Poderia citar temperaturas específicas (25°C e 37°C)

**Feedback:** Boa resposta que aborda definição, importância na patogênese e até a dificuldade diagnóstica. O conceito de mascaramento para evasão imune é pertinente.

---

#### Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

#### Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

##### O que voce acertou:

- KOH dissolve queratina e células epiteliais
- Estruturas fúngicas ficam visíveis
- Facilita visualização microscópica
- Diagnóstico rápido de micoses superficiais

##### O que estava incorreto:

- Chamou KOH de 'peróxido de potássio' na segunda parte - o correto é hidróxido de potássio

##### O que faltou:

- Menção à resistência da parede fúngica (quitina) ao KOH

**Feedback:** Resposta correta nos conceitos, mas contém erro terminológico ao chamar KOH de 'peróxido de potássio' (o correto é hidróxido). Faltou explicar por que as estruturas fúngicas resistem.

---

##### Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

### Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

#### O que voce acertou:

- Sem inflamação
- Sem circulação sistêmica do fungo
- Pouco sintomáticas
- Tratadas com antifúngicos tópicos

#### O que faltou:

- Restrita à camada córnea da epiderme/pelos
- Sem invasão de tecidos vivos
- Exemplos (pitíriase versicolor, piedra)

**Feedback:** Identificou corretamente a ausência de inflamação e o caráter leve. Faltou especificar a localização anatômica (camada córnea) e dar exemplos clínicos.

---

#### Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitíriase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).



## Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

### O que voce acertou:

- Cutâneas geram irritações e lesões

### O que estava incorreto:

- Afirmou que cutâneas não têm inflamação - incorreto, cutâneas SIM apresentam inflamação
- Não diferenciou adequadamente das superficiais
- Atribuiu cutâneas a 'roupas molhadas' - simplificação inadequada

### O que faltou:

- Superficiais: camada córnea, sem inflamação, Malassezia
- Cutâneas: epiderme/derme com resposta inflamatória
- Dermatófitos como agentes das cutâneas
- Prurido e descamação como sintomas

**Feedback:** Resposta com erro conceitual importante: micoses cutâneas SIM causam inflamação (é justamente o que as diferencia das superficiais). A diferenciação não foi adequadamente estabelecida. Revise este conteúdo.

---

### Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como Malassezia e Piedraia, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

## Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

### O que voce acertou:

- Candida como oportunista que se aproveita de situações específicas
- Ambientes hospitalares como fator de risco
- Condições físicas e biológicas que beneficiam infecção

### O que faltou:

- Candida faz parte da microbiota normal
- Em condições normais não causa doença
- Fatores específicos: antibióticos, dispositivos invasivos, imunossupressão

**Feedback:** Resposta parcial. Identificou o oportunismo e o contexto hospitalar, mas faltou explicar que Candida é parte da microbiota normal e detalhar os fatores de risco específicos.

---

### Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

## Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

### O que voce acertou:

- Exemplo de Candida na flora vaginal como colonizador normal
- Fungo presente sem causar doença em condições normais
- Proliferação exacerbada em condições de alteração (pH)
- Distinção entre presença funcional e infecção

### O que faltou:

- Contaminação da amostra como possibilidade
- Necessidade de correlação clínica formal
- Conceito de contaminação laboratorial

**Feedback:** Boa resposta com exemplo prático de colonização vs infecção. Faltou abordar a possibilidade de contaminação da amostra e a necessidade formal de correlação clínica para interpretação.

---

### Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como Candida na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

**UNIPAC / FUPAC – Ciências da Saúde – Micologia Clínica**

Prof.: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a) Mariane P. Viana Nota:

farmacia - 3-3

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

**1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.**

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

**2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.**

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

**3. Responda:**

- a) **Caracterize morfolologicamente as leveduras.**
- b) **Defina micélio e relacione sua organização.**
- c) **Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.**

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

**4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.**

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram



① fungos são caracterizados como eucariontes por serem multicelulares ~~com~~ de componentes ~~em~~ celulares extremamente simples; em geral unicelulares e heterotrofos por serem agentes fermentadores ~~e~~ elos decompositores de matéria orgânica. Combinadas, essas duas características garantem a capacidade de sobrevivência do fungo, necessitando de condições simples para reprodução e proliferação. Por exemplo, ambientes úmidos, quentes e de determinado PH são ideais para o crescimento de mofo e bolores.

② O ergosterol é uma molécula presente na membrana celular fúngica responsável pela "função" das unidades <sup>(funções)</sup> fúngicas. Para que a atividade antifúngica de certo fármaco seja eficiente é necessário que haja o bloqueio da molécula ergosterol, inativando o crescimento do fungo no meio.

3-  
a) leveduras: unidades fúngicas de "vida livre",

b) micélio é caracterizado por ser uma grande "raiz" operante. Forma de organização dos fungos filamentosos que se conectam pela hifas.

c) A capacidade deméfica do fungo se relaciona <sup>diretamente</sup> com a capacidade de preferência no meio e/ou organismo. Ao detectar um meio mais "hostil" o fungo entende a necessidade de se organizar de maneira mais contida e lenta para que não seja eliminado mais rapidamente, mascarando-se e dificultando a cura e o diagnóstico.

④  $K_2O$  (peróxido de Potássio) age como um agente de "limpeza", na superfície celular do fungo facilitando a resudização e ~~de~~ identificação.

⑤ Mucose superficial é a forma mais simples de micoses. Não há inflamação, sem circulação sanguínea do fungo. Geralmente tratada com antifúngicos tópicos.

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

⑥ superficial x cutânea

Micoses superficiais são micoses que não geram inflamação da pele e não afetam sistemicamente. Geralmente tratadas de maneira rápida e pouco contagiosas.

Micoses cutâneas ~~se~~ apresentam localidade limitada e geram irritações e exúrias, mas sem inflamações; lesões simples e de fácil manejo, ~~fazem~~ muito determinadas pelo "meio", roupas molhadas, por exemplo.

⑦ - Fungos da família *Candida* são considerados oportunistas pois se aproveitam de situações específicas para sua proliferação. Em ambientes hospitalares, pacientes são submetidos a tratamentos, condutas físicas e biológicas que podem beneficiar as infecções fúngicas.

⑧ - Um grande exemplo desse fato está na existência do fungo *Candida* na flora vaginal feminina. O fungo permanece em associação constante biologicamente, existindo de forma ~~funcional~~ <sup>fungal</sup>. Em condições de alteração do pH fisiológico vaginal, a proliferação exacerbada do fungo é iniciada, produzindo sintomas ~~previamente~~ <sup>previamente</sup> conhecidos como coceira e formação de grânulos brancos. Em um exame de acompanhamento, ~~mas~~ <sup>mas</sup> em condições fisiológicas o fungo será detectado, ~~mas~~ <sup>mas</sup> não em sua participação infecciosa.