Alapderiváltak

$c' = 0, c \in R$	$(ctgx)' = \frac{-1}{sin^2x}$	$(log_a x)' = \frac{1}{xlna}$
$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(e^x)' = e^x$	$(arcsinx)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(sinx)' = cosx$	$(a^x)' = a^x lna$	$(arccosx)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(cosx)' = -sinx$	$(lnx)' = \frac{1}{x}$	$(arctgx)' = \frac{1}{1+x^2}$
$(tgx)' = \frac{1}{cos^2x}$		$(arcctgx)' = \frac{-1}{1+x^2}$

Deriválási szabályok

$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$

$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$

$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

$f(x)$ függvény x_0 pontjába húzható érintőegyenes egyenlete

$$y = f(x_0) - f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$