

	INDICACIONES POST EXAMEN CON CONTRASTE <i>Procedimientos Imagenológicos con Medios de Contraste Endovenosos</i>	Versión 1.0	Fecha 07/2025
Código: GP1.5-C · Tabla 3	Ref.: Protocolo GP1.5 · Anexo 4 DiagnoPRO · ACR Manual on Contrast Media 2024	DiagnoPRO	

1. OBJETIVO

Establecer las indicaciones que deben entregarse al paciente una vez finalizado un procedimiento imagenológico con medio de contraste endovenoso (TC con contraste yodado o RM con gadolinio), con el fin de favorecer la eliminación del contraste, prevenir complicaciones tardías y orientar al paciente ante la aparición de síntomas posteriores.

3. INDICACIONES GENERALES (TC y RM con contraste)

Las siguientes indicaciones aplican a ambas modalidades de examen sin distinción:

N°	Indicación	Fundamento
1	Puede retomar sus actividades habituales de forma regular inmediatamente después del procedimiento.	<i>El medio de contraste no genera limitaciones funcionales en pacientes sin complicaciones.</i>
2	Beber aproximadamente 2 litros de agua al día durante los próximos 2 a 3 días.	<i>Favorecer la eliminación del medio de contraste a través de la orina.</i>

4. INDICACIÓN ESPECIAL: PACIENTES CON METFORMINA (Solo TC con contraste yodado)

⚠ Aplica únicamente a exámenes de TC con contraste yodado. NO aplica a RM con gadolinio.
Si el paciente usa Metformina (Glafornil®, Dimefor® u otros derivados):
Mantener la suspensión del medicamento durante **48 horas** posteriores al examen.

i Fundamento clínico:

La Metformina puede acumularse en presencia de deterioro renal transitorio post contraste yodado, aumentando el riesgo de acidosis láctica.

5. SÍNTOMAS DE ALARMA — CONSULTAR URGENCIAS

Indicar al paciente que acuda a un servicio de urgencias de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:

Síntoma / Signo de alarma	Posible causa a descartar
Dificultad para respirar o sensación de ahogo	<i>Reacción anafiláctica tardía / broncoespasmo</i>
Hinchazón de rostro, labios o lengua	<i>Angioedema / reacción alérgica tardía</i>
Urticaria, picazón intensa o sarpullido generalizado	<i>Reacción cutánea tardía al contraste</i>
Náuseas o vómitos persistentes	<i>Reacción sistémica tardía al contraste</i>
Dolor, enrojecimiento, hinchazón o calor en el brazo donde se aplicó el contraste	<i>Extravasación tardía / flebitis</i>

Ante cualquiera de estos síntomas:

acudir directamente al servicio de urgencias más cercano. No esperar a que los síntomas empeoren.

6. RESUMEN — INFORMACIÓN A ENTREGAR AL PACIENTE AL ALTA

El siguiente resumen refleja lo que debe comunicarse al finalizar el procedimiento:

Lo que puede hacer	Consulte urgencias si presenta...
• Retomar actividades normales de inmediato. • Beber ~2 litros de agua al día por 2 a 3 días. • Si usa Metformina (solo TC con yodo): no reanudarla hasta 48 h después del examen.	• Dificultad para respirar o hinchazón del rostro. • Urticaria, picazón o sarpullido intenso. • Náuseas o vómitos persistentes. • Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo.