

# HIGIENE PREDIAL

POST COSECHA



1 AL FINALIZAR  
LA COSECHA

La eliminación de cualquier fruta que ha caído en el suelo y cualquier fruto infestado que queda en las plantas en el huerto, puede reducir las poblaciones de moscas que podrían infestar variedades de maduración más tardía o la producción del año siguiente.

El enterrar o hacer compostaje con la fruta NO es una manera confiable para destruir los huevos y larvas, por tanto se recomienda realizar solarizing o solarización, que consiste en poner la fruta bajo un plástico transparente al sol

## DROSOTIPS

Verificar que no quede fruta colgada en las plantas que sirvan de sustrato para la plaga

Eliminar toda la fruta del suelo. Métodos: enterrar, solarizar, quemar.

# HIGIENE PREDIAL

POST COSECHA

## 2. EN RECESO INVERNAL

la poda debe permitir que penetre más luz a través del follaje, con el objetivo de reducir la humedad y aumentar la temperatura al interior de la planta. Adicionalmente, un follaje equilibrado en las plantas puede mejorar la cobertura de la pulverización y la eficiencia de las aplicaciones



## PODAR ARANDANO



## 3. ¿CUÁNDΟ APLICAR?

Una vez finalizada la cosecha de un cuartel, se puede realizar una aplicación de insecticida, a la espera de la eliminación total de la fruta colgada

## OTROS MANEJOS

- Incorporación de cal agrícola en camellón completo
- Mantener libre de malezas el huerto y sus alrededores
- Evitar que se generen pozas en el huerto.
- Protección de hileras.

## DROSOTIPS

El mulch de plástico negro en la entre hilera o sobre esta, proporciona una barrera efectiva que evita que las larvas pupen por debajo la superficie del suelo, reduciendo la supervivencia de *Drosophila suzukii*