

## Daños en Fruta Fresca Arándano

**DROSOALERT**, Plataforma On-line de apoyo a la toma de decisiones para establecer estrategias de prevención, seguimiento y control de *D. suzukii*  
[www.drosoalert.cl](http://www.drosoalert.cl)

### DAÑOS EN ARÁNDANO

Por equipo Drosoalert

*D. suzukii*, afecta fruta sana, siendo su preferida aquella de piel delgada. Los daños por la presencia de *D. suzukii*, en arándano se observan en la disminución de turgencia de la fruta, hundimientos y pequeños orificios.

#### ¿Como actúa?

El daño comienza con la inserción del aparato ovopositor de la hembra en la fruta, dependiendo del tamaño del fruto y del cultivo puede colocar entre 1 a 10 huevos



a) Fruto de Arándano de rezago con daño b) Hembra en fruta, c) Pinchazos en fruta por ovipositor de hembra, d) Espiráculos de *D. suzukii*, e) Larva en fruta, f) Larva en el interior de fruta, g) Larva en el interior de fruta

### DROSOTIPS

El daño en la fruta lo genera la hembra al insertar su aparato ovipositor en la fruta sana para depositar sus huevos y posteriormente la larva al eclosionar y alimentarse dentro del fruto.

