ARIA CLINIC · הנחיות למטופל

הנחיות לאחר טיפול בפולידוקנול

סקלרותרפיה להעלמת נימים ווורידים קטנים. החומר מגרה את דופן כלי הדם, שנסגר ונספג בהדרגה במשך שבועות. גרב הלחץ היא החלק החשוב ביותר בהצלחת הטיפול.

1 24 השעות הראשונות

- **גרב לחץ:** ללבוש ברציפות 24 שעות, כולל בלילה – לא להוריד כלל
- ללכת 15–20 דקות מיד אחרי הטיפול, ולהמשיך ללכת מספר פעמים ביום
- לא לעמוד ולא לשבת ברציפות זמן ממושך – להניע את הרגליים
- להשאיר את התחבושות/הפדים הקטנים במקום עד למחרת
- ללא מקלחת ביממה הראשונה (גם לא קצרה); ללא אמבטיה, סאונה או ג'קוזי
- ללא ספורט מאומץ, ריצה או קפיצות

2 השבועיים הקרובים

- **גרב לחץ** במשך היום בלבד למשך שבועיים (מורידים בלילה)
- הליכה יומית 30 דקות – משפרת את זרימת הדם ואת התוצאה
- ללא ספורט מאומץ, משקולות או רכיבה על אופניים
- להימנע מחום על הרגליים: סאונה, אמבטיה חמה, הסקה ישירה
- ללא שמש ישירה או סולריום על האזור – סיכון לכתמים
- ללא טיסה ארוכה (מעל 4 שעות) בשבועיים הראשונים

3 מה צפוי – וזה בסדר

- אדמומיות, נפיחות קלה ותחושת "עקיצות" סביב נקודות ההזרקה – חולפות תוך ימים
- שטפי דם קטנים – נעלמים תוך 1–2 שבועות
- קשיות או "חבל" לאורך הוריד המטופל – נספג תוך שבועות
- גוון חום לאורך הוריד (היפרפיגמנטציה) – צפוי, דוהה תוך 3–12 חודשים
- גרד קל באזור ביום הראשון
- הנימים נעלמים בהדרגה; התוצאה המלאה אחרי 4–8 שבועות. לעיתים נדרש טיפול נוסף

4 ההמשך

- להמשיך בהגנה מהשמש על הרגליים SPF 50 למשך 4 שבועות
- ללא שעווה, לייזר או טיפולים אחרים על האזור למשך 4 שבועות
- ללא אספירין ונוגדי דלקת ללא צורך רפואי בשבוע הראשון; אקמול מותר
- אם נראית נקודה כהה קטנה (דם כלוא) – לא ללחוץ; הרופא ישחרר אותה בביקורת
- ביקורת במרפאה אחרי 4–6 שבועות להערכת התוצאה ותכנון טיפול נוסף במידת הצורך
- מרווח בין טיפולים: 4–6 שבועות

פנה/י למרפאה מיד אם מופיעים:
כאב חזק, נפיחות או אדמומיות שמחמירות · פצע, שלפוחית או כיב באזור ההזרקה · רגל נפוחה, חמה וכואבת (במיוחד בשוק) · קוצר נשימה או כאב בחזה – לפנות מיד למיון · הפרעת ראייה, כאב ראש חזק או חולשה

ARIA Clinic – רפואה אסתטית
טלפון: 052-4430344 · וואטסאפ: 052-361-7231
האורזים 23, בניין היהלום, נתניה