



# PHQ-9 — Patient Health Questionnaire

RASTREAMENTO E GRAVIDADE DE SINTOMAS DEPRESSIVOS · ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Paciente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Avaliador \_\_\_\_\_

**Aplicação:** ☐ Autoaplicado ☐ Entrevista

Nas últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado(a) pelos problemas abaixo?

| Item / sintoma                                                                                              | 0<br>Nenhuma<br>vez      | 1<br>Vários dias         | 2<br>> metade<br>dos dias | 3<br>Quase<br>todos os<br>dias |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas.                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 2. Sentir-se para baixo, deprimido(a) ou sem esperança.                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 3. Dificuldade para dormir, permanecer dormindo ou dormir demais.                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 4. Sentir-se cansado(a) ou com pouca energia.                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 5. Falta de apetite ou comer em excesso.                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 6. Sentir-se mal consigo mesmo(a), como se tivesse fracassado ou decepcionado a si/família.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 7. Dificuldade para se concentrar, por exemplo ao ler ou assistir televisão.                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 8. Lentidão perceptível para se mover/falar ou, ao contrário, inquietação e movimentação acima do habitual. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |
| 9. Pensamentos de que seria melhor estar morto(a) ou de se ferir de alguma forma.                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>       |

## IMPACTO FUNCIONAL

Se você marcou algum problema, quanto esses sintomas dificultaram seu trabalho, tarefas de casa ou convivência com outras pessoas?

☐ Nenhuma dificuldade ☐ Alguma ☐ Muita ☐ Extrema

**ESCORE TOTAL**

**/ 27**



## Resultado e interpretação

| Escore total | Gravidade dos sintomas |
|--------------|------------------------|
| 0 – 4        | Mínima / ausente       |
| 5 – 9        | Leve                   |
| 10 – 14      | Moderada               |
| 15 – 19      | Moderadamente grave    |
| 20 – 27      | Grave                  |

### RESULTADO DO PACIENTE

Escore \_\_\_\_\_ Classificação \_\_\_\_\_

Impacto funcional: ☐ Nenhum ☐ Algum ☐ Muito ☐ Extremo

**Atenção ao item 9.** Qualquer resposta diferente de “nenhuma vez” requer avaliação clínica específica e imediata da segurança, incluindo natureza dos pensamentos, intenção, plano, meios disponíveis, fatores protetores e necessidade de intervenção. O escore total do PHQ-9 não substitui essa avaliação.

## Interpretação clínica

O PHQ-9 é um instrumento de rastreamento e medida de gravidade. Um escore  $\geq 10$  apresentou sensibilidade e especificidade de aproximadamente 88% para depressão maior no estudo de validação original, mas o diagnóstico deve ser confirmado clinicamente. Avalie também duração, prejuízo funcional, diagnóstico diferencial, transtorno bipolar, substâncias e medicamentos e condições clínicas associadas.

### IMPRESSÃO / CONDUTA

- ☐ Sem sintomas clinicamente relevantes ☐ Sintomas leves
- ☐ Avaliação diagnóstica indicada ☐ Acompanhamento / repetir PHQ-9
- ☐ Plano terapêutico ☐ Avaliação de segurança realizada

Observações

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo do profissional