



SARC-F e SARC-CalF

RASTREIO DE SARCOPENIA

Paciente _____ Data _____

Idade _____ Sexo _____ Avaliador _____

Cada item vale de 0 a 2 pontos. 0 — nenhuma dificuldade · 1 — alguma dificuldade · 2 — muita dificuldade ou incapaz. Nas quedas: 0 nenhuma, 1 uma a três, 2 quatro ou mais.

Componente e pergunta	0	1	2
Força — Qual a dificuldade para levantar e carregar 4,5 kg?	☐	☐	☐
Ajuda para caminhar — Qual a dificuldade para atravessar um cômodo?	☐	☐	☐
Levantar da cadeira — Qual a dificuldade para levantar de uma cadeira ou da cama?	☐	☐	☐
Subir escadas — Qual a dificuldade para subir um lance de dez degraus?	☐	☐	☐
Quedas — Quantas vezes caiu no último ano?	☐	☐	☐
SARC-F — ESCORE TOTAL	/ 10		

Ponto de corte: ≥ 4 pontos é sugestivo de sarcopenia e indica seguir para a confirmação com medida de força e massa muscular.

SARC-CalF — acrescentando a circunferência de panturrilha

Meça a panturrilha da perna dominante, com o paciente sentado, joelho a 90 graus e pés apoiados no chão, no ponto de maior perímetro. Abaixo do ponto de corte, some 10 pontos ao SARC-F.

Sexo	Ponto de corte	SARC-CalF	Interpretação
Homens	≤ 34 cm	0 – 10	Rastreio negativo
Mulheres	≤ 33 cm	≥ 11	Sugestivo de sarcopenia

REGISTRO

Circunferência de panturrilha (cm) _____ Pontos somados _____ SARC-CalF total _____

Rastreio positivo não fecha diagnóstico: confirme com prensão palmar (baixa < 27 kg em homens e < 16 kg em mulheres) e avaliação de massa muscular. O desempenho físico define a gravidade.

Observações e conduta _____

Assinatura e carimbo do profissional

Referência: Malmstrom TK, Morley JE. SARC-F. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):531–532. · Barbosa-Silva TG et al. Enhancing SARC-F. J Am Med Dir Assoc. 2016;17(12):1136–1141. · Cruz-Jentoft AJ et al. EWGSOP2. Age Ageing. 2019;48(1):16–31.