



Triagem sensorial — visão e audição

RASTREIO E REGISTRO NA CONSULTA DO IDOSO

Paciente _____ Data _____
Idade _____ Avaliador _____

Perguntas de triagem

Pergunta	Sim	Não
Percebe dificuldade para enxergar de longe ou de perto?	☐	☐
Usa óculos? Estão atualizados e em uso efetivo?	☐	☐
Precisa aumentar o volume da televisão mais que os outros da casa?	☐	☐
Tem dificuldade para acompanhar conversa em ambiente com ruído?	☐	☐
A visão ou a audição atrapalha atividades do dia a dia?	☐	☐

Acuidade visual

Use a tabela E direcional a 3 metros, com boa iluminação. Teste um olho de cada vez, ocluindo o outro sem comprimir o globo. Se usa óculos para longe, teste com eles. Registre a menor linha em que acerta mais da metade dos optótipos.

REGISTRO DA ACUIDADE

Olho direito _____ Olho esquerdo _____ Ambos _____
Com correção? _____ Última consulta oftalmológica _____

Acuidade pior que 6/12 (20/40) em qualquer olho, diferença importante entre os olhos ou queixa persistente com acuidade normal indicam avaliação oftalmológica. Lembre de catarata, glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética como causas frequentes nesta faixa etária.

Teste do sussurro

Posicione-se atrás do paciente, fora do campo visual, a cerca de 60 cm. Oclua e fricção suavemente o trago do ouvido não testado. Após expirar completamente, sussurre uma sequência de três números ou palavras e peça que repita. Teste um ouvido de cada vez.

REGISTRO DA AUDIÇÃO

Ouvindo direito: ☐ Repetiu corretamente ☐ Falhou
Ouvindo esquerdo: ☐ Repetiu corretamente ☐ Falhou
Otosopia: ☐ Normal ☐ Cerume obstrutivo ☐ Alteração timpânica ☐ Não realizada
Usa aparelho auditivo: ☐ Não ☐ Sim, em uso ☐ Sim, mas não usa



Falha em qualquer ouvido sugere perda auditiva e indica avaliação audiológica. Antes de encaminhar, examine o conduto: cerume obstrutivo é causa comum e reversível de perda súbita aparente.

Perda sensorial não corrigida agrava isolamento, humor, cognição e risco de quedas, e distorce o resultado de testes cognitivos. Garanta óculos e aparelho auditivo em uso **antes** de aplicar MEEM, MoCA ou bateria breve — caso contrário o desempenho mede o sentido, não a cognição.

Conduta e encaminhamentos

Assinatura e carimbo do profissional

Referência: Pirozzo S, Papinczak T, Glasziou P. Whispered voice test for screening for hearing impairment in adults and children: systematic review. BMJ. 2003;327(7421):967. · US Preventive Services Task Force, recomendações sobre rastreio visual e auditivo em idosos.