



IPSS — sintomas do trato urinário inferior

ESCORE INTERNACIONAL DE SINTOMAS PROSTÁTICOS

Paciente _____ Data _____
Idade _____ Avaliador _____

No último mês, com que frequência ocorreu cada situação? 0 nenhuma vez · 1 menos de uma em cada cinco vezes · 2 menos da metade das vezes · 3 cerca de metade das vezes · 4 mais da metade das vezes · 5 quase sempre.

Sintoma	0	1	2	3	4	5
1. Esvaziamento incompleto — sensação de não esvaziar completamente a bexiga após urinar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Frequência — necessidade de urinar novamente em menos de duas horas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Intermitência — o jato de urina para e recomeça várias vezes.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Urgência — dificuldade para adiar a vontade de urinar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Jato fraco — diminuição da força do jato urinário.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Esforço — necessidade de fazer força para começar a urinar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. Noctúria — número de vezes que levanta para urinar à noite (0 nenhuma até 5 cinco ou mais).	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ESCORE TOTAL	/ 35
--------------	------

Escore	Gravidade
0 – 7	Leve
8 – 19	Moderado
20 – 35	Grave

Qualidade de vida
Se tivesse de conviver com os sintomas urinários atuais pelo resto da vida, como se sentiria?
0 ótimo · 1 satisfeito · 2 pouco satisfeito · 3 indiferente · 4 pouco insatisfeito · 5 insatisfeito

Resposta: _____ / 6

Sintomas moderados ou graves, retenção, hematúria, infecções de repetição ou alteração da função renal indicam avaliação urológica. Antes de atribuir os sintomas à próstata, revise diuréticos, anticolinérgicos, ingestas noturnas, diabetes e insuficiência cardíaca.

Observações e conduta

Dr. Pedro H. Dias Lino
Médico | CRM-7618 | RQE-4251

Referência: Barry MJ, Fowler FJ, O’Leary MP, et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. J Urol. 1992;148(5):1549–1557. Adotado pela OMS como IPSS.