



Revisão de polifarmácia e desprescrição

CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA NA CONSULTA DO IDOSO

Paciente _____ Data _____

Nº de medicamentos em uso _____ Quem administra _____ Avaliador _____

Peça que traga todas as caixas e receitas, incluindo o que usa por conta própria: fitoterápicos, suplementos, colírios, pomadas e analgésicos de farmácia.

Medicamento e dose	Indicação	Início	Quem prescreveu	Manter?

Perguntas que guiam a revisão

CINCO PERGUNTAS

1. Existe indicação ativa e documentada para cada item?
2. A dose está ajustada para função renal, peso e idade?
3. Algum sintoma novo pode ser efeito adverso de medicamento? Cuidado com a cascata iatrogênica: um remédio tratando o efeito colateral de outro.
4. O benefício esperado cabe no tempo de vida e nas metas de cuidado desta pessoa?
5. A pessoa consegue tomar como prescrito: entende, enxerga, alcança, lembra e tem acesso?



Classes que exigem atenção redobrada

Classe	Motivo da atenção
Benzodiazepínicos e hipnóticos	Quedas, fraturas, delirium, dependência; retirada gradual
Anticolinérgicos	Carga anticolinérgica cumulativa: confusão, retenção urinária, obstipação, boca seca
Antipsicóticos na demência	Aumento de mortalidade e AVC; usar só se risco claro e por tempo limitado
AINes	Sangramento digestivo, lesão renal, descompensação de pressão e insuficiência cardíaca
Sulfonilureias de longa ação	Hipoglicemia grave e prolongada
Inibidores de bomba de prótons	Uso crônico sem indicação renovada
Anti-hipertensivos em excesso	Hipotensão postural e quedas; rever metas na fragilidade
Opioides	Sedação, obstipação, delirium; associar plano intestinal

Como desprescrever

PRINCÍPIOS

Priorize um medicamento por vez, começando pelo de maior risco e menor benefício. Explique o motivo à pessoa e à família, combine a redução gradual quando houver risco de retirada, registre o que esperar e marque reavaliação próxima. Desprescrever é decisão compartilhada, não suspensão unilateral.

Plano de mudanças e reavaliação

Dr. Pedro H. Dias Lino

Médico | CRM-7618 | RQE-4251

Referência: American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc, edição vigente. • O'Mahony D et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people, versão vigente. As listas completas devem ser consultadas nas publicações originais.