



Timed Up and Go (TUG)

MOBILIDADE FUNCIONAL E RISCO DE QUEDAS

Paciente _____ Data _____
Idade _____ Avaliador _____

MATERIAL NECESSÁRIO

Cadeira com encosto e braços · percurso plano e demarcado de 3 metros · cronômetro · calçado habitual e dispositivo auxiliar de marcha, se normalmente utilizado.

Como realizar

O paciente inicia sentado, com as costas apoiadas na cadeira. Ao comando “vá”, deve levantar-se, caminhar 3 metros em ritmo habitual e seguro, virar, retornar até a cadeira e sentar-se novamente. Cronometrar desde o comando até o momento em que o paciente volta a sentar-se.

Orientação ao paciente: “Quando eu disser ‘vá’, levante-se da cadeira, caminhe até a marca de 3 metros, vire, volte até a cadeira e sente-se novamente, no seu ritmo habitual e com segurança.”

REGISTRO DO TESTE

Tempo total: _____ s

Dispositivo auxiliar: ☐ Não ☐ Bengala ☐ Andador ☐ Outro: _____

Necessitou ajuda física: ☐ Não ☐ Sim

Marcha / transferência: ☐ Estável ☐ Instável

Observações

Interpretação clínica

O TUG deve ser interpretado em conjunto com idade, condição clínica, cognição, equilíbrio, força, uso de dispositivo auxiliar e histórico de quedas. Em idosos da comunidade, um tempo ≥ 12 segundos é frequentemente utilizado como ponto de corte para sinalizar maior risco de quedas, mas não deve ser usado isoladamente para diagnóstico ou decisão clínica.

Atenção durante o teste: além do tempo, observar dificuldade para levantar-se, hesitação, instabilidade, passos curtos, alteração da velocidade, dificuldade para realizar a volta e controle ao sentar.

Dr. Pedro H. Dias Lino

Médico | CRM-7618 | RQE-4251

Referência: Podsiadlo D, Richardson S. The Timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142–148.