



Índice de Katz — atividades básicas de vida diária

ABVD · AVALIAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Paciente _____ Data _____

Informante _____ Avaliador _____

COMO PONTUAR

Marque **independente** quando a atividade é realizada sem supervisão, direção ou ajuda pessoal — o uso de dispositivos de apoio não caracteriza dependência. Cada item independente vale 1 ponto.

Atividade	Independente	Dependente
Banho — banha-se completamente ou precisa de ajuda apenas para uma região do corpo, como costas ou um membro.	☐	☐
Vestir-se — pega as roupas e se veste sem ajuda, exceto para amarrar os sapatos.	☐	☐
Uso do banheiro — vai ao banheiro, higieniza-se e se veste após as eliminações sem ajuda.	☐	☐
Transferência — deita e levanta da cama ou senta e levanta da cadeira sem ajuda de outra pessoa.	☐	☐
Continência — tem controle completo sobre as eliminações de urina e fezes.	☐	☐
Alimentação — leva a comida do prato à boca sem ajuda; cortar carne e passar manteiga podem ser feitos por outra pessoa.	☐	☐

ESCORE TOTAL — ATIVIDADES INDEPENDENTES

/ 6

INTERPRETAÇÃO

6 — independente para todas as atividades · 5 — dependência leve · 3 a 4 — dependência moderada · 0 a 2 — dependência importante

A perda funcional no Katz costuma seguir uma ordem previsível: banho e vestir-se são afetados primeiro; alimentação, por último. Perda em atividade isolada fora dessa sequência sugere causa aguda ou local — investigar.

Observações e conduta

Assinatura e carimbo do profissional

Referência: Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, et al. Studies of illness in the aged. The index of ADL. JAMA. 1963;185:914–919. · Lino VTS et al. Adaptação transcultural da Escala de Independência em Atividades da Vida Diária. Cad Saúde Pública. 2008;24(1):103–112.