



Questionário de Atividades Funcionais

PFEFFER (QAF) · AVALIAÇÃO FUNCIONAL POR INFORMANTE

Paciente _____ Data _____

Informante _____ Parentesco / função _____

COMO PONTUAR

0 — normal ou nunca fez, mas poderia fazer agora · 1 — faz com dificuldade ou nunca fez e agora teria dificuldade
2 — necessita de ajuda · 3 — não é capaz

Atividade avaliada	0	1	2	3
1. Manuseia seu próprio dinheiro?	☐	☐	☐	☐
2. É capaz de comprar roupas, comida e coisas para casa sozinho(a)?	☐	☐	☐	☐
3. É capaz de esquentar água para o café e apagar o fogo?	☐	☐	☐	☐
4. É capaz de preparar uma comida?	☐	☐	☐	☐
5. É capaz de manter-se em dia com atualidades e acontecimentos da comunidade ou vizinhança?	☐	☐	☐	☐
6. É capaz de prestar atenção, entender e discutir programa de rádio/TV, jornal ou revista?	☐	☐	☐	☐
7. É capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos familiares e feriados?	☐	☐	☐	☐
8. É capaz de manusear seus próprios remédios?	☐	☐	☐	☐
9. É capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para casa?	☐	☐	☐	☐
10. Pode ser deixado(a) sozinho(a) de forma segura?	☐	☐	☐	☐

ESCORE TOTAL**/ 30**

Interpretação prática

Escore ≥ 5 são frequentemente utilizados como indicativos de prejuízo ou dependência funcional. A interpretação deve considerar limitações físicas, sensoriais e outras condições que possam interferir no desempenho, buscando identificar o componente relacionado à cognição.

Instrumento aplicado preferencialmente a familiar, cuidador ou outro informante que conheça bem o desempenho cotidiano do paciente.

Assinatura e carimbo do profissional

Referência: Pfeffer RI et al. Measurement of functional activities in older adults in the community. J Gerontol. 1982;37(3):323–329. Versão brasileira amplamente utilizada em avaliação cognitivo-funcional.