



# Triagem sensorial — visão e audição

RASTREIO E REGISTRO NA CONSULTA DO IDOSO

Paciente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Idade \_\_\_\_\_ Avaliador \_\_\_\_\_

## Perguntas de triagem

| Pergunta                                                           | Sim                      | Não                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Percebe dificuldade para enxergar de longe ou de perto?            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usa óculos? Estão atualizados e em uso efetivo?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Precisa aumentar o volume da televisão mais que os outros da casa? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tem dificuldade para acompanhar conversa em ambiente com ruído?    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A visão ou a audição atrapalha atividades do dia a dia?            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Acuidade visual

Use a tabela E direcional a 3 metros, com boa iluminação. Teste um olho de cada vez, ocluindo o outro sem comprimir o globo. Se usa óculos para longe, teste com eles. Registre a menor linha em que acerta mais da metade dos optótipos.

### REGISTRO DA ACUIDADE

Olho direito \_\_\_\_\_ Olho esquerdo \_\_\_\_\_ Ambos \_\_\_\_\_  
Com correção? \_\_\_\_\_ Última consulta oftalmológica \_\_\_\_\_

Acuidade pior que 6/12 (20/40) em qualquer olho, diferença importante entre os olhos ou queixa persistente com acuidade normal indicam avaliação oftalmológica. Lembre de catarata, glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética como causas frequentes nesta faixa etária.

## Teste do sussurro

Posicione-se atrás do paciente, fora do campo visual, a cerca de 60 cm. Oclua e fricção suavemente o trago do ouvido não testado. Após expirar completamente, sussurre uma sequência de três números ou palavras e peça que repita. Teste um ouvido de cada vez.

### REGISTRO DA AUDIÇÃO

**Ouvido direito:** ☐ Repetiu corretamente ☐ Falhou  
**Ouvido esquerdo:** ☐ Repetiu corretamente ☐ Falhou  
**Otosopia:** ☐ Normal ☐ Cerume obstrutivo ☐ Alteração timpânica ☐ Não realizada  
**Usa aparelho auditivo:** ☐ Não ☐ Sim, em uso ☐ Sim, mas não usa



Falha em qualquer ouvido sugere perda auditiva e indica avaliação audiológica. Antes de encaminhar, examine o conduto: cerume obstrutivo é causa comum e reversível de perda súbita aparente.

Perda sensorial não corrigida agrava isolamento, humor, cognição e risco de quedas, e distorce o resultado de testes cognitivos. Garanta óculos e aparelho auditivo em uso **antes** de aplicar MEEM, MoCA ou bateria breve — caso contrário o desempenho mede o sentido, não a cognição.

Conduta e encaminhamentos

---

---

---

Assinatura e carimbo do profissional

Referência: Pirozzo S, Papinczak T, Glasziou P. Whispered voice test for screening for hearing impairment in adults and children: systematic review. BMJ. 2003;327(7421):967. • US Preventive Services Task Force, recomendações sobre rastreio visual e auditivo em idosos.