


Patient	Geschl.	Ethnische Herkunft	Geburtsdatum	Größe	Gewicht	Gemessen
####, ####	####	####	####	####	####	####

Zusammensetzung des Bauchgewebes




Fettgewebe
1 Viszeral
2 Subkutan

Die androide Region (männlicher Fettverteilungstyp) ist um den Bauch herum. Erhöhte Fetteinlagerungen in diesem Bereich werden als "Apfelform" bezeichnet. Die gynoide Region (weiblicher Fettverteilungstyp) ist um Hüften und Oberschenkel herum. Erhöhte Fetteinlagerungen in diesem Bereich werden als "Birnenform" bezeichnet. Das Verständnis dafür, wo im Körper Fett eingelagert wird, wurde als wichtiger Faktor bei der Voraussage potentieller Gesundheitsrisiken durch Adipositas festgestellt.

CoreScan schätzt, dass das Bauchfettgewebe (VAT = Visceral Adipose Tissue) und das subkutane Fettgewebe (SAT = Subcutaneous Adipose Tissue) in der Android-Region liegen. VAT ist eine bestimmte Fettsorte, die mit einigen Typen von Stoffwechselkrankheiten in Verbindung gebracht wird (Fettleibigkeit, metabolisches Syndrom und Diabetes Typ 2). Die CoreScan-Ergebnisse wurden für Erwachsene im Alter von 18-90 Jahren und mit einem BMI im Bereich von 18,5-40 validiert.

Gesamt


Zusammensetzungstrend: Gesamt



Datum	Alter	Ges. Masse (kg)	Mager Masse (g)	Fett Masse (g)
####	####	60,3	37 994	20 108

Android / Gynoid

Zusammensetzungstrend: Android



Datum	Alter	Android Masse (kg)	Android Mager (g)	Android Fett (g)	Android %Fett	Gynoid %Fett	A/G Verhältnis
####	####	4,1	2 668	1 344	33,5	39,8	0,84