


röntgen am kai

Priv. Doz. Dr. Peter Kalmar
Priv. Doz. Dr. Georg Riegler

Fachärzte für Radiologie OG


Patient:	####, ####	Überweisender Arzt:	####
Geburtsdatum:	####	Alter:	####
Größe:	####	Gewicht:	####
Geschl.:	####	Ethnische Herkunft:	####
		Patientenkennung:	####
		Gemessen:	#### #### (18 [SP 5])
		Analysiert:	#### #### (18 [SP 5])

AP-Wirbelsäule Knochendichte



Kommentare:

AP-Wirbelsäule: L1-L4 (BMD)



Bereich	Densitometrie				
	BMD (g/cm ²)	YA (%)	YA T-Wert	AM (%)	AM Z-Wert
L1	1,185	105	0,5	110	0,9
L2	1,303	109	0,9	113	1,3
L3	1,388	116	1,6	121	2,0
L4	1,409	117	1,7	123	2,2
L1-L4	1,326	112	1,2	117	1,6

Laut Statistik sind 68% der Folge-Scans im Bereich von 1SA ($\pm 0,010$ g/cm² für AP-Wirbelsäule L1-L4 BMD); Deutschland (Alter 20-40) AP-Wirbelsäule; Female Referenzbevölkerung (v113); Übereinstimmung nach Alter, Geschl., Gewicht (Frauen 25-100 kg), ethnischer Herkunft; Weltgesundheitsorganisation: Definition von Osteoporose und Osteopenie für hellhäutige Frauen: Normal = T-score größer gleich -1,0 SD; Osteopenie = T-score zwischen -1,0 und -2,5 SD; Osteoporose = T-score kleiner gleich -2,5 SD; (die Definitionen der WHO können nur angewendet werden, wenn eine Datenbank von jungen, gesunden und hellhäutigen Frauen existiert, mit der T-Scores ermittelt werden können.

Erstellungsdatum: #### 18 [SP 6]; Dateiname: ####; AP-Wirbelsäule; 76,3,00:50,03:12,0 0,00:9,54 0,60x1,05 22,3%Fett=28,4%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Scanmodus: Standard; 37,0 µGy; 1,23 cGy*cm²