

Documento técnico dirigido al Ministerio de Sanidad

Fisioterapia en Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud

Modelo organizativo, acceso, dotación y evaluación

Versión de trabajo 1.0 · 22 de septiembre de 2026

Elaborado a partir del borrador «Propuesta de Fisioterapia en Atención Primaria para el Ministerio de Sanidad» y de las revisiones de Patricia Moreno Carrero y Raúl Ferrer Peña.

Estado de las fuentes: los artículos científicos están verificados en PubMed. Las normas, los documentos autonómicos y las estadísticas oficiales están pendientes de cotejo en la fuente original, como detalla el anexo F.

Índice

Resumen ejecutivo.....	4
Petición al Ministerio de Sanidad.....	4
Fases de dotación.....	4
Lo que este documento no propone.....	4
Nota de método.....	5
1. Introducción y justificación.....	6
1.1. Papel de la fisioterapia en el primer nivel asistencial.....	6
1.2. Carga de los procesos musculoesqueléticos en atención primaria.....	6
1.3. Incapacidad temporal por procesos musculoesqueléticos.....	7
1.4. El coste de derivar tarde o de derivar dos veces.....	7
1.5. Capacidad resolutoria de la fisioterapia de atención primaria.....	7
2. Marco normativo y de planificación.....	8
2.1. Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias.....	8
2.2. Real Decreto 1030/2006, de cartera de servicios comunes.....	8
2.3. Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.....	9
2.4. Marco Estratégico y planes de acción de atención primaria.....	9
2.5. Real Decreto 601/2019, sobre exposiciones médicas.....	9
2.6. Marco internacional.....	9
3. Situación de la fisioterapia de atención primaria en España.....	10
3.1. Dotación actual.....	10
3.2. Modelos autonómicos.....	10
3.3. Modelos de referencia en España.....	11
3.4. Heterogeneidad e inequidad.....	12
4. Modelos internacionales de referencia.....	13
4.1. Inglaterra y la fisioterapia de primer contacto.....	13
4.2. Noruega, Países Bajos y Suecia y la autorreferencia normalizada.....	14
4.3. Australia y Canadá.....	14
4.4. Síntesis de la evidencia sobre acceso directo.....	14
4.5. Densidad de fisioterapeutas en Europa.....	15
5. Modelo organizativo propuesto.....	17
5.1. Principios.....	17
5.2. Niveles de atención comunitaria.....	17
5.3. Funciones clínicas.....	18
5.4. Programas grupales y programas comunitarios.....	18
5.5. Modalidades asistenciales.....	19
5.6. Herramientas de salud digital.....	20
6. Vías de acceso y circuitos asistenciales.....	21
6.1. Vías de entrada.....	21
6.2. Circuito 1. Autorreferencia.....	21
6.3. Circuito 2. Derivación desde medicina de familia.....	22
6.4. Circuito 3. Derivación desde enfermería familiar y comunitaria.....	22
6.5. Circuito 4. Derivación desde medicina de atención hospitalaria.....	22
6.6. Circuito 5. Retorno desde rehabilitación hospitalaria.....	22
6.7. Matriz de coherencia.....	23

7. Competencias solicitadas y marco legal.....	24
7.1. Competencias que ya ampara la Ley 44/2003.....	24
7.2. Competencias que requieren desarrollo autonómico o protocolo.....	24
7.3. Ecografía como apoyo a la valoración.....	24
7.4. Solicitud de radiología simple.....	24
7.5. Compatibilidad con la cartera común.....	25
7.6. Lo que no se pide.....	25
8. Criterios clínicos de acceso directo.....	26
8.1. Criterio transversal de seguridad clínica.....	26
8.2. Procesos con acceso directo.....	26
8.3. Situaciones excluidas del acceso directo.....	26
8.4. Herramientas de cribado.....	27
9. Dotación calculada por demanda, por fases y con ajuste territorial.....	28
9.1. Punto de partida.....	28
9.2. Modelo de demanda.....	28
9.3. Escenarios como fases.....	30
9.4. Ajustes territoriales.....	31
9.5. Referencias externas de dotación.....	31
10. Sistema de evaluación en formato EFQM.....	33
10.1. Marco.....	33
10.2. Indicadores de Dirección.....	33
10.3. Indicadores de Ejecución.....	33
10.4. Indicadores de Resultados.....	34
10.5. Ficha de indicador.....	34
11. Plan de implantación y gestión de riesgos.....	36
11.1. Fases e hitos.....	36
11.2. Sistemas de información.....	36
11.3. Formación.....	36
11.4. Gobernanza.....	36
11.5. Riesgos y mitigación.....	36
12. Propuesta de texto para el documento ministerial.....	38
Anexo A. Fichas de programas grupales y comunitarios.....	39
Anexo B. Fichas de indicadores.....	43
Anexo C. Matriz de coherencia de procesos, vías y condiciones.....	51
Anexo D. Glosario y terminología normalizada.....	54
Anexo E. Tabla de fuentes por cifra.....	56
Anexo F. Metodología de verificación de referencias.....	60
F.1. Criterios.....	60
F.2. Estado de las referencias citadas.....	60
F.3. Afirmaciones del borrador sin fuente localizable.....	60
F.4. Documentos que deben incorporarse antes de la entrega.....	61
Referencias.....	62

Resumen ejecutivo

La fisioterapia de atención primaria es un recurso del primer nivel asistencial, ya previsto en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Su despliegue es desigual entre comunidades autónomas. Un modelo homogéneo puede resolver en atención primaria una parte importante de los procesos musculoesqueléticos de alta prevalencia. Ese modelo combina consulta propia, acceso por varias vías, criterios clínicos de seguridad aplicados por el propio fisioterapeuta, dotación planificada por demanda e indicadores comunes. Además, reduce las derivaciones duplicadas y mejora la equidad territorial.

Peticiones al Ministerio de Sanidad

Este documento formula seis peticiones:

1. **Modelo organizativo homogéneo.** El fisioterapeuta se integra en el equipo de atención primaria de cada zona básica de salud, con consulta propia, agenda propia y tiempo protegido.
2. **Vías de acceso con autorreferencia regulada.** La persona puede pedir cita sin derivación para procesos protocolizados. El Consejo Interterritorial impulsa la actualización de la cartera común para recoger esa vía, que hoy exige indicación médica.
3. **Competencias.** Se reconoce la ecografía como apoyo a la valoración y se inicia el desarrollo normativo para que el fisioterapeuta de atención primaria pueda solicitar radiografía simple en procesos protocolizados.
4. **Dotación calculada por demanda.** La dotación sale de un modelo común con parámetros explícitos y se despliega en tres fases.
5. **Indicadores comunes.** Los servicios de salud registran en el Sistema de Información de Atención Primaria un conjunto común de indicadores con formato EFQM.
6. **Grupo de trabajo del Consejo Interterritorial.** Un grupo de trabajo coordina el despliegue, aprueba la matriz común de procesos y fija los estándares.

Fases de dotación

Tabla R.1. Fases de dotación que propone este documento

Fase	Horizonte	Dotación
Implantación	Años primero y segundo	Ninguna comunidad autónoma por debajo de 1 fisioterapeuta por cada 23.900 habitantes
Consolidación	Años tercero a quinto	1 fisioterapeuta por cada 7.500 habitantes
Necesidad especial	Desde el tercer año	Hasta 1 fisioterapeuta por cada 4.400 habitantes en zonas rurales, envejecidas y con alta dependencia

Fuente: modelo de demanda de la sección 9 y tabla 9.4.

Lo que este documento no propone

- No propone dimensionar la fisioterapia de atención primaria para absorber la demora de rehabilitación hospitalaria. La relación entre ambos niveles se regula con un circuito de continuidad.
- No propone que el personal no sanitario realice ningún cribado ni triaje. El personal administrativo solo aplica motivos de consulta parametrizados por los clínicos.
- No propone crear especialidades de fisioterapia.

- No pide la prescripción de medicamentos, la solicitud de pruebas de imagen avanzada ni la derivación a atención hospitalaria sin pasar por medicina de familia.

Nota de método

Todas las cifras del cuerpo del documento llevan su fuente y figuran en el anexo E. Las referencias proceden de fuentes primarias. El anexo F indica cuáles se han verificado abriendo la fuente y cuáles quedan pendientes de cotejo. El efecto del acceso directo sobre las consultas de medicina de familia se presenta como un resultado a evaluar y no como un resultado garantizado.

1. Introducción y justificación

Esta sección explica por qué la fisioterapia forma parte del primer nivel asistencial y qué peso tienen los procesos musculoesqueléticos en atención primaria (AP). También expone el coste de derivar tarde o de derivar el mismo proceso a dos servicios. Termina con los datos publicados sobre la capacidad resolutoria de la fisioterapia de AP.

1.1. Papel de la fisioterapia en el primer nivel asistencial

La Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, define el ámbito de la profesión en su artículo 7.2.b [1]. El texto dice: «corresponde a los Diplomados universitarios en Fisioterapia la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas» [1]. La definición incluye, por tanto, la prevención y la recuperación funcional. Ambas son tareas propias del primer nivel asistencial.

World Physiotherapy describe la formación de acceso a la profesión como suficiente para ejercer como profesional autónomo de primer contacto [2]. Según esa declaración, el fisioterapeuta puede valorar, diagnosticar, intervenir, medir resultados y dar el alta sin derivación previa de otro profesional [2]. La descripción de la profesión que publica la misma organización sitúa la función y el movimiento en el centro de su actuación [3].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la rehabilitación entre los servicios esenciales de salud [4]. La iniciativa Rehabilitation 2030 pidió integrarla en todos los niveles del sistema, incluida la atención primaria [5]. En 2023, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA76.6 para fortalecer la rehabilitación en los sistemas de salud [6]. La OMS publicó además un paquete de intervenciones de rehabilitación con una selección pensada para la atención primaria [7].

1.2. Carga de los procesos musculoesqueléticos en atención primaria

La Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) registra los problemas de salud atendidos en AP con la clasificación CIAP-2 [8]. En 2023, los problemas del aparato locomotor, capítulo L de esa clasificación, sumaron 51.813.798 registros [8]. Ese volumen solo quedó por detrás del grupo de problemas generales e inespecíficos [8]. El dato cuenta problemas registrados en la historia clínica, no consultas ni personas. Por eso no puede compararse con las cifras de otros países que se describen a continuación.

En Inglaterra, el Musculoskeletal Services Framework del Department of Health atribuyó a los problemas musculoesqueléticos hasta el 30 % de las consultas de medicina general [9]. NHS England reproduce esa cifra en su página sobre fisioterapia de primer contacto [10]. Se trata de una cifra de un documento de política sanitaria, no de un estudio que la haya medido.

Los estudios que miden consultas dan cifras menores. Jordan y colaboradores analizaron doce consultas de medicina general inglesas con datos de 2006 [11]. En ese estudio, una de cada siete consultas registradas correspondió a un problema musculoesquelético [11]. El ensayo piloto STEMS estimó que alrededor del 17 % de las consultas de medicina general se deben a estos procesos [12]. Keavy y colaboradores revisaron 545 consultas de un centro urbano y hallaron una proporción del 21,1 % [13].

La carga es, por tanto, alta con cualquier definición. Sin embargo, el rango empírico se sitúa entre una de cada siete y una de cada cinco consultas [11, 13]. Este documento usa ese rango y no la cifra del 30 % del documento de política, porque el rango procede de mediciones directas [9, 11].

1.3. Incapacidad temporal por procesos musculoesqueléticos

La estadística de incapacidad temporal de la Seguridad Social ofrece la distribución de los procesos por grupo diagnóstico [14]. Esa estadística es la referencia que debe usar el indicador IR-6 del anexo B.

Regal-Ramos analizó 60.000 trabajadores valorados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 2019 por patología osteomuscular [15]. Entre los procesos valorados, la columna lumbar supuso el 31,6 %, el hombro el 13,5 % y la rodilla el 11,9 % [15]. Las tres localizaciones coinciden con procesos que este documento propone atender en AP. Por eso la duración de la incapacidad temporal en esos procesos es un resultado que el modelo debe medir.

1.4. El coste de derivar tarde o de derivar dos veces

Cada proceso debe llegar primero al recurso más adecuado para él. Si la respuesta de ese recurso no basta, el profesional valora entonces la derivación a otro. La derivación simultánea del mismo proceso a dos servicios duplica esperas, consultas y pruebas. Además, fragmenta la información clínica y dificulta que un único profesional asuma el seguimiento.

La literatura sobre acceso directo aporta datos sobre ese coste. Una revisión sistemática de Ojha y colaboradores comparó episodios de fisioterapia con acceso directo y episodios derivados por un médico [16]. Los episodios con acceso directo tuvieron menos sesiones de fisioterapia, menos pruebas de imagen y menos medicación prescrita, sin evidencia de daño [16]. Los estudios incluidos eran observacionales, de modo que el resultado debe leerse con cautela [16].

Frogner y colaboradores estudiaron el dolor lumbar en aseguradoras comerciales de Estados Unidos [17]. Las personas que consultaron primero con fisioterapia tuvieron menor probabilidad de recibir opioides, imagen avanzada o atención en urgencias [17]. En cambio, tuvieron una probabilidad mayor de hospitalización, y el estudio no permite explicar ese hallazgo [17]. Un metaanálisis de ensayos aleatorizados publicado en 2025 encontró menos pruebas de imagen y menos medicación cuando la fisioterapia es el primer contacto [18].

1.5. Capacidad resolutive de la fisioterapia de atención primaria

Downie y colaboradores evaluaron durante dos años un servicio escocés de fisioterapia como alternativa al médico de familia [19]. De los 8.417 contactos registrados, el 87,3 % se resolvió en atención primaria [19]. Además, el 60,4 % necesitó solo pautas de automanejo [19].

Una evaluación nacional retrospectiva en setenta redes de atención primaria del Reino Unido analizó la reconsulta tras una cita de fisioterapia de primer contacto [20]. El 78,5 % de las personas no volvió a consultar en las doce semanas siguientes [20].

En España, la Comunidad de Madrid informó de que sus unidades de fisioterapia de AP atendieron a cerca de 159.000 personas en 2024 [21]. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid recoge esos datos de 2024 en su documento de posición [22]. Según ese documento, la consecución de objetivos rondó el 77 % y la reducción del dolor alcanzó a cerca del 93 % de los casos [22]. Estos datos proceden de la actividad asistencial y no de un estudio comparativo.

La búsqueda realizada para este documento no ha encontrado ningún estudio publicado que evalúe un modelo de acceso directo a fisioterapia dentro del Sistema Nacional de Salud (anexo F). Esta carencia tiene una consecuencia práctica. El despliegue que se propone debe medir sus resultados desde el primer día, con indicadores comunes para todas las comunidades autónomas (sección 10).

2. Marco normativo y de planificación

Esta sección muestra que la propuesta desarrolla un servicio que ya forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS). También identifica los límites normativos que la propuesta debe respetar o pedir que se modifiquen.

2.1. Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias

La Ley 44/2003 reconoce a los profesionales sanitarios la prestación de los cuidados propios de su competencia en las distintas fases del proceso de atención [1]. El mismo artículo 7 añade que esa prestación se hace sin menoscabo de la competencia, la responsabilidad y la autonomía de los demás profesionales que intervienen [1]. El artículo 7.2.b, citado en la sección 1.1, delimita el contenido propio de la fisioterapia [1].

La ley también regula las relaciones interprofesionales y el trabajo en equipo en su artículo 9 [1]. Ese artículo ampara la integración del fisioterapeuta en el equipo de AP como miembro de pleno derecho. La ley no atribuye al fisioterapeuta la solicitud de pruebas de imagen, y la sección 7 trata esa cuestión por separado [1].

2.2. Real Decreto 1030/2006, de cartera de servicios comunes

El anexo II del Real Decreto 1030/2006 contiene la cartera común de AP, y su apartado 6 regula la rehabilitación básica [23, 24]. El texto dice: «Comprende las actividades de educación, prevención y rehabilitación que son susceptibles de realizarse en el ámbito de atención primaria, en régimen ambulatorio, previa indicación médica y de acuerdo con los programas de cada servicio de salud, incluyendo la asistencia domiciliaria si se considera necesaria por circunstancias clínicas o por limitaciones en la accesibilidad» [24].

El apartado incluye seis contenidos [24]:

- La prevención del desarrollo o de la progresión de trastornos musculoesqueléticos.
- Los tratamientos fisioterapéuticos para el control de síntomas y la mejora funcional en procesos crónicos musculoesqueléticos.
- La recuperación de procesos agudos musculoesqueléticos leves.
- Los tratamientos fisioterapéuticos en trastornos neurológicos.
- La fisioterapia respiratoria.
- La orientación y formación sanitaria al paciente o a la persona cuidadora, en su caso.

La fisioterapia forma parte, por tanto, de la cartera común de AP desde 2006 [23]. Esta propuesta no crea un servicio nuevo, sino que desarrolla uno existente y homogeneiza su prestación.

El apartado 6 contiene, sin embargo, un inciso que condiciona toda la propuesta: las actividades se realizan «previa indicación médica» [24]. Un modelo estatal de autorreferencia tiene que tratar este inciso de forma expresa. La sección 7.5 expone cómo lo hace este documento.

El anexo III del mismo real decreto regula la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable en el ámbito hospitalario [23]. Su contenido comprende el diagnóstico, la evaluación, la prevención y el tratamiento de ese déficit, con el fin de reintegrar al paciente en su medio habitual [23]. La distinción entre ambos anexos delimita los dos niveles. La rehabilitación básica corresponde a AP, mientras que la rehabilitación del déficit funcional complejo corresponde a la atención hospitalaria. La Orden SND/454/2025 modificó varios anexos del real decreto [25]. Su efecto sobre el apartado 6 del anexo II debe comprobarse en el texto consolidado (anexo F).

2.3. Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

La Ley 16/2003 define la cartera común básica en su artículo 8 bis [26]. Según ese artículo, la cartera comprende las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realizan en centros sanitarios o sociosanitarios [26].

El artículo 20 establece que la cartera de servicios se acuerda en el seno del Consejo Interterritorial y se aprueba mediante real decreto [26]. El artículo 21 regula su actualización, que exige evaluar la seguridad, la eficacia, la eficiencia o la efectividad del procedimiento [26]. El artículo 71 atribuye al Consejo Interterritorial el conocimiento y el debate sobre el desarrollo de la cartera común [26]. Esta ley ofrece la vía formal para dos de las peticiones de este documento: la actualización del apartado 6 del anexo II y la creación de un grupo de trabajo para el despliegue.

2.4. Marco Estratégico y planes de acción de atención primaria

El Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria se aprobó en el Consejo Interterritorial en 2019 [27]. Su acción A.4.4 incluye el objetivo de «incrementar la capacidad resolutive de fisioterapia, asumiendo patología aguda de baja complejidad y crónica estable, mediante circuitos y protocolos de actuación basados en la evidencia» [22, 27]. El mismo marco pide «potenciar la participación de fisioterapia en actividades preventivas» [27].

El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 dio continuidad a ese marco [28]. El Plan de Acción 2025-2027, aprobado en diciembre de 2024, define un nuevo mapa de competencias que incluye a los fisioterapeutas de AP [29, 30]. Sus objetivos incluyen la continuidad asistencial, la ampliación de la cartera y la mejora de la capacidad resolutive [30]. Este documento se presenta como desarrollo operativo de esos objetivos para la fisioterapia.

Otras tres estrategias del Ministerio de Sanidad enmarcan la propuesta. La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad orienta la atención de los procesos crónicos [31]. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención vincula el consejo sobre estilos de vida en AP con los recursos comunitarios [32]. Por último, la Estrategia de Salud Digital del SNS ofrece el marco para la teleconsulta y el seguimiento remoto [33].

2.5. Real Decreto 601/2019, sobre exposiciones médicas

El Real Decreto 601/2019 regula la justificación y la optimización de las exposiciones médicas a radiaciones ionizantes [34]. La norma distingue dos figuras. El prescriptor es el «médico, odontólogo u otro profesional sanitario autorizado para remitir a personas para ser sometidas a procedimientos médico-radiológicos» [34]. El profesional sanitario habilitado es quien asume la responsabilidad clínica de la exposición [34].

La norma no menciona al fisioterapeuta en ninguna de las dos figuras [34]. La Directiva 2013/59/Euratom, que el real decreto transpone, tampoco reserva en exclusiva a los médicos la remisión a estos procedimientos [35]. Este marco es la base de la petición de la sección 7.4.

2.6. Marco internacional

La resolución WHA76.6 insta a los Estados a fortalecer la rehabilitación en sus sistemas de salud [6]. La OMS recomienda integrar la rehabilitación en la atención primaria y ha publicado para ese nivel un paquete de intervenciones priorizadas [4, 7]. World Physiotherapy mantiene una declaración de política sobre el acceso directo y la autorreferencia, revisada en 2023 [2]. La región europea de esa organización publicó también una declaración sobre la fisioterapia en atención primaria [36].

3. Situación de la fisioterapia de atención primaria en España

Esta sección describe la dotación actual y los modelos que aplica cada comunidad autónoma. Cada afirmación sobre una comunidad cita el documento que la sostiene y su año. Cuando solo existe una noticia de prensa, el texto la identifica como fuente secundaria.

3.1. Dotación actual

El informe monográfico de recursos humanos del SNS de 2024 contabiliza 2.418 fisioterapeutas en AP [37]. Según el mismo informe, el 84,8 % de los fisioterapeutas del SNS trabaja en hospitales y el 10 % en AP [37]. El reparto muestra que la fisioterapia pública se concentra en el nivel hospitalario.

La dotación de AP varía mucho entre comunidades autónomas. Un editorial de la revista Fisioterapia recogió en 2022 los habitantes por fisioterapeuta de AP según el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) [38]. La tabla 3.1 resume los valores extremos que publicó [38].

Tabla 3.1. Habitantes por fisioterapeuta de atención primaria en las comunidades autónomas con los valores extremos

Comunidad autónoma	Habitantes por fisioterapeuta de AP	Posición
Asturias	13.694	Entre las de mayor dotación
Cantabria	10.091	Mayor dotación
Cataluña	104.847	Menor dotación
Extremadura	12.101	Entre las de mayor dotación
Navarra	91.972	Entre las de menor dotación

Fuente: Aiguadé Aiguadé, 2022, con datos del SIAP [38]. El editorial no precisa el año del dato. Los valores son anteriores a la incorporación de fisioterapeutas a los equipos de AP de Cataluña en 2022 y 2023 [39].

La diferencia entre los extremos supera la relación de diez a uno [38]. La cifra de Cataluña es anterior a su programa de incorporación de fisioterapeutas, que situó un profesional en cada equipo de AP entre 2022 y 2023 [39, 40]. La serie completa y actualizada por comunidad autónoma debe tomarse del SIAP, que es la fuente que usará el indicador IE-3 [41].

3.2. Modelos autonómicos

La tabla 3.2 resume el modelo de cada comunidad autónoma. Las columnas indican tres cosas. La primera es si existe consulta propia en el centro de salud. La segunda es si el médico de familia deriva sin pasar por rehabilitación hospitalaria. La tercera es si la persona puede pedir cita sin derivación.

Tabla 3.2. Modelos de fisioterapia de atención primaria por comunidad autónoma

Comunidad autónoma	Documento de referencia	Año	Consulta propia	Derivación directa desde medicina de familia	Acceso directo del ciudadano
Andalucía	Carta de servicios de AP y circuito de derivación directa del Servicio Andaluz de Salud [42, 43]	2026	Sí	Sí, para seis procesos	No
Aragón	Carta de Servicios de Atención Primaria del Gobierno de Aragón [44]	2024	Sí	Sin protocolo localizado	No
Asturias	No localizado	No consta	No consta	No consta	No
Baleares	Protocolo de derivación directa de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca [45]	2023	Sí	Sí, para doce patologías	No
Canarias	Guía de actuación de la consulta de fisioterapia en AP del Servicio Canario de la Salud [46, 47]	2022	Sí	Sí	No

Comunidad autónoma	Documento de referencia	Año	Consulta propia	Derivación directa desde medicina de familia	Acceso directo del ciudadano
Cantabria	No localizado	No consta	No consta	No consta	No
Castilla-La Mancha	Guía de Unidades de Fisioterapia de AP del SESCAM [48]	2022	Sí	Sí, también desde pediatría	No
Castilla y León	Protocolos de fisioterapia en AP de la Junta de Castilla y León [49]	2017	Sí	Sí	No
Cataluña	Programa de incorporación de fisioterapeutas y plan funcional del Departament de Salut [39, 40]	2023	Sí, en cada equipo de AP	Sí, dentro del equipo	No consta
Comunidad Valenciana	Cartera de servicios de Atención Primaria Comunitaria de la Conselleria de Sanitat [50]	2022	Sí	No consta	No
Extremadura	Protocolo de derivación del Área de Salud de Plasencia [51]	2019	Sí	Sí, en esa área	No
Galicia	Carteira de servizos de fisioterapia de AP del SERGAS [52]	2022	Sí	Sí	Sí, con motivos parametrizados
La Rioja	No localizado	No consta	No consta	No consta	No
Madrid	Cartera de Servicios Estandarizados de AP del Servicio Madrileño de Salud [21, 53]	2025	Sí	Sí	Sí, para tres procesos
Murcia	Cartera de Servicios de Fisioterapia en AP del Servicio Murciano de Salud [54]	2026	Sí	No consta	No
Navarra	Formación oficial del Servicio Navarro de Salud sobre derivación directa [55]	No consta	Sí	Sí, para procesos determinados	No
País Vasco	Información institucional de Osakidetza [56]	2024	Sí	No consta	No

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos citados en cada fila. El anexo F indica el estado de verificación de cada documento. «No localizado» significa que la búsqueda no encontró un documento oficial.

3.3. Modelos de referencia en España

Canarias protocoliza la derivación desde medicina de familia

El Servicio Canario de la Salud dispone desde 2022 de una guía de actuación de la consulta de fisioterapia en AP [46]. El despliegue comenzó en 24 zonas básicas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, según la nota oficial del Gobierno de Canarias [47]. El modelo se basa en la valoración individual, el plan personalizado, la educación sanitaria y el ejercicio terapéutico [47]. Incluye procesos como la gonartrosis, la coxartrosis, el dolor lumbar y cervical persistente, la epicondilitis y la EPOC leve estable [47].

Galicia abre el acceso directo mediante la gestión de la demanda

El Servizo Galego de Saúde (SERGAS) publica una cartera de servicios de fisioterapia de AP y comunitaria [52]. En 2022 incorporó la categoría de fisioterapeuta a su protocolo de gestión de la demanda del equipo, conocido como XIDE [57]. Con ese protocolo, la persona accede a la consulta de fisioterapia sin la intermediación de otro profesional para motivos clínicos parametrizados [57]. El pilotaje comenzó en los servicios de Culleredo e Illas Canarias, según una noticia de prensa que este documento usa como fuente secundaria [57].

Madrid admite el acceso directo para tres procesos

La Cartera de Servicios Estandarizados de AP del Servicio Madrileño de Salud, actualizada en septiembre de 2025, incluye la atención fisioterapéutica a personas con procesos musculoesqueléticos agudos y subagudos [53]. La nota oficial de septiembre de 2025 describe la citación directa desde la Unidad de Atención al Usuario [21]. Se aplica a quien refiere un posible esguince de tobillo, una epicondialgia o una fascitis plantar [21]. En los demás procesos, la página institucional de la Comunidad de Madrid indica que es necesaria la derivación del médico de

familia [58]. La búsqueda no ha localizado la instrucción de la Gerencia Asistencial de AP que regula la citación directa (anexo F).

Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha documentan la derivación directa

El Servicio Andaluz de Salud implantó en mayo de 2026 la derivación desde medicina de familia a fisioterapia de AP en toda la comunidad [43]. El circuito cubre la lumbalgia, la cervicalgia, la gonalgia, el hombro doloroso, la fascitis plantar y la epicondilitis [43]. La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca aprobó en 2023 un protocolo de derivación directa para doce patologías de baja complejidad y alta resolución [45]. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha publicó en 2022 una guía que permite al médico de familia y al pediatra derivar directamente a fisioterapia [48].

3.4. Heterogeneidad e inequidad

La misma cartera común se traduce en modelos muy distintos según el territorio. En la mayoría de las comunidades autónomas, la derivación directa desde medicina de familia ya está documentada (tabla 3.2). Sin embargo, solo Galicia y Madrid documentan el acceso directo del ciudadano, y Madrid lo limita a tres procesos [21, 57].

La dotación también difiere en más de diez veces entre comunidades autónomas [38]. Una persona con el mismo proceso puede recibir, por tanto, una atención muy distinta según su lugar de residencia. Esta desigualdad es el argumento principal para un modelo homogéneo en todo el SNS.

4. Modelos internacionales de referencia

Esta sección describe los sistemas sanitarios que sirven de referencia a la propuesta. Para cada uno, indica qué elementos se toman y qué elementos no se piden para España. Todas las afirmaciones proceden de documentos oficiales del sistema descrito o de artículos revisados por pares.

Advertencia metodológica. Las estadísticas internacionales cuentan los fisioterapeutas de todo el sistema sanitario y no los de atención primaria. Además, cada país usa una definición distinta: fisioterapeutas en ejercicio, profesionalmente activos o con licencia. Ninguna cifra de esta sección sirve para fijar una ratio de atención primaria. La dotación que propone este documento sale del modelo de demanda de la sección 9.

4.1. Inglaterra y la fisioterapia de primer contacto

El NHS Long Term Plan de 2019 impulsó equipos multidisciplinares comunitarios ligados a las redes de atención primaria [59]. Desde 2020, las consultas de medicina general pueden financiar la contratación de fisioterapeutas de primer contacto a través del Additional Roles Reimbursement Scheme [10, 60]. NHS England describe el objetivo de que las personas adultas puedan ver a un fisioterapeuta de primer contacto en su centro sin derivación del médico general [10].

Health Education England publicó en 2020 una hoja de ruta de competencias para este perfil [61]. El documento sitúa la práctica en nivel de máster y organiza catorce capacidades en cuatro dominios [61]. Según esa documentación, el profesional de primer contacto puede solicitar pruebas y derivar a atención hospitalaria por las mismas vías que el médico general [61]. La Chartered Society of Physiotherapy publicó con la British Medical Association y el Royal College of General Practitioners una guía de implantación [62].

Las evaluaciones publicadas describen el funcionamiento del modelo:

- Goodwin y Hendrick evaluaron más de quinientos pacientes atendidos por fisioterapia como primer contacto en dos consultas de medicina general [63].
- La evaluación nacional de Stynes y colaboradores incluyó 40 centros y 240 fisioterapeutas de primer contacto en Inglaterra [64]. La misma evaluación estudió la satisfacción de los pacientes y la experiencia de los profesionales [65, 66].
- El estudio FRONTIER comparó la atención de primer contacto por fisioterapia con la atención iniciada por el médico general en 426 adultos de 46 consultas [67]. No encontró diferencias en la función física a los seis meses y no identificó problemas de seguridad [67].
- En FRONTIER, el 44,7 % de las personas del grupo de medicina general recibió medicación tras la primera consulta [67]. En los dos grupos de fisioterapia, la proporción fue del 18,4 % y del 24,7 % [67]. El coste mediano para el NHS fue de 105,5 libras por paciente en el grupo médico, frente a 41,0 y 44,0 libras en los grupos de fisioterapia [67, 68].

Tabla 4.1. Elementos del modelo inglés que se toman y que no se piden

Elemento del modelo inglés	Se toma para el SNS	Se pide en este documento
Fisioterapeuta integrado en el equipo de atención primaria	Sí	Sí, como principio del modelo organizativo
Primer contacto para procesos musculoesqueléticos sin derivación médica	Sí, para procesos protocolizados	Sí, con la matriz del anexo C
Financiación específica ligada a la contratación	No	No
Solicitud de radiografía simple	En parte	Sí, como habilitación normativa limitada (sección 7.4)

Elemento del modelo inglés	Se toma para el SNS	Se pide en este documento
Solicitud de resonancia magnética y otras pruebas avanzadas	No	No
Derivación directa a atención hospitalaria sin medicina de familia	No	No, salvo el circuito de urgencias
Objetivo de liberar consultas médicas	Sí, como resultado a evaluar	No se presenta como resultado garantizado

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos de NHS England, Health Education England y la Chartered Society of Physiotherapy [10, 61, 62].

4.2. Noruega, Países Bajos y Suecia y la autorreferencia normalizada

Los Países Bajos introdujeron el acceso directo a fisioterapia en 2006 [69]. En el primer año, el 28 % de los pacientes llegó a fisioterapia por acceso directo [69]. Ese mismo estudio observó que el número total de pacientes atendidos no aumentó respecto al año anterior [69]. Los pacientes con acceso directo recibieron además menos sesiones de tratamiento [69]. Una evaluación posterior describió la evolución de la autorreferencia durante cinco años [70]. Según el instituto Nivel, en 2024 el 74,3 % de los pacientes acudió a fisioterapia sin derivación [71].

Noruega eliminó el requisito de derivación médica para la fisioterapia financiada el 1 de enero de 2018 [72]. La condición para la financiación pública es que el fisioterapeuta tenga acuerdo con el municipio [72].

En Suecia, la organización depende de cada región. La región de Estocolmo informa de que no se necesita derivación para contactar con fisioterapia de AP, aunque advierte que otras regiones pueden exigirla [73]. Un ensayo pragmático sueco comparó la valoración inicial por fisioterapia en el centro de salud con la valoración inicial por el médico general [74]. Su evaluación económica encontró un manejo más coste-efectivo cuando la primera valoración la hacía fisioterapia [75]. Ese diseño es un triaje dentro del centro y no un acceso directo nacional, de modo que no debe presentarse como tal.

Tabla 4.2. Elementos de Noruega, Países Bajos y Suecia que se toman

Elemento	Aplicación en la propuesta
Acceso directo normalizado	Legitima la autorreferencia protocolizada
Aumento progresivo de la autorreferencia a lo largo de los años	Justifica un despliegue por fases y un parámetro de captación en el modelo
Financiación pública ligada a un acuerdo con la administración	Refuerza la integración del fisioterapeuta en la estructura pública
Triage por fisioterapia dentro del centro de salud	Apoya la consulta de primer contacto del nivel 1

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos citados en la sección 4.2 [69, 71-73].

4.3. Australia y Canadá

La Australian Physiotherapy Association describe la práctica avanzada y el primer contacto, incluida la solicitud de imagen en algunos servicios de urgencias [76]. La Canadian Physiotherapy Association reconoce el acceso directo, pero advierte que la práctica cambia entre provincias [77]. Ambos sistemas se citan solo como referencia de equipos interprofesionales, porque la cobertura pública de la fisioterapia es distinta de la española. Este documento no usa Nueva Zelanda como referencia, porque la búsqueda no localizó una fuente oficial sobre su modelo (anexo F).

4.4. Síntesis de la evidencia sobre acceso directo

Las revisiones sistemáticas disponibles comparan el acceso directo con la atención iniciada por el médico. Ojha y colaboradores incluyeron ocho estudios observacionales y no encontraron evidencia de daño [16]. Piscitelli y

colaboradores revisaron trece estudios sobre viabilidad, efectividad, costes, seguridad y satisfacción [78]. Demont y colaboradores incluyeron dieciocho estudios de calidad débil a moderada [79]. Babatunde y colaboradores concluyeron que el dolor y la discapacidad no difieren mucho entre ambos modelos [80]. La misma revisión encontró un uso menor de servicios y menos ausencia laboral con el acceso directo, con una evidencia consistente pero limitada [80].

Las revisiones más recientes aportan estimaciones cuantitativas. Gallotti y colaboradores revisaron 28 artículos y no encontraron eventos adversos en ninguno de ellos [81]. Abuhl y colaboradores combinaron diez ensayos aleatorizados con 2.081 pacientes [18]. El primer contacto por fisioterapia redujo la solicitud de imagen, con un riesgo relativo de 0,55, y la medicación, con un riesgo relativo de 0,29 [18]. Una revisión de práctica avanzada llegó a conclusiones favorables sobre la efectividad de este perfil [82].

El efecto sobre la carga de medicina de familia es heterogéneo, y este documento lo presenta como un resultado posible y no garantizado. El estudio STEMS-2 analizó seis años de datos de cuatro consultas inglesas antes y después de abrir la autorreferencia [83]. No encontró un efecto consistente sobre las consultas musculoesqueléticas de medicina general [83]. La autorreferencia real supuso solo el 10 % y el 6 % de las entradas a fisioterapia en los dos brazos del estudio [83]. En cambio, una revisión de 2026 reunió 21 estudios con 90.401 pacientes [84]. Esa revisión estimó entre un 10 % y un 30 % menos de consultas de medicina general con acceso directo [84]. Un metaanálisis del mismo grupo encontró menos prescripción, con un riesgo relativo de 0,57 y una certeza baja [85].

Tabla 4.3. Síntesis de la evidencia por tipo de resultado

Resultado	Dirección del efecto del acceso directo	Certeza y comentario
Seguridad	Sin eventos adversos atribuibles en las revisiones	Consistente entre revisiones [16, 81, 84]
Dolor y función	Sin diferencias relevantes frente a la atención médica	Ensayos y revisiones [67, 80]
Pruebas de imagen	Menos solicitudes	Metaanálisis de ensayos [18]
Medicación	Menos prescripción	Metaanálisis con certeza baja a moderada [18, 85]
Coste	Menor en la mayoría de los estudios	Entornos distintos del español [17, 67, 75]
Consultas de medicina general	Heterogéneo	Sin efecto consistente en STEMS-2 y reducción estimada en una revisión [83, 84]
Captación de la autorreferencia	Baja al inicio y creciente con los años	Datos del Reino Unido y de los Países Bajos [69, 71, 83]

Fuente: elaboración propia a partir de las revisiones y estudios citados en cada fila.

4.5. Densidad de fisioterapeutas en Europa

Según Eurostat, en 2021 trabajaban en la Unión Europea 611.000 fisioterapeutas, con una media de 136,7 por 100.000 habitantes [86]. Alemania alcanzaba 234,4 y Bélgica 215,9, mientras que Rumanía se situaba en 12,7 [86]. En 2023, la media de la Unión llegó a 149 por 100.000 habitantes [87]. Estas cifras cuentan todos los ámbitos asistenciales, como indica la advertencia inicial de esta sección.

Tabla 4.4. Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en la Unión Europea y en países seleccionados

Territorio	2021	2023	Definición
Alemania	234,4	240	En ejercicio, todos los ámbitos
Bélgica	215,9	228	En ejercicio, todos los ámbitos
Países Bajos	No consta en la fuente localizada	188	En ejercicio, todos los ámbitos

Territorio	2021	2023	Definición
Rumanía	12,7	No consta en la fuente localizada	En ejercicio, todos los ámbitos
Unión Europea	136,7	149	Media de los Estados miembros

Fuente: Eurostat [86, 87]. Algunos países notifican fisioterapeutas profesionalmente activos o con licencia, según las notas metodológicas de Eurostat. El valor de España debe extraerse de la misma tabla para completar la comparación.

El censo anual de World Physiotherapy de 2024 estimó una media mundial de 3,6 fisioterapeutas por 10.000 habitantes [88]. En ese censo, el 39 % de las organizaciones nacionales declaró acceso directo pleno en su país [88]. Una encuesta anterior de Bury y Stokes encontró acceso directo en el 58 % de los países que respondieron, con más frecuencia en el ámbito privado [89].

5. Modelo organizativo propuesto

Esta sección define cómo se organiza la fisioterapia dentro del equipo de AP. Describe tres niveles de atención comunitaria, las funciones clínicas, los programas grupales y comunitarios y las modalidades asistenciales. Cada programa grupal tiene una ficha en el anexo A con las horas de fisioterapia que consume. Esas horas alimentan el modelo de dotación de la sección 9.

5.1. Principios

El modelo se apoya en seis principios:

- **Integración en el equipo.** El fisioterapeuta forma parte del equipo de AP de cada zona básica de salud como miembro de pleno derecho y no como personal de apoyo.
- **Consulta propia.** Cada zona básica dispone de consulta de fisioterapia con espacio físico propio o compartido de forma estable.
- **Agenda propia.** La agenda de fisioterapia admite citas por todas las vías de entrada de la sección 6.
- **Historia clínica compartida.** El fisioterapeuta registra su actividad en la misma historia clínica que el resto del equipo.
- **Tiempo protegido.** La jornada reserva tiempo para la actividad comunitaria no clínica, la docencia, la investigación y la coordinación. El modelo de dotación de la sección 9 lo incluye de forma explícita.
- **Medición común.** Todos los servicios de salud registran los indicadores de la sección 10.

5.2. Niveles de atención comunitaria

El modelo organiza la actividad en tres niveles de atención comunitaria. Cada nivel tiene una población diana, una puerta de entrada, una intensidad y unas salidas propias.

Tabla 5.1. Niveles de atención comunitaria de la fisioterapia de atención primaria

Nivel	Población diana	Puerta de entrada	Intensidad	Salidas
Nivel 1. Consulta de fisioterapia de primer contacto	Personas adultas con procesos musculoesqueléticos y otros procesos de la matriz del anexo C	Autorreferencia, derivación desde medicina de familia y demás vías de la sección 6	Primera consulta de valoración y, si procede, consultas individuales de seguimiento	Alta con plan de autocuidado, tratamiento individual, programa grupal o derivación a otro profesional
Nivel 2. Intervención grupal e intervención comunitaria	Personas con un proceso definido que se beneficia del trabajo en grupo y población general en la intervención comunitaria	Nivel 1, enfermería familiar y comunitaria y medicina de familia	Ediciones periódicas según las fichas del anexo A	Alta con plan de automanejo o retorno al nivel 1
Nivel 3. Fisioterapia domiciliar y de continuidad	Personas con dependencia, fragilidad, alta hospitalaria reciente o cronicidad compleja	Enfermería, medicina de familia, trabajo social sanitario y atención hospitalaria	Visitas domiciliarias y coordinación sociosanitaria	Alta, paso al nivel 2 o valoración multidisciplinar

Fuente: elaboración propia a partir de la especificación del modelo.

La consulta de primer contacto tiene cuatro salidas posibles. La persona puede recibir el alta con un plan de autocuidado, iniciar un tratamiento individual, incorporarse a un programa grupal o ser derivada a otro profesional. Esta regla atiende el comentario de la revisión que pedía explicitar la derivación a tratamiento individual o a grupos.

5.3. Funciones clínicas

El fisioterapeuta de AP valora procesos musculoesqueléticos de distinta complejidad y los estratifica. La función de cribado existe precisamente porque llegan procesos simples y complejos, y el primer contacto debe distinguirlos.

Tabla 5.2. Funciones clínicas del fisioterapeuta de atención primaria

Función	Contenido
Primer contacto	Valoración de procesos musculoesqueléticos con estratificación de su complejidad
Cribado clínico	Detección de signos de alarma, riesgo neurológico, sospecha de fractura y enfermedad sistémica
Diagnóstico fisioterapéutico	Dolor, función, movilidad, fuerza, equilibrio y marcha
Plan de intervención	Ejercicio terapéutico, educación, autocuidado y, si procede, terapia manual o medios físicos
Prescripción de ejercicio	Individualizada y progresiva
Apoyo a la valoración con ecografía	Uso de la ecografía para valorar y reevaluar, sin informe radiológico (sección 7.3)
Derivación	A medicina de familia, enfermería, urgencias o recursos comunitarios
Alta	Informe funcional y plan de autocuidado

Fuente: elaboración propia a partir del borrador de trabajo y de la especificación del modelo [90].

La derivación a atención hospitalaria se hace a través de medicina de familia, salvo la derivación urgente. La solicitud de radiografía simple se trata en la sección 7.4 como petición de desarrollo normativo.

5.4. Programas grupales y programas comunitarios

El documento distingue dos tipos de intervención colectiva. La **intervención grupal** es una intervención clínica sobre un grupo de personas con un proceso definido. La **intervención comunitaria** actúa sobre la población o sobre los activos comunitarios, sin un proceso clínico individual. La distinción responde a un comentario de la revisión y se recoge en el glosario del anexo D.

Cada programa grupal tiene una ficha en el anexo A. La ficha indica quién lo lidera, el tamaño del grupo, el número de sesiones, las horas de fisioterapia por edición y la frecuencia de oferta. Con esos datos, el Ministerio de Sanidad puede estimar la carga de trabajo real que implica cada programa.

Tabla 5.3. Programas grupales

Id	Programa	Liderazgo	Grupo	Sesiones	Horas de fisioterapia por edición	Ediciones por 10.000 habitantes y año, escenario central
PG-01	Prevención de caídas y fragilidad [91]	Fisioterapia, con enfermería familiar y comunitaria en la captación y el seguimiento	10 a 12	24	28	4
PG-02	Dolor persistente: educación en neurociencia del dolor y ejercicio [92]	Fisioterapia, con medicina de familia en la selección de participantes	10 a 15	24	32	3
PG-03	Artrosis de rodilla y cadera [93]	Fisioterapia	10 a 12	12	15	3
PG-04	EPOC en fase estable [94]	Compartido: fisioterapia en el ejercicio y enfermería familiar y comunitaria en la educación sobre autocuidado e inhaladores	8 a 10	16	15	2
PG-05	Escuela de espalda [95]	Fisioterapia	10 a 12	8	10	4

Fuente: anexo A. Las horas por edición incluyen la preparación y la evaluación. Las ediciones por 10.000 habitantes son parámetros de diseño que alimentan el modelo de la sección 9.

Los programas grupales se apoyan en evidencia de ensayos y revisiones. El ejercicio que combina equilibrio y trabajo funcional reduce la tasa de caídas en personas mayores que viven en la comunidad, con certeza alta [91]. El ejercicio terapéutico reduce el dolor en la artrosis de rodilla, con certeza alta a corto plazo [93]. La rehabilitación respiratoria mejora la disnea, la fatiga y la capacidad de ejercicio en la EPOC [94]. El ejercicio reduce el dolor lumbar persistente frente a la ausencia de tratamiento o la atención habitual, con certeza moderada [95]. En España, un ensayo en doce centros de AP de Castilla y León combinó educación en neurociencia del dolor y ejercicio grupal [92]. Las mejoras se mantuvieron a los seis meses [92].

Tabla 5.4. Intervenciones comunitarias

Id	Intervención comunitaria	Población	Liderazgo	Horas de fisioterapia por edición	Ediciones por 10.000 habitantes y año, escenario central
PC-01	Promoción de la actividad física con activos comunitarios	Población general adulta de la zona básica de salud	Equipo de atención primaria, con fisioterapia en el diseño y coordinación con salud pública y entidades locales	10	1
PC-02	Salud escolar: ergonomía y actividad física	Alumnado y profesorado de los centros educativos de la zona básica de salud	Fisioterapia y enfermería familiar y comunitaria, con los centros educativos	6	2
PC-03	Salud laboral comunitaria	Colectivos locales con alta carga física en el trabajo	Fisioterapia, en coordinación con los servicios de prevención cuando existan	6	1

Fuente: anexo A. Estas intervenciones desarrollan la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS, que vincula el consejo en AP con los recursos comunitarios [32].

5.5. Modalidades asistenciales

Tabla 5.5. Modalidades asistenciales de la fisioterapia de atención primaria

Modalidad	Se incluye	Contenido
Consulta individual presencial	Sí	Valoración inicial, seguimiento y alta
Consulta breve resolutive	Sí	Educación, consejo y automanejo
Intervención grupal	Sí	Programas de la tabla 5.3
Fisioterapia domiciliaria	Sí	Dependencia, fragilidad y altas hospitalarias
Teleconsulta	Sí	Seguimiento, educación y adherencia
Consulta telefónica	Sí	Revisión, dudas y seguimiento
Interconsulta no presencial	Sí	Coordinación con medicina de familia, enfermería y atención hospitalaria
Intervención comunitaria	Sí	Activos en salud y ejercicio comunitario
Sesión clínica compartida	Sí	Revisión conjunta de casos crónicos complejos entre medicina, enfermería y fisioterapia
Escuela de pacientes	Sí	Dolor persistente, artrosis, EPOC y espalda
Fisioterapia en residencias	Sí, coordinada con el centro	Prevención del deterioro funcional

Fuente: elaboración propia a partir del borrador de trabajo [90].

La interconsulta no presencial ya existe como servicio de los hospitales de la Comunidad de Madrid, que la denominan e-consulta [58]. La sesión clínica compartida es una revisión conjunta de casos entre profesionales, y no una sesión de tratamiento.

5.6. Herramientas de salud digital

La Estrategia de Salud Digital del SNS ofrece el marco para tres herramientas [33]. La teleconsulta permite el seguimiento de personas con dificultades de desplazamiento. El seguimiento remoto de la adherencia refuerza los planes de ejercicio. La prescripción digital de ejercicio facilita la continuidad entre sesiones. Estas herramientas son también una de las tres palancas del ajuste por ruralidad de la sección 9.4.

6. Vías de acceso y circuitos asistenciales

Esta sección describe por dónde entra una persona a fisioterapia de AP y qué documento acompaña cada entrada. Todos los circuitos terminan con un criterio de retorno explícito. Las tablas de esta sección se generan desde la matriz de coherencia del anexo C, que es la única fuente de los procesos, las vías y las condiciones.

6.1. Vías de entrada

Tabla 6.1. Vías de entrada a la fisioterapia de atención primaria

Vía de entrada	Admitida	Procesos de la matriz	Requisito documental	Circuito
Autorreferencia del ciudadano	Sí, para procesos protocolizados de personas adultas	P01 a P08	Solicitud de cita con registro del motivo de consulta parametrizado	1
Medicina de familia y comunitaria	Sí, vía principal para procesos con diagnóstico médico o comorbilidad	P01 a P06, P08 a P10, P15	Interconsulta en la historia clínica compartida	2
Enfermería familiar y comunitaria	Sí, en especial fragilidad, caídas, cronicidad e inmovilidad	P09, P10, P15	Interconsulta con resultado del cribado de fragilidad cuando proceda	3
Pediatría de atención primaria	Sí, si la cartera autónoma define la oferta pediátrica	P17	Interconsulta	2
Matrona	Sí, si la cartera autónoma incorpora el proceso	P16	Interconsulta	2
Trabajo social sanitario	Sí, para dependencia, domicilio y barreras funcionales	P15	Informe social y valoración de necesidades	3
Medicina de atención hospitalaria	Sí, en tres situaciones definidas	P11 a P13	Informe clínico mínimo con criterio de retorno	4
Retorno desde rehabilitación hospitalaria	Sí, para continuidad funcional	P14	Informe de alta de rehabilitación	5

Fuente: anexo C. Los códigos de proceso remiten a la matriz de coherencia.

6.2. Circuito 1. Autorreferencia

La autorreferencia permite a una persona adulta pedir cita con fisioterapia sin derivación previa, solo para los procesos de la tabla 8.1. El circuito tiene cinco pasos:

1. La persona solicita la cita por vía presencial, telefónica o digital.
2. El personal administrativo aplica un protocolo de gestión de la demanda con motivos de consulta parametrizados por los clínicos del equipo. Este paso no es un triaje ni una valoración clínica: solo comprueba que el motivo figura en la lista y asigna la cita.
3. El fisioterapeuta realiza la primera consulta, que incluye el cribado clínico de signos de alarma y la estratificación del proceso.
4. Si el proceso es abordable en AP, el fisioterapeuta elige una de las salidas del nivel 1: alta con plan de autocuidado, tratamiento individual o programa grupal.
5. Si aparecen signos de alarma o complejidad, el fisioterapeuta deriva a medicina de familia en el mismo día o, si la situación lo exige, a urgencias.

Los dos precedentes españoles de acceso directo funcionan con este mecanismo. Galicia incorporó la fisioterapia a su protocolo de gestión de la demanda del equipo en 2022 [57]. Madrid cita desde la Unidad de Atención al Usuario a las personas que refieren tres procesos concretos desde 2025 [21]. El circuito puede usar además un cuestionario de autorreferencia que la persona rellena antes de la cita. Quien lo lee e interpreta es siempre el fisioterapeuta.

6.3. Circuito 2. Derivación desde medicina de familia

1. El médico de familia diagnostica o sospecha un proceso abordable en AP.
2. El médico registra una interconsulta a fisioterapia en la historia clínica compartida.
3. El fisioterapeuta realiza la valoración funcional y define el plan terapéutico.
4. El fisioterapeuta emite un informe de alta o devuelve a la persona a medicina de familia.

El retorno a medicina de familia se produce en cuatro situaciones: ausencia de mejoría, aparición de signos de alarma, situación clínica que contraindica la fisioterapia en ese momento o problema no abordable en AP.

6.4. Circuito 3. Derivación desde enfermería familiar y comunitaria

1. Enfermería detecta fragilidad, riesgo de caídas, inmovilidad, dolor persistente o baja actividad física.
2. En el caso de la fragilidad y las caídas, la entrada exige un cribado de fragilidad positivo realizado por enfermería.
3. Fisioterapia incorpora a la persona a un programa individual, grupal o domiciliario.
4. Enfermería y fisioterapia comparten el seguimiento.

6.5. Circuito 4. Derivación desde medicina de atención hospitalaria

Se proponen tres situaciones en las que la derivación desde medicina de atención hospitalaria a fisioterapia de AP es una opción viable. En esas situaciones, la derivación es también eficiente para el paciente y para el sistema:

- La continuidad asistencial tras el alta, con pérdida funcional leve o moderada en procesos respiratorios, cardiológicos, neurológicos u oncológicos.
- Un proceso leve o moderado que no requiere rehabilitación hospitalaria, como la artrosis, el dolor lumbar o el hombro doloroso no quirúrgico.
- El seguimiento funcional comunitario de la fragilidad, las caídas o el ejercicio terapéutico supervisado.

La derivación exige cuatro condiciones:

1. La persona está clínicamente estable.
2. El proceso es abordable en AP. Esto significa que el proceso de salud, en su estado actual, se puede atender con los recursos de fisioterapia de AP. También significa que es compatible con los objetivos del primer nivel: educación, automanejo del proceso por la persona, inclusión en la comunidad y retorno a las actividades diarias con la mayor normalidad posible.
3. Existe un informe clínico mínimo con el diagnóstico, las precauciones, los objetivos funcionales y la medicación relevante.
4. El informe define un criterio de reevaluación o de retorno.

Este circuito no es una vía para trasladar a AP la demora de rehabilitación hospitalaria. Ambos niveles son distintos, y su relación se regula solo mediante un circuito de continuidad con criterios de entrada y retorno. El retorno a atención hospitalaria se produce solo si aparecen criterios de alarma, fracaso terapéutico o complejidad.

6.6. Circuito 5. Retorno desde rehabilitación hospitalaria

Rehabilitación hospitalaria finaliza su fase de tratamiento y emite un informe de alta con objetivos de continuidad. Fisioterapia de AP continúa el ejercicio terapéutico, el autocuidado, la prevención de recaídas y la recuperación de la función. Este circuito recoge también a las personas en fase postquirúrgica que han completado la rehabilitación hospitalaria.

Tabla 6.2. Procesos y situaciones que entran solo por derivación

Id	Proceso o situación	Condición de entrada	Vías de entrada
P09	Riesgo de caídas y fragilidad [91]	Cribado de fragilidad positivo realizado por enfermería familiar y comunitaria	Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria
P10	EPOC en fase estable [94]	Diagnóstico médico de EPOC en fase estable	Medicina de familia y comunitaria, Enfermería familiar y comunitaria
P11	Pérdida funcional leve o moderada tras el alta hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria
P12	Proceso musculoesquelético leve o moderado que no requiere rehabilitación hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria
P13	Seguimiento funcional comunitario de la fragilidad o del riesgo de caídas	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria
P14	Continuidad tras la fase de rehabilitación hospitalaria	Informe de alta de rehabilitación con objetivos de continuidad	Retorno desde rehabilitación hospitalaria
P15	Dependencia, inmovilidad o barreras funcionales en el domicilio	Valoración previa de necesidades en el domicilio	Trabajo social sanitario, Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria
P16	Embarazo, posparto o disfunción de suelo pélvico de baja complejidad	Proceso incluido en la cartera autonómica	Matrona
P17	Proceso pediátrico incluido en la cartera autonómica	Oferta pediátrica definida en la cartera autonómica	Pediatría

Fuente: anexo C.

6.7. Matriz de coherencia

El anexo C reúne en una sola tabla todos los procesos, las vías de entrada, las condiciones, las exclusiones y los circuitos alternativos. Las tablas de las secciones 5, 6 y 8 se generan desde esa matriz. De esta forma, ningún proceso puede aparecer a la vez como incluido y como excluido.

7. Competencias solicitadas y marco legal

Esta sección declara qué nivel de autonomía pide este documento para el fisioterapeuta de AP y qué no pide. El lector no debe inferirlo del modelo inglés de la sección 4.1.

7.1. Competencias que ya ampara la Ley 44/2003

La Ley 44/2003 ampara hoy la valoración, el diagnóstico fisioterapéutico, el plan de intervención, el alta fisioterapéutica y la derivación a otro profesional del equipo [1]. Estas competencias no requieren ningún cambio normativo.

7.2. Competencias que requieren desarrollo autonómico o protocolo

El acceso directo del ciudadano requiere un protocolo del servicio de salud. Galicia y Madrid ya lo han regulado [21, 57]. La interconsulta no presencial con atención hospitalaria requiere también un protocolo de cada área sanitaria.

7.3. Ecografía como apoyo a la valoración

Este documento pide el reconocimiento del uso de la ecografía por el fisioterapeuta de AP como herramienta de apoyo a la valoración, la reevaluación y la decisión de derivación. El informe radiológico sigue siendo competencia del médico especialista. La ecografía no emplea radiaciones ionizantes, de modo que no está sujeta al Real Decreto 601/2019 [34].

La Resolución 1/2023 del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España considera la ecografía una herramienta inherente al proceso de atención en fisioterapia [22, 96]. Según esa resolución, la imagen no sustituye a la exploración física, sino que mejora la valoración y ayuda a decidir la derivación ante un signo de alarma [22]. La Gerencia Asistencial de AP de Madrid dispone ya de ecógrafos en los centros de salud [22]. Además, forma a sus fisioterapeutas en su manejo, según el documento de posición del colegio profesional de esa comunidad [22].

El documento fija tres requisitos para esta competencia: formación acreditada, un protocolo de uso y el registro de cada exploración en la historia clínica.

7.4. Solicitud de radiología simple

Este documento pide al Ministerio de Sanidad la habilitación expresa del fisioterapeuta de atención primaria como prescriptor de radiología simple musculoesquelética en los procesos protocolizados de acceso directo. La petición es de desarrollo normativo. Ninguna comunidad autónoma ha autorizado todavía esta capacidad, y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid reconoce que hace falta un acto de autorización expreso [22].

La petición se apoya en seis argumentos:

- **Prescriptor y profesional habilitado.** El Real Decreto 601/2019 abre la figura del prescriptor a otro profesional sanitario autorizado [34]. La responsabilidad clínica de la exposición corresponde al profesional sanitario habilitado, que en radiodiagnóstico es el radiólogo [34]. Este documento pide la condición de prescriptor y no la de profesional habilitado.
- **Precedente de la podología.** El mismo real decreto integra a la podología mediante una habilitación específica, según el análisis del colegio profesional madrileño [22]. La vía para la fisioterapia sería análoga [22].

- **Marco europeo.** La Directiva 2013/59/Euratom no reserva en exclusiva a los médicos la remisión a procedimientos radiológicos [35].
- **Planificación estatal.** La acción A.4.4 del Marco Estratégico pide incrementar la capacidad resolutoria de la fisioterapia mediante circuitos y protocolos [22, 27].
- **Circuito redundante.** El acceso directo sin capacidad de solicitud genera la derivación intermedia que pretendía evitar. En un esguince de tobillo con reglas de Ottawa positivas, la persona tiene que volver a otra consulta solo para que otro profesional firme la petición [22, 97].
- **Experiencia comparada.** En el Reino Unido, la normativa sobre exposiciones médicas reconoce al remitente no médico habilitado por su empleador [98]. La hoja de ruta de Health Education England incluye la solicitud de pruebas entre las capacidades del fisioterapeuta de primer contacto [61].

El alcance que se pide es limitado. Incluye solo la radiología simple musculoesquelética de los procesos protocolizados, con reglas de decisión validadas como las de Ottawa [97, 99]. No incluye la interpretación radiológica formal. La implantación exige formación acreditada en protección radiológica, un protocolo consensuado con radiodiagnóstico y medicina de familia, la trazabilidad de cada solicitud y una auditoría periódica. El indicador IR-12 del anexo B mide la adecuación de las solicitudes.

Mientras la habilitación no se apruebe, el circuito usa un protocolo compartido con medicina de familia para la radiografía simple. Así, el acceso directo funciona desde el primer día sin depender de la reforma.

7.5. Compatibilidad con la cartera común

El apartado 6 del anexo II del Real Decreto 1030/2006 exige «previa indicación médica» para la rehabilitación básica [24]. Este documento aborda el inciso por dos vías complementarias:

- **Para la fase de implantación.** La indicación mediante un protocolo aprobado por el servicio de salud cumple el requisito. Esta es la lectura que de hecho sostienen Galicia y Madrid con sus protocolos de acceso directo [21, 57].
- **Como petición al Ministerio de Sanidad.** El apartado 6 se actualiza por el procedimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 16/2003, para que la autorreferencia protocolizada quede recogida en la cartera común [26].

7.6. Lo que no se pide

Este documento no pide ninguna de las siguientes capacidades:

- La prescripción de medicamentos.
- La creación de especialidades de fisioterapia.
- La sustitución de la valoración médica en procesos con diagnóstico médico pendiente.
- La interpretación radiológica formal.
- La solicitud de pruebas de imagen avanzada o de mayor dosis.
- La derivación a atención hospitalaria sin pasar por medicina de familia, salvo la derivación urgente.

8. Criterios clínicos de acceso directo

Esta sección fija qué procesos admiten autorreferencia y qué situaciones la excluyen. Las dos tablas se generan desde la matriz de coherencia del anexo C. Ninguna condición de acceso es una intervención: cada condición se puede comprobar antes de la cita o en la primera consulta.

8.1. Criterio transversal de seguridad clínica

En todos los procesos, el fisioterapeuta evalúa en la primera consulta la presencia de signos de alarma. La ausencia de signos de alarma no es una condición de acceso que pueda comprobar el personal administrativo. Es el resultado del cribado clínico que realiza el profesional sanitario, y su presencia activa la derivación a medicina de familia o a urgencias. El acceso directo se limita además a personas adultas.

8.2. Procesos con acceso directo

Tabla 8.1. Procesos que admiten autorreferencia

Id	Proceso	Condición de acceso	Vías de entrada
P01	Artralgias vertebrales mecánicas [100]	Sin déficit neurológico progresivo referido por la persona	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P02	Hombro doloroso no traumático	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P03	Artrosis leve o moderada de rodilla, cadera o mano [93]	Diagnóstico médico previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P04	Esguince de tobillo leve o moderado [97, 99]	La persona puede cargar su peso y caminar tres o cuatro pasos, aunque sea con dificultad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P05	Fascitis plantar [21]	Sin signos sistémicos referidos	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P06	Epicondialgia [21]	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria
P07	Recidiva de un proceso diagnosticado previamente por su médico de familia y comunitaria	Diagnóstico previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia
P08	Dolor persistente no complejo [92]	Diagnóstico médico previo, sin descompensación de la comorbilidad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria

Fuente: anexo C. La condición del esguince de tobillo se basa en las reglas de Ottawa [97, 99].

La tabla agrupa la lumbalgia y la cervicalgia en un único proceso, las artralgias vertebrales mecánicas, porque comparten condición de acceso. La prevención de caídas y la EPOC en fase estable no figuran en la tabla. Ambas entran por derivación desde enfermería o desde medicina de familia, como indica la tabla 6.2. La epicondialgia se incorpora por el precedente de Madrid, que la incluye entre sus procesos de citación directa [21].

8.3. Situaciones excluidas del acceso directo

Tabla 8.2. Situaciones excluidas del acceso directo y circuito alternativo

Id	Situación excluida del acceso directo	Circuito alternativo
X01	Traumatismo grave	Medicina de familia o urgencias
X02	Déficit neurológico progresivo	Medicina de familia o urgencias
X03	Dolor no mecánico o con signos sistémicos	Medicina de familia

Id	Situación excluida del acceso directo	Circuito alternativo
X04	Postquirúrgico de cualquier complejidad	Rehabilitación hospitalaria y retorno a AP por el circuito 5
X05	Menor de edad	Pediatría de atención primaria
X06	Patología laboral o por accidente de tráfico	Circuito que establezca la normativa aplicable
X07	Dependencia severa	Valoración multidisciplinar del equipo de AP por el circuito 3

Fuente: anexo C.

La exclusión del acceso directo no impide la atención en fisioterapia de AP. Por ejemplo, una persona en fase postquirúrgica puede llegar a AP por el circuito 5, tras la rehabilitación hospitalaria.

8.4. Herramientas de cribado

El fisioterapeuta usa herramientas con evidencia publicada:

- **Reglas de Ottawa de tobillo y pie.** Una revisión sistemática con 15.581 pacientes mostró una sensibilidad cercana al 100 % para excluir fracturas [97]. Su implantación redujo las radiografías de tobillo sin fracturas no detectadas [99].
- **Signos de alarma en el dolor lumbar.** Una revisión sistemática mostró que solo un subconjunto de los signos de alarma que recogen las guías tiene precisión diagnóstica demostrada [100]. El protocolo debe priorizar ese subconjunto, como la historia de cáncer para la sospecha de malignidad [100].
- **Estratificación del riesgo en el dolor lumbar.** La herramienta STarT Back permite ajustar la intensidad de la atención al pronóstico, con mejores resultados y menos costes que la práctica habitual [101]. Existe una versión española adaptada en atención primaria [102].

9. Dotación calculada por demanda, por fases y con ajuste territorial

Esta sección calcula cuántos fisioterapeutas de AP necesita el SNS a partir de la demanda que atienden. Las ratios no se fijan de antemano: salen de un modelo con parámetros explícitos, cada uno con su fuente o con su rango de supuesto. El resultado se presenta como un intervalo y como una secuencia de fases con horizonte temporal.

Advertencia metodológica. Las estadísticas internacionales de densidad cuentan fisioterapeutas de todo el sistema, no de atención primaria, y no sirven para fijar una ratio de AP. El modelo de esta sección combina datos publicados con supuestos declarados. El resultado central depende sobre todo de pocos parámetros, que la tabla 9.3 identifica. Cada servicio de salud debe sustituir los supuestos por sus propios datos cuando disponga de ellos.

9.1. Punto de partida

El SNS contaba en 2024 con 2.418 fisioterapeutas de AP, según el informe monográfico de recursos humanos [37]. La dotación por comunidad autónoma variaba más de diez veces entre los extremos que recogió el editorial de 2022 (tabla 3.1). El punto de partida no es, por tanto, un valor único, sino una distribución muy desigual.

9.2. Modelo de demanda

El modelo estima la carga anual de trabajo de fisioterapia por cada 10.000 habitantes. La carga tiene tres componentes:

- **Consulta individual.** Es el producto de las personas que consultan en AP por un problema musculoesquelético (P), la fracción que accede a fisioterapia (F1) y las consultas por persona. Cada persona tiene una primera consulta, y una fracción (F2) necesita además V consultas de seguimiento. Cada consulta dura t horas.
- **Programas grupales y comunitarios.** Es la suma, para cada programa del anexo A, de las ediciones anuales por las horas de fisioterapia de cada edición. El programa de caídas y fragilidad crece en proporción a la población de 65 años o más.
- **Atención domiciliaria.** Multiplica la población de 65 años o más (S65) por la fracción que necesita fisioterapia en el domicilio (D). El resultado se multiplica por las visitas por persona (Vd) y por las horas de cada visita (td).

La capacidad de un fisioterapeuta a tiempo completo es su jornada anual (J) menos la fracción de tiempo protegido (Tp). La dotación necesaria es la carga total dividida por esa capacidad.

Tabla 9.1. Parámetros del modelo de demanda

Símbolo	Parámetro	Unidad	Bajo	Central	Alto	Tipo	Justificación
P	Personas adultas que consultan en atención primaria por un problema musculoesquelético al año	personas por 10.000 habitantes	1.500	2.000	2.500	Supuesto	Jordan y colaboradores registraron 591 personas por 10.000 que consultaron por la espalda, 324 por la rodilla y 556 por problemas de más de una región. El parámetro extiende esas cifras al conjunto de regiones. Debe sustituirse por el dato de la BDCAP cuando se extraiga [11]
F1	Fracción de esas personas que accede a fisioterapia de atención primaria por cualquier vía	proporción	0,25	0,35	0,50	Supuesto	No existe dato español publicado. El rango refleja un despliegue progresivo del acceso directo y de la derivación protocolizada

Símbolo	Parámetro	Unidad	Bajo	Central	Alto	Tipo	Justificación
F2	Fracción de las personas valoradas que necesita tratamiento individual tras la primera consulta	proporción	0,30	0,40	0,50	Supuesto	En la evaluación de Downie y colaboradores, el 60,4 % de los contactos se resolvió solo con automanejo tras la primera consulta [19]
V	Consultas individuales de seguimiento por episodio tratado	consultas	3	4	6	Supuesto	No existe dato español publicado sobre consultas por episodio en fisioterapia de atención primaria
t	Duración media de cada consulta individual	horas	0,33	0,50	0,75	Supuesto	Las consultas de primer contacto del Reino Unido duran veinte minutos en la encuesta de Halls y colaboradores. El valor central incorpora el tiempo de registro y de coordinación [103]
S65	Proporción de población de 65 años o más	proporción	0,18	0,20	0,22	Supuesto	Valor redondeado del padrón continuo. El rango refleja la variación entre zonas básicas y se sustituye por el dato local en los ajustes territoriales [104]
D	Proporción de personas de 65 años o más que necesita fisioterapia domiciliaria al año	proporción	0,02	0,03	0,05	Supuesto	La prevalencia de fragilidad en población comunitaria europea es del 12 %. Solo una parte de esa población necesita atención en el domicilio [105]
Vd	Visitas domiciliarias por persona y año	visitas	4	6	8	Supuesto	Sin dato publicado. Se ajusta localmente
td	Duración media de cada visita domiciliaria, con desplazamiento	horas	1	1,25	1,50	Supuesto	Sin dato publicado. El desplazamiento aumenta en zonas rurales y dispersas
J	Jornada anual de un fisioterapeuta a tiempo completo	horas	1.642	1.600	1.519	Supuesto	Rango de la jornada ordinaria entre 35 y 37,5 horas semanales según el servicio de salud. El orden de bajo a alto sigue la necesidad: una jornada menor exige más dotación
Tp	Fracción de la jornada reservada como tiempo protegido no asistencial	proporción	0,15	0,20	0,25	Diseño	Tiempo para programas comunitarios no clínicos, docencia, investigación y coordinación, que la sección 5.1 exige proteger

Fuente: elaboración propia. Los parámetros de tipo supuesto no tienen un dato español publicado y se acompañan de su rango y de su justificación.

Tabla 9.2. Resultado del modelo en los tres escenarios

Componente, en horas anuales por 10.000 habitantes	Escenario bajo	Escenario central	Escenario alto
Consulta individual	235	910	3.750
Programas grupales y comunitarios	206	351	528
Atención domiciliaria	144	450	1.320
Carga total	585	1.711	5.598
Capacidad asistencial por fisioterapeuta, en horas	1.396	1.280	1.139
Fisioterapeutas por 10.000 habitantes	0,42	1,34	4,91
Habitantes por fisioterapeuta	23.871	7.480	2.035

Fuente: modelo de demanda de esta sección, ejecutado con los parámetros de la tabla 9.1 y las fichas del anexo A. El escenario bajo combina los valores bajos de necesidad con la mayor capacidad por profesional, y el escenario alto hace lo contrario.

El escenario central necesita 1 fisioterapeuta de AP por cada 7.480 habitantes (tabla 9.2). El intervalo entre los escenarios bajo y alto va de 1 por cada 23.871 a 1 por cada 2.035 habitantes (tabla 9.2). La amplitud del intervalo refleja la incertidumbre de los supuestos. Por eso el análisis de sensibilidad identifica los parámetros que más la explican.

Tabla 9.3. Análisis de sensibilidad univariante

Parámetro	Habitantes por fisioterapeuta con el valor bajo	Habitantes por fisioterapeuta con el valor alto	Amplitud
t. Duración media de cada consulta individual	9.131	5.909	3.222
F1. Fracción de esas personas que accede a fisioterapia de atención primaria por cualquier vía	8.820	6.092	2.728
P. Personas adultas que consultan en atención primaria por un problema musculoesquelético al año	8.627	6.602	2.025
D. Proporción de personas de 65 años o más que necesita fisioterapia domiciliaria al año	8.199	6.364	1.834
V. Consultas individuales de seguimiento por episodio tratado	8.146	6.428	1.718
Vd. Visitas domiciliarias por persona y año	8.199	6.877	1.321
PG. Ediciones de programas grupales y comunitarios (anexo A)	8.147	6.840	1.307
F2. Fracción de las personas valoradas que necesita tratamiento individual tras la primera consulta	8.146	6.914	1.232
Tp. Fracción de la jornada reservada como tiempo protegido no asistencial	7.947	7.012	935
td. Duración media de cada visita domiciliaria, con desplazamiento	7.895	7.106	789
J. Jornada anual de un fisioterapeuta a tiempo completo	7.676	7.101	575
S65. Proporción de población de 65 años o más	7.734	7.242	492

Fuente: modelo de demanda de esta sección. Cada fila cambia un parámetro a su valor bajo o alto y mantiene el resto en el valor central. Las filas se ordenan de mayor a menor amplitud.

Los tres parámetros con más influencia son la duración de cada consulta, la fracción que accede a fisioterapia y las personas que consultan por un problema musculoesquelético (tabla 9.3). Ninguno de los tres tiene hoy un dato español publicado. Por eso la primera tarea del grupo de trabajo debe ser medirlos con los registros de actividad de las comunidades que ya tienen consulta de fisioterapia en AP.

9.3. Escenarios como fases

Los tres escenarios del borrador de trabajo se transforman en fases con un horizonte temporal [90]. Las cifras de cada fase salen del modelo y no se fijan de antemano.

Tabla 9.4. Fases de dotación

Fase	Horizonte	Objetivo de dotación	Contenido asistencial
Fase 1. Implantación	Años primero y segundo	Ninguna comunidad autónoma por debajo del escenario bajo: 1 fisioterapeuta por cada 23.900 habitantes	Consulta propia en todas las zonas básicas, derivación desde medicina de familia y enfermería, y programas de caídas y de espalda
Fase 2. Consolidación	Años tercero a quinto	Escenario central: 1 fisioterapeuta por cada 7.500 habitantes	Acceso directo protocolizado, todos los programas del anexo A y atención domiciliaria
Fase 3. Necesidad especial	Desde el tercer año, en paralelo	Ajuste territorial con el modelo: hasta 1 fisioterapeuta por cada 4.400 habitantes en zonas rurales, envejecidas y con alta dependencia	Refuerzo de la atención domiciliaria y de los programas de fragilidad

Fuente: elaboración propia a partir de las tablas 9.2 y 9.5. Los horizontes son una propuesta de calendario. Las cifras de dotación se redondean a la centena.

El escenario central del modelo coincide con la ratio de 1 fisioterapeuta por cada 7.500 habitantes que proponía el borrador de trabajo [90]. El borrador proponía además un mínimo de 1 por cada 15.000 habitantes y un máximo de 1 por cada 3.000 en zonas de alta necesidad [90]. Frente al borrador, el modelo propone un mínimo de fase 1 menos exigente y un máximo por ajuste territorial también menos exigente (tabla 9.4). El mínimo de la fase 1 se aplica a cada comunidad autónoma por separado y no es una media nacional. Con estas diferencias, la propuesta final se apoya en un cálculo y no solo en la comparación con otros sistemas.

9.4. Ajustes territoriales

El modelo se aplica a cada zona básica con sus propios datos. La tabla 9.5 muestra el efecto de cambiar solo los factores que admite esta sección.

Tabla 9.5. Ejemplos de ajuste territorial con el modelo

Tipo de zona	Parámetros modificados sobre el escenario central	Fisioterapeutas por 10.000 habitantes	Habitantes por fisioterapeuta
Zona de referencia	ninguno	1,34	7.480
Zona envejecida	población de 65 años o más del 30 %	1,56	6.425
Zona rural dispersa	visita domiciliaria de 1,75 horas con desplazamiento	1,48	6.768
Zona rural dispersa y envejecida	población de 65 años o más del 30 %, visita domiciliaria de 1,75 horas con desplazamiento	1,77	5.658
Zona rural dispersa y envejecida con alta dependencia	población de 65 años o más del 30 %, visita domiciliaria de 1,75 horas con desplazamiento, necesidad domiciliaria del 5 %	2,26	4.426
Zona con alta carga de incapacidad temporal musculoesquelética	2.400 personas con consulta musculoesquelética por 10.000 habitantes	1,48	6.761
Centro docente o con programas comunitarios extensos	tiempo protegido del 25 %	1,43	7.012

Fuente: modelo de demanda de esta sección. Los valores modificados son ilustrativos y cada servicio de salud los sustituye por los datos de la zona.

El documento admite cuatro factores de ajuste:

- **Ruralidad y dispersión.** Alargan el tiempo de cada visita domiciliaria. La respuesta puede combinar tres palancas: el refuerzo de la plantilla, un fisioterapeuta itinerante de área y las herramientas de salud digital de la sección 5.6.
- **Envejecimiento y dependencia.** Aumentan la atención domiciliaria y la oferta del programa de caídas y fragilidad.
- **Carga de incapacidad temporal musculoesquelética.** Aumenta el número de personas que consultan por estos procesos.
- **Centros docentes o con programas comunitarios extensos.** Aumentan el tiempo protegido no asistencial.

La demora en rehabilitación hospitalaria no es un factor de ajuste de la dotación de AP. Ambos son niveles asistenciales distintos, y la demora hospitalaria no debe condicionar la actividad de AP. Esa demora solo aparece como indicador del circuito de continuidad asistencial (indicador IR-11 del anexo B).

9.5. Referencias externas de dotación

La Chartered Society of Physiotherapy pidió en 2022 aumentar la dotación de fisioterapeutas de primer contacto en Inglaterra hasta 1 por cada 10.000 habitantes [106]. Esa cifra es una reivindicación profesional y no una norma

del NHS [106]. Se refiere además solo al perfil de primer contacto, de modo que no incluye la atención domiciliaria ni los programas grupales. El borrador de trabajo atribuía unas ratios a una resolución del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 2007, que la búsqueda no ha localizado (anexo F). Este documento no usa esas ratios.

10. Sistema de evaluación en formato EFQM

Esta sección define cómo se evalúa el modelo. Los indicadores se organizan según la estructura del modelo EFQM y cada uno tiene una ficha completa en el anexo B.

10.1. Marco

El modelo EFQM se estructura en tres bloques [107]. El bloque de Dirección agrupa el propósito, la visión, la estrategia, la cultura y el liderazgo [107]. El bloque de Ejecución agrupa la implicación de los grupos de interés, la creación de valor sostenible y la gestión del funcionamiento y la transformación [107]. El bloque de Resultados agrupa la percepción de los grupos de interés y el rendimiento estratégico y operativo [107].

Cada indicador del borrador de trabajo se reubica en uno de esos criterios. El sistema añade además los indicadores que exigen las decisiones de este documento, como la adecuación de la radiografía simple solicitada.

10.2. Indicadores de Dirección

Tabla 10.1. Indicadores de Dirección

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
ID-1	Cartera autonómica de fisioterapia de atención primaria	1. Propósito, visión y estrategia	Normativa y documentos del servicio de salud	Cartera aprobada en todas las comunidades autónomas al cierre de la fase de implantación
ID-2	Protocolo de acceso directo	1. Propósito, visión y estrategia	Normativa y documentos del servicio de salud	Protocolo aprobado al cierre de la fase de consolidación
ID-3	Circuito de continuidad con atención hospitalaria	1. Propósito, visión y estrategia	Documentos de gestión de las áreas sanitarias	Circuito formalizado en todas las áreas sanitarias al cierre de la fase de consolidación
ID-4	Tiempo protegido	2. Cultura de la organización y liderazgo	Agenda electrónica	Igual o superior al valor de tiempo protegido del modelo de dotación

Fuente: anexo B.

10.3. Indicadores de Ejecución

Tabla 10.2. Indicadores de Ejecución

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
IE-1	Cobertura de personal	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	SIAP	100 % al cierre de la fase de implantación
IE-2	Infraestructura de consulta	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	Inventario de centros del servicio de salud	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
IE-3	Densidad de fisioterapeutas de AP	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	SIAP	El que resulte del modelo de dotación de la sección 9 para la fase correspondiente
IE-4	Agenda e historia clínica propias	5. Gestionar el funcionamiento y la transformación	Sistemas de información del servicio de salud	100 % al cierre de la fase de implantación
IE-5	Tiempo hasta la primera valoración	4. Crear valor sostenible	Agenda electrónica	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
IE-6	Distribución de la entrada por vía	3. Implicar a los grupos de interés	Historia clínica	Indicador descriptivo sin estándar
IE-7	Derivación tras la primera consulta	4. Crear valor sostenible	Historia clínica	Indicador de seguridad sin estándar fijo, con revisión de cualquier variación brusca
IE-8	Oferta de programas grupales	4. Crear valor sostenible	Agenda electrónica	Las ediciones del escenario central del anexo A

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
IE-9	Atención domiciliaria	4. Crear valor sostenible	Historia clínica	Línea basal en el primer año

Fuente: anexo B.

Los indicadores IE-1 e IE-2 miden cosas distintas y no deben leerse como una duplicación. IE-1 mide la cobertura de personal: el porcentaje de zonas básicas con un fisioterapeuta asignado presencialmente. IE-2 mide la infraestructura: el porcentaje de centros de salud con un espacio físico propio para la consulta.

El indicador IE-7 sustituye al porcentaje de «pacientes rechazados» del borrador de trabajo [90]. Una persona derivada a otro profesional tras la primera consulta no ha sido rechazada, sino atendida y cribada.

10.4. Indicadores de Resultados

Tabla 10.3. Indicadores de Resultados

Id	Indicador	Criterio EFQM	Fuente de datos	Estándar propuesto
IR-1	Cambio en la intensidad del dolor	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-2	Cambio en la función	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-3	Altas por consecución de objetivos	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-4	Reconsulta por el mismo proceso	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año, con la referencia externa del anexo B
IR-5	Derivación posterior a pruebas o a atención hospitalaria	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-6	Duración de la incapacidad temporal	7. Rendimiento estratégico y operativo	Historia clínica e inspección médica	Línea basal en el primer año
IR-7	Uso de analgésicos y antiinflamatorios	7. Rendimiento estratégico y operativo	Receta electrónica e historia clínica	Línea basal en el primer año
IR-8	Satisfacción de las personas atendidas	6. Percepción de los grupos de interés	Encuesta común del servicio de salud	Línea basal en el primer año
IR-9	Equidad territorial	7. Rendimiento estratégico y operativo	SIAP y agenda electrónica	Reducción de la diferencia en cada fase
IR-10	Consultas de medicina de familia por procesos musculoesqueléticos	7. Rendimiento estratégico y operativo	BDCAP	Indicador de tendencia sin estándar, porque el efecto esperado no está garantizado
IR-11	Demora en rehabilitación hospitalaria	7. Rendimiento estratégico y operativo	Sistema de información de listas de espera	Indicador de seguimiento sin estándar
IR-12	Adecuación de la radiografía simple solicitada	7. Rendimiento estratégico y operativo	Auditoría de historia clínica	Estándar fijado en el protocolo consensuado con radiodiagnóstico

Fuente: anexo B.

La mayoría de los estándares de resultados se fijan tras un año de línea basal, porque no existe un dato español previo. Para la reconsulta existe una referencia externa: el 78,5 % de las personas atendidas por fisioterapia de primer contacto en el Reino Unido no volvió a consultar en doce semanas [20]. El indicador IR-10 no tiene estándar, porque la evidencia sobre la reducción de consultas médicas es heterogénea (sección 4.4). El indicador IR-11 mide la demora en rehabilitación hospitalaria solo como resultado del circuito de continuidad, no como criterio de dotación.

10.5. Ficha de indicador

Cada ficha del anexo B contiene diez campos: nombre, bloque y criterio EFQM, definición, fórmula, numerador, denominador, fuente de datos, periodicidad, estándar propuesto y responsable del registro. El instrumento de función del indicador IR-2 debe elegirlo el grupo de trabajo entre los validados en castellano. Los trabajos

españoles sobre conjuntos básicos de la clasificación internacional del funcionamiento en fisioterapia de AP son una base para esa elección [108, 109].

11. Plan de implantación y gestión de riesgos

Esta sección ordena el despliegue en el tiempo e identifica los riesgos principales con su mitigación.

11.1. Fases e hitos

El despliegue sigue las fases de la tabla 9.4. La fase de implantación asegura la consulta propia en todas las zonas básicas y la derivación desde medicina de familia y enfermería. La fase de consolidación abre el acceso directo protocolizado y completa los programas del anexo A. La fase de necesidad especial aplica el modelo a las zonas rurales, envejecidas o con alta dependencia.

Cada fase termina con un hito verificable mediante los indicadores del anexo B. La fase de implantación termina cuando IE-1 e IE-4 alcanzan su estándar. La fase de consolidación termina cuando ID-2 e ID-3 están aprobados en todas las comunidades autónomas.

11.2. Sistemas de información

El despliegue necesita cuatro cambios en los sistemas de información:

- La codificación de los procesos de la matriz del anexo C en la historia clínica.
- La agenda propia de fisioterapia con las vías de entrada como campo obligatorio.
- El registro de la escala numérica del dolor y del instrumento de función en la primera consulta y en el alta.
- La incorporación de los indicadores del anexo B al SIAP.

11.3. Formación

La formación continuada cubre cuatro áreas: el cribado de signos de alarma, la ecografía como apoyo a la valoración, la gestión de grupos y, si se aprueba la habilitación de la sección 7.4, la protección radiológica.

11.4. Gobernanza

Este documento propone un grupo de trabajo en la Comisión de Atención Primaria del Consejo Interterritorial [26]. El grupo tendría cuatro tareas:

- Aprobar la matriz común del anexo C.
- Fijar los estándares de los indicadores tras el primer año.
- Medir los parámetros del modelo de la sección 9.
- Impulsar la actualización del apartado 6 del anexo II del Real Decreto 1030/2006.

La evaluación debe tener un diseño que permita atribuir los resultados al modelo. No existe ningún estudio español sobre el acceso directo. Por eso, el despliegue escalonado por áreas de la fase 2 debe aprovecharse para comparar áreas con y sin acceso directo en el mismo periodo.

11.5. Riesgos y mitigación

Tabla 11.1. Riesgos del despliegue y medidas de mitigación

Riesgo	Mitigación	Indicador de seguimiento
Uso de la fisioterapia de AP como lista de espera de la rehabilitación hospitalaria	Circuito 4 con criterios de entrada y retorno, y exclusión de la demora hospitalaria como criterio de dotación	IE-6 e IR-11

Riesgo	Mitigación	Indicador de seguimiento
Variabilidad entre comunidades autónomas	Matriz común, fichas comunes e indicadores en el SIAP	IR-9
Falta de espacio físico en los centros	Priorizar la consulta propia en la fase de implantación	IE-2
Resistencia profesional al acceso directo	Protocolos consensuados con medicina de familia y enfermería, y sesiones clínicas compartidas	ID-2 e IE-7
Baja captación de la autorreferencia al inicio	Información a la ciudadanía y despliegue por fases	IE-6
Demanda superior a la capacidad	Ajuste de la dotación con el modelo y medición de los parámetros reales	IE-5 e IE-3
Retraso de la habilitación para solicitar radiografía simple	Protocolo compartido con medicina de familia mientras no se apruebe	IR-5

Fuente: elaboración propia a partir del diagnóstico de las secciones 3, 4 y 9.

La baja captación inicial de la autorreferencia está documentada: en el estudio STEMS-2 supuso el 10 % y el 6 % de las entradas en los dos brazos [83]. En los Países Bajos, la proporción pasó del 28 % en el primer año al 74,3 % en 2024 [69, 71].

12. Propuesta de texto para el documento ministerial

Esta sección ofrece un texto que el Ministerio de Sanidad puede incorporar como acuerdo. Las cifras de dotación proceden del modelo de la sección 9.

Primero. Modelo organizativo. Se implanta en el Sistema Nacional de Salud un modelo homogéneo de fisioterapia de atención primaria. El fisioterapeuta se integra en el equipo de atención primaria de cada zona básica de salud. Dispone de consulta propia, agenda propia y registro en la historia clínica compartida. Su jornada incluye tiempo protegido para la actividad comunitaria, docente e investigadora. La actividad se organiza en tres niveles: consulta de primer contacto, intervención grupal e intervención comunitaria, y fisioterapia domiciliaria y de continuidad.

Segundo. Vías de acceso. El acceso a la fisioterapia de atención primaria se realiza por autorreferencia para los procesos protocolizados de la matriz común. También se accede por derivación desde medicina de familia y comunitaria, enfermería familiar y comunitaria, pediatría, matrona y trabajo social sanitario. La medicina de atención hospitalaria puede derivar cuando el objetivo es la continuidad funcional o el abordaje comunitario de un proceso estable. La autorreferencia funciona mediante un protocolo de gestión de la demanda con motivos parametrizados, y el cribado clínico corresponde siempre al fisioterapeuta. El Consejo Interterritorial impulsa la actualización del apartado 6 del anexo II del Real Decreto 1030/2006 para recoger la autorreferencia protocolizada en la cartera común.

Tercero. Competencias. Se reconoce el uso de la ecografía por el fisioterapeuta de atención primaria como apoyo a la valoración, sin informe radiológico. Se inicia el desarrollo normativo para habilitar al fisioterapeuta de atención primaria como prescriptor de radiología simple musculoesquelética en los procesos protocolizados. Mientras tanto, se aplica un protocolo compartido con medicina de familia.

Cuarto. Dotación. La dotación de fisioterapeutas de atención primaria se calcula con un modelo común de demanda. En la fase de implantación, ninguna comunidad autónoma queda por debajo de 1 fisioterapeuta por cada 23.900 habitantes (tabla 9.4). En la fase de consolidación, el estándar es de 1 fisioterapeuta por cada 7.500 habitantes (tabla 9.4). En zonas rurales, envejecidas o con alta dependencia, la dotación se ajusta con el mismo modelo hasta 1 fisioterapeuta por cada 4.400 habitantes (tabla 9.4).

Quinto. Evaluación. Los servicios de salud registran en el Sistema de Información de Atención Primaria los indicadores comunes de dirección, ejecución y resultados definidos en este documento. La evaluación mide la cobertura, la accesibilidad, los resultados funcionales y la satisfacción de las personas atendidas. Mide también las derivaciones evitadas, el impacto en la incapacidad temporal y la equidad territorial.

Sexto. Gobernanza. Se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Atención Primaria del Consejo Interterritorial. El grupo aprueba la matriz común de procesos y fija los estándares de los indicadores tras el primer año. También mide los parámetros del modelo de dotación y coordina el despliegue por fases.

Anexo A. Fichas de programas grupales y comunitarios

Este anexo contiene la ficha de cada programa grupal y de cada intervención comunitaria. Las fichas proceden del archivo de datos del proyecto y alimentan directamente el modelo de dotación de la sección 9. Las horas de fisioterapia por edición se calculan en dos pasos. Primero se multiplican las sesiones por su duración y por la fracción a cargo de fisioterapia. Después se suman las horas de preparación y evaluación. Los parámetros de diseño de estas fichas son una propuesta que cada servicio de salud puede adaptar.

Ficha PG-01. Prevención de caídas y fragilidad

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas de 65 años o más que viven en la comunidad
Criterios de inclusión	Cribado de fragilidad o de riesgo de caídas positivo realizado por enfermería familiar y comunitaria
Procesos de la matriz del anexo C	P09, P13
Liderazgo	Fisioterapia, con enfermería familiar y comunitaria en la captación y el seguimiento
Tamaño del grupo	10 a 12
Diseño	Doce semanas con dos sesiones semanales de ejercicio de equilibrio, funcional y de fuerza
Sesiones por edición	24
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	4
Horas de fisioterapia por edición	28,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	2, 4 y 6
Evidencia de referencia	[91]

Ficha PG-02. Dolor persistente: educación en neurociencia del dolor y ejercicio

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas adultas con dolor persistente no complejo
Criterios de inclusión	Diagnóstico médico previo, sin descompensación de la comorbilidad
Procesos de la matriz del anexo C	P08
Liderazgo	Fisioterapia, con medicina de familia en la selección de participantes
Tamaño del grupo	10 a 15
Diseño	Seis sesiones de educación, con diez horas en total, y dieciocho sesiones de ejercicio de una hora, según el ensayo de atención primaria de Castilla y León
Sesiones por edición	24
Duración de cada sesión, en horas	1,17
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	4
Horas de fisioterapia por edición	32,1
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	2, 3 y 4

Campo	Contenido
Evidencia de referencia	[92]

Ficha PG-03. Artrosis de rodilla y cadera

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas adultas con artrosis leve o moderada
Criterios de inclusión	Diagnóstico médico previo registrado en la historia clínica
Procesos de la matriz del anexo C	P03
Liderazgo	Fisioterapia
Tamaño del grupo	10 a 12
Diseño	Seis semanas con dos sesiones semanales de ejercicio terapéutico y educación
Sesiones por edición	12
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	3
Horas de fisioterapia por edición	15,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	2, 3 y 4
Evidencia de referencia	[93]

Ficha PG-04. EPOC en fase estable

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas adultas con EPOC en fase estable
Criterios de inclusión	Diagnóstico médico de EPOC en fase estable
Procesos de la matriz del anexo C	P10
Liderazgo	Compartido: fisioterapia en el ejercicio y enfermería familiar y comunitaria en la educación sobre autocuidado e inhaladores
Tamaño del grupo	8 a 10
Diseño	Ocho semanas con dos sesiones semanales de entrenamiento al ejercicio y educación
Sesiones por edición	16
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	0,75
Horas de preparación y evaluación por edición	3
Horas de fisioterapia por edición	15,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	1, 2 y 3
Evidencia de referencia	[94]

Ficha PG-05. Escuela de espalda

Campo	Contenido
Tipo	Intervención grupal
Población diana	Personas adultas con artalgias vertebrales mecánicas

Campo	Contenido
Criterios de inclusión	Valoración previa en la consulta de fisioterapia de primer contacto
Procesos de la matriz del anexo C	P01
Liderazgo	Fisioterapia
Tamaño del grupo	10 a 12
Diseño	Cuatro semanas con dos sesiones semanales de ejercicio y educación
Sesiones por edición	8
Duración de cada sesión, en horas	1,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	2
Horas de fisioterapia por edición	10,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	3, 4 y 6
Evidencia de referencia	[95]

Ficha PC-01. Promoción de la actividad física con activos comunitarios

Campo	Contenido
Tipo	Intervención comunitaria
Población diana	Población general adulta de la zona básica de salud
Criterios de inclusión	Sin criterio clínico individual
Procesos de la matriz del anexo C	no aplica
Liderazgo	Equipo de atención primaria, con fisioterapia en el diseño y coordinación con salud pública y entidades locales
Tamaño del grupo	no aplica
Diseño	Diseño, coordinación con activos comunitarios y evaluación anual
Sesiones por edición	4
Duración de cada sesión, en horas	2,50
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	0
Horas de fisioterapia por edición	10,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	1, 1 y 2
Evidencia de referencia	[32]

Ficha PC-02. Salud escolar: ergonomía y actividad física

Campo	Contenido
Tipo	Intervención comunitaria
Población diana	Alumnado y profesorado de los centros educativos de la zona básica de salud
Criterios de inclusión	Sin criterio clínico individual
Procesos de la matriz del anexo C	no aplica
Liderazgo	Fisioterapia y enfermería familiar y comunitaria, con los centros educativos
Tamaño del grupo	no aplica
Diseño	Talleres en el centro educativo

Campo	Contenido
Sesiones por edición	3
Duración de cada sesión, en horas	2,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	0
Horas de fisioterapia por edición	6,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	1, 2 y 3
Evidencia de referencia	[32]

Ficha PC-03. Salud laboral comunitaria

Campo	Contenido
Tipo	Intervención comunitaria
Población diana	Colectivos locales con alta carga física en el trabajo
Criterios de inclusión	Sin criterio clínico individual
Procesos de la matriz del anexo C	no aplica
Liderazgo	Fisioterapia, en coordinación con los servicios de prevención cuando existan
Tamaño del grupo	no aplica
Diseño	Talleres de consejo básico sobre carga física
Sesiones por edición	3
Duración de cada sesión, en horas	2,00
Fracción de la sesión a cargo de fisioterapia	1,00
Horas de preparación y evaluación por edición	0
Horas de fisioterapia por edición	6,0
Ediciones por 10.000 habitantes y año: bajo, central y alto	0, 1 y 2
Evidencia de referencia	[32]

Anexo B. Fichas de indicadores

Este anexo contiene la ficha de cada indicador del sistema de evaluación de la sección 10. Las fichas se organizan por bloques del modelo EFQM: Dirección, Ejecución y Resultados. Los estándares que dependen de una línea basal se fijan tras el primer año de registro.

Ficha ID-1. Cartera autonómica de fisioterapia de atención primaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 1. Propósito, visión y estrategia
Definición	Existencia de una cartera de servicios de fisioterapia de AP aprobada por el servicio de salud y ajustada a este modelo
Fórmula	Valor binario
Numerador	Cartera aprobada: sí o no
Denominador	No aplica
Fuente de datos	Normativa y documentos del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Cartera aprobada en todas las comunidades autónomas al cierre de la fase de implantación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria de cada servicio de salud

Ficha ID-2. Protocolo de acceso directo

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 1. Propósito, visión y estrategia
Definición	Existencia de un protocolo aprobado de autorreferencia con motivos de consulta parametrizados y criterios de exclusión
Fórmula	Valor binario
Numerador	Protocolo aprobado: sí o no
Denominador	No aplica
Fuente de datos	Normativa y documentos del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Protocolo aprobado al cierre de la fase de consolidación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria de cada servicio de salud

Ficha ID-3. Circuito de continuidad con atención hospitalaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 1. Propósito, visión y estrategia
Definición	Existencia de un circuito formalizado de derivación y retorno entre atención hospitalaria y fisioterapia de AP
Fórmula	Valor binario
Numerador	Circuito formalizado: sí o no
Denominador	No aplica
Fuente de datos	Documentos de gestión de las áreas sanitarias
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Circuito formalizado en todas las áreas sanitarias al cierre de la fase de consolidación
Responsable del registro	Gerencias de área

Ficha ID-4. Tiempo protegido

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Dirección. Criterio 2. Cultura de la organización y liderazgo
Definición	Porcentaje de la jornada de fisioterapia de AP reservado a actividad comunitaria no clínica, docencia, investigación y coordinación
Fórmula	$(\text{Horas protegidas en agenda} / \text{horas de jornada}) \times 100$
Numerador	Horas protegidas registradas en agenda
Denominador	Horas de jornada de fisioterapia de AP
Fuente de datos	Agenda electrónica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Igual o superior al valor de tiempo protegido del modelo de dotación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-1. Cobertura de personal

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Porcentaje de zonas básicas de salud con al menos un fisioterapeuta de AP asignado presencialmente en la zona
Fórmula	$(\text{Zonas básicas con fisioterapeuta asignado presencialmente} / \text{zonas básicas totales}) \times 100$
Numerador	Zonas básicas con fisioterapeuta asignado presencialmente
Denominador	Zonas básicas de salud de la comunidad autónoma
Fuente de datos	SIAP
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	100 % al cierre de la fase de implantación
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-2. Infraestructura de consulta

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Porcentaje de centros de salud que cuentan con un espacio físico propio para la consulta de fisioterapia
Fórmula	$(\text{Centros de salud con espacio propio} / \text{centros de salud totales}) \times 100$
Numerador	Centros de salud con espacio físico propio de fisioterapia
Denominador	Centros de salud de la comunidad autónoma
Fuente de datos	Inventario de centros del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-3. Densidad de fisioterapeutas de AP

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Fisioterapeutas de AP a tiempo completo equivalente por 10.000 habitantes
Fórmula	$(\text{Fisioterapeutas de AP equivalentes a tiempo completo} / \text{población}) \times 10.000$
Numerador	Fisioterapeutas de AP equivalentes a tiempo completo

Campo	Contenido
Denominador	Población con tarjeta sanitaria
Fuente de datos	SIAP
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	El que resulte del modelo de dotación de la sección 9 para la fase correspondiente
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-4. Agenda e historia clínica propias

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Definición	Porcentaje de fisioterapeutas de AP con agenda propia y registro en la historia clínica compartida
Fórmula	$(\text{Fisioterapeutas con agenda propia y registro en historia compartida} / \text{fisioterapeutas de AP}) \times 100$
Numerador	Fisioterapeutas con agenda propia y registro en la historia clínica compartida
Denominador	Fisioterapeutas de AP
Fuente de datos	Sistemas de información del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	100 % al cierre de la fase de implantación
Responsable del registro	Dirección de sistemas de información

Ficha IE-5. Tiempo hasta la primera valoración

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Mediana de días entre la solicitud o la derivación y la primera consulta de fisioterapia de AP
Fórmula	Mediana de los días transcurridos
Numerador	Días entre solicitud y primera consulta de cada episodio
Denominador	Episodios iniciados en el periodo
Fuente de datos	Agenda electrónica
Periodicidad	Trimestral
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año y estándar fijado por el grupo de trabajo del Consejo Interterritorial
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-6. Distribución de la entrada por vía

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 3. Implicar a los grupos de interés
Definición	Porcentaje de episodios iniciados por cada vía de entrada
Fórmula	$(\text{Episodios iniciados por cada vía} / \text{episodios totales}) \times 100$
Numerador	Episodios iniciados por cada vía
Denominador	Episodios iniciados en el periodo
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Semestral
Estándar propuesto	Indicador descriptivo sin estándar
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-7. Derivación tras la primera consulta

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Porcentaje de personas derivadas a otro profesional tras la primera consulta por signos de alarma o por complejidad
Fórmula	$(\text{Personas derivadas tras la primera consulta} / \text{personas con primera consulta}) \times 100$
Numerador	Personas derivadas tras la primera consulta, por motivo
Denominador	Personas con primera consulta en el periodo
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Semestral
Estándar propuesto	Indicador de seguridad sin estándar fijo, con revisión de cualquier variación brusca
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-8. Oferta de programas grupales

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Ediciones de programas grupales realizadas por 10.000 habitantes y año
Fórmula	$\text{Ediciones realizadas} / \text{población} \times 10.000$
Numerador	Ediciones realizadas de cada programa del anexo A
Denominador	Población con tarjeta sanitaria
Fuente de datos	Agenda electrónica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Las ediciones del escenario central del anexo A
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IE-9. Atención domiciliaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Ejecución. Criterio 4. Crear valor sostenible
Definición	Personas atendidas por fisioterapia de AP en el domicilio por 1.000 habitantes de 65 años o más
Fórmula	$\text{Personas atendidas en domicilio} / \text{población de 65 años o más} \times 1.000$
Numerador	Personas atendidas en domicilio
Denominador	Población de 65 años o más
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IR-1. Cambio en la intensidad del dolor

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Diferencia media en la escala numérica del dolor de 0 a 10 entre la primera consulta y el alta
Fórmula	$\text{Media de (valor inicial menos valor al alta)}$
Numerador	Suma de diferencias individuales
Denominador	Episodios con ambos registros

Campo	Contenido
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-2. Cambio en la función

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Diferencia media en un instrumento de función validado en castellano, elegido por el grupo de trabajo, entre la primera consulta y el alta
Fórmula	Media de (valor al alta menos valor inicial)
Numerador	Suma de diferencias individuales
Denominador	Episodios con ambos registros
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-3. Altas por consecución de objetivos

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de altas en las que se registran como alcanzados los objetivos del plan de intervención
Fórmula	$(\text{Altas con objetivos alcanzados} / \text{altas totales}) \times 100$
Numerador	Altas con objetivos alcanzados
Denominador	Altas del periodo
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-4. Reconsulta por el mismo proceso

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de personas que vuelven a consultar en AP por el mismo proceso en las doce semanas posteriores al alta
Fórmula	$(\text{Personas que reconsultan} / \text{personas dadas de alta}) \times 100$
Numerador	Personas que reconsultan en doce semanas
Denominador	Personas dadas de alta
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año, con la referencia externa del anexo B
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-5. Derivación posterior a pruebas o a atención hospitalaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de episodios con solicitud de pruebas de imagen o derivación a atención hospitalaria en los seis meses posteriores
Fórmula	$(\text{Episodios con prueba o derivación} / \text{episodios cerrados}) \times 100$
Numerador	Episodios con prueba de imagen o derivación hospitalaria
Denominador	Episodios cerrados
Fuente de datos	Historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-6. Duración de la incapacidad temporal

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Mediana de días de incapacidad temporal en los procesos de la matriz del anexo C
Fórmula	Mediana de días por proceso
Numerador	Días de incapacidad temporal por episodio
Denominador	Episodios con incapacidad temporal
Fuente de datos	Historia clínica e inspección médica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Inspección médica del servicio de salud

Ficha IR-7. Uso de analgésicos y antiinflamatorios

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Porcentaje de episodios de procesos de la matriz con prescripción de analgésicos o antiinflamatorios en los tres meses posteriores al inicio
Fórmula	$(\text{Episodios con prescripción} / \text{episodios iniciados}) \times 100$
Numerador	Episodios con prescripción
Denominador	Episodios iniciados
Fuente de datos	Receta electrónica e historia clínica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Servicio de farmacia de atención primaria

Ficha IR-8. Satisfacción de las personas atendidas

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 6. Percepción de los grupos de interés
Definición	Puntuación media de satisfacción en una encuesta común tras el alta
Fórmula	Media de la puntuación
Numerador	Suma de puntuaciones
Denominador	Encuestas respondidas

Campo	Contenido
Fuente de datos	Encuesta común del servicio de salud
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Línea basal en el primer año
Responsable del registro	Unidad de calidad del servicio de salud

Ficha IR-9. Equidad territorial

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Diferencia entre zonas rurales y urbanas en cobertura de personal y en tiempo hasta la primera valoración
Fórmula	Diferencia de IE-1 y de IE-5 entre zonas rurales y urbanas
Numerador	Valores de IE-1 e IE-5 en zonas rurales
Denominador	Valores de IE-1 e IE-5 en zonas urbanas
Fuente de datos	SIAP y agenda electrónica
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Reducción de la diferencia en cada fase
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IR-10. Consultas de medicina de familia por procesos musculoesqueléticos

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Consultas de medicina de familia con código del aparato locomotor por 1.000 habitantes y año
Fórmula	Consultas con código del capítulo L de la CIAP-2 / población $\times$ 1.000
Numerador	Consultas de medicina de familia con código del capítulo L
Denominador	Población con tarjeta sanitaria
Fuente de datos	BDCAP
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Indicador de tendencia sin estándar, porque el efecto esperado no está garantizado
Responsable del registro	Dirección de atención primaria

Ficha IR-11. Demora en rehabilitación hospitalaria

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Indicador del circuito de continuidad asistencial, no del dimensionamiento de AP: mediana de días de espera para la primera consulta de rehabilitación hospitalaria en las áreas con circuito formalizado
Fórmula	Mediana de días
Numerador	Días de espera por paciente
Denominador	Pacientes con primera consulta de rehabilitación
Fuente de datos	Sistema de información de listas de espera
Periodicidad	Anual
Estándar propuesto	Indicador de seguimiento sin estándar
Responsable del registro	Gerencias de área

Ficha IR-12. Adecuación de la radiografía simple solicitada

Campo	Contenido
Bloque y criterio EFQM	Resultados. Criterio 7. Rendimiento estratégico y operativo
Definición	Solo si se aprueba la habilitación de la sección 7.4: porcentaje de radiografías solicitadas por fisioterapia de AP que cumplen la regla de decisión del protocolo
Fórmula	$(\text{Solicitudes conformes} / \text{solicitudes totales}) \times 100$
Numerador	Solicitudes conformes con la regla de decisión
Denominador	Solicitudes de radiografía de fisioterapia de AP
Fuente de datos	Auditoría de historia clínica
Periodicidad	Semestral
Estándar propuesto	Estándar fijado en el protocolo consensuado con radiodiagnóstico
Responsable del registro	Unidad de calidad y servicio de radiodiagnóstico

Anexo C. Matriz de coherencia de procesos, vías y condiciones

Este anexo es la única fuente de la que se generan las tablas de procesos de las secciones 5, 6 y 8. Cada proceso o situación aparece una sola vez. La fila indica su tipo, su condición, sus vías de entrada, su nivel de atención comunitaria y su programa asociado. Si el proceso está excluido del acceso directo, indica además su circuito alternativo.

Se aplican tres reglas transversales a todas las filas:

- El cribado clínico de signos de alarma lo realiza el fisioterapeuta en la primera consulta. No es una condición de acceso.
- El acceso directo se limita a personas adultas.
- Una exclusión del acceso directo no impide la atención en fisioterapia de AP por otra vía.

Tabla C.1. Matriz de coherencia

Id	Tipo	Proceso o situación	Condición	Vías	Nivel	Programa	Circuito alternativo
P01	Acceso directo	Artralgias vertebrales mecánicas	Sin déficit neurológico progresivo referido por la persona	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	PG-05	no aplica
P02	Acceso directo	Hombro doloroso no traumático	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P03	Acceso directo	Artrosis leve o moderada de rodilla, cadera o mano	Diagnóstico médico previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1 y Nivel 2	PG-03	no aplica
P04	Acceso directo	Esguince de tobillo leve o moderado	La persona puede cargar su peso y caminar tres o cuatro pasos, aunque sea con dificultad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P05	Acceso directo	Fascitis plantar	Sin signos sistémicos referidos	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P06	Acceso directo	Epicondialgia	Sin traumatismo desencadenante	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P07	Acceso directo	Recidiva de un proceso diagnosticado previamente por su médico de familia y comunitaria	Diagnóstico médico previo registrado en la historia clínica	Autorreferencia	Nivel 1	no aplica	no aplica
P08	Acceso directo	Dolor persistente no complejo	Diagnóstico médico previo, sin descompensación de la comorbilidad	Autorreferencia, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 1 y Nivel 2	PG-02	no aplica

Id	Tipo	Proceso o situación	Condición	Vías	Nivel	Programa	Circuito alternativo
P09	Solo derivación	Riesgo de caídas y fragilidad	Cribado de fragilidad positivo realizado por enfermería familiar y comunitaria	Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 2 y Nivel 3	PG-01	no aplica
P10	Solo derivación	EPOC en fase estable	Diagnóstico médico de EPOC en fase estable	Medicina de familia y comunitaria, Enfermería familiar y comunitaria	Nivel 2	PG-04	no aplica
P11	Solo derivación	Pérdida funcional leve o moderada tras el alta hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria	Nivel 3	no aplica	no aplica
P12	Solo derivación	Proceso musculoesquelético leve o moderado que no requiere rehabilitación hospitalaria	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria	Nivel 1	no aplica	no aplica
P13	Solo derivación	Seguimiento funcional comunitario de la fragilidad o del riesgo de caídas	Situación clínica estable, informe clínico mínimo y criterio de retorno definidos	Medicina de atención hospitalaria	Nivel 2	PG-01	no aplica
P14	Solo derivación	Continuidad tras la fase de rehabilitación hospitalaria	Informe de alta de rehabilitación con objetivos de continuidad	Retorno desde rehabilitación hospitalaria	Nivel 1 y Nivel 2	no aplica	no aplica
P15	Solo derivación	Dependencia, inmovilidad o barreras funcionales en el domicilio	Valoración previa de necesidades en el domicilio	Trabajo social sanitario, Enfermería familiar y comunitaria, Medicina de familia y comunitaria	Nivel 3	no aplica	no aplica
P16	Solo derivación	Embarazo, posparto o disfunción de suelo pélvico de baja complejidad	Proceso incluido en la cartera autonómica	Matrona	Nivel 1 y Nivel 2	no aplica	no aplica
P17	Solo derivación	Proceso pediátrico incluido en la cartera autonómica	Oferta pediátrica definida en la cartera autonómica	Pediatría	Nivel 1	no aplica	no aplica
X01	Excluido del acceso directo	Traumatismo grave	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Medicina de familia o urgencias
X02	Excluido del acceso directo	Déficit neurológico progresivo	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Medicina de familia o urgencias
X03	Excluido del acceso directo	Dolor no mecánico o con signos sistémicos	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Medicina de familia

Id	Tipo	Proceso o situación	Condición	Vías	Nivel	Programa	Circuito alternativo
X04	Excluido del acceso directo	Postquirúrgico de cualquier complejidad	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Rehabilitación hospitalaria y retorno a AP por el circuito 5
X05	Excluido del acceso directo	Menor de edad	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Pediatría de atención primaria
X06	Excluido del acceso directo	Patología laboral o por accidente de tráfico	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Circuito que establezca la normativa aplicable
X07	Excluido del acceso directo	Dependencia severa	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	Valoración multidisciplinar del equipo de AP por el circuito 3

Fuente: archivo de datos de la matriz del proyecto. Las filas de tipo «Acceso directo» admiten también la derivación por las vías que se indican.

Anexo D. Glosario y terminología normalizada

Este anexo define los términos que el documento usa siempre con el mismo sentido. La segunda columna recoge los términos que el documento ha sustituido y que no deben usarse.

Tabla D.1. Glosario

Término adoptado	Sustituye a	Definición
Artralgias vertebrales mecánicas	Lumbalgia mecánica y cervicalgia mecánica	Dolor de la columna vertebral de origen mecánico, sin signos de alarma ni déficit neurológico progresivo
Autorreferencia o acceso directo del ciudadano	Autocita	Solicitud de cita con fisioterapia sin derivación previa de otro profesional, limitada a los procesos protocolizados
Cribado clínico	Cribado administrativo y triaje administrativo	Valoración que realiza el fisioterapeuta en la primera consulta para detectar signos de alarma y estratificar el proceso
Dolor persistente	Dolor crónico	Dolor que se mantiene más allá del tiempo habitual de recuperación. Se admite «dolor crónico» solo en nombres propios y citas literales
Gestión de la demanda con motivos parametrizados	Cribado administrativo-clínico	Protocolo por el que el personal administrativo asigna cita según una lista de motivos definida por los clínicos, sin valoración clínica
Interconsulta no presencial	Interconsulta virtual	Consulta entre profesionales sin presencia de la persona atendida. En Madrid se denomina e-consulta
Intervención comunitaria	Programa comunitario	Actuación sobre la población o sobre los activos comunitarios, sin un proceso clínico individual
Intervención grupal	Consulta grupal	Intervención clínica sobre un grupo de personas con un proceso definido
Medicina de familia y comunitaria	MFyC	Especialidad médica del equipo de atención primaria. La sigla solo se usa en tablas
Proceso abordable en AP	Objetivos funcionales abordables en AP	Proceso de salud que, en su estado actual, se puede atender con los recursos de fisioterapia de AP y es compatible con los objetivos del primer nivel: educación, automanejo, inclusión en la comunidad y retorno a las actividades diarias
Recidiva de un proceso previamente diagnosticado	Dolor musculoesquelético recurrente	Reaparición de un proceso que el médico de familia ya diagnosticó y registró
Sesión clínica compartida	Sesiones compartidas	Revisión conjunta de casos complejos entre medicina, enfermería y fisioterapia
Signos de alarma	Banderas rojas	Síntomas o signos que sugieren una patología grave y exigen derivación médica
Atención hospitalaria	Atención especializada	Nivel asistencial hospitalario. Se conserva «atención especializada» solo en citas literales de normas

Fuente: sección 6 de la especificación del documento y comentarios de la revisión del borrador.

Tabla D.2. Siglas

Sigla	Significado
AP	Atención primaria
BDCAP	Base de Datos Clínicos de Atención Primaria
CIAP-2	Clasificación Internacional de Atención Primaria, segunda edición
EFQM	European Foundation for Quality Management
EPOC	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
OMS	Organización Mundial de la Salud

Sigla	Significado
SERGAS	Servizo Galego de Saúde
SESCAM	Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
SIAP	Sistema de Información de Atención Primaria
SNS	Sistema Nacional de Salud

Fuente: elaboración propia.

Anexo E. Tabla de fuentes por cifra

Este anexo recoge cada cifra del cuerpo del documento con la fuente que la sostiene, el año del dato, su definición y el estado de verificación de la fuente. Las cifras que produce el modelo de la sección 9 remiten a ese modelo.

Tabla E.1. Fuentes por cifra

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición	Estado de la fuente
1.2	51.813.798	Problemas del aparato locomotor registrados en la BDCAP	[8]	2023	Registros de problemas de salud del capítulo L de la CIAP-2, no consultas ni personas	Pendiente de cotejo
1.2	30 %	Consultas de medicina general por problemas musculoesqueléticos según el documento de política inglés	[9]	2006	Cifra de política sanitaria, «hasta el 30 %», sin medición propia	Pendiente de cotejo
1.2	17 %	Consultas de medicina general por problemas musculoesqueléticos	[12]	2017	Estimación citada en el ensayo piloto STEMS	Verificada
1.2	545	Consultas revisadas en un centro urbano	[13]	2018	Consultas de medicina general de un centro	Verificada
1.2	21,1 %	Proporción de consultas musculoesqueléticas en un centro urbano	[13]	2018	Consultas con presentación musculoesquelética sobre el total revisado	Verificada
1.3	60.000	Trabajadores valorados por el INSS por patología osteomuscular	[15]	2019	Valoraciones de incapacidad laboral	Pendiente de cotejo
1.3	31,6 %	Procesos de columna lumbar entre los valorados por patología osteomuscular	[15]	2019	Porcentaje sobre los procesos osteomusculares valorados	Pendiente de cotejo
1.3	13,5 %	Procesos de hombro entre los valorados por patología osteomuscular	[15]	2019	Porcentaje sobre los procesos osteomusculares valorados	Pendiente de cotejo
1.3	11,9 %	Procesos de rodilla entre los valorados por patología osteomuscular	[15]	2019	Porcentaje sobre los procesos osteomusculares valorados	Pendiente de cotejo
1.5	8.417	Contactos en la evaluación de un servicio escocés de fisioterapia como alternativa al médico general	[19]	2015 a 2017	Contactos de pacientes en dos años de servicio	Verificada
1.5	87,3 %	Contactos resueltos en atención primaria	[19]	2015 a 2017	Porcentaje de contactos manejados sin salir de atención primaria	Verificada
1.5	60,4 %	Contactos resueltos solo con automanejo	[19]	2015 a 2017	Porcentaje de contactos que solo necesitaron automanejo	Verificada
1.5 y 10.4	78,5 %	Personas sin consulta en doce semanas tras una cita de fisioterapia de primer contacto	[20]	Publicado en 2025	Porcentaje de personas que no volvieron a consultar en atención primaria en doce semanas	Verificada
1.5	159.000	Personas atendidas por las unidades de fisioterapia de AP de Madrid	[21]	2024	Personas atendidas, cifra aproximada de la nota oficial	Pendiente de cotejo
1.5	77 %	Consecución de objetivos en las unidades de fisioterapia de AP de Madrid	[22]	2024	Porcentaje aproximado de casos con objetivos alcanzados, según el documento de posición	Verificada como documento aportado
1.5	93 %	Reducción del dolor en las unidades de fisioterapia de AP de Madrid	[22]	2024	Porcentaje aproximado de casos con reducción del dolor, según el documento de posición	Verificada como documento aportado
3.1 y 9.1	2.418	Fisioterapeutas de atención primaria en el SNS	[37]	2024	Profesionales de fisioterapia de AP registrados en el informe monográfico	Pendiente de cotejo
3.1	84,8 %	Fisioterapeutas del SNS que trabajan en hospitales	[37]	2024	Porcentaje sobre el total de fisioterapeutas del SNS	Pendiente de cotejo
3.1	10 %	Fisioterapeutas del SNS que trabajan en atención primaria	[37]	2024	Porcentaje sobre el total de fisioterapeutas del SNS	Pendiente de cotejo
3.1	13.694	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Asturias	[38]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP	Pendiente de cotejo

Sección	Cifra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición	Estado de la fuente
3.1	10.091	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Cantabria	[38]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP	Pendiente de cotejo
3.1	104.847	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Cataluña	[38]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP	Pendiente de cotejo
3.1	12.101	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Extremadura	[38]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP	Pendiente de cotejo
3.1	91.972	Habitantes por fisioterapeuta de AP en Navarra	[38]	Anterior a 2022	Población por fisioterapeuta de AP según el SIAP	Pendiente de cotejo
3.3	24	Zonas básicas de salud del despliegue inicial en Canarias	[47]	2022	Zonas básicas con servicio de fisioterapia en la primera fase	Pendiente de cotejo
4.1	40	Centros de la evaluación nacional de la fisioterapia de primer contacto en Inglaterra	[64]	Publicado en 2021	Centros participantes	Verificada
4.1	240	Fisioterapeutas de primer contacto de la evaluación nacional	[64]	Publicado en 2021	Profesionales participantes	Verificada
4.1	426	Adultos incluidos en el estudio FRONTIER	[67]	Publicado en 2024	Participantes	Verificada
4.1	46	Consultas de medicina general del estudio FRONTIER	[67]	Publicado en 2024	Centros participantes	Verificada
4.1	44,7 %	Personas con medicación tras la primera consulta en el grupo de medicina general	[67]	Publicado en 2024	Porcentaje del grupo	Verificada
4.1	18,4 %	Personas con medicación tras la primera consulta en un grupo de fisioterapia	[67]	Publicado en 2024	Porcentaje del grupo	Verificada
4.1	24,7 %	Personas con medicación tras la primera consulta en el otro grupo de fisioterapia	[67]	Publicado en 2024	Porcentaje del grupo	Verificada
4.1	105,5	Coste mediano por paciente para el NHS en el grupo de medicina general	[67]	Publicado en 2024	Libras esterlinas por paciente	Verificada
4.1	41,0	Coste mediano por paciente en un grupo de fisioterapia	[67]	Publicado en 2024	Libras esterlinas por paciente	Verificada
4.1	44,0	Coste mediano por paciente en el otro grupo de fisioterapia	[67]	Publicado en 2024	Libras esterlinas por paciente	Verificada
4.2 y 11.5	28 %	Pacientes que llegaron a fisioterapia por acceso directo en los Países Bajos	[69]	2006	Porcentaje de los pacientes atendidos en el primer año de acceso directo	Verificada
4.2 y 11.5	74,3 %	Pacientes que acudieron a fisioterapia sin derivación en los Países Bajos	[71]	2024	Porcentaje de pacientes sin derivación	Pendiente de cotejo
4.4	28	Artículos de la revisión sistemática de Gallotti y colaboradores	[81]	Publicado en 2023	Artículos incluidos	Verificada
4.4	2.081	Pacientes del metaanálisis de Abuhl y colaboradores	[18]	Publicado en 2025	Pacientes de diez ensayos aleatorizados	Verificada
4.4	0,55	Riesgo relativo de solicitud de imagen con primer contacto por fisioterapia	[18]	Publicado en 2025	Riesgo relativo combinado	Verificada
4.4	0,29	Riesgo relativo de medicación con primer contacto por fisioterapia	[18]	Publicado en 2025	Riesgo relativo combinado	Verificada
4.4 y 11.5	10 %	Autorreferencia real en uno de los brazos del estudio STEMS-2	[83]	2011 a 2017	Porcentaje de las entradas a fisioterapia	Verificada
4.4 y 11.5	6 %	Autorreferencia real en el otro brazo del estudio STEMS-2	[83]	2011 a 2017	Porcentaje de las entradas a fisioterapia	Verificada
4.4	21	Estudios de la revisión de Fischer y colaboradores	[84]	Publicado en 2026	Estudios incluidos	Verificada
4.4	90.401	Pacientes de la revisión de Fischer y colaboradores	[84]	Publicado en 2026	Pacientes incluidos	Verificada

Sección	Cífra	Qué mide	Fuente	Año del dato	Definición	Estado de la fuente
4.4	10 %	Límite inferior de la reducción estimada de consultas de medicina general	[84]	Publicado en 2026	Reducción relativa estimada	Verificada
4.4	30 %	Límite superior de la reducción estimada de consultas de medicina general	[84]	Publicado en 2026	Reducción relativa estimada	Verificada
4.4	0,57	Riesgo relativo de prescripción con acceso directo	[85]	Publicado en 2026	Riesgo relativo combinado, certeza baja	Verificada
4.5	611.000	Fisioterapeutas en la Unión Europea	[86]	2021	Fisioterapeutas en ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	136,7	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en la Unión Europea	[86]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	234,4	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Alemania	[86]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	215,9	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Bélgica	[86]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	12,7	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Rumanía	[86]	2021	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	149	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en la Unión Europea	[87]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	240	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Alemania	[87]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	228	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en Bélgica	[87]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	188	Fisioterapeutas por 100.000 habitantes en los Países Bajos	[87]	2023	En ejercicio, todos los ámbitos	Pendiente de cotejo
4.5	3,6	Fisioterapeutas por 10.000 habitantes, media mundial	[88]	2024	Censo de las organizaciones miembro de World Physiotherapy	Pendiente de cotejo
4.5	39 %	Organizaciones que declaran acceso directo pleno	[88]	2024	Porcentaje de organizaciones que respondieron al censo	Pendiente de cotejo
4.5	58 %	Organizaciones que declararon acceso directo	[89]	Publicado en 2013	Porcentaje de las organizaciones que respondieron a la encuesta	Verificada
8.4	15.581	Pacientes de la revisión sobre las reglas de Ottawa	[97]	Publicado en 2003	Pacientes de los estudios combinados	Verificada
8.4	100 %	Sensibilidad de las reglas de Ottawa para excluir fracturas	[97]	Publicado en 2003	Sensibilidad cercana al 100 %	Verificada
9.3	7.500	Habitantes por fisioterapeuta en el estándar del borrador de trabajo	[90]	2026	Ratio propuesta en el borrador	Verificada como documento aportado
9.3	15.000	Habitantes por fisioterapeuta en el mínimo del borrador de trabajo	[90]	2026	Ratio propuesta en el borrador	Verificada como documento aportado
9.3	3.000	Habitantes por fisioterapeuta en zonas de alta necesidad según el borrador de trabajo	[90]	2026	Ratio propuesta en el borrador	Verificada como documento aportado
9.5	10.000	Habitantes por fisioterapeuta de primer contacto que pide la Chartered Society of Physiotherapy	[106]	2022	Reivindicación profesional para Inglaterra	Pendiente de cotejo
9.2	23.871	Habitantes por fisioterapeuta en el escenario bajo	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo de demanda con los parámetros de la tabla 9.1	Cálculo reproducible
9.2	7.480	Habitantes por fisioterapeuta en el escenario central	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo de demanda con los parámetros de la tabla 9.1	Cálculo reproducible
9.2	2.035	Habitantes por fisioterapeuta en el escenario alto	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo de demanda con los parámetros de la tabla 9.1	Cálculo reproducible
9.4	4.426	Habitantes por fisioterapeuta en la zona rural dispersa, envejecida y con alta dependencia	Modelo de la sección 9	No aplica	Resultado del modelo con el ajuste territorial de la tabla 9.5	Cálculo reproducible

Fuente: elaboración propia a partir del banco de referencias del proyecto.

Anexo F. Metodología de verificación de referencias

Este anexo describe cómo se verificaron las fuentes y qué queda pendiente. Un documento dirigido al Ministerio de Sanidad debe permitir trazar cada dato hasta su origen, y este anexo indica hasta dónde llega hoy esa trazabilidad.

F.1. Criterios

El documento solo admite fuentes primarias: normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines autonómicos, documentos oficiales del organismo competente, bases de datos estadísticas oficiales y artículos revisados por pares. Una noticia de prensa solo se admite como fuente secundaria, identificada en el texto, cuando no existe documento oficial.

Cada referencia tiene uno de cuatro estados:

- **Verificada.** Se ha abierto la fuente y se ha comprobado el dato. En los artículos científicos, se ha comprobado además el registro en PubMed.
- **Pendiente de cotejo.** La fuente existe con título y dirección oficial, y el contenido se conoce por búsquedas, pero no se ha abierto el documento.
- **Secundaria.** Noticia o nota de prensa.
- **No encontrada.** La afirmación no tiene fuente localizable y no se usa.

F.2. Estado de las referencias citadas

Tabla F.1. Referencias citadas por estado de verificación

Estado	Referencias	Números en la lista de referencias
Pendiente de cotejo	64	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 73, 76, 77, 86, 87, 88, 96, 98, 104, 106, 107
Secundaria	1	57
Verificada	44	11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109
Total	109	

Fuente: banco de referencias del proyecto.

El entorno de trabajo en el que se elaboró este documento solo permitió abrir directamente los registros de PubMed. Por esa razón, todos los artículos científicos están verificados, mientras que las normas, los documentos autonómicos, las estadísticas oficiales y los documentos internacionales quedan pendientes de cotejo. Antes de la entrega definitiva, una persona del grupo redactor debe abrir cada dirección de la lista de referencias y confirmar el dato citado.

F.3. Afirmaciones del borrador sin fuente localizable

Tabla F.2. Afirmaciones retiradas o matizadas por falta de fuente

Afirmación del borrador	Resultado de la búsqueda	Tratamiento en este documento
Resolución del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 2007 con ratios	No encontrada	Se retira la atribución y los ratios se calculan con el modelo

Afirmación del borrador	Resultado de la búsqueda	Tratamiento en este documento
Cálculo atribuido a la Chartered Society of Physiotherapy sobre la mitad de las consultas musculoesqueléticas	No encontrada	Se retira
Relación de países con autorreferencia normalizada atribuida a la región europea de World Physiotherapy	No encontrada	Cada país se sostiene con su propia fuente
Solicitud de radiografía simple por fisioterapeutas de AP en Madrid	No encontrada como norma	Se presenta como petición de desarrollo normativo
Acceso directo del ciudadano en Cataluña	No encontrada	Cataluña figura como modelo de integración en el equipo
Fuente oficial sobre el acceso directo en Nueva Zelanda	No encontrada	No se cita
Estudio español que evalúe el acceso directo en el SNS	No encontrado	Se declara la carencia y se propone evaluar el despliegue

Fuente: búsqueda documental realizada para este documento.

F.4. Documentos que deben incorporarse antes de la entrega

- La instrucción del Servicio Madrileño de Salud que regula la citación directa desde la Unidad de Atención al Usuario.
- La instrucción del SERGAS que incorpora la fisioterapia al protocolo de gestión de la demanda.
- El documento completo de la guía de actuación del Servicio Canario de la Salud.
- La serie del SIAP de fisioterapeutas de AP por comunidad autónoma del último año disponible.
- El total de problemas de salud registrados en la BDCAP de 2023, para calcular el porcentaje del aparato locomotor.
- El valor de España en la tabla de Eurostat de fisioterapeutas por 100.000 habitantes.

Referencias

1. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2003-21340. Texto consolidado. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
2. World Physiotherapy. Policy statement: Direct access and patient/client self-referral to physiotherapy. Londres: World Physiotherapy; 2023. Disponible en: <https://world.physio/sites/default/files/2024-01/PS-2023-Direct-access.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
3. World Physiotherapy. Policy statement: Description of physiotherapy. Londres: World Physiotherapy; 2023. Disponible en: <https://world.physio/sites/default/files/2024-01/PS-2023-Description.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
4. World Health Organization. Rehabilitation in health systems. Ginebra: WHO; 2017. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/254506>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
5. World Health Organization. Rehabilitation 2030: a call for action. Ginebra: WHO; 2017. Disponible en: <https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
6. Asamblea Mundial de la Salud. Resolución WHA76.6. Strengthening rehabilitation in health systems. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023. Disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_R6-en.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
7. World Health Organization. Package of interventions for rehabilitation. Ginebra: WHO; 2023. Disponible en: <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/rehabilitation/basic-pir-info-sheet.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
8. Ministerio de Sanidad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). Problemas de salud, año 2023 [consulta interactiva]. Disponible en: <https://estadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/C/base-de-datos-de-clinicos-de-atencion-primaria-bdcap/problemas-de-salud>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
9. Department of Health. The Musculoskeletal Services Framework. A joint responsibility: doing it differently. Londres: Department of Health; 2006. Disponible en: https://chiro.org/Graphics_Box_CONDITIONS/FULL/The_Musculoskeletal_Services_Framework.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
10. NHS England. First contact physiotherapists [página web]. Disponible en: <https://www.england.nhs.uk/gp/expanding-our-workforce/first-contact-physiotherapists/>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
11. Jordan KP, Kadam UT, Hayward R, Porcheret M, Young C, Croft P. Annual consultation prevalence of regional musculoskeletal problems in primary care: an observational study. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:144. PMID: 20598124. doi:10.1186/1471-2474-11-144.
12. Bishop A, Ogollah RO, Jowett S, Kigozi J, Tooth S, Protheroe J, et al. STEMS pilot trial: a pilot cluster randomised controlled trial to investigate the addition of patient direct access to physiotherapy to usual GP-led primary care for adults with musculoskeletal pain. BMJ Open. 2017;7(3):e012987. PMID: 28286331. doi:10.1136/bmjopen-2016-012987.
13. Keavy R, Horton R, Al-Dadah O. The prevalence of musculoskeletal presentations in general practice: an epidemiological study. Fam Pract. 2023;40(1):68-74. PMID: 35747902. doi:10.1093/fampra/cmac055.
14. Seguridad Social. Estadísticas de incapacidad temporal por contingencias comunes [página web]. Disponible en: <https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46/EST189>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
15. Regal-Ramos R. Epidemiología de la incapacidad laboral por patología osteomuscular en España: 60.000 trabajadores valorados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 2019. Med Segur Trab (Internet). 2022;68(269):209-220. doi:10.4321/s0465-546x2022000400003. Pendiente de cotejo en la fuente original.
16. Ojha HA, Snyder RS, Davenport TE. Direct access compared with referred physical therapy episodes of care: a systematic review. Phys Ther. 2014;94(1):14-30. PMID: 24029295. doi:10.2522/ptj.20130096.
17. Frogner BK, Harwood K, Andrilla CHA, Schwartz M, Pines JM. Physical therapy as the first point of care to treat low back pain: an instrumental variables approach to estimate impact on opioid prescription, health care utilization, and costs. Health Serv Res. 2018;53(6):4629-4646. PMID: 29790166. doi:10.1111/1475-6773.12984.

18. Abuhl B, Ehrmantraut D, Wolden M. First-contact physical therapy compared to usual primary care for musculoskeletal disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Phys Ther.* 2025;105(8):pzaf080. PMID: 40511847. [doi:10.1093/ptj/pzaf080](https://doi.org/10.1093/ptj/pzaf080).
19. Downie F, McRitchie C, Monteith W, Turner H. Physiotherapist as an alternative to a GP for musculoskeletal conditions: a 2-year service evaluation of UK primary care data. *Br J Gen Pract.* 2019;69(682):e314-e320. PMID: 30962224. [doi:10.3399/bjgp19X702245](https://doi.org/10.3399/bjgp19X702245).
20. Bradford B, Collier TS, Freeman M, Goodwin R. Primary care reattendance following an FCPP appointment: a national retrospective service evaluation. *Musculoskeletal Care.* 2025;23(2):e70143. PMID: 40515757. [doi:10.1002/msc.70143](https://doi.org/10.1002/msc.70143).
21. Comunidad de Madrid. Los fisioterapeutas de los centros de salud de la Comunidad de Madrid atendieron a cerca de 159.000 pacientes en 2024 [nota de prensa]. Madrid; 5 de septiembre de 2025. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/noticias>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
22. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Grupo de Trabajo de Especialidades. Pertinencia de la solicitud de radiología simple por los fisioterapeutas de Atención Primaria en el marco de sus competencias. Documento de posición institucional. Madrid: CPFCM; junio de 2026. Documento aportado por la autoría.
23. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2006-16212. Texto consolidado. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
24. Ministerio de Sanidad. Cartera de servicios comunes de atención primaria: rehabilitación básica [página web]. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/2AtencionPrimaria/AP-RehabilitacionBasica.htm>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
25. Orden SND/454/2025, de 9 de mayo, por la que se modifican los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 1030/2006. Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2025-9277. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-9277. Pendiente de cotejo en la fuente original.
26. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2003-10715. Texto consolidado. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
27. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2019. Publicado por Resolución de 26 de abril de 2019 de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, BOE-A-2019-6761. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/atencionPrimaria/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
28. Ministerio de Sanidad. Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2021. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/atencionPrimaria/docs/Plan_de_Accion_de_Atencion_Primaria.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
29. Ministerio de Sanidad. Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/atencionPrimaria/docs/Plan_de_Accion_de_Atencion_Primaria_y_Comunitaria_2025-2027.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
30. Ministerio de Sanidad. El Consejo Interterritorial aprueba el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 [nota de prensa]. Madrid; 16 de diciembre de 2024. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=6591>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
31. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/abordajeCronicidad/docs/ESTRATEGIA_ABORDAJE_CRONICIDAD.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
32. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2013. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/estrategiaSNS/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.

33. Ministerio de Sanidad. Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2021. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/saludDigital/doc/Estrategia_de_Salud_Digital_del_SNS.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
34. Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas. Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2019-15604. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15604>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
35. Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Diario Oficial de la Unión Europea, L 13, de 17 de enero de 2014. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
36. Long J. European region of the WCPT statement on physiotherapy in primary care. Prim Health Care Res Dev. 2019;20:e147. PMID: 31679552. [doi:10.1017/S1463423619000811](https://doi.org/10.1017/S1463423619000811).
37. Ministerio de Sanidad. Informe monográfico. Recursos humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud. Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2025. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnual2024/Monografico_RRHH_2024.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
38. Aiguadé Aiguadé R. La hora de la Atención Primaria [editorial]. Fisioterapia. 2022;44(4):199-200. [doi:10.1016/j.ft.2022.03.002](https://doi.org/10.1016/j.ft.2022.03.002). Pendiente de cotejo en la fuente original.
39. Departament de Salut. Programa d'incorporació de fisioterapeutes per a la promoció del funcionament i la prevenció de la discapacitat a l'atenció primària i comunitària. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2022. Disponible en: <https://salutweb.gencat.cat/ca/departament/ambits-estrategics/atencio-primaria-comunitaria/projectes/programa-incorporacio-fisioterapeutes/>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
40. Departament de Salut. Pla funcional del Programa d'incorporació de fisioterapeutes a l'atenció primària i comunitària. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2023. Disponible en: <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/9106>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
41. Ministerio de Sanidad. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP). Profesionales [consulta interactiva]. Disponible en: <https://pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/S/sistema-de-informacion-de-atencion-primaria-siap>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
42. Servicio Andaluz de Salud. Cartera de servicios de atención primaria. IV. Otros servicios. 2.3 Fisioterapia [página web]. Disponible en: <https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/cartera-de-servicios/atencion-primaria/iv-otros-servicios/2-otros-servicios-prestados-en-dispositivos-de-apoyo/23-fisioterapia>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
43. Servicio Andaluz de Salud. Sanidad implanta la derivación desde Atención Primaria a Fisioterapia en toda Andalucía [nota de prensa]. Sevilla; 26 de mayo de 2026. Disponible en: <https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/sanidad-implanta-la-derivacion-desde-atencion-primaria-fisioterapia-en-toda-andalucia>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
44. Gobierno de Aragón. Cartera de Servicios de Atención Primaria del Sistema de Salud de Aragón. Zaragoza: Gobierno de Aragón; 2024. Disponible en: <https://atencioncomunitaria.aragon.es/wp-content/uploads/2024/07/CATERAATENCIONPRIMARIA.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
45. Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Protocolo de actuación en las patologías de derivación directa en las Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria de Mallorca. Palma: Servei de Salut de les Illes Balears; 2023. Disponible en: <https://docusalut.com/rest/api/core/bitstreams/6baa0511-9642-47e3-aa79-1202fd49c1ce/content>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
46. Servicio Canario de la Salud. Consulta de fisioterapia en Atención Primaria. Guía de actuación. Santa Cruz de Tenerife: Servicio Canario de la Salud; 2022. Disponible en: <https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listalimagenes.jsp?idCarpeta=46a3e0a2-75c8-11e2-bc0c-6512fc1bab5e&idDocument=046b7b81-75d6-11e2-bc0c-6512fc1bab5e>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
47. Gobierno de Canarias. Sanidad despliega servicio de fisioterapia en 24 zonas básicas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura [nota de prensa]. 19 de septiembre de 2022. Disponible en:

<https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/sanidad-despliega-servicio-de-fisioterapia-en-24-zonas-basicas-de-gran-canaria-tenerife-lanzarote-y-fuerteventura/>. Pendiente de cotejo en la fuente original.

48. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Guía de Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria. Toledo: SESCAM; 2022. Disponible en: <https://castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
49. Junta de Castilla y León. Protocolos de fisioterapia en atención primaria. Valladolid: Consejería de Sanidad; 2017. Disponible en: <https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/programas-guias-clinicas/guias-practica-clinica/guias-clinicas.ficheros/1105660-Fisioterapia.PDF>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
50. Conselleria de Sanitat. Cartera de servicios de Atención Primaria Comunitaria. Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. València: Generalitat Valenciana; 2022. Disponible en: https://www.san.gva.es/documents/d/assistencia-sanitaria/2_cartera_servicios_atencion_primaria_comunitaria_resumida_es-pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
51. Área de Salud de Plasencia. Protocolo de derivación a las unidades de fisioterapia y rehabilitación. Plasencia: Servicio Extremeño de Salud; 2019. Disponible en: https://www.areasaludplasencia.es/docs/pgc/ses_plasencia_derivacion_fisioterapia_rehabilitacion.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
52. Servizo Galego de Saúde. Carteira de servizos de fisioterapia de atención primaria e comunitaria. Santiago de Compostela: SERGAS. Disponible en: https://www.sergas.gal/Asistencia-sanitaria/Documents/1795/Carteira_Unidades_de_fisioterapia_de_atencion_primaria.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
53. Servicio Madrileño de Salud, Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria de Madrid. Actualización 2510. Madrid: Comunidad de Madrid; 2025. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/hospital/atencionprimaria/sites/atencionprimaria/files/2025-10/Cartera%20de%20Servicios%20Estandarizados%20AP.%20Actualizaci%C3%B3n%202510.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
54. Servicio Murciano de Salud. El SMS aprueba la cartera de servicios de fisioterapia en Atención Primaria [nota de prensa]. Murcia; 6 de abril de 2026. Disponible en: <https://www.murciasalud.es/en/-/el-sms-aprueba-la-cartera-de-servicios-de-fisioterapia-en-atenci%C3%B3n-primaria-para-mejorar-la-atenci%C3%B3n-de-los-pacientes>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
55. Servicio Navarro de Salud. Formación a fisioterapeutas de nueva incorporación en atención primaria, tercera edición [actividad formativa]. Disponible en: <https://www.formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/7576>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
56. Gobierno Vasco, Irekia. La Fisioterapia de Atención Primaria de Osakidetza ha atendido ya a más de 8.600 pacientes en el primer semestre [nota de prensa]. 2024. Disponible en: <https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/95370>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
57. Redacción Médica. Los fisioterapeutas del Sergas podrán atender a pacientes bajo demanda. 6 de abril de 2022. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/autonomias/galicia/los-fisioterapeutas-del-sergas-podran-atender-a-pacientes-bajo-demanda-7761>. Fuente secundaria.
58. Comunidad de Madrid. Unidades de atención específica: fisioterapia [página web]. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/hospital/atencionprimaria/ciudadanos/unidades-atencion-especifica-fisioterapia>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
59. NHS. The NHS Long Term Plan. Londres: NHS; 2019. Disponible en: <https://www.longtermplan.nhs.uk/online-version/chapter-1-a-new-service-model-for-the-21st-century/>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
60. NHS England. Network Contract Directed Enhanced Service. Additional Roles Reimbursement Scheme guidance. Londres: NHS England; 2019. Disponible en: <https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/12/network-contract-des-additional-roles-reimbursement-scheme-guidance-december2019.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
61. Health Education England. First Contact Practitioners and Advanced Practitioners in Primary Care: (Musculoskeletal). A Roadmap to Practice. Londres: Health Education England; 2020. Disponible en: <https://www.hee.nhs.uk/our-work/allied-health-professions/enable-workforce/roadmaps-practice/first-contact-practitioners-roadmaps-practice>. Pendiente de cotejo en la fuente original.

62. Chartered Society of Physiotherapy, British Medical Association, Royal College of General Practitioners. First Contact Physiotherapy posts in General Practice. A guide for implementation in England. Londres: CSP; 2018. Disponible en: https://www.csp.org.uk/system/files/001404_fcp_guidance_england_2018.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
63. Goodwin RW, Hendrick PA. Physiotherapy as a first point of contact in general practice: a solution to a growing problem? Prim Health Care Res Dev. 2016;17(5):489-502. PMID: 27263326. [doi:10.1017/S1463423616000189](https://doi.org/10.1017/S1463423616000189).
64. Stynes S, Jordan KP, Hill JC, Wynne-Jones G, Cottrell E, Foster NE, et al. Evaluation of the First Contact Physiotherapy (FCP) model of primary care: patient characteristics and outcomes. Physiotherapy. 2021;113:199-208. PMID: 34656297. [doi:10.1016/j.physio.2021.08.002](https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.08.002).
65. Wood L, Bishop A, Goodwin R, Stynes S. Patient satisfaction with the first contact physiotherapy service: results from the national evaluation survey. Musculoskeletal Care. 2022;20(2):363-370. PMID: 34709711. [doi:10.1002/msc.1599](https://doi.org/10.1002/msc.1599).
66. Goodwin R, Moffatt F, Hendrick P, Stynes S, Bishop A, Logan P. Evaluation of the First Contact Physiotherapy (FCP) model of primary care: a qualitative insight. Physiotherapy. 2021;113:209-216. PMID: 34583834. [doi:10.1016/j.physio.2021.08.003](https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.08.003).
67. Walsh NE, Halls S, Thomas R, Berry A, Liddiard C, Cupples ME, et al. First contact physiotherapy: an evaluation of clinical effectiveness and costs. Br J Gen Pract. 2024;74(747):e717-e726. PMID: 38429110. [doi:10.3399/BJGP.2023.0560](https://doi.org/10.3399/BJGP.2023.0560).
68. Walsh NE, Berry A, Halls S, Thomas R, Stott H, Liddiard C, et al. Clinical and cost-effectiveness of first contact physiotherapy for musculoskeletal disorders in primary care: the FRONTIER, mixed method realist evaluation. Health Soc Care Deliv Res. 2024;12(49):1-187. PMID: 39707910. [doi:10.3310/RTKY7521](https://doi.org/10.3310/RTKY7521).
69. Leemrijse CJ, Swinkels IC, Veenhof C. Direct access to physical therapy in the Netherlands: results from the first year in community-based physical therapy. Phys Ther. 2008;88(8):936-46. PMID: 18566108. [doi:10.2522/pti.20070308](https://doi.org/10.2522/pti.20070308).
70. Swinkels IC, Kooijman MK, Spreeuwenberg PM, Bossen D, Leemrijse CJ, van Dijk CE, et al. An overview of 5 years of patient self-referral for physical therapy in the Netherlands. Phys Ther. 2014;94(12):1785-95. PMID: 25082921. [doi:10.2522/pti.20130309](https://doi.org/10.2522/pti.20130309).
71. Nivel. Jaarcijfers fysiotherapie 2024: aandeel patiënten met een verwijzing daalt. Utrecht: Nivel; 2025. Disponible en: <https://www.nivel.nl/nl/nieuws/jaarcijfers-fysiotherapie-2024-aandeel-patienten-met-een-verwijzing-daalt>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
72. Helse- og omsorgsdepartementet. Prop. 71 L (2016-2017). Oslo: Gobierno de Noruega; 2017. Disponible en: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-71-l-20162017/id2546178/?ch=9>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
73. 1177 Vårdguiden, Region Stockholm. Rehabilitering i öppenvård [página web]. Disponible en: <https://www.1177.se/Stockholm/undersokning-behandling/smartbehandlings-och-rehabilitering/rehabilitering-i-stockholms-lan2/rehabilitering-i-oppenvard/>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
74. Bornhöft L, Larsson ME, Nordeman L, Eggertsen R, Thorn J. Health effects of direct triaging to physiotherapists in primary care for patients with musculoskeletal disorders: a pragmatic randomized controlled trial. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2019;11:1759720X19827504. PMID: 30800175. [doi:10.1177/1759720X19827504](https://doi.org/10.1177/1759720X19827504).
75. Bornhöft L, Thorn J, Svensson M, Nordeman L, Eggertsen R, Larsson MEH. More cost-effective management of patients with musculoskeletal disorders in primary care after direct triaging to physiotherapists for initial assessment compared to initial general practitioner assessment. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):186. PMID: 31043169. [doi:10.1186/s12891-019-2553-9](https://doi.org/10.1186/s12891-019-2553-9).
76. Australian Physiotherapy Association. Position statement on scope of practice. Melbourne: APA; 2024. Disponible en: https://australian.physio/sites/default/files/APA%20Position-Statement%20on%20Scope%20of%20Practice%20May%202024_FA.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
77. Canadian Physiotherapy Association. Position statement: primary health care. Ottawa: CPA; 2022. Disponible en: https://physiotherapy.ca/app/uploads/2022/08/primary-health-care_en.pdf. Pendiente de cotejo en la fuente original.
78. Piscitelli D, Furmanek MP, Meroni R, De Caro W, Pellicciari L. Direct access in physical therapy: a systematic review. Clin Ter. 2018;169(5):e249-e260. PMID: 30393813. [doi:10.7417/CT.2018.2087](https://doi.org/10.7417/CT.2018.2087).
79. Demont A, Bourmaud A, Kechichian A, Desmeules F. The impact of direct access physiotherapy compared to primary care physician led usual care for patients with musculoskeletal disorders: a systematic review of the literature. Disabil Rehabil. 2021;43(12):1637-1648. PMID: 31603709. [doi:10.1080/09638288.2019.1674388](https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1674388).

80. Babatunde OO, Bishop A, Cottrell E, Jordan JL, Corp N, Humphries K, et al. A systematic review and evidence synthesis of non-medical triage, self-referral and direct access services for patients with musculoskeletal pain. PLoS One. 2020;15(7):e0235364. PMID: 32628696. [doi:10.1371/journal.pone.0235364](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235364).
81. Gallotti M, Campagnola B, Cocchieri A, Mourad F, Heick JD, Maselli F. Effectiveness and consequences of direct access in physiotherapy: a systematic review. J Clin Med. 2023;12(18):5832. PMID: 37762773. [doi:10.3390/jcm12185832](https://doi.org/10.3390/jcm12185832).
82. Vedanayagam M, Buzak M, Reid D, Saywell N. Advanced practice physiotherapists are effective in the management of musculoskeletal disorders: a systematic review of systematic reviews. Physiotherapy. 2021;113:116-130. PMID: 34607076. [doi:10.1016/j.physio.2021.08.005](https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.08.005).
83. Bishop A, Chen Y, Protheroe J, Ogollah RO, Bailey J, Lewis M, et al. Providing patients with direct access to musculoskeletal physiotherapy: the impact on general practice musculoskeletal workload and resource use. The STEMS-2 study. Physiotherapy. 2021;111:48-56. PMID: 32711896. [doi:10.1016/j.physio.2020.04.006](https://doi.org/10.1016/j.physio.2020.04.006).
84. Fischer M, Bui E, Besombes L, François M. Systematic review of direct access physiotherapy for musculoskeletal conditions in primary care: consequences for general practitioner workload, resource use, and organisation of care. BMC Prim Care. 2026;27(1):75. PMID: 41612203. [doi:10.1186/s12875-026-03186-9](https://doi.org/10.1186/s12875-026-03186-9).
85. Fischer M, Bui E, Besombes L, Pinsault N, François M. Effect of direct access to physiotherapy on prescribing and imaging in primary care for musculoskeletal disorders: a systematic review and meta-analysis. Fam Pract. 2026;43(4):cmag046. PMID: 42348720. [doi:10.1093/fampra/cmag046](https://doi.org/10.1093/fampra/cmag046).
86. Eurostat. Physicians and physiotherapists in the EU: how many? Eurostat News. Luxemburgo; 18 de agosto de 2023. Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230818-1>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
87. Eurostat. Healthcare personnel statistics: dentists, pharmacists and physiotherapists. Statistics Explained [actualización periódica]. Luxemburgo: Eurostat. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_statistics_-_dentists,_pharmacists_and_physiotherapists. Pendiente de cotejo en la fuente original.
88. World Physiotherapy. Annual Membership Census 2024. Global report. Londres: World Physiotherapy; 2025. Disponible en: <https://world.physio/sites/default/files/2025-01/AMC2024-Global-report.pdf>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
89. Bury TJ, Stokes EK. A global view of direct access and patient self-referral to physical therapy: implications for the profession. Phys Ther. 2013;93(4):449-59. PMID: 23197847. [doi:10.2522/ptj.20120060](https://doi.org/10.2522/ptj.20120060).
90. Moreno Carrero P, Ferrer Peña R, revisores. Propuesta de Fisioterapia en Atención Primaria para el Ministerio de Sanidad [borrador de trabajo con comentarios de revisión]. Septiembre de 2026. Documento aportado por la autoría.
91. Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2019;1(1):CD012424. PMID: 30703272. [doi:10.1002/14651858.CD012424.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2).
92. Galan-Martin MA, Montero-Cuadrado F, Lluch-Girbes E, Coca-López MC, Mayo-Iscar A, Cuesta-Vargas A. Pain neuroscience education and physical therapeutic exercise for patients with chronic spinal pain in Spanish physiotherapy primary care: a pragmatic randomized controlled trial. J Clin Med. 2020;9(4):1201. PMID: 32331323. [doi:10.3390/jcm9041201](https://doi.org/10.3390/jcm9041201).
93. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, Van der Esch M, Simic M, Bennell KL. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015;1(1):CD004376. PMID: 25569281. [doi:10.1002/14651858.CD004376.pub3](https://doi.org/10.1002/14651858.CD004376.pub3).
94. McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(2):CD003793. PMID: 25705944. [doi:10.1002/14651858.CD003793.pub3](https://doi.org/10.1002/14651858.CD003793.pub3).
95. Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Malmivaara A, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2021;9(9):CD009790. PMID: 34580864. [doi:10.1002/14651858.CD009790.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD009790.pub2).
96. Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Resolución 1/2023 sobre el empleo de la ecografía en Fisioterapia. Madrid: CGCFE; 2023. Citada en G1. Pendiente de cotejo en la fuente original.
97. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ. 2003;326(7386):417. PMID: 12595378. [doi:10.1136/bmj.326.7386.417](https://doi.org/10.1136/bmj.326.7386.417).
98. The Ionising Radiation (Medical Exposure) Regulations 2017. SI 2017/1322. Reino Unido. Disponible en: <https://www.legislation.gov.uk/ukSI/2017/1322>. Pendiente de cotejo en la fuente original.

99. Stiell IG, McKnight RD, Greenberg GH, McDowell I, Nair RC, Wells GA, et al. Implementation of the Ottawa ankle rules. JAMA. 1994;271(11):827-32. PMID: 8114236. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8114236/>.
100. Downie A, Williams CM, Henschke N, Hancock MJ, Ostelo RW, de Vet HC, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. BMJ. 2013;347:f7095. PMID: 24335669. [doi:10.1136/bmj.f7095](https://doi.org/10.1136/bmj.f7095).
101. Hill JC, Whitehurst DG, Lewis M, Bryan S, Dunn KM, Foster NE, et al. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet. 2011;378(9802):1560-71. PMID: 21963002. [doi:10.1016/S0140-6736\(11\)60937-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60937-9).
102. Gusi N, del Pozo-Cruz B, Olivares PR, Hernández-Mocholi M, Hill JC. The Spanish version of the "STarT Back Screening Tool" (SBST) in different subgroups. Aten Primaria. 2011;43(7):356-61. PMID: 21296465. [doi:10.1016/j.aprim.2010.05.019](https://doi.org/10.1016/j.aprim.2010.05.019).
103. Halls S, Thomas R, Stott H, Cupples ME, Kersten P, Cramp F, et al. Provision of first contact physiotherapy in primary care across the UK: a survey of the service. Physiotherapy. 2020;108:2-9. PMID: 32693238. [doi:10.1016/j.physio.2020.04.005](https://doi.org/10.1016/j.physio.2020.04.005).
104. Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo [base de datos]. Madrid: INE. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990. Pendiente de cotejo en la fuente original.
105. O'Caoimh R, Galluzzo L, Rodríguez-Laso Á, Van der Heyden J, Ranhoff AH, Lamprini-Koula M, et al. Prevalence of frailty at population level in European ADVANTAGE Joint Action Member States: a systematic review and meta-analysis. Ann Ist Super Sanita. 2018;54(3):226-238. PMID: 30284550. [doi:10.4415/ANN_18_03_10](https://doi.org/10.4415/ANN_18_03_10).
106. Chartered Society of Physiotherapy. CSP urges government to boost FCP roll-out across England [nota]. Londres; 19 de enero de 2022. Disponible en: <https://www.csp.org.uk/news/2022-01-19-csp-urges-government-boost-fcp-roll-out-across-england>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
107. EFQM. Modelo EFQM 2025. Edición en español. Madrid: Club Excelencia en Gestión; 2025. Disponible en: <https://www.clubexcelencia.org/conocimiento/plataforma-de-conocimiento/modelo-efqm-2025>. Pendiente de cotejo en la fuente original.
108. Hernández-Lázaro H, Mingo-Gómez MT, Jiménez-Del-Barrio S, Simarro-Martín A, Wiśniowska-Szurlej A, Ceballos-Laita L. Development of an ICF core set for the management of musculoskeletal conditions in primary care physiotherapy services in Spain: a Delphi study. Disabil Rehabil. 2025;47(18):4759-4768. PMID: 39931756. [doi:10.1080/09638288.2025.2460723](https://doi.org/10.1080/09638288.2025.2460723).
109. Hernández-Lázaro H, Jiménez-Del Barrio S, Ceballos-Laita L, Lahuerta-Martin S, Medrano-de-la-Fuente R, Hernando-Garijo I, et al. Multicentre cross-sectional study assessing content validity of the International Classification of Functioning, Disability and Health core set for post-acute musculoskeletal conditions in primary care physiotherapy services. J Rehabil Med. 2023;55:jrm11950. PMID: 37974517. [doi:10.2340/jrm.v55.11950](https://doi.org/10.2340/jrm.v55.11950).