
O que é o apêndice e onde ele se localiza?

É uma estrutura tubular longa, origina-se na parede póstero lateral do ceco.



Qual a causa da apendicite?

Obstrução da luz, que pode ser causada por:


- Sementes;
- Fezes espessas;
- Neoplasias;
- Hiperplasias linfoide;

Com o lúmen obstruído ocorre proliferação bacteriana que produzem muco, o que favorece a pressão sobre a luz, essas distensão que promove a dor.

Em qual região anatômica fazemos os exames físicos do apêndice?

Dores iniciais no mesogástrio e epigástrio, após isso a dor se localiza na fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney.





Escala de Alvarato

leucocitose. É a Escala de Alvarado:

Dor que migra para FID	1 ponto
Anorexia	1 ponto
Náuseas/Vômitos	1 ponto
Dor à palpação em FID	2 pontos
Descompressão brusca dolorosa em FID	1 ponto



Temperatura > 37,5°C	1 ponto	
Leucocitose	2 pontos	

0 a 3 pontos: baixa probabilidade de apendicite.

4 a 6 pontos: admitidos para observação, se a pontuação permanecer a mesma após 12h, indicação cirúrgica.

7 a 9 pontos: **apendicectomia** é a indicação. Sendo que em mulheres é indicada a videolaparoscopia.

Qual o tratamento?

É cirúrgico: nas cirurgias abertas, é empregada a **incisão transversa do quadrante inferior direito** (no ponto de McBurney), chamada de Davis-Rockey, ou incisão oblíqua, chamada de McArthur-Rockey.

Se houver perfuração, será necessário, fazer uma lavagem intestinal e uma antibioticoterapia sistêmica.

APOIE A PRODUÇÃO DE MAIS CONTEÚDOS COMO ESSE

SIGA-ME NO INSTAGRAM



Erros? Texto pouco claro? Entre em contato comigo:



PARA DOAÇÕES



dcc807be-9492-4b43-baa4-60ca9dda8da3