

# REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD A CONTRASTE YODADO

Protocolo de actuación rápida • Guía ESUR 2025 • Clasificación ACR

van der Molen et al. European Radiology (2025)

## LEVE

### SÍNTOMAS

- Urticaria limitada / prurito
- Congestión nasal, estornudos, rinorrea
- Eritema difuso sin hipotensión
- Angioedema leve sin disnea
- Edema cutáneo localizado

### ACTUACIÓN

- Tranquilizar al paciente y mantener en reposo
- No retirar el acceso venoso durante la observación
- Vigilar constantes hasta resolución completa
- **Desloratadina 5 mg VO ó Cetirizina 10 mg VO**
- Ondansetrón 4 mg IV si vómitos persistentes

**Observación mínima: 30 min**

## MODERADA

### BRONCOESPASMO LEVE

- **Salbutamol 2–4 pulsaciones de 100 µg inhalado**
- Repetir cada 20 min si precisa, hasta mejoría
- Alternativa: nebulización 2,5–5 mg en 3 mL SSF
- **Si deteriora → Adrenalina 0,5 mg IM + llamar RRT**

### EDEMA FACIAL SIN ESTRIDOR

- **O<sub>2</sub> 10–15 L/min con mascarilla no reinhalación**
- **Clorfeniramina 20 mg IV ó Clemastina 2 mg IV**
- Si estridor o edema de vía aérea → tratar como GRAVE

### URTICARIA DIFUSA / ERITEMA DIFUSO

- **Clorfeniramina 20 mg IV ó Clemastina 2 mg IV**
- Si hipotensión acompañante → tratar como GRAVE

### ! AVISO Betabloqueantes:

Adrenalina menos eficaz → Glucagón o Dobutamina

**Observación: 4–6 h tras tratamiento**

## GRAVE — ANAFILAXIA

### PARADA CARDIORRESPIRATORIA

- **Llamar al equipo de RCP**
- **Iniciar RCP inmediatamente**

### REACCIÓN ANAFILACT. / ESTRIDOR

- 1 Llamar al equipo de respuesta rápida (RRT)
- 2 O<sub>2</sub> 10–15 L/min con mascarilla no reinhalación
- 3 **ADRENALINA 0,5 mg IM cara lateral del muslo — repetir según FC**
- 4 Bolus cristaloides 500 mL IV en 10 min — repetir si precisa
- 5 Salbutamol 2–10 pulsaciones 100 µg inhalado cada 20 min (máx 1 h)
- 6 Clorfeniramina 20 mg ó Clemastina 2 mg IV
- 7 Prednisolona 50 mg IV (previene reacción bifásica)

### Equivalencias 50 mg prednisolona IV:

Metilprednisolona 40 mg | Dexametasona 8 mg | Hidrocortisona 200 mg

**INGRESO obligatorio**