Entrenamiento de pie contra la pared

Guía para el paciente: cómo hacerlo paso a paso

¿Para qué sirve? Pararte quieto, de a poco y todos los días, ayuda a que tu cuerpo se acostumbre a estar de pie y a bajar la chance de desmayos. Lleva varias semanas: lo que más importa es **hacerlo todos los días**.

Así tiene que ser tu postura



De costado



De frente: pies juntos, piernas rectas y sin cruzar



Correcto: talones a 15-20 cm de la pared



Incorrecto: talones pegados a la pared



Incorrecto: piernas cruzadas

Paso a paso

1. **Elegí un lugar seguro.** Pared lisa, piso con alfombra o superficie blanda y nada filoso ni duro cerca. Que haya otra persona en la casa, sobre todo las primeras semanas. Si el paciente es un niño o adolescente, un adulto tiene que estar presente.
2. **Preparáte.** Estar bien hidratado y haber comido algo (no hacerlo en ayunas). Evitá los momentos de mucho calor o justo después de una ducha caliente. Ropa cómoda, descalzo o con calzado cómodo.

3. **Poné los pies.** Apoyá la espalda en la pared y alejá los talones **15 a 20 cm** de ella. Pies juntos o muy cerca.
4. **Quedáte quieto.** Cabeza, hombros y espalda apoyados. Rodillas sueltas (sin trabarlas), sin cruzar las piernas y sin mover los pies. Mirá al frente y respirá normal. Usá un temporizador.
5. **Sostenelo el tiempo indicado.** Empezá con los minutos que te dijo tu médico (si no te dijo, 5 minutos). Si no tuviste síntomas en la semana, sumá 5 minutos más a la semana siguiente.
6. **Repetilo todos los días.** 1 o 2 veces por día, durante al menos 2 o 3 meses. Anotá cada sesión en tu diario y llevalo a los controles.

Cuánto tiempo

Ejemplo de cómo subir de a poco (tu médico puede indicarte otro ritmo):

Semana	Tiempo por sesión	Semana	Tiempo por sesión
1	5 min	5	25 min
2	10 min	6	30 min
3	15 min	7	35 min
4	20 min	8	40 min

Mi meta indicada por el médico: _____ minutos por sesión, _____ veces por día.

Si te sentís mal durante la sesión

Ante el primer aviso (mareo, visión borrosa, sudor frío, náuseas, calor):
1. Apretá los puños y tensá los brazos unos segundos (o cruzá las piernas y apretalas).
2. Si no se pasa, **sentate o acostate enseguida** con las piernas elevadas. No trates de aguantar.
3. Anotá cuánto tiempo llegaste y qué sentiste.
4. Repetí la sesión más tarde o al día siguiente con el mismo tiempo, sin aumentarlo.

Consultá con tu médico si te desmayás y te golpeás, si tuviste palpitaciones o dolor de pecho, o si te desmayás durante un esfuerzo o sin ningún aviso previo.