

Tableau n° 40

Solvants organiques liquides à usage professionnel :
Hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et
aromatiques, et leurs mélanges (white-spirit, essences spéciales)
Dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, acétonitrile
Alcools, aldéhydes, cétones, esters, éthers dont le tétrahydrofurane,
glycols et leurs éthers, diméthylformamide, diméthylsulfoxyde, pyridine,
diméthylsulfone

Date de création : 10 Janvier 1995 ; N° JORT : 26/1995
Date de la dernière mise à jour : 29 Mars 2018 ; N° JORT : 40/2018

Désignation des maladies	Délai de prise en charge	Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma.	3 jours	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation, emploi, manipulation des solvants. - Traitements des résines naturelles et synthétiques. - Emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques. Production des caoutchoucs naturels et synthétiques. - Utilisation des solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. - Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire dans les synthèses organiques, en pharmacie dans les cosmétiques.
Dermo-épidermite irritative avec dessication de la peau récidivante après nouvelle exposition au solvant.	7 jours	
Dermatite eczématiforme récidivante après nouvelle exposition au solvant ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.	15 jours	
Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : ralentissement psychomoteur, troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visio-spatiale, des fonctions exécutives et de l'attention. Le diagnostic sera confirmé par des tests psychométriques adaptés aux anomalies constatées, à réaliser 1 mois au moins après cessation de l'exposition.	1 an sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans	