ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 09 · RI

Manual de

REUMATOLOGÍA

& Inmunología Clínica

Módulo 1 · Medicina Interna · 24 clases

Índice general

01 Artritis Inflamatorias, Cristales y Diagnóstico Articular 3

9.1. Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial 5
9.2. Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos 9
9.3. Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) 14
9.4. Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada 19
9.5. Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto 23

02 Artritis Reumatoide y Enfermedades del Tejido Conectivo 28

9.6. Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares 30
9.7. Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES 35
9.8. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal 39
9.9. Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora 45
9.10. Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas 50

03 Esclerosis Sistémica, Miopatías Inflamatorias y Síndromes Autoinmunes 55

9.11. Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico 57
9.12. Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal 62
9.13. Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto 68
9.14. Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal 73
9.15. Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) 77

04 Espondiloartritis Seronegativas y Enfermedad de Behçet 83

9.16. Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico 85
9.17. Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF 89
9.18. Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII 94
9.19. Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento 98
9.20. Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis 102

05 Vasculitis Sistémicas, Reumatología de Partes Blandas y Metabolismo Óseo 107

9.21. Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu 109
9.22. Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) 115
9.23. Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS 122
9.24. Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica 125

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 130

MANUAL EUNACOM DE REUMATOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

5	15	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
9.1	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	5
9.2	Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos	9
9.3	Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)	14
9.4	Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada	19
9.5	Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto	23

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.11.1.015, 1.11.4.002, 1.11.5.001, 4.02.4.009	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Específico	Inicial	Derivar
1.11.2.001, 1.11.5.001, 1.11.4.002, 2.01.1.093, 1.04.1.021, 4.02.4.008	Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos	Específico	Inicial	Derivar
1.11.2.002, 1.11.1.007, 1.11.4.002	Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis	Específico	Inicial	Completo
1.11.1.004, 1.11.4.004, 4.02.3.003	Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada	Específico	Inicial	Completo
2.01.1.143, 1.11.1.019	Artritis Idiopática Juvenil	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
15 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Toda monoartritis aguda se considera séptica hasta que la artrocentesis y el análisis de líquido sinovial demuestren lo contrario.

La artrocentesis diagnóstica debe realizarse SIEMPRE antes de administrar la primera dosis de antibióticos.

Líquido séptico típico: > 50.000 leucocitos/mm³ con > 90% PMN, aspecto purulento y glucosa marcadamente disminuida (< 50% plasmática).

Líquido inflamatorio: 2.000 a 50.000 leucocitos/mm³ con PMN > 50% (Gota, Condrocalcinosis, Artritis Reumatoide).

! TRAMPA · La única contraindicación absoluta de artrocentesis es la infección cutánea activa sobre el trayecto de punción (celulitis).

La coexistencia de microcristales y gérmenes piógenos es posible; ante la duda con líquido purulento, siempre cubrir infección bacteriana.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	EUNACOM Diciembre 2025 · #112 · EUNACOM Diciembre 2019 · #69 · EUNACOM Julio 2015 · #8
Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos	EUNACOM Julio 2024 · #171 · EUNACOM Agosto 2021 · #95 · EUNACOM Agosto 2021 · #94 · EUNACOM Julio 2018 · #161
Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis	EUNACOM Julio 2024 · #34 · EUNACOM Enero 2023 · #96 · EUNACOM Diciembre 2022 · #132 · EUNACOM Julio 2019 · #112
Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada	EUNACOM Enero 2023 · #95 · EUNACOM Diciembre 2022 · #137 · EUNACOM Julio 2017 · #121 · EUNACOM Julio 2016 · #102

9.1. Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.015 | 1.11.4.002 | 1.11.5.001 | 4.02.4.009

¿POR QUÉ?

La monoartritis aguda constituye una de las mayores urgencias médicas en medicina interna. La regla de oro del EUNACOM exige considerar toda monoartritis como séptica hasta realizar una artrocentesis diagnóstica. Omitir la punción articular o diferir el drenaje conlleva destrucción osteocartilaginosa irreversible en menos de 48 a 72 horas.

1. PRINCIPIOS CLÍNICOS Y DEFINICIÓN DE MONOARTRITIS AGUDA

1.11.1.015

Se define monoartritis aguda como la inflamación (dolor, eritema, aumento de volumen local, calor y marcada impotencia funcional) de una única articulación con tiempo de evolución inferior a 4 a 6 semanas. La articulación más comúnmente comprometida es la rodilla (50%), seguida de tobillo, muñeca, cadera y primera articulación metatarsofalángica.

El espectro etiológico de mayor trascendencia en el examen EUNACOM se divide en cuatro categorías biológicas: **1) Artritis infecciosa (séptica bacteriana y gonocócica)**; **2) Artritis microcristalina (gota por urato monosódico y condrocalcinosis por pirofosfato de calcio)**; **3) Inicio monoarticular de artropatías inflamatorias sistémicas (artritis reumatoide, espondiloartritis)**; y **4) Hemartrosis / patología mecánica-traumática**.

2. ARTROCENTESIS DIAGNÓSTICA: CLASIFICACIÓN DEL LÍQUIDO SINOVIAL

1.11.1.015 | 1.11.5.001

La **artrocentesis es mandatoria e inaplazable** ante todo derrame articular agudo no filiado. Solo se contraindica de forma absoluta ante infección cutánea activa directamente sobre el sitio de punción (ej. celulitis suprapatelar) por riesgo de inoculación iatrogénica.

1.11.4.002 | 4.02.4.009

El líquido sinovial aspirado debe enviarse de inmediato a: citoquímico y recuento diferencial leucocitario, tinción de Gram, cultivo corriente para aerobios/anaerobios, y examen microscópico en fresco con luz polarizada compensada para cristales. **(ver Imagen 9.1B)**

1.11.4.002

Líquido Normal: Volumen < 3.5 mL, transparente, incoloro o pajizo claro, alta viscosidad (filancia > 3 cm), leucocitos < 200/mm³ (mononucleares > 75%).

Líquido No Inflamatorio (Tipo I): Amarillento transparente, viscosidad alta, leucocitos entre 200 y 2.000/mm³ con PMN < 25%. Característico de la artrosis, trauma mecánico articular y osteocondritis.

Líquido Inflamatorio (Tipo II): Translúcido a turbio, viscosidad disminuida (goteo acuoso), leucocitos entre 2.000 y 50.000/mm³ con PMN > 50%. Típico de artritis reumatoide, espondiloartropatías, gota, pseudogota y artritis lúpica.

Líquido Séptico (Tipo III): Francamente purulento, opaco, viscosidad muy baja, leucocitos > 50.000/mm³ (frecuentemente > 80.000-100.000/mm³) con PMN > 90%, glucosa sinovial marcadamente inferior a la glicemia (< 50% de la cifra plasmática). Característico de la artritis bacteriana piógena. *Nota EUNACOM:* Las crisis de gota hiperagudas pueden alcanzar recuentos > 50.000 leucocitos, por lo que siempre deben buscarse cristales y teñir con Gram.

Líquido Hemorrágico (Tipo IV): Rojo oscuro o sanguinolento, incoagulable en el tubo. Sugiere rotura de ligamentos cruzados, fractura intraarticular, sobredosis de anticoagulantes, hemofilia o sinovitis villonodular pigmentada.

1.11.5.001

Técnica de la punción articular de rodilla (procedimiento que el médico general debe saber realizar): explicar el procedimiento y obtener consentimiento; paciente en decúbito supino con la rodilla extendida (o flectada unos 20°) y el cuádriceps relajado. El abordaje habitual es el **suprarrotuliano lateral** (también sirve el medial): se palpa el polo superior de la rótula y se punciona 1 cm por fuera de él, dirigiendo la aguja (18-21 G, jeringa de 10-20 mL) en sentido oblicuo hacia la bolsa suprarrotuliana, por debajo de la rótula. Requiere **asepsia estricta** (antisepsia con clorhexidina o povidona, guantes y campo estériles, sin volver a palpar el punto limpio), anestesia local de la piel opcional, aspiración lo más completa posible y presión local al retirar. Contraindicaciones: celulitis o piel infectada en el sitio de punción, prótesis articular (la punción la hace el traumatólogo) y coagulopatía no corregida; la anticoagulación bien controlada no la contraindica. Complicaciones: dolor, hemartrosis e infección iatrogénica (muy rara con buena técnica). No se inyecta corticoide si hay posibilidad de infección.

4.02.4.009


Interpretación del Gram del líquido articular (examen que el médico general debe emplear a partir del informe): cocos grampositivos en racimos orientan a *Staphylococcus aureus* (cobertura con cloxacilina o cefazolina; vancomicina si hay riesgo de SAMR); **cocos grampositivos en cadenas o pares**, a estreptococos (*S. pyogenes*, *S. pneumoniae*); **diplococos gramnegativos intracelulares**, a *Neisseria gonorrhoeae* (poco frecuentes de ver: el Gram es positivo solo en alrededor del 25-30% de las artritis gonocócicas); **bacilos gramnegativos**, a enterobacterias o *Pseudomonas* (adulto mayor, usuario de drogas endovenosas, sondado). La sensibilidad del Gram es de 60-75% en la infección por *S. aureus* y mucho menor en gonococo y gramnegativos: **un Gram negativo NO descarta artritis séptica**; la decisión de tratar se toma por clínica y recuento celular, y el cultivo confirma. Los cristales no excluyen infección concomitante.

3. ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO Y DECISIÓN TERAPÉUTICA INMEDIATA


1.11.1.015 | 4.02.4.009

Si la sospecha de artritis séptica es alta (fiebre, líquido purulento o leucocitos > 50.000 con neutrofilia extrema), **nunca debe esperarse el resultado del cultivo definitivo**. Se debe hospitalizar al paciente, solicitar hemocultivos x 2 e iniciar antibioterapia bactericida endovenosa inmediata empírica, asociada a descompresión/lavado articular urgente.

Si se constata visualización inequívoca de cristales de urato monosódico (birrefringencia negativa) y el Gram es negativo, se confirma artritis gotosa aguda y se instaura terapia antiinflamatoria (AINEs potentes o colchicina), pero manteniendo vigilancia estricta si coexiste sospecha infecciosa (infección y cristales pueden coexistir hasta en un 5% de los casos). **(ver Imagen 9.1A)**



A. CRISTALES DE URATO



B. AGUJAS EN LUZ POLARIZADA

Imagen 9.1

FIGURA 9.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN MONOARTRITIS AGUDA: DECISIÓN POR LÍQUIDO SINOVIAL




TABLA 9.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL LÍQUIDO SINOVIAL EN MONOARTRITIS AGUDA

1.11.1.015, 1.11.4.002, 1.11.5.001, 4.02.4.009

TIPO DE LÍQUIDO	ASPECTO Y COLOR	LEUCOCITOS (/MM³)	% PMN	GLUCOSA SINOVIAL	ETIOLOGÍAS TÍPICAS
Normal	Transparente, pajizo, filante	< 200	< 25%	= Glicemia	Articulación sana
Tipo I (No Inflamatorio)	Claro a amarillo claro	200 – 2.000	< 25%	= Glicemia	Artrosis, meniscopatía, trauma leve
Tipo II (Inflamatorio)	Amarillo turbio, no filante	2.000 – 50.000	> 50%	Levemente disminuida	Artritis reumatoide, gota, pseudogota, EA
Tipo III (Séptico)	Opaco, francamente purulento	> 50.000 (hasta >100k)	> 90%	< 50% de glicemia	S. aureus, Streptococcus, Neisseria gonorrhoeae
Tipo IV (Hemorrágico)	Rojo intenso / sanguinolento	Similar a sangre	Similar a sangre	= Glicemia	Trauma capsuloligamentoso, hemofilia, prótesis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.1

Hombre de 42 años sin antecedentes mórbidos consulta en el servicio de urgencia por cuadro de 14 horas de evolución de dolor intenso, tumefacción y calor en la rodilla derecha, que le impide el apoyo. Al examen físico: T° 38.3 °C, PA 125/75 mmHg, FC 92 lpm. Rodilla derecha con marcado derrame a tensión, eritema supraarticular, choque rotuliano positivo y dolor exquisito al mínimo intento de flexión activa o pasiva.

Conducta oficial. Frente a una monoartritis aguda febril en una articulación grande como la rodilla, la conducta inicial obligatoria, prioritaria e inaplazable es realizar una artrocentesis diagnóstica para análisis citoquímico, tinción de Gram, cultivo y búsqueda de cristales bajo microscopía óptica. Iniciar antibióticos o analgésicos antes de la punción enmascara el cultivo e impide confirmar si se trata de una artritis séptica que requiere drenaje quirúrgico de rescate.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Toda monoartritis aguda se considera séptica hasta que la artrocentesis y el análisis de líquido sinovial demuestren lo contrario.
- La artrocentesis diagnóstica debe realizarse SIEMPRE antes de administrar la primera dosis de antibióticos.
- Líquido séptico típico: > 50.000 leucocitos/mm³ con > 90% PMN, aspecto purulento y glucosa marcadamente disminuida (< 50% plasmática).
- Líquido inflamatorio: 2.000 a 50.000 leucocitos/mm³ con PMN > 50% (Gota, Condrocalcinosis, Artritis Reumatoide).
- La única contraindicación absoluta de artrocentesis es la infección cutánea activa sobre el trayecto de punción (celulitis).
- La coexistencia de microcristales y gérmenes piógenos es posible; ante la duda con líquido purulento, siempre cubrir infección bacteriana.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.015

1. Un paciente de 70 años consulta por dolor muy intenso en la rodilla izquierda, asociada a aumento de volumen, calor local y eritema. Al examen físico presenta derrame articular y signos inflamatorios en dicha articulación. Se realiza una radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación a nivel del cartílago articular. La artrocentesis da salida a un líquido turbio, de filancia disminuida, con cerca de 10.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía en el microscopio de campo oscuro observa múltiples cristales con brirrefringencia de elongación positiva. La -3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetologiaynutriciontraumatologia/1/7 tinción de Gram no muestra bacterias. La conducta más adecuada es:

A) Enviar a domicilio con paracetamol oral y una dieta pobre en calcio
B) Iniciar AINEs y alopurinol oral
C) Solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico, calcemia y paratohormona y decidir manejo según resultados
D) Iniciar AINEs endovenosos y reposo
E) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje articular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.015

2. Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. Se realiza una artrocentesis, obteniéndose un líquido articular inflamatorio, con visualización de cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva, sin visualización de bacterias. En sus exámenes generales presenta hemograma normal, ácido úrico: 8,0 mg/dl, calcemia: 10 mg/dl, creatinina: 0,8 mg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento agudo es:

A) AINEs y reposo
B) AINEs, bifosfonatos y reposo
C) AINEs, antibióticos, bifosfonatos y reposo
D) AINEs, diuréticos y reposo
E) AINEs, alopurinol y reposo

Más preguntas online de Monoartritis Aguda →

9.2. Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.2.001 | 1.11.5.001 | 1.11.4.002 | 2.01.1.093 | 1.04.1.021 | 4.02.4.008

¿POR QUÉ?

La artritis séptica es una verdadera urgencia quirúrgica y médica. La liberación de enzimas proteolíticas lisosomales bacterianas y de neutrófilos destruye el cartílago articular hialino de manera irreversible en 48 horas. El manejo no consiste únicamente en antibióticos: el vaciamiento y drenaje de la cavidad cerrada es indispensable para salvar la articulación.

1. FISIOPATOLOGÍA, VÍAS DE DISEMINACIÓN Y MICROBIOLOGÍA EUNACOM

La infección de la membrana sinovial y del espacio articular se produce fundamentalmente por **vía hematógena** (la más frecuente en el adulto, secundaria a bacteriemias transitorias cutáneas, dentales, urinarias o catéteres vasculares). Otras vías incluyen la inoculación directa (infiltraciones articulares, artroscopía, trauma penetrante) y la contigüidad (osteomielitis adyacente o celulitis profunda). **(ver Imagen 9.2A y C)** 1.11.2.001 2.01.1.093

Etiologías bacterianas principales: 1.11.2.001

• *Staphylococcus aureus*: Causa más prevalente en todas las edades (> 50-60% de los casos en adultos nativos y protésicos). En Chile se debe evaluar el riesgo de SAMR comunitario u hospitalario.

• *Streptococcus pyogenes* (Grupo A), *Streptococcus agalactiae* (Grupo B en diabéticos y ancianos) y *Streptococcus pneumoniae* (en alcohólicos o esplenectomizados): ocupan el 15-20% de los aislamientos.

• *Bacilos gramnegativos entéricos (E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa)*: Representan el 10-15%, predominando en adultos mayores frágiles, usuarios de drogas intravenosas, pacientes sondados o con comorbilidades urológicas/inmunosupresión.

• *Neisseria gonorrhoeae*: Principal causa en adultos jóvenes sexualmente activos. Clásicamente se presenta como el **síndrome de artritis-dermatitis**: pródromo de fiebre, tenosinovitis migratoria asimétrica (muñecas, dedos), pápulas o pústulas necróticas acrales escasas, evolucionando luego a una mono u oligoartritis purulenta de rodilla o tobillo.

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS, FACTORES DE RIESGO Y DIAGNÓSTICO

Clínica cardinal: Comienzo súbito de dolor monoarticular lancinante, aumento de volumen marcado, calor cutáneo, hipersensibilidad extrema y limitación total del rango de movilidad (la movilización pasiva es intolerable). La fiebre está presente en el 60-80% de los pacientes (puede estar ausente en ancianos o inmunocomprometidos). 1.11.2.001 2.01.1.093

Factores de riesgo reconocidos: Edad avanzada (> 80 años), artritis reumatoide previa (las articulaciones con sinovitis crónica son propensas a siembra bacteriana), diabetes mellitus, hemodiálisis, uso crónico de corticoides o inmunosupresores, y presencia de material protésico articular. 1.11.2.001

Laboratorio: La VHS (> 50-70 mm/h) y la PCR están marcadamente elevadas. El hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia. Los **hemocultivos deben tomarse siempre** (positivos en el 50% de las bacteriemias). 1.11.2.001 4.02.4.008

La artrocentesis revela líquido turbio-purulento con > 50.000 leucocitos/mm³ y > 90% neutrófilos. La tinción de Gram detecta cocos grampositivos en 60-75% de las infecciones estafilocócicas, pero solo en < 25-30% de las gonocócicas. El cultivo sinovial en medios enriquecidos confirma el diagnóstico y aporta el antibiograma. 1.11.2.001 1.11.4.002 2.01.1.093 4.02.4.008

TABLA 9.2.A · ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS EMPÍRICOS EN ARTRITIS SÉPTICA 1.11.2.001, 1.11.5.001, 1.11.4.002, 2.01.1.093, 1.04.1.021, 4.02.4.008

ESCENARIO CLÍNICO	MICROORGANISMO SOSPECHOSO	ESQUEMA EMPÍRICO DE ELECCIÓN	ALTERNATIVA / ALERGIA	DURACIÓN TOTAL
Adulto sano sin factores de riesgo	S. aureus sensible (SASM), Streptococcus	Cefazolina 2 g c/8h EV o Cloxacilina 2 g c/4h EV	Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV	3 – 4 semanas
Riesgo SAMR / Catéter / UCI	SAMR (meticilino resistente)	Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV	Daptomicina 8-10 mg/kg/día EV	4 semanas
Adulto joven activo sexualmente	Neisseria gonorrhoeae	Ceftriaxona 1-2 g c/24h EV + Azitromicina 1g VO	Ciprofloxacino (si sensible) o Espectinomicina	7 – 10 días
Anciano frágil / ITU / Drogas EV	Bacilos Gram (-) entéricos, Pseudomonas	Ceftriaxona 2 g c/24h EV + Cefazolina (o Cefepime 2g c/8h)	Meropenem 1 g c/8h EV	4 – 6 semanas
Prótesis articular con biofilm	S. aureus, S. epidermidis	Esquema anti-estafilocócico + Rifampicina 300mg c/12h VO	Linezolid 600 mg c/12h VO	3 – 6 meses

9.2. Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO DE URGENCIA Y REGÍMENES ANTIMICROBIANOS

El tratamiento exitoso descansa en dos pilares simultáneos e indivisibles: **antimicrobianos bactericidas endovenosos** y **descompresión mecánica / drenaje articular**. 1.11.2.001 2.01.1.093

Regímenes Empíricos Iniciales: 1.11.2.001

• Paciente estándar sin sospecha de SAMR: **Cefazolina 2 g EV cada 8 horas** (o Cloxacilina 2 g EV cada 4 horas). En alérgicos no anafilácticos a penicilina se prefiere cefazolina. 1.11.2.001 2.01.1.093

• Sospecha de SAMR (colonización previa, hemodiálisis, hospitalización reciente, sepsis grave): **Vancomicina 15-20 mg/kg EV cada 12 horas** (titulando según niveles plasmáticos valle 15-20 mcg/mL) o Daptomicina 8-10 mg/kg/día. 1.11.2.001

• Sospecha de gramnegativos (ancianos frágiles, infección urinaria concomitante, drogas EV): Añadir **Ceftriaxona 2 g EV al día** o Ceftazidima / Cefepime si hay riesgo de *Pseudomonas*.

• Sospecha de infección gonocócica diseminada: **Ceftriaxona 1 a 2 g EV al día** + Azitromicina 1 g oral (dosis única para cobertura de *Chlamydia trachomatis* concomitante). Respuesta rápida en 24-48 horas. 1.11.2.001 2.01.1.093

Duración: Mínimo 2 semanas de terapia endovenosa, completando 3 a 4 semanas totales con terapia oral según mejoría clínica, normalización de PCR y cultivos negativos.



A. DERRAME ARTICULAR **B.** BURSITIS OLECRANEANA **C.** RM: OSTEOMIELITIS VERTEBRAL

Imagen 9.2

FIGURA 9.2 · MANEJO INTEGRAL DE LA ARTRITIS SÉPTICA: DRENAJE + ANTIBIOTERAPIA EV ESCALONADA




TABLA 9.2.B · CLASIFICACIÓN DE INFECCIÓN EN PRÓTESIS ARTICULAR Y CONDUCTA QUIRÚRGICA CRITERIOS DE GRAVEDAD

TIPO DE INFECCIÓN	TIEMPO DESDE CIRUGÍA	PATÓGENOS FRECUENTES	ESTRATEGIA QUIRÚRGICA	TERAPIA ADYUVANTE
Aguda Precoz	< 3 meses postoperatorio	S. aureus, Bacilos Gram (-)	DAIR (Desbridamiento + cambio de polietileno)	Antibióticos EV + Rifampicina x 3 meses
Crónica Tardía	> 3 meses a 24 meses	S. epidermidis (biofilm), Cutibacterium	Recambio protésico en 2 tiempos (espaciador)	Antibióticos dirigidos + nuevo implante
Hematógena Aguda	Cualquier tiempo (<3 sem síntomas)	S. aureus, Streptococcus spp.	DAIR si prótesis fija y síntomas < 3 semanas	Antibióticos EV + Rifampicina

9.2. Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DRENAJE ARTICULAR Y MANEJO DE LA INFECCIÓN PROTÉSICA ARTICULAR

El drenaje articular es mandatorio: se realiza mediante **artroscopía con lavado abundante** o artrotomía abierta en articulaciones complejas (cadera en el niño o adulto siempre requiere drenaje quirúrgico abierto inmediato). En articulaciones de fácil acceso como la rodilla pueden realizarse punciones evacuadoras diarias con aguja gruesa si la evolución es favorable. 1.11.2.001 1.11.5.001 2.01.1.093

Infección de Prótesis Articular: Se clasifica en precoz (< 3 meses postoperatorio), tardía (3 a 24 meses) y hematógena aguda. El pilar es el recambio protésico en 1 o 2 tiempos o desbridamiento con retención del implante (DAIR) en infecciones agudas (< 3 semanas de síntomas con implante estable). En infecciones por estafilococo sobre prótesis es mandatorio asociar **Rifampicina (300-450 mg oral cada 12 horas)** una vez controlado el inóculo, por su capacidad de penetrar y erradicar el biofilm bacteriano. 1.11.2.001 2.01.1.093

Técnica de la punción evacuadora diaria de rodilla séptica: se usa la misma vía suprarrotuliana lateral descrita en el tema 9.1, con aguja gruesa (16-18 G) para que no se obstruya con el material purulento, aspirando **todo el líquido posible** (se anota volumen y aspecto) y repitiendo la punción cada 24 horas mientras reaparezca derrame. Cada punción se hace con asepsia estricta y nunca a través de piel eritematosa o celulítica. La respuesta se vigila con fiebre, dolor, volumen y aspecto del líquido y la PCR: si a los 5-7 días persiste líquido purulento o no hay mejoría, o si la articulación es profunda (cadera, hombro) o protésica, se pasa a lavado artroscópico o artrotomía por traumatología. 1.11.5.001

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y ERRORES CRÍTICOS EUNACOM


Es vital no confundir la artritis séptica con la bursitis prepatelar u olecraneana: en la bursitis el dolor y el aumento de volumen son extracapsulares, y la movilidad pasiva intraarticular está conservada o mucho menos dolorosa. **(ver Imagen 9.2B)** 1.11.2.001



Bursitis olecraneana o prepatelar

No administrar corticoides intraarticulares ni orales ante sospecha de artritis séptica. Nunca demorar el drenaje confiando únicamente en la respuesta a antibióticos; la persistencia de pus a tensión destruye los condrocitos y produce anquilosis articular irreversible.

Osteomielitis: cuándo sospecharla y qué hacer inicialmente. La infección del hueso puede coexistir con la artritis séptica (foco contiguo, sobre todo en cadera y hombro del niño, o en el pie diabético) o ser el diagnóstico real. Se origina por **vía hematógena** (metáfisis de huesos largos en el niño; vértebras en el adulto, con espondilodiscitis, a menudo en diabéticos y usuarios de drogas endovenosas), por **contigüidad** (úlcera de pie diabético con hueso palpable al estilete, escaras sacras, fracturas expuestas, postoperatorio) o por inoculación directa. El agente más frecuente es *S. aureus*; *Salmonella* en drepanocitosis y *Pseudomonas* en punción plantar y drogas endovenosas. Se sospecha ante **dolor óseo localizado persistente** con fiebre (puede faltar en las formas crónicas), eritema o fístula y VHS/PCR elevadas. La radiografía puede ser normal los primeros 10-14 días (después aparecen reacción perióstica y lisis); la **resonancia magnética** es el examen más sensible y precoz, y el diagnóstico definitivo es la biopsia ósea con cultivo (los hemocultivos son positivos en cerca de la mitad). Conducta del médico general: solicitar hemograma, VHS, PCR, hemocultivos y radiografía, iniciar antibiótico empírico solo si hay sepsis o inestabilidad (idealmente tras tomar cultivos) y **derivar** para biopsia, desbridamiento y antibioticoterapia dirigida prolongada (alrededor de 6 semanas). 1.04.1.021



Osteomielitis vertebral por S. aureus con absceso epidural: RM sagital con contraste, destrucción del disco T9-T10

TABLA 9.2.C · PROTOCOLO DE RESCATE Y SEGUIMIENTO EN ARTRITIS SÉPTICA NATIVA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL TRATAMIENTO	OBJETIVO TERAPÉUTICO	INTERVENCIÓN CLÍNICA / FARMACOLÓGICA	CRITERIO DE ÉXITO / AJUSTE
Día 0 (Urgencia)	Control de fuente y descompresión	Artroscopía/artrotomía de lavado + Cefazolina 2g EV	Cese de dolor a tensión y descompresión capsular
Día 2 – 3	Ajuste microbiológico	Ajuste a antibiograma específico; evaluar necesidad de re-lavado	Cultivos sinoviales negativos a las 48-72 horas
Semana 2	Transición a vía oral	Cefadroxilo 1g c/12h o Ciprofloxacino/Levofloxacino oral	Afebril, mejoría funcional marcada, PCR en caída > 50%
Semana 3 – 4	Rehabilitación y alta	Kinesioterapia pasiva asistida precoz para evitar rigidez	Rango articular conservado, PCR normalizada

9.2. Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ARTRITIS SÉPTICA DEL ADULTO Y PROTÉSICA)

- Staphylococcus aureus es el microorganismo más frecuente (> 60%) en la artritis séptica del adulto.
- El drenaje articular (artroscopía, artrotomía o punciones evacuadoras repetidas) es tan vital como los antibióticos endovenosos.
- En artritis gonocócica el tratamiento de elección es Ceftriaxona 1-2 g EV al día asociada a cobertura de Chlamydia con azitromicina.
- Las articulaciones con daño previo (ej. artritis reumatoide) presentan mayor susceptibilidad a siembras hematógenas.
- Neisseria gonorrhoeae debe sospecharse en adultos jóvenes con síndrome artritis-dermatitis y tenosinovitis migratoria.
- El esquema empírico inicial habitual es Cefazolina 2 g c/8h EV (o Cloxacilina 2 g c/4h EV); agregar Vancomicina ante riesgo de SAMR.
- En infecciones protésicas por estafilococo, la adición de Rifampicina es obligatoria para erradicar bacterias adheridas al biofilm.
- La movilización articular pasiva debe iniciarse precozmente una vez controlada la infección para prevenir la anquilosis fibrosa.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.2

Mujer de 72 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato y prednisona 5 mg/día. Consulta por fiebre de 38.8 °C y dolor progresivo e invalidante en la rodilla izquierda de 36 horas de evolución. Al examen físico se observa rodilla intensamente tumefacta, caliente, eritematosa y con flexión bloqueada por dolor agudo. La artrocentesis extrae 45 mL de líquido lechoso y turbio; el recuento arroja 110.000 leucocitos/mm³ con 94% de neutrófilos, y la tinción de Gram evidencia abundantes cocos grampositivos en racimos.

Conducta oficial razonada. El cuadro corresponde a una artritis séptica bacteriana por Staphylococcus aureus en una paciente de alto riesgo (anciana con artritis reumatoide e inmunosupresión crónica). El manejo indispensable e inmediato consiste en hospitalización, toma de hemocultivos, inicio de antibioterapia endovenosa bactericida antiestafilocócica (Cefazolina o Vancomicina si hay sospecha de SAMR) y descompresión/lavado articular urgente mediante artroscopía o artrotomía. El retraso del drenaje quirúrgico destruye el cartílago articular y genera sepsis sistémica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

1. En un adolescente con síntomas de artritis séptica del tobillo derecho se realiza estudio de líquido sinovial que muestra un aspecto turbio, poco filante, con células 85.000 x mm3, con 95% de polimorfonucleares y visualización de abundantes cocáceas Gram negativas intracelulares. La conducta más adecuada es:

A) Administrar penicilina benzatina
B) Iniciar flucloxacilina oral
C) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
D) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje quirúrgico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

2. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en la artritis séptica de rodilla, con presencia de cocaceas Gram (-) intracelulares y cultivo negativo del líquido articular?

A) Anaerobios
B) Chlamydia trachomatis
C) Neisseria gonorrhoeae
D) Streptococcus agalactiae
E) Staphylococcus aureus

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

3. Un paciente de 33 años es diagnosticado de artritis séptica de cadera izquierda por estudio de líquido sinovial, con visualización de cocáceas Gram positivas dispuestas en racimo. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar cloxacilina oral e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
B) Iniciar ceftriaxona endovenosa e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
C) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación
D) Iniciar clindamicina oral y realizar aseo quirúrgico de la articulación
E) Iniciar cefazolina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

4. Un paciente de 56 años consulta por intenso dolor en rodilla derecha. Al examen se aprecia rodilla derecha eritematosa, caliente y aumentada de volumen. Se realiza artrocentesis, con salida de líquido turbio, poco filante. El estudio citológico demuestra más de 100.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía demuestra cristales escasos de pirofosfato de calcio y la tinción de Gram demuestra cocáceas gran positivas en racimo. El tratamiento de elección es:

A) Drenaje quirúrgico, asociado a Vancomicina endovenosa
B) Drenaje quirúrgico, asociado a Cloxacilina endovenosa
C) Cefazolina endovenosa, en dosis altas
D) Drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico intraarticular
E) Cefadroxilo por vía oral

Más preguntas online de Artritis Séptica del Adulto y Protésica →

9.3. Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.2.002 1.11.1.007 1.11.4.002

¿POR QUÉ?

Las artritis microcristalinas son las artropatías inflamatorias más comunes en hombres adultos mayores de 40 años. El EUNACOM pone a prueba de forma reiterada dos conceptos críticos: la identificación óptica de los cristales (aguja/birrefringencia negativa vs romboide/positiva) y la regla de oro terapéutica que prohíbe iniciar o modificar dosis de alopurinol durante una crisis aguda.

1. FISIOPATOLOGÍA, FACTORES DESENCADENANTES Y METABOLISMO DEL ÁCIDO ÚRICO

La **gota** se produce por el depósito intra y periarticular de cristales de **urato monosódico (UMS)** como consecuencia de una hiperuricemia crónica persistente (ácido úrico sérico > 6.8 mg/dL, punto de saturación fisicoquímica a 37 °C). **(ver Imagen 9.3B)** 1.11.2.002

El 90% de los pacientes presenta hipoexcreción renal de ácido úrico, mientras que solo el 10% corresponde a sobreproducción (déficit enzimático, lisis tumoral, psoriasis severa).

Factores desencadenantes de crisis aguda: Ingesta de alcohol (especialmente cerveza por su contenido en purinas y guanosina, y destilados que aumentan el lactato y compiten por la excreción renal de urato), comidas copiosas ricas en purinas (carnes rojas, vísceras, mariscos), deshidratación aguda, traumatismos locales, inicio o cambio brusco de diuréticos (tiazidas, furosemida) y fluctuaciones bruscas de la uricemia tras iniciar fármacos hipouricemiantes.

La **condrocalcinosis o pseudogota** se debe al depósito de cristales de **pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)** en el cartílago articular y fibrocartílago. Es más prevalente en ancianos (> 65 años) y puede ser idiopática o asociarse a hemocromatosis, hiperparatiroidismo primario, hipomagnesemia o hipofosfatasia. **(ver Imagen 9.3C)** 1.11.1.007

2. CUADRO CLÍNICO COMPARATIVO: PODAGRA VS PSEUDOGOTA

Gota Aguda: Inicio nocturno hiperagudo, alcanzando intensidad máxima en menos de 12 a 24 horas. Dolor exquisito que no tolera el roce de las sábanas, tumefacción violácea y calor local. La localización clásica en el 50-70% del primer ataque es la primera articulación metatarsofalángica (**podagra**), seguida por dorso del pie, tobillo y rodilla. 1.11.2.002

Gota Tofácea Crónica: Aparición de tofos (acúmulos nodulares indoloros o dolorosos de cristales de urato rodeados de reacción granulomatosa de cuerpo extraño) en hélix auricular, bolsas olecraneanas, tendón de Aquiles y dedos. En radiografía se observan **erosiones periarticulares en sacabocado con bordes escleróticos colgantes (signo de Martel)** sin osteopenia periarticular. **(ver Imagen 9.3A)**



FIG. 6.23 **Gout.** Sharply marginated erosions, some with sclerotic margin, are noted throughout the carpus and proximal metacarpals. These erosions are classic in gout. Note the absence of marked demineralization.

Rx de gota crónica

Pseudogota: Afecta típicamente a grandes articulaciones, predominantemente la **rodilla (50%)**, muñecas y hombros. En la radiografía simple se evidencia calcificación lineal o punteada del fibrocartílago (meniscos de la rodilla, ligamento triangular del carpo, sínfisis púbica). 1.11.1.007

TABLA 9.3.A · DIFERENCIAS CRÍTICAS ENTRE GOTA Y CONDROCALCINOSIS (PSEUDOGOTA) 1.11.2.002, 1.11.1.007, 1.11.4.002

CARACTERÍSTICA	GOTA (URATO MONOSÓDICO)	CONDROCALCINOSIS / PSEUDOGOTA (CPPD)
Cristal responsable	Urato monosódico monohidratado (UMS)	Pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)
Morfología microscópica	Forma de aguja fina, bordes afilados	Forma romboidal, rectangular o poligonal
Birrefringencia (luz polarizada)	Negativa INTENSA (Amarillo paralelo)	Positiva DÉBIL (Azul paralelo)
Articulación más frecuente	1ra Metatarsofalángica (Podagra > 50%)	Rodilla (> 50%), muñeca, sínfisis púbica
Signos radiológicos típicos	Erosiones en sacabocado con borde colgante (Martel)	Calcificación lineal de meniscos y cartílago hialino
Asociaciones etiológicas	Síndrome metabólico, alcohol, carnes, diuréticos	Hemocromatosis, hiperparatiroidismo, hipomagnesemia
Manejo de crisis aguda	Colchicina 1+0.5mg, AINEs o Prednisona	AINEs, corticoides intraarticulares o sistémicos
Terapia hipouricemiante crónica	Alopurinol (titulado) + Colchicina profilaxis	No aplica terapia de disolución; AINEs si recidivas

9.3. Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESTUDIO DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE CRISTALES CON LUZ POLARIZADA

El **diagnóstico de certeza absoluto** exige la identificación de cristales fagocitados por neutrófilos en el líquido sinovial mediante microscopio óptico con filtro de luz polarizada y compensador rojo de primer orden: 1.11.2.002 1.11.1.007 1.11.4.002

• **Cristales de Gota (Urato Monosódico):** Forma alargada de aguja con extremos puntiagudos, intracelulares, con **birrefringencia intensamente negativa**. Al alinearse paralelos al eje del compensador se ven de color **AMARILLO**; perpendiculares se ven AZULES. 1.11.2.002 1.11.4.002

• **Cristales de Pseudogota (CPPD):** Forma romboidal, rectangular o poliédrica, con **birrefringencia débilmente POSITIVA**. Al alinearse paralelos al eje del compensador se ven de color **AZUL**; perpendiculares se ven AMARILLOS. 1.11.1.007 1.11.4.002

Trampa EUNACOM: Hasta un 30-40% de los pacientes en plena crisis gotosa aguda pueden presentar niveles de ácido úrico normales o incluso bajos debido a la excreción urinaria facilitada por el estado inflamatorio y citoquinas (IL-6). Un ácido úrico normal NO descarta gota aguda. 1.11.2.002




A. TOFOS EN LAS MANOS



FIG. 6.23 **Gout.** Sharply marginated erosions, some with sclerotic margin, are noted throughout the carpus and proximal metacarpals. These erosions are classic in gout. Note the absence of marked demineralization.

B. RX DE GOTA CRÓNICA



C. CONDROCALCINOSIS

Imagen 9.3

FIGURA 9.3 · ENFRENTAMIENTO Y MANEJO ESCALONADO DE LA ARTRITIS GOTOSA: CRISIS AGUDA VS HIPOURICEMIANTES




TABLA 9.3.B · ESTRATIFICACIÓN TERAPÉUTICA EN CRISIS GOTOSA SEGÚN COMORBILIDADES — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PERFIL DEL PACIENTE	FÁRMACO DE ELECCIÓN EN CRISIS	FÁRMACOS CONTRAINDICADOS	JUSTIFICACIÓN CLÍNICA
Joven sin daño renal ni digestivo	Naproxeno 500mg c/12h o Colchicina 1.5mg/d	Alopurinol nuevo	Respuesta antiinflamatoria rápida sin toxicidad
Insuficiencia renal crónica (VFG < 50)	Prednisona 30-35 mg/día VO x 5 días	AINEs, Colchicina a dosis plenas	AINEs precipitan falla renal aguda; colchicina se acumula
Úlcera péptica activa o anticoagulado	Corticoides orales o intraarticulares	AINEs tradicionales	Riesgo inminente de hemorragia digestiva masiva
Gota tofácea crónica con daño óseo	Alopurinol iniciado a las 3 semanas de crisis	Iniciar alopurinol durante el ataque	Riesgo de perpetuar crisis por lisis rápida de cristales

9.3. Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. FARMACOTERAPIA DEL ATAQUE AGUDO DE GOTA (REGLA DE ORO)

El objetivo en la fase aguda es exclusivamente **suprimir la inflamación y aliviar el dolor**. Opciones de primera línea según comorbilidades: 1.11.2.002

1. **AINEs a dosis plenas:** Naproxeno 500 mg c/12h o Ibuprofeno 600-800 mg c/8h o Indometacina 50 mg c/8h. Primera elección en adultos jóvenes sin patología gástrica ni renal.

2. **Colchicina:** Esquema moderno de dosis bajas: **1 mg de inicio, seguido de 0.5 mg a la hora** (máximo 1.5 mg en el día 1; luego 0.5 mg 1 o 2 veces al día). Es altamente efectiva si se administra en las primeras 24 horas del inicio de los síntomas. Los esquemas antiguos con dosis horarias repetidas están proscritos por toxicidad gastrointestinal severa (diarrea profusa).

3. **Corticoides Sistémicos:** Prednisona 30 a 35 mg/día vía oral por 5 días (o pauta descendente en 7-10 días). Fármaco de **primera elección en pacientes con insuficiencia renal crónica, úlcera péptica activa o anticoagulación**.

REGLA DE ORO MANDATORIA EUNACOM: Durante el ataque agudo de gota **NUNCA se debe iniciar Alopurinol** ni ningún otro fármaco reductor de urato. Una caída brusca de la uricemia disuelve parcialmente los tofos y promueve la precipitación de nuevos cristales, perpetuando y agravando la sinovitis. Si el paciente ya venía tomando alopurinol previamente de forma crónica, se debe MANTENER a la misma dosis sin modificarla.

Tratamiento inicial de la crisis de pseudogota (artritis aguda por CPPD): la lógica es la de la crisis gotosa, pero **sin fármacos hipouricemiantes**, porque el alopurinol no actúa sobre el pirofosfato de calcio. En mono u oligoartritis (típicamente una rodilla), la primera opción es la **artrocentesis evacuadora más infiltración intraarticular de corticoide** (metilprednisolona o triamcinolona), una vez descartada infección con Gram y cultivo. Alternativas: AINEs a dosis plenas con protección gástrica (si la función renal y las comorbilidades lo permiten), colchicina en dosis bajas (0,5 mg cada 8-12 horas, ajustada a la función renal; menos eficaz y peor tolerada que en gota) o prednisona 30-40 mg/día por 3-5 días con pauta descendente cuando hay poliartritis, insuficiencia renal o contraindicación de AINEs. Se agregan reposo articular y hielo local. En la pseudogota recurrente puede usarse colchicina 0,5 mg/día como profilaxis. Siempre se buscan las causas metabólicas ya mencionadas (calcio, fósforo, PTH, magnesio, ferritina y saturación de transferrina) si la persona es menor de 60 años o hay poliartritis, y se **deriva** a reumatología si hay crisis repetidas. 1.11.1.007

5. TRATAMIENTO HIPOURICEMIANTE A LARGO PLAZO Y PREVENCIÓN DE RECIDIVAS

El tratamiento reductor de urato está indicado ante: ≥ 2 crisis al año, presencia de tofos clínicos o radiológicos, daño articular erosivo, urolitiasis o insuficiencia renal crónica estadio ≥ 2. 1.11.2.002

Momento de inicio: Se inicia **2 a 4 semanas después de la resolución completa de la crisis aguda**.

- **Alopurinol:** Inhibidor de la xantina oxidasa. Se inicia a dosis bajas: **100 mg/día vía oral** (50 mg/día en ERC avanzada) y se titula mensualmente de 100 en 100 mg hasta alcanzar la meta de uricemia (máximo 800-900 mg/día). Fármaco de primera línea.

- **Febuxostat:** Inhibidor selectivo potente de xantina oxidasa (40-80 mg/día), de elección si hay intolerancia, alergia o ineficacia de alopurinol; no requiere ajuste por función renal leve-moderada.

Profilaxis de Crisis al Iniciar Hipouricemiantes: Todo inicio o titulación de alopurinol debe acompañarse de **Colchicina 0.5 mg/día oral en dosis baja por 3 a 6 meses** continuos, para prevenir los brotes reactivos de movilización de cristales.

Metas de Ácido Úrico: < 6.0 mg/dL en todo paciente gotoso; meta < 5.0 mg/dL en pacientes con tofos palpables para acelerar su reabsorción.

TABLA 9.3.C · ESQUEMA DE TITULACIÓN Y METAS DE ALOPURINOL EN GOTA CRÓNICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PASO TERAPÉUTICO	DOSIFICACIÓN Y FÁRMACO	COADYUVANTE OBLIGATORIO	META TERAPÉUTICA
Paso 1: Post-crisis (Semana 2-4)	Alopurinol 100 mg/día oral (50 mg en ERC)	Colchicina 0.5 mg/día oral continua	Evitar brotes reactivos
Paso 2: Control a las 4 semanas	Aumentar a 200 mg/día si urato > 6.0	Mantener colchicina profiláctica	Descenso progresivo y seguro
Paso 3: Titulación final	Aumentar a 300 mg/día (máximo 800 mg/d)	Mantener colchicina por 3 a 6 meses	Uricemia < 6.0 mg/dL (< 5.0 si tofos)
Paso 4: Mantenimiento anual	Dosis fija que mantenga la meta de ácido úrico	Retirar colchicina profiláctica a los 6 meses	Ausencia de crisis y reabsorción tofácea

9.3. Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ARTRITIS POR MICROCRISTALES)

- Gota: Cristales de urato monosódico en aguja con birrefringencia intensamente NEGATIVA (amarillos paralelos).
- El ácido úrico sérico puede ser normal o bajo durante la crisis gotosa aguda (hasta en un 30-40% de los casos).
- El tratamiento de la crisis gotosa se realiza con AINEs plenos, Colchicina (1 mg + 0.5 mg) o Prednisona (de elección en ERC/úlcera).
- Al iniciar Alopurinol es mandatorio asociar Colchicina 0.5 mg/día por 3 a 6 meses como profilaxis de crisis por movilización.
- Pseudogota / Condrocalcinosis: Cristales de pirofosfato de calcio romboidales con birrefringencia débilmente POSITIVA (azules paralelos).
- REGLA DE ORO: Durante la crisis aguda NUNCA se debe iniciar Alopurinol ni modificar su dosis si ya venía tomándolo.
- El Alopurinol se inicia 2 a 4 semanas después de resuelta la crisis, a dosis baja (100 mg/d) y titulando cada 4 semanas.
- La meta de ácido úrico plasmático es < 6.0 mg/dL (< 5.0 mg/dL en presencia de tofos).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 9.3

Hombre de 52 años, hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida, asiste a un asado familiar con abundante consumo de carne vacuna y cerveza. A las 4:00 AM despierta súbitamente por dolor lancinante e insoportable en el primer ortejo del pie derecho, que le impide tolerar el roce de las sábanas. Al examen se observa la 1ra articulación metatarsofalángica tumefacta, violácea, caliente y exquisitamente dolorosa al tacto. Se realiza artrocentesis que evidencia cristales aciculares intra y extracelulares con intensa birrefringencia negativa. El ácido úrico plasmático resulta en 5.8 mg/dL.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una podagra aguda clásica (artritis gotosa) precipitada por alcohol, purinas y tiazidas. Los cristales con forma de aguja y birrefringencia negativa confirman el diagnóstico de certeza. Es típico que durante el ataque agudo el ácido úrico esté falsamente normal. El manejo de elección inmediato es el control de la inflamación con AINEs o Colchicina en pauta moderna (1 mg de inicio + 0.5 mg a la hora). Está estrictamente contraindicado iniciar Alopurinol en este momento.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.007

1. Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. Se realiza una artrocentesis, obteniéndose un líquido articular inflamatorio, con visualización de cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva, sin visualización de bacterias. En sus exámenes generales presenta hemograma normal, ácido úrico: 8,0 mg/dl, calcemia: 10 mg/dl, creatinina: 0,8 mg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento agudo y para prevenir nuevas crisis es respectivamente:

A) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: Bifosfonatos
B) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: No deben indicarse medicamentos
C) Agudo: AINEs y bifosfonatos; Prevenir nuevas crisis: Bifosfonatos
D) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: Alopurinol
E) Agudo: AINEs y bifosfonatos; Prevenir nuevas crisis: Alopurinol

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.007

2. Un paciente de 70 años presenta una artritis aguda de rodilla, la que se punciona, dando salida a un líquido inflamatorio, con 10.000 células por mm3, con abundantes cristales, compatibles con pirofosfato de calcio, sin visualización de bacterias. La conducta más adecuada es:

A) Indicar reposo e iniciar AINES
B) Indicar reposo, iniciar analgésicos y alopurinol
C) Indicar reposo, iniciar analgésicos y bifosfonatos
D) Indicar reposo, iniciar analgésicos, bifosfonatos y alopurinol
E) Indicar reposo, iniciar analgésicos, antibióticos y bifosfonatos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.007

3. Un paciente de 68 años consulta por dolor intenso de la rodilla izquierda, de 4 horas de evolución, asociado a aumento de volumen. Al examen físico se aprecia enrojecimiento, aumento de la temperatura local y derrame articular, con intenso dolor a la movilización activa y pasiva de la articulación. Se solicita radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación del cartílago articular y se realiza estudio del líquido sinovial, demostrándose la presencia de abundantes cristales con birrefringencia de elongación positiva. La tinción de Gram no visualiza bacterias. La conducta más adecuada es:

A) Realizar drenaje articular y administrar analgésicos y bifosfonatos
B) Indicar reposo e iniciar analgésicos y bifosfonatos
C) Indicar reposo e iniciar analgésicos y sulfato de magnesio
D) Indicar reposo e iniciar analgésicos y antibióticos empíricos
E) Indicar reposo e iniciar analgésicos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.002

4. ¿Qué fármaco es más útil para prevenir un ataque de gota?:

A) Alopurinol
B) Hidroclorotiazida
C) Enalapril
D) Metotrexato
E) Prednisona

Más preguntas online de Artritis por Microcristales →

9.4. Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.004 1.11.4.004 4.02.3.003

¿POR QUÉ?

La artrosis u osteoartritis es la enfermedad articular más prevalente en el mundo y una de las principales causas de discapacidad en adultos mayores en Chile. Es una patología GES garantizada en mayores de 55 años para manejo médico y en mayores de 65 años para reemplazo protésico de cadera. El EUNACOM exige diferenciar su dolor mecánico de los dolores inflamatorios y dominar los hallazgos radiológicos clásicos.

1. CONCEPTO, FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

La artrosis no es un simple proceso de desgaste senil pasivo, sino una enfermedad activa que compromete la **totalidad de la articulación**: pérdida progresiva del cartílago articular hialino, remodelación y esclerosis del hueso subcondral, formación de osteofitos marginales y sinovitis de bajo grado secundaria a detritos cartilaginosos. 1.11.1.004

Factores de riesgo principales: Edad avanzada (principal factor), sexo femenino (mayor prevalencia tras la menopausia), obesidad (factor mecánico y metabólico adipocitoquinario crucial en rodilla y cadera), sobrecarga articular mecánica ocupacional o deportiva, traumatismos previos y alineación articular anómala (genu varo/valgo). 4.02.3.003

2. CUADRO CLÍNICO Y LOCALIZACIONES ANATÓMICAS TÍPICAS

El síntoma guía es el **dolor de características mecánicas**: aparece o se intensifica con el movimiento, la carga y la deambulación, y cede típicamente con el reposo. A medida que avanza la enfermedad puede aparecer dolor nocturno o en reposo. 1.11.1.004

La **rigidez matinal o tras períodos de inactividad es breve**, durando típicamente **menos de 15 a 30 minutos** (a diferencia de la artritis reumatoide, donde supera los 45-60 minutos).

Al examen físico se aprecian crepitaciones palpables o audibles al movilizar la articulación, aumento de volumen de consistencia dura u ósea, dolor en la interlínea articular y limitación del rango articular activo y pasivo.

Patrones anatómicos clásicos:

• Manos: **Nódulos de Heberden** en articulaciones interfalángicas distales (IFD); **Nódulos de Bouchard** en interfalángicas proximales (IFP); y **Rizartrosis** en la primera articulación carpometacarpiana (base del pulgar). *Nota EUNACOM:* Las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) y muñecas son respetadas por la artrosis típica (su afectación orienta a artritis reumatoide o hemocromatosis). **(ver Imagen 9.4A y B)**

• Grandes articulaciones de carga: Rodilla (gonartrosis, frecuentemente femorotibial medial con deformidad en genu varo) y Cadera (coxartrosis, con dolor inguinal que irradia a cara anterior de muslo y rodilla).

3. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO Y MANEJO TERAPÉUTICO ESCALONADO GES

El diagnóstico es eminentemente clínico-radiológico. La radiografía simple en carga (bipedestación para rodillas y pelvis anteroposterior para cadera) revela los **cuatro signos cardinales patognomónicos**: 1) Pinzamiento asimétrico del espacio articular; 2) Esclerosis ósea subcondral (hueso eburnado reactivo); 3) Osteofitos marginales (proliferación fibrocartilaginosa calcificada); y 4) Geodas o quistes subcondrales. **(ver Imagen 9.4C)** 1.11.1.004 1.11.4.004

Manejo Escalonado según Guía Clínica GES: 1.11.1.004

• **Medidas No Farmacológicas (Pilar Fundamental):** Educación del paciente, reducción de peso corporal (disminuye exponencialmente la carga intraarticular), kinesioterapia con fortalecimiento del cuádriceps en gonartrosis, uso de bastón en la mano contralateral para descargar cadera/rodilla, y calzado amortiguador.

• **Farmacoterapia de Primera Línea:** Paracetamol (hasta 1 g cada 8 horas) para dolor leve a moderado. En artrosis de rodilla o manos se recomienda de inicio **AINEs tópicos (diclofenaco o ketoprofeno en gel)** por su eficacia comparable a los orales pero con excelente perfil de seguridad gastrointestinal y renal.

• **Farmacoterapia de Segunda Línea:** AINEs orales (Ibuprofeno, Naproxeno o inhibidores COX-2 como Celecoxib) en las dosis mínimas eficaces y en **ciclos cortos durante períodos de exacerbación**, asociando siempre protección gástrica con IBP en mayores de 60 años.

• **Tratamiento Invasivo / Quirúrgico:** Infiltración intraarticular con corticoides de depósito (triamcinolona) como rescate temporal en crisis inflamatorias con derrame articular. La **endoprótesis articular total (artroplastia de cadera o rodilla)** está indicada ante dolor refractario invalidante y limitación funcional severa a pesar del tratamiento médico óptimo.



A. NÓDULOS DE HEBERDEN



B. NÓDULOS DE BOUCHARD



C. ARTROSIS DE CADERA (PELVIS)

Imagen 9.4

FIGURA 9.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y ESCALONAMIENTO TERAPÉUTICO EN ARTROSIS (GES)




TABLA 9.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: ARTROSIS VS ARTRITIS REUMATOIDE

1.11.1.004, 1.11.4.004, 4.02.3.003

PARÁMETRO	ARTROSIS / OSTEOARTRITIS	ARTRITIS REUMATOIDE (AR)
Naturaleza de la enfermedad	Degenerativa / biomecánica del cartílago	Autoinmune inflamatoria de membrana sinovial
Tipo de dolor	Mecánico (empeora con uso, alivia en reposo)	Inflamatorio (peor en reposo, alivia con movimiento)
Rigidez matinal	Breve (< 15 a 30 minutos)	Prolongada (> 45 a 60 minutos)
Articulaciones en mano	IFD (Heberden), IFP (Bouchard), 1ra CMC	MCF, IFP, muñecas (RESPETA típicamente IFD)
Consistencia de tumefacción	Dura, ósea (osteofitos)	Blanda, pastosa, fluctuante (sinovitis)
Signos radiológicos	Pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis	Osteopenia periarticular, erosiones simétricas marginales
Laboratorio sistémico	VHS y PCR normales, FR y Anti-CCP negativos	VHS y PCR elevadas, FR y Anti-CCP positivos (80%)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.4

Mujer de 64 años, obesa (IMC 32 kg/m²), consulta por dolor en ambas rodillas de 2 años de evolución, que empeora al bajar escaleras y al final de la jornada laboral, aliviando al sentarse. Refiere rigidez de rodillas al levantarse que dura unos 10 minutos. Al examen físico se palpan crepitaciones gruesas femorotibiales bilaterales y leve deformidad en varo, sin signos de calor local ni eritema. En las manos presenta nódulos duros no dolorosos en articulaciones interfalángicas distales de ambas manos.

Conducta oficial. El cuadro es plenamente concordante con una osteoartritis (artrosis) femorotibial y de manos. El dolor mecánico que empeora con la carga (bajar escaleras), la rigidez matinal menor a 30 minutos, las crepitaciones óseas y la presencia de nódulos de Heberden en las IFD son los elementos cardinales diagnósticos. El manejo médico inicial incluye reducción de peso, kinesioterapia para fortalecimiento muscular, AINEs tópicos o paracetamol y educación GES.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El dolor de la artrosis es típicamente MECÁNICO: aumenta con el uso/deambulación y alivia en reposo.
- La rigidez matinal es breve: dura menos de 15 a 30 minutos.
- Afectación clásica en manos: Nódulos de Heberden en IFD, Nódulos de Bouchard en IFP y Rizartrosis en 1ra CMC.
- La artrosis típicamente RESPETA las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) y muñecas.
- Los 4 signos radiológicos cardinales son: pinzamiento articular asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas.
- Tratamiento de primera línea: medidas no farmacológicas (baja de peso, kinesiología) + AINEs tópicos / Paracetamol.
- Los AINEs orales se reservan para períodos breves de reagudización dolorosa, minimizando riesgos digestivos y renales.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.3.003

1. Un paciente de 66 años aqueja dolor en la ingle derecha, especialmente al caminar varias cuadras. Se solicita radiografía de cadera que demuestra disminución del espacio articular, con algunos osteofitos acetabulares y esclerosis del hueso subcodral. El diagnóstico más probable es:

A) Pelviespondilopatía seronegativa
B) Artrosis
C) Condrocalcinosis
D) Necrosis avascular de la cabeza femoral
E) Epifisiolisis femoral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.4.004

2. Un paciente de 71 años consulta por dolor en la ingle derecha, que aumenta con la marcha, por lo que ha disminuido su actividad. El dolor varía de un día a otro y cede con el reposo. El examen físico se observa dolor a la abducción y rotación interna de la cadera derecha. Se solicita radiografía de cadera que muestra disminución del espacio articular, con reacción subcortical y presencia de algunos osteofitos acetabulares. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar tratamiento sintomático con paracetamol
B) Solicitar hemograma, VHS, ANA, ANCA y factor reumatoídeo
C) Iniciar corticoides orales
D) Realizar infiltraciones con corticoides
E) Resolver quirúrgicamente

Más preguntas online de Artrosis / Osteoartritis →

9.5. Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.143 1.11.1.019

¿POR QUÉ?

La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) es la causa más frecuente de artritis crónica en la infancia y forma parte de las patologías GES en Chile. La perla más evaluada en EUNACOM es el riesgo de ceguera silenciosa por uveítis anterior crónica en la forma oligoarticular con ANA positiva, lo que exige control protocolizado con lámpara de hendidura. En el adulto, la Enfermedad de Still destaca por su fiebre en aguja, exantema asalmonado y cifras estratosféricas de ferritina.


1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ GES)

Se define como artritis persistente de causa desconocida en una o más articulaciones, que comienza **antes de los 16 años** y dura al menos **6 semanas**, tras descartar otras causas infecciosas, neoplásicas o hematológicas. 2.01.1.143

Subtipos Clínicos Principales:

1. **AIJ Oligoarticular (Persistente o Extendida):** Compromete **≤ 4 articulaciones** durante los primeros 6 meses. Es el subtipo más frecuente (50%). Afecta típicamente a niñas de 2 a 4 años en grandes articulaciones (rodillas, tobillos). Presenta **ANA positivos en 70-80%** con factor reumatoide negativo.

Alerta Médica EUNACOM: Este grupo tiene un **altísimo riesgo (hasta 20-30%) de desarrollar Uveítis Anterior Crónica**, la cual es completamente **asintomática** (ojo blanco, sin dolor ni hiperemia inicial). Si no se detecta precozmente produce sinequias, cataratas, glaucoma y ceguera permanente. Por ello, es obligatorio el **tamizaje oftalmológico periódico con lámpara de hendidura cada 3 a 6 meses**. **(ver Imagen 9.5B)**



Uveítis anterior crónica de la AIJ

2. **AIJ Poliarticular:** Compromete **≥ 5 articulaciones** en los primeros 6 meses. Se divide en FR positivo (similar a la AR del adulto, de peor pronóstico y erosiva) y FR negativo. 2.01.1.143 1.11.1.019

3. **AIJ Sistémica (Enfermedad de Still Juvenil):** Artritis acompañada de fiebre cotidiana en agujas, rash macular salmón, visceromegalias y serositis. 2.01.1.143

2. ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO: CLÍNICA Y CRITERIOS DE YAMAGUCHI

Es un trastorno autoinflamatorio sistémico idiopático caracterizado por desregulación de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, IL-18, TNF-alfa).

Tétrada Clínica Cardinal:

1. **Fiebre cotidiana en espigas:** Picos febriles diarios o vespertinos que superan los 39 °C, retornando espontáneamente a la normalidad.

2. **Artralgias o artritis:** Compromete muñecas, rodillas y tobillos. 1.11.1.019

3. **Exantema macular color salmón evanescente:** Lesiones máculo-papulares no pruriginosas en tronco y extremidades que coinciden típicamente con los picos febriles y desaparecen al ceder la temperatura. **(ver Imagen 9.5A)**

4. **Faringitis / Odinofagia no exudativa:** Pródromo muy frecuente que precede a las crisis febriles.

Laboratorio Característico: Marcada leucocitosis neutrofílica (> 10.000 a 15.000/mm³ con > 80% PMN), elevación extrema de reactantes de fase aguda (VHS > 100, PCR muy alta) y **Ferritina sérica masivamente elevada** (frecuentemente > 1.000 a 5.000 ng/mL, pudiendo superar los 10.000 ng/mL) con fracción de ferritina glicosilada baja (< 20%). Típicamente los **ANA y el Factor Reumatoide son NEGATIVOS**.

3. MANEJO TERAPÉUTICO Y COMPLICACIÓN VITAL: SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA

Manejo de AIJ Oligoarticular: Infiltraciones intraarticulares con triamcinolona hexacetónida de primera línea; si falla o progresa se indica Metotrexato oral o subcutáneo (15 mg/m²/semana) y biológicos anti-TNF. 2.01.1.143


Manejo de Enfermedad de Still: En formas leves se prueban AINEs a dosis altas. La mayoría requiere corticoides sistémicos (Prednisona 0.5 a 1 mg/kg/día) o pulsos de metilprednisolona. Como ahorrador de corticoides se utiliza Metotrexato o terapia biológica dirigida anti-IL-1 (Anakinra, Canakinumab) o anti-IL-6 (Tocilizumab). 1.11.1.019

Complicación de Urgencia Vital: Tanto la AIJ sistémica como la enfermedad de Still del adulto pueden complicarse con un **Síndrome de Activación Macrofágica (SAM)**, una linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria caracterizada por fiebre continua, pancitopenia rápida, coagulopatía de consumo con fibrinógeno bajo, hipertrigliceridemia y ferritina extrema (> 10.000 ng/mL). Requiere pulsos urgentes de metilprednisolona y ciclosporina en UCI. 2.01.1.143

Enfrentamiento general de la poliartritis (5 o más articulaciones) en el adulto: primero se define la **duración** (aguda < 6 semanas; crónica ≥ 6 semanas) y se descartan causas infecciosas y de cristales. La poliartritis aguda simétrica y autolimitada obliga a pensar en causa viral (parvovirus B19, hepatitis B y C, rubéola, chikungunya, VIH). Luego se reconoce el **patrón**: simétrica de manos y pies con rigidez matinal > 1 hora, AR (FR, anti-CCP); afectación de interfalángicas distales, dactilitis o psoriasis, artritis psoriásica; asimétrica de extremidades inferiores con entesitis, lumbago inflamatorio o diarrea o uretritis previa, espondiloartritis o artritis reactiva; con rash fotosensible, aftas, citopenias o proteinuria, LES (ANA, anti-dsDNA); con fiebre en agujas y exantema evanescente, enfermedad de Still. También se consideran endocarditis (soplo), sarcoidosis y causas paraneoplásicas. Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, función renal y hepática, orina completa, ácido úrico, FR, anti-CCP, ANA, serologías virales según contexto y radiografía de manos y pies. Manejo inicial en APS: analgesia y AINEs (± prednisona en dosis bajas tras tomar los exámenes) y **derivación a reumatología** si la poliartritis persiste más de 6 semanas, hay compromiso sistémico o se sospecha enfermedad autoinmune, porque el pronóstico de la AR depende de iniciar el tratamiento en los primeros meses (véase tema 9.6). 1.11.1.019



A. EXANTEMA ASALMONADO



B. UVEÍTIS CRÓNICA DE LA AIJ

Imagen 9.5

FIGURA 9.5 · CLASIFICACIÓN DE AIJ Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO




TABLA 9.5 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE YAMAGUCHI PARA ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO 2.01.1.143, 1.11.1.019

CATEGORÍA DE CRITERIOS	MANIFESTACIONES ESPECÍFICAS
Criterios Mayores (se requieren ≥ 2)	1) Fiebre ≥ 39 °C intermitente de ≥ 1 semana de duración
	2) Artralgias o artritis de ≥ 2 semanas de evolución
	3) Exantema salmón macular o máculopapular no pruriginoso coincidente con la fiebre
	4) Leucocitosis ≥ 10.000/mm³ con ≥ 80% de granulocitos polimorfonucleares
Criterios Menores	1) Faringitis u odinofagia no purulenta
	2) Linfadenopatías y/o esplenomegalia
	3) Elevación de transaminasas hepáticas (GOT/GPT) y/o LDH
	4) Factor Reumatoide y ANA negativos por técnicas estándar
Criterio Excluyente	Exclusión estricta de infecciones bacterianas/virales, neoplasias (linfoma) y otras vasculitis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.5

Niña de 3 años es traída por su madre por cojera progresiva en la pierna izquierda de 8 semanas de evolución, que es más notoria por las mañanas. Al examen físico se constata aumento de volumen y calor en la rodilla izquierda, con choque rotuliano positivo y flexión limitada. El resto del examen articular es normal. No tiene fiebre ni lesiones cutáneas. El hemograma es normal, la VHS es de 35 mm/h y los anticuerpos antinucleares (ANA) son positivos en dilución 1:160, con factor reumatoide negativo.

Conducta oficial. Se trata de una Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) de subtipo oligoarticular (una sola articulación en una niña menor de 4 años de más de 6 semanas de evolución). La positividad de los ANA confiere un riesgo sumamente elevado de uveítis anterior crónica asintomática. La conducta obligatoria e inmediata, además de la derivación reumatológica GES, es solicitar una interconsulta urgente a oftalmología para evaluación con lámpara de hendidura, ya que la uveítis no da ojo rojo ni dolor inicial pero causa ceguera irreversible si no se trata.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- AIJ se define como artritis de causa desconocida de ≥ 6 semanas de duración en menores de 16 años.
- El subtipo oligoarticular (≤ 4 articulaciones) es el más frecuente y afecta a niñas de 2-4 años en grandes articulaciones.
- AIJ oligoarticular con ANA (+) confiere un altísimo riesgo de UVEÍTIS ANTERIOR CRÓNICA ASINTOMÁTICA.
- Todo niño con sospecha de AIJ oligoarticular requiere examen oftalmológico urgente con lámpara de hendidura.
- La Enfermedad de Still del adulto se caracteriza por fiebre cotidiana vespertina > 39 °C, artritis y rash asalmonado evanescente.
- La ferritina sérica en la Enfermedad de Still del adulto se eleva a cifras extremas (> 1.000-5.000 ng/mL).
- El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una urgencia vital caracterizada por pancitopenia, ferritina > 10.000 y coagulopatía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.143

1. Una paciente de 17 años presenta fiebre intermitente de 3 semanas de evolución, acompañada en algunas oportunidades de un rash eritematoso macular, que compromete el tronco y la zona proximal de las extremidades que desaparece al ceder la fiebre. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata artritis de el tobillo derecho y de la tercera y cuarta articulaciones metacarpofalángica izquierdas. Destaca elevación importante de la ferritina plasmática. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus infantil
B) Púrpura de Schoenlein Henoch
C) Enfermedad de Kawasaki
D) Artritis juvenil idiopática (Enfermedad de Still)
E) Poliangeitis microscópica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.143

2. Un niño de 5 años presenta un cuadro de 2 meses de evolución de artritis de rodillas, muñecas y algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de las manos, asociado a fiebre ocasional. En sus exámenes presenta función renal normal, anemia discreta, con VCM: 85, leucocitos normales, plaquetas discretamente elevadas. En el perfil de fierro destaca elevación importante de la ferritina. El tratamiento de la patología descrita es:

A) Corticoides orales
B) Corticoides más ciclosporina
C) Metotrexato oral en dosis única semanal
D) Inmunoglobulina G en altas dosis por vía endovenosa
E) Antiinflamatorios no esteroidales orales

Más preguntas online de Artritis Idiopática Juvenil →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 9.1 A 9.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Toda monoartritis aguda se considera séptica hasta que la artrocentesis y el análisis...	**La artrocentesis diagnóstica debe realizarse SIEMPRE antes de administrar la primera...**	La única contraindicación absoluta de artrocentesis es la infección cutánea activa...
Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos	Staphylococcus aureus es el microorganismo más frecuente (> 60%) en la artritis séptica...	**Neisseria gonorrhoeae debe sospecharse en adultos jóvenes con síndrome...**	—
Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)	Gota: Cristales de urato monosódico en aguja con birrefringencia intensamente NEGATIVA...	**Pseudogota / Condrocalcinosis: Cristales de pirofosfato de calcio romboidales con...**	REGLA DE ORO: Durante la crisis aguda NUNCA se debe iniciar Alopurinol ni modificar su...
Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada	El dolor de la artrosis es típicamente MECÁNICO: aumenta con el uso/deambulación y...	**La rigidez matinal es breve: dura menos de 15 a 30 minutos.**	—
Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto	AIJ se define como artritis de causa desconocida de ≥ 6 semanas de duración en menores...	**El subtipo oligoarticular (≤ 4 articulaciones) es el más frecuente y afecta a niñas de...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Toda monoartritis aguda se considera séptica hasta que la artrocentesis y el análisis de líquido sinovial demuestren lo...

La artrocentesis diagnóstica debe realizarse SIEMPRE antes de administrar la primera dosis de antibióticos.

Líquido séptico típico: > 50.000 leucocitos/mm³ con > 90% PMN, aspecto purulento y glucosa marcadamente disminuida (< 50%...

Líquido inflamatorio: 2.000 a 50.000 leucocitos/mm³ con PMN > 50% (Gota, Condrocalcinosis, Artritis Reumatoide).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- La artrocentesis diagnóstica debe realizarse SIEMPRE antes de administrar la primera dosis de antibióticos.
- Líquido séptico típico: > 50.000 leucocitos/mm³ con > 90% PMN, aspecto purulento y glucosa marcadamente disminuida (< 50% plasmática).
- Neisseria gonorrhoeae debe sospecharse en adultos jóvenes con síndrome artritis-dermatitis y tenosinovitis migratoria.
- El drenaje articular (artroscopía, artrotomía o punciones evacuadoras repetidas) es tan vital como los antibióticos endovenosos.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Toda monoartritis aguda se considera séptica hasta que la artrocentesis y el análisis de líquido sinovial...	Tema 9.1 →
Staphylococcus aureus es el microorganismo más frecuente (> 60%) en la artritis séptica del adulto.	Tema 9.2 →
Gota: Cristales de urato monosódico en aguja con birrefringencia intensamente NEGATIVA (amarillos paralelos).	Tema 9.3 →
El dolor de la artrosis es típicamente MECÁNICO: aumenta con el uso/deambulación y alivia en reposo.	Tema 9.4 →
AIJ se define como artritis de causa desconocida de ≥ 6 semanas de duración en menores de 16 años.	Tema 9.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

02

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

5	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
9.6	Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares	30
9.7	Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES	35
9.8	Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal	39
9.9	Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora	45
9.10	Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas	50

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.11.1.003, 1.11.1.019, 1.11.4.003	Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares	Específico	Inicial	Completo
1.11.1.003	Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES	Específico	Completo	Completo
1.11.1.014, 1.11.4.003	Lupus Eritematoso Sistémico	Específico	Inicial	Completo
1.09.1.006, 1.11.1.014	Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora	Específico	Inicial	Derivar
6.01.1.016, 1.11.1.014	Lupus Cutáneo	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La AR es una poliartritis simétrica aditiva que compromete muñecas, MCF e IFP.
- La AR RESPETA clásicamente las interfalángicas distales (IFD) y el esqueleto axial lumbar/dorsal.
- La única región vertebral afectada por AR es la columna cervical (riesgo vital de subluxación atloaxoidea C1-C2).
- Rigidez matinal prolongada mayor a 45-60 minutos es el síntoma cardinal de actividad inflamatoria.
- Criterios ACR/EULAR 2010: puntaje ≥ 6 de 10 puntos confirma el diagnóstico.
- El Anti-CCP posee una especificidad del 96-98% para AR y predice enfermedad erosiva agresiva.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares	EUNACOM Diciembre 2024 · #46 · EUNACOM Enero 2023 · #94 · EUNACOM Diciembre 2022 · #130 · EUNACOM Agosto 2021 · #96
Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES	EUNACOM Diciembre 2024 · #46 · EUNACOM Enero 2023 · #94 · EUNACOM Diciembre 2022 · #130 · EUNACOM Agosto 2021 · #96
Lupus Eritematoso Sistémico	EUNACOM Diciembre 2024 · #154 · EUNACOM Agosto 2021 · #98 · EUNACOM Diciembre 2018 · #28 · EUNACOM Julio 2017 · #74
Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora	EUNACOM Diciembre 2024 · #154 · EUNACOM Agosto 2021 · #98 · EUNACOM Diciembre 2018 · #113 · EUNACOM Diciembre 2018 · #28
Lupus Cutáneo	EUNACOM Julio 2025 · #14 · EUNACOM Diciembre 2024 · #2 · EUNACOM Diciembre 2024 · #154 · EUNACOM Agosto 2021 · #98

9.6. Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.003 1.11.1.019 1.11.4.003

¿POR QUÉ?

La Artritis Reumatoide (AR) es la artropatía inflamatoria crónica más prevalente en Chile y el mundo. Es una patología GES garantizada por ley. El EUNACOM enfatiza la sospecha temprana para evitar el daño osteoarticular erosivo irreversible, la aplicación de los criterios ACR/EULAR 2010 y el reconocimiento precoz de las manifestaciones extraarticulares graves, como la subluxación atloaxoidea.

1. FISIOPATOLOGÍA Y DAÑO ARTICULAR INDUCIDO POR PANNUS SINOVIAL

La AR es una enfermedad autoinmune sistémica mediada por 1.11.1.003 linfocitos T CD4+ Th1 y Th17, linfocitos B productores de autoanticuerpos y macrófagos sinoviales activados. Estos liberan citoquinas proinflamatorias clave (**TNF-alfa, Interleuquina-6, Interleuquina-1**) que promueven la neoangiogénesis y la hiperplasia masiva de los sinoviocitos, conformando el **pannus sinovial** invasivo.

El pannus secreta metaloproteinasas de matriz que degradan el cartílago articular hialino y activa osteoclastos vía ligando de RANK (RANKL), provocando **erosiones óseas marginales y osteopenia yuxtaarticular** en las zonas desprovistas de cartílago protector.

Afecta predominantemente a mujeres (proporción 3:1 respecto a hombres), con pico de incidencia entre los 35 y 55 años. Existe una fuerte susceptibilidad genética ligada al alelo **HLA-DR4** (epítopo compartido) y un rol ambiental gatillante demostrado en el **tabaquismo**, que induce la citrulinación de proteínas en el epitelio alveolar pulmonar.

2. MANIFESTACIONES ARTICULARES TÍPICAS Y DEFORMIDADES TARDÍAS

El cuadro clínico clásico es un **síndrome poliarticular inflamatorio crónico, bilateral y simétrico**, de curso aditivo. Compromete típicamente pequeñas articulaciones: 1.11.1.003 1.11.1.019

• Muñecas (articulación radiocarpiana y radiocubital distal). 1.11.1.003

• Articulaciones Metacarpofalángicas (MCF).

• Articulaciones Interfalángicas Proximales (IFP).

• Metatarsofalángicas (MTF) en pies.

• Grandes articulaciones: rodillas, hombros, codos y tobillos.

Reglas de Oro Topográficas EUNACOM:

1. La AR **RESPETA típicamente las articulaciones interfalángicas distales (IFD)** (su inflamación orienta a artrosis o artritis psoriásica). 1.11.1.003 1.11.1.019

2. La AR **RESPETA el esqueleto axial sacroilíaco y toracolumbar** (su compromiso orienta a espondiloartropatías).

3. *Excepción Crítica:* En la columna cervical puede haber inflamación sinovial de la apófisis odontoides y del ligamento transverso del atlas, produciendo **subluxación atloaxoidea (C1-C2)**. Puede debutar con parestesias, hiperreflexia o compresión medular mortal ante flexión forzada o intubación endotraqueal. 1.11.1.003

El síntoma cardinal funcional es la **rigidez matinal prolongada, superior a 45-60 minutos** (frecuentemente > 2 horas), que mejora con la actividad y el movimiento.

Deformidades tardías de la enfermedad avanzada no tratada: desviación ulnar de los dedos en ráfaga, dedos en ojal (boutonnière), dedos en cuello de cisne (hiperextensión de IFP con flexión de IFD) y pulgar en Z. **(ver Imagen 9.6B y C)**



Mano reumatoide con dedos en cuello de cisne y en ojal

TABLA 9.6.A · DESGLOSE DEL PUNTAJE DIAGNÓSTICO ACR/EULAR 2010 PARA ARTRITIS REUMATOIDE 1.11.1.003, 1.11.1.019, 1.11.4.003

CATEGORÍA DE CRITERIOS	HALLAZGOS ESPECÍFICOS	PUNTAJE ASIGNADO
Compromiso Articular	1 articulación grande / mediana afectada	0 puntos
	2 – 10 articulaciones grandes / medianas afectadas	1 punto
	1 – 3 articulaciones pequeñas afectadas	2 puntos
	4 – 10 articulaciones pequeñas afectadas	3 puntos
	> 10 articulaciones afectadas (al menos 1 pequeña)	5 puntos
Serología (FR / Anti-CCP)	FR y Anti-CCP negativos	0 puntos
	FR o Anti-CCP positivo a títulos bajos (≤ 3x VN)	2 puntos
	FR o Anti-CCP positivo a títulos ALTOS (> 3x VN)	3 puntos
Reactantes de Fase Aguda	VHS y PCR normales	0 puntos
	VHS o PCR anormalmente elevadas	1 punto
Duración de Síntomas	Duración < 6 semanas	0 puntos
	Duración ≥ 6 semanas	1 punto

9.6. Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CLASIFICATORIOS ACR/EULAR 2010

Los criterios clásicos de 1987 esperaban deformidades y erosiones radiológicas, perdiendo la ventana de oportunidad terapéutica. Los **criterios ACR/EULAR 2010** se diseñaron para el diagnóstico precoz. Requieren presencia de sinovitis clínica en al menos una articulación no explicada por otra patología, y un puntaje **≥ 6 de 10 puntos**: 1.11.1.003 1.11.1.019

A. Compromiso Articular (0 a 5 puntos): 1.11.1.003

• 1 articulación mediana o grande: 0 puntos.

• 2 a 10 articulaciones medianas o grandes: 1 punto.

• 1 a 3 articulaciones pequeñas: 2 puntos.

• 4 a 10 articulaciones pequeñas: 3 puntos.

• > 10 articulaciones (al menos una pequeña): 5 puntos.

B. Serología Inmunológica (0 a 3 puntos): 1.11.1.003 1.11.4.003

• FR y Anti-CCP negativos: 0 puntos.

• FR o Anti-CCP positivo a títulos bajos (≤ 3 veces valor normal): 2 puntos.

• FR o Anti-CCP positivo a títulos ALTOS (> 3 veces valor normal): 3 puntos.

C. Reactantes de Fase Aguda (0 a 1 punto): 1.11.1.003


• VHS y PCR normales: 0 puntos.

• VHS o PCR anormalmente elevadas: 1 punto.

D. Duración de los Síntomas (0 a 1 punto):

• < 6 semanas: 0 puntos.

• ≥ 6 semanas: 1 punto.



A. EROSIONES EN LAS MANOS



B. DESVIACIÓN CUBITAL



C. RX: ENFERMEDAD AVANZADA

Imagen 9.6

FIGURA 9.6 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO PRECOZ EN ARTRITIS REUMATOIDE: PUNTUACIÓN ACR/EULAR 2010




TABLA 9.6.B · FACTORES CLÍNICO-BIOLÓGICOS DE MAL PRONÓSTICO EN ARTRITIS REUMATOIDE — CRITERIOS DE GRAVEDAD

FACTOR DE RIESGO	MANIFESTACIÓN / BIOMARCADOR	IMPLICANCIA PRONÓSTICA
Serología de Alto Título	Anti-CCP y Factor Reumatoide > 3 veces el límite superior	Rápida progresión a erosiones óseas y deformidad articular
Reactantes Muy Elevados	VHS > 50 mm/h o PCR persistentemente elevada	Persistencia de actividad inflamatoria destructiva continua
Erosiones Radiológicas Precoces	Presencia de erosiones marginales en los primeros 12 meses	Fenotipo erosivo agresivo con pérdida funcional prematura
Manifestaciones Extraarticulares	Nódulos reumatoideos, vasculitis o afección pulmonar	Mayor morbimortalidad global y necesidad de terapia biológica precoz

9.6. Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PERFIL SEROLÓGICO: FACTOR REUMATOIDE VS ANTICUERPOS ANTI-CCP

1.11.1.003 1.11.4.003

• **Factor Reumatoide (FR):** Autoanticuerpo (habitualmente IgM) dirigido contra la porción Fc de la IgG humana. Sensibilidad del 70-80%, pero baja especificidad (se positiviza en síndrome de Sjögren [>80%], hepatopatías crónicas, endocarditis, lepra y hasta en un 5% de ancianos sanos).

• **Anti-Péptido Citrulinado Cíclico (Anti-CCP):** Sensibilidad comparable a FR (70-80%), pero con **especificidad sobresaliente del 96% al 98%**. Aparece años antes de las primeras manifestaciones articulares. Su positividad a títulos altos es el mejor factor predictor de **artritis reumatoide agresiva y fuertemente erosiva**.

5. MANIFESTACIONES EXTRAARTICULARES DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

1.11.1.003

Aparecen predominantemente en pacientes con serología intensamente positiva (FR y Anti-CCP altos) y enfermedad de larga data:

• **Nódulos Reumatoideos Subcutáneos:** Presentes en el 20-30%. Nódulos firmes, adheridos a planos profundos pero móviles sobre el hueso, indoloros, ubicados en zonas de presión repetida (superficie extensora del cúbito/olécranon, tendón de Aquiles). Histología: granuloma con necrosis fibrinoide central rodeada de histiocitos en empalizada.



Nódulos reumatoides subcutáneos en el codo

• **Compromiso Pleuropulmonar:** Enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID, patrón NIU o NINE), pleuritis con derrame pleural característico (**glucosa sinovial extremadamente baja < 30 mg/dL** y LDH muy alta), nódulos pulmonares reumatoides y **Síndrome de Caplan** (asociación de AR con neumoconiosis y nódulos pulmonares múltiples).

• **Compromiso Ocular:** Queratoconjuntivitis seca secundaria (la más frecuente), epiescleritis (benigna, no dolorosa) y escleritis necrotizante anterior (urgencia oftalmológica: dolor ocular intenso y riesgo de perforación escleral).

• **Vasculitis Reumatoidea:** Vasculitis necrotizante de vasos pequeños/medianos con úlceras isquémicas en extremidades inferiores, púrpura palpable y mononeuritis múltiple.

• **Síndrome de Felty:** Tríada clásica consistente en: **1) Artritis Reumatoide severa; 2) Esplenomegalia; y 3) Neutropenia (< 1.500/mm³)**. Conlleva un alto riesgo de infecciones bacterianas piógenas graves recurrentes.

6. CONDUCTA INICIAL ANTE SOSPECHA DE ARTRITIS REUMATOIDE EN LA RED ASISTENCIAL

1.11.1.003

Tratamiento inicial en atención primaria y derivación (GES AR ≥ 15 años): se sospecha AR ante sinovitis de una o más articulaciones, especialmente pequeñas y simétricas, con rigidez matinal > 1 hora y evolución de 6 semanas o más sin otra causa. Se solicitan hemograma, VHS, PCR, FR, anti-CCP, función hepática y renal, y radiografías de manos y pies; los exámenes normales no descartan la enfermedad. Se **deriva de forma preferente a reumatología**, ya que el beneficio máximo se logra iniciando FARME dentro de los primeros 3-6 meses (la derivación no debe esperar a que aparezcan erosiones). Mientras tanto: AINEs a dosis plenas con protección gástrica y/o prednisona en dosis baja (≤ 10 mg/día) como puente, sabiendo que no modifican la evolución. El FARME de inicio es el **metotrexato semanal con ácido fólico** (véase tema 9.7), previa verificación de hemograma, transaminasas, creatinina y serologías de hepatitis B y C. Medidas generales: educación, ejercicio y kinesioterapia, suspensión del tabaco (empeora la enfermedad y la respuesta), vacunación antiinfluenza y antineumocócica y control cardiovascular. La meta es la remisión o baja actividad (DAS28 < 3,2) y se controla la actividad cada 1-3 meses hasta alcanzarla. **(ver Imagen 9.6A)**

TABLA 9.6.C · EVALUACIÓN Y METAS DE REMISIÓN EN ARTRITIS REUMATOIDE (TREAT-TO-TARGET) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ÍNDICE DE ACTIVIDAD	PARÁMETROS EVALUADOS	META TERAPÉUTICA (REMISIÓN)
DAS28 (Disease Activity Score)	28 articulaciones dolorosas/tumefactas + VHS/PCR + EVA global	DAS28 < 2.6 (Remisión clínica) o ≤ 3.2 (Baja actividad)
CDAI (Clinical Disease Activity Index)	Recuento articular de 28 articulaciones + EVA médico + EVA paciente	CDAI ≤ 2.8 (Remisión clínica estricta sin reactantes)
SDAI (Simplified Disease Activity)	CDAI + valor numérico de PCR (mg/dL)	SDAI ≤ 3.3 (Remisión estricta de Guías ACR/EULAR)

9.6. Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ARTRITIS REUMATOIDE)

- La AR es una poliartritis simétrica aditiva que compromete muñecas, MCF e IFP.
- La única región vertebral afectada por AR es la columna cervical (riesgo vital de subluxación atloaxoidea C1-C2).
- Criterios ACR/EULAR 2010: puntaje ≥ 6 de 10 puntos confirma el diagnóstico.
- El Síndrome de Felty consiste en la tríada: Artritis Reumatoide + Esplenomegalia + Neutropenia.
- La AR RESPETA clásicamente las interfalángicas distales (IFD) y el esqueleto axial lumbar/dorsal.
- Rigidez matinal prolongada mayor a 45-60 minutos es el síntoma cardinal de actividad inflamatoria.
- El Anti-CCP posee una especificidad del 96-98% para AR y predice enfermedad erosiva agresiva.
- El derrame pleural reumatoide se caracteriza patognomónicamente por niveles de glucosa extremadamente bajos (< 30 mg/dL).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.6

Mujer de 46 años consulta por dolor e inflamación progresiva en ambas manos y muñecas de 8 semanas de evolución. Refiere que al despertar siente las manos engatilladas y rígidas, demorando más de 2 horas en poder preparar el desayuno. Al examen físico se constata tumefacción dolorosa a la palpación y peloteo sinovial en articulaciones metacarpofalángicas 2da y 3ra de ambas manos, interfalángicas proximales 3ra y 4ta bilaterales y ambas muñecas. Las interfalángicas distales son móviles e indoloras. En el codo derecho se palpa un nódulo subcutáneo firme de 1.5 cm indoloro. Laboratorio: VHS 58 mm/h, PCR 42 mg/L, Anti-CCP fuertemente positivo (180 U/mL, valor normal < 15).

Conducta oficial razonada. El cuadro cumple plenamente los criterios ACR/EULAR 2010 para Artritis Reumatoide con puntaje máximo: compromiso de > 10 articulaciones con pequeñas articulaciones (5 pts), Anti-CCP a títulos altos > 3x (3 pts), reactantes elevados (1 pt) y duración ≥ 6 semanas (1 pt), totalizando 10/10 puntos. El respeto de las interfalángicas distales es típico. La presencia de nódulos subcutáneos traduce enfermedad seropositiva establecida. Debe confirmarse e ingresarse de inmediato a la canasta GES para inicio urgente de FARME.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

1. Un hombre de 40 años presenta rigidez matinal de una hora y artralgias de articulaciones metacarpofalángicas, muñecas y tobillos, desde hace 6 semanas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en las articulaciones descritas. El diagnóstico más probable es:

A) Artritis reumatoide
B) Artritis por cristales
C) Artrosis
D) Lupus eritematoso
E) Artritis viral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

2. Una paciente de 36 años consulta por artralgias de manos de algunos meses de evolución, asociados a rigidez matinal de 1 hora aproximadamente. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en la mayoría de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de ambas manos. El diagnóstico más probable es:

A) Artrosis 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6
B) Artritis reumatoide
C) Artritis psoriática
D) Lupus sistémico
E) Esclerodermia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

3. ¿Cuál de las siguientes NO suele ser una manifestación extra articular de la artritis reumatoide?

A) Fibrosis pulmonar
B) Mielitis transversa
C) Vasculitis de vaso pequeño 18gastroenterologia7
D) Pericarditis
E) Síndrome de Sjörgren secundario

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

4. ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele aparecer en los pacientes con artritis reumatoide?

A) Mano en ráfaga
B) Dedos en cuello de cisne
C) Dedos en sastre
D) Nódulos de Heberden
E) Nódulos reumatoídeos

Más preguntas online de Artritis Reumatoide →

9.7. Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.003

¿POR QUÉ?

El tratamiento de la AR se rige por la estrategia Treat-to-Target: el objetivo es la remisión clínica estricta (DAS28 < 2.6) o al menos baja actividad de la enfermedad. El retraso en el inicio de FARME condiciona discapacidad laboral permanente. El EUNACOM interroga intensamente la dosificación semanal de metotrexato, la coadministración obligatoria de ácido fólico y el cribado mandatorio de tuberculosis previo al uso de fármacos biológicos.

1. FILOSOFÍA TREAT-TO-TARGET Y VENTANA DE OPORTUNIDAD TERAPÉUTICA

La AR debe tratarse inmediatamente tras su confirmación 1.11.1.003 diagnóstica. Existe una **"ventana de oportunidad" crítica durante los primeros 3 meses** desde el inicio de los síntomas en la que el inicio precoz de un Fármaco Modificador de la Enfermedad (FARME) detiene la progresión radiológica y preserva la capacidad funcional.

La estrategia *Treat-to-Target* (tratar hasta alcanzar el objetivo) implica ajustar la farmacoterapia cada 1 a 3 meses hasta lograr la **remisión clínica (DAS28 < 2.6)** o baja actividad (DAS28 ≤ 3.2).

Los analgésicos puros y AINEs solo controlan el dolor y la rigidez de forma transitoria, pero **NO modifican el curso natural de la enfermedad ni evitan la destrucción osteoarticular**.

2. METOTREXATO: ESTÁNDAR DE ORO Y REGLAS DE PRESCRIPCIÓN EUNACOM

El **Metotrexato (MTX)** es un antagonista del folato que ejerce 1.11.1.003 su acción antiinflamatoria en dosis bajas mediante la acumulación y liberación extracelular de adenosina.

Reglas Inquebrantables de Prescripción EUNACOM:

- **Dosificación SEMANAL (NUNCA DIARIA):** La dosis inicial es de 10 a 15 mg una vez por semana, titulando rápidamente cada 2 a 4 semanas hasta 20 a 25 mg **UNA VEZ A LA SEMANA** por vía oral o subcutánea (la vía SC tiene mayor biodisponibilidad y menores efectos adversos digestivos). *Peligro mortal:* La prescripción accidental diaria produce aplasia medular y mucositis tóxica severa.
- **Suplementación con Ácido Fólico:** Es **MANDATORIO coadministrar Ácido Fólico (5 a 10 mg semanales)** administrado 24 a 48 horas después de la dosis de metotrexato. Reduce en más de un 80% las náuseas, estomatitis ulcerosa, alopecia, citopenias y elevación asintomática de transaminasas, sin disminuir la eficacia terapéutica del MTX.
- **Monitorización:** Hemograma y perfil hepático basales, y luego cada 1 a 3 meses. Si las transaminasas se elevan > 3 veces el límite superior normal se debe suspender temporalmente.
- **Contraindicaciones Absolutas:** Embarazo y lactancia (es teratogénico y abortivo demostrado), hepatopatía crónica activa, consumo abusivo de alcohol, e insuficiencia renal severa (VFG < 30 mL/min).

TABLA 9.7.A · PERFIL COMPARATIVO DE FARME SINTÉTICOS EN ARTRITIS REUMATOIDE 1.11.1.003

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	DOSIS HABITUAL	TOXICIDAD PRINCIPAL	MONITOREO OBLIGATORIO
Metotrexato (MTX)	Antagonista del folato / adenosina	15 – 25 mg SEMANAL VO o SC	Hepatotoxicidad, citopenias, neumonitis	Hemograma y transaminasas cada 1-3 meses + Ácido Fólico
Leflunomida	Inhibidor síntesis de pirimidinas	20 mg / día oral	Diarrea, hipertensión, alopecia, hepatopatía	Presión arterial, hemograma y transaminasas
Sulfasalazina	Modulación citoquinas / prostaglandinas	2 – 3 g / día oral	Molestias GI, erupción cutánea, neutropenia	Hemograma y perfil hepático periódico
Hidroxicloroquina	Inhibición de presentación antigénica	200 – 400 mg / día (≤5mg/kg/d)	Toxicidad retiniana (maculopatía en ojo de buey)	Fondo de ojo y campo visual anual tras 5 años
Prednisona (Puente)	Inhibición transcripcional NF-kB	5 – 10 mg / día oral (transitorio)	Osteoporosis, síndrome de Cushing, diabetes	Densitometría ósea, glicemia, presión arterial

9.7. Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES — Enfrentamiento Diagnóstico

3. OTROS FARME SINTÉTICOS CONVENCIONALES (SCDMARDS)

• **Leflunomida:** Inhibe la síntesis de novo de pirimidinas (dihidroorotato deshidrogenasa). Dosis: 20 mg/día oral. Eficacia similar a MTX. Muy teratogénica (requiere lavado con colestiramina si se desea embarazo). 1.11.1.003

• **Sulfasalazina:** Dosis: 2 a 3 g/día oral. De elección ante contraindicación o intolerancia a MTX, y es el fármaco más seguro si la paciente busca embarazo planificado.

• **Hidroxicloroquina (HCQ):** Dosis: 200 a 400 mg/día (≤ 5 mg/kg peso real/día). Potencia antiinflamatoria moderada, excelente como coadyuvante en combinaciones (ej. terapia triple: MTX + SSZ + HCQ). Requiere **evaluación oftalmológica basal y anual después del 5to año** para tamizar maculopatía en ojo de buey.

• **Terapia de Puente con Corticoides (Bridge Therapy):** Como el MTX demora entre 6 y 12 semanas en alcanzar su efecto terapéutico pleno, se asocian **corticoides orales a dosis bajas (Prednisona 5 a 10 mg/día)** para alivio sintomático rápido, con el compromiso formal de desescalar y retirarlos completamente una vez que el FARME actúe.

FIGURA 9.7 · ESQUEMA TERAPÉUTICO ESCALONADO EN ARTRITIS REUMATOIDE (ESTRATEGIA TREAT-TO-TARGET GES)




TABLA 9.7.B · PROTOCOLO DE SEGURIDAD PREVIO AL INICIO DE TERAPIAS BIOLÓGICAS ANTI-TNF CRITERIOS DE GRAVEDAD

INFECCIÓN A DESCARTAR	HERRAMIENTA DE TAMIZAJE	CRITERIO DE POSITIVIDAD	CONDUCTA MANDATORIA PREVIA AL BIOLÓGICO
Tuberculosis Latente	PPD (tuberculina) y/o IGRA + Radiografía de tórax	PPD ≥ 5 mm o IGRA reactivo	Isoniazida 300 mg/d por 9 meses; iniciar biológico tras 1 mes
Hepatitis B Crónica	HBsAg y anticuerpo anti-HBc total	Cualquiera positivo	Carga viral VHB y profilaxis con Entecavir / Tenofovir
Hepatitis C	Anticuerpos anti-VHC	Serología reactiva	Confirmación con ARN viral y tratamiento antiviral previo
Infección activa bacteriana	Examen físico, sedimento orina, hemograma	Presencia de foco infeccioso	Tratar y resolver completamente la infección antes de iniciar

9.7. Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TERAPIA BIOLÓGICA Y FÁRMACOS DIRIGIDOS (GES): REGLA DE ORO EN TUBERCULOSIS

Indicada ante fracaso terapéutico (actividad moderada a alta DAS28 > 3.2 persistente tras 3 a 6 meses de MTX optimizado o combinación de FARME sintéticos): 1.11.1.003

Familias de Biológicos Disponibles:

• Inhibidores de TNF-alfa: **Adalimumab, Infliximab, Etanercept, Golimumab, Certolizumab**.

• Inhibidores de receptor de IL-6: **Tocilizumab**.

• Moduladores de la coestimulación de células T: **Abatacept**.

• Depletores de linfocitos B anti-CD20: **Rituximab**.

• Inhibidores de Janus Kinasas (JAK oral): **Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib**.

REGLA DE ORO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA EUNACOM:

Antes de prescribir cualquier fármaco inhibidor del TNF-alfa o terapia biológica inmunosupresora es **ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO descartar Tuberculosis Latente** mediante:

1. Radiografía de tórax frontal y lateral.

2. Test de tuberculina (PPD) o Ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA / QuantiFERON).

3. Serología de Hepatitis B (HBsAg, Anti-HBc) y Hepatitis C.

Conducta ante PPD positivo (≥ 5 mm en este grupo) o IGRA positivo con radiografía normal: Iniciar **quimioprofilaxis con Isoniazida 300 mg/día + Vitamina B6 por 9 meses** (o Rifampicina 4 meses). La terapia biológica solo puede iniciarse después de haber completado al menos **1 mes de tratamiento tuberculostático** para evitar la reactivación de una TBC miliar o extrapulmonar mortal.

TABLA 9.7.C · ALGORITMO DE ESCALONAMIENTO TERAPÉUTICO EN ARTRITIS REUMATOIDE GES — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACOS UTILIZADOS	MOMENTO DE EVALUACIÓN	CRITERIO DE CAMBIO / ESCALADA
Primera Línea	Metotrexato 15-25 mg/semana + Ácido Fólico 5mg + Prednisona puente	3 meses (esperar mejoría >50%)	Si no hay remisión a los 6 meses (DAS28 > 3.2)
Segunda Línea	Asociar FARME sintético (Leflunomida 20mg/d o Sulfasalazina 2g/d)	A los 3 meses de ajuste	Falla de respuesta o intolerancia a sintéticos
Tercera Línea (Biológico)	Inhibidor de TNF-alfa (Adalimumab 40mg SC c/2 sem o Etanercept 50mg SC/sem)	A los 3 a 6 meses con biológico	Si DAS28 persiste > 3.2 tras descartar TBC
Cuarta Línea (Biológico switch)	Cambio a Tocilizumab (Anti-IL-6), Abatacept o Inhibidor JAK (Tofacitinib)	Continuo	Refractariedad o pérdida secundaria de respuesta

9.7. Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ARTRITIS REUMATOIDE)

- Metotrexato es el fármaco modificador de la enfermedad (FARME) de primera línea indiscutido en Artritis Reumatoide.
- Es obligatorio prescribir Ácido Fólico (5 a 10 mg semanales) a las 24-48 horas del MTX para reducir toxicidad digestiva y hepática.
- Los corticoides a dosis bajas (≤ 7.5-10 mg/día) se usan como terapia de puente inicial y deben retirarse gradualmente.
- Ante PPD ≥ 5 mm o IGRA positivo se debe iniciar Isoniazida 300 mg/día por 9 meses, difiriendo el biológico al menos 1 mes.
- El metotrexato se prescribe SIEMPRE en dosis SEMANAL (15 a 25 mg/semana), NUNCA diaria.
- El metotrexato está absolutamente contraindicado en el embarazo por ser teratogénico y abortivo.
- REGLA DE ORO: Antes de iniciar cualquier terapia biológica (Anti-TNF) es MANDATORIO descartar Tuberculosis Latente (PPD/IGRA + Rx tórax).
- La meta terapéutica Treat-to-Target en AR es alcanzar la remisión clínica definida por un DAS28 < 2.6.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 9.7

Mujer de 42 años con diagnóstico reciente de artritis reumatoide seropositiva (Anti-CCP fuertemente positivo) con puntaje ACR/EULAR de 9 puntos. Consulta en policlínico para inicio de tratamiento farmacológico modificador. Presenta marcada inflamación en muñecas e interfalángicas proximales bilaterales y rigidez matinal de 2 horas. Su hemograma, función renal y perfil hepático basales son normales.

Conducta oficial razonada. En toda artritis reumatoide recién diagnosticada, el tratamiento modificador de primera línea de elección absoluta es el Metotrexato a dosis de 15 mg/semana oral o subcutáneo, con titulación progresiva hasta 20-25 mg/semana. Es MANDATORIO prescribir de forma concomitante Ácido Fólico (5 a 10 mg semanales administrados 24-48 horas después del metotrexato) para prevenir toxicidad hepática, estomatitis y citopenias. Se puede asociar una pauta corta de prednisona a dosis baja (5-10 mg/día) como terapia de puente mientras el metotrexato alcanza su efecto.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

1. Un paciente de 43 años es diagnosticada de artritis reumatoide. El tratamiento de primera línea es:

A) Indometacina
B) Metotrexato
C) Prednisona
D) Ciclofosfamida
E) Paracetamol

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

2. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es menos probable de encontrar en un paciente con artritis reumatoide?

A) Nódulos reumatoídeos
B) Derrame pleural
C) Nefritis
D) Anemia
E) Miocarditis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

3. El tratamiento de elección de la artritis reumatoide es:

A) Paracetamol
B) AINES
C) Prednisona
D) Metotrexato
E) Prednisona + ciclofosfamida

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

4. Una paciente de 40 años presenta dolor en las manos desde hace 3 meses. Refiere marcada rigidez articular, que dura cerca de una hora. Al examen físico se aprecia artritis de ambas muñecas y de varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, de manera bilateral. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

A) Paracetamol
B) Prednisona
C) Ciclofosfamida + corticoides
D) Alopurinol más AINEs
E) Metotrexato

Más preguntas online de Artritis Reumatoide →

9.8. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.014 1.11.4.003

¿POR QUÉ?

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es el prototipo de enfermedad autoinmune multisistémica. En Chile es una patología garantizada por el GES. El EUNACOM pone a prueba de forma sistemática el criterio de entrada de los criterios EULAR/ACR 2019 (ANA ≥ 1:80), la interpretación de los anticuerpos específicos (Anti-dsDNA y Anti-Smith), el rol de los niveles de complemento (C3 y C4) como marcador de actividad y el uso mandatorio de hidroxicloroquina en todo paciente.

1. INMUNOPATOGENIA, EPIDEMIOLOGÍA Y FENÓMENOS GATILLANTES

El LES se caracteriza por la pérdida de la autotolerancia frente a antígenos intracelulares nucleares y citoplasmáticos. El defecto primario involucra una **depuración deficiente de las células apoptóticas**: el material nuclear queda expuesto a las células dendríticas plasmocitoides, las cuales secretan grandes cantidades de **Interferón alfa (firma de interferón)**. 1.11.1.014

Los linfocitos B autorreactivos producen autoanticuerpos dirigidos contra complejos ADN-histonas y ribonucleoproteínas (Anti-dsDNA, Anti-Smith, Anti-Ro, Anti-La). Estos autoanticuerpos forman **inmunocomplejos circulantes que precipitan en endotelios y membranas basales** (glomérulo renal, piel, pleura, pericardio, articulaciones), activando la vía clásica del complemento con atracción masiva de neutrófilos y daño tisular inflamatorio severo.

Epidemiología: El 90% de los pacientes son **mujeres en edad fértil (15 a 45 años)** (relación mujer:hombre de 9:1). Los estrógenos amplifican la respuesta autoinmune.

Factores gatillantes de brotes de actividad lúpica: **Radiación ultravioleta (UVB)** (induce apoptosis de queratinocitos y liberación masiva de autoantígenos), infecciones bacterianas o virales (EBV, CMV), estrés físico/emocional y fluctuaciones hormonales (embarazo y puerperio).

2. CRITERIOS CLASIFICATORIOS EULAR/ACR 2019 (EL NUEVO ESTÁNDAR)

Para clasificar a un paciente con LES según el consenso internacional EULAR/ACR 2019 se deben cumplir dos fases obligatorias: 1.11.1.014

Fase 1: Criterio de Entrada Único y Mandatorio:

• **Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos por inmunofluorescencia indirecta en células HEp-2 en título ≥ 1:80** (o técnica equivalente positiva). 1.11.1.014 1.11.4.003

Regla de Oro: Si los ANA son negativos, **el paciente NO puede clasificarse como LES** (sensibilidad > 98%). Si los ANA son positivos, se pasa a evaluar los dominios adicionales.

Fase 2: Sistema de Dominios Ponderados (Se requiere un puntaje ≥ 10 puntos): 1.11.1.014

Solo se cuenta el criterio de mayor puntaje dentro de cada dominio:

• *Dominio Constitucional:* Fiebre inexplicada > 38.3 °C (2 puntos).

• *Dominio Hematológico:* Leucopenia < 4.000/mm³ (3 pts), Trombocitopenia < 100.000/mm³ (4 pts), Anemia hemolítica autoinmune con Coombs directo (+) (4 pts).

• *Dominio Neuropsiquiátrico:* Delirium (2 pts), Psicosis (3 pts), Convulsiones (5 pts).

• *Dominio Mucocutáneo:* Alopecia no cicatricial (2 pts), Úlceras orales indoloras (2 pts), Lupus cutáneo subagudo o discoide (4 pts), Lupus cutáneo agudo / **Eritema malar en alas de mariposa que respeta los surcos nasogenianos** (6 pts). **(ver Imagen 9.8A y B)**



Úlcera oral en el lupus eritematoso sistémico

• *Dominio Serositis:* Derrame pleural o pericárdico o pericarditis aguda clínica (5 pts).

• *Dominio Musculoesquelético:* Afectación articular (sinovitis en ≥ 2 articulaciones o rigidez matinal > 30 min en ≥ 2 art) (6 pts). La artropatía lúpica clásica es la **Artropatía de Jaccoud**: deformidades articulares marcadas en manos que son **reducibles pasivamente y NO presentan erosiones óseas en la radiografía**. **(ver Imagen 9.8C)**



Artropatía de Jaccoud

• *Dominio Renal:* Proteinuria > 0.5 g/24 horas (4 pts), Biopsia renal con nefritis lúpica Clase II o V (8 pts), Biopsia renal con nefritis Clase III o IV (10 pts).

• *Dominio Anticuerpos Antifosfolípidos:* Anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o anti-beta-2-glicoproteína I positivos (2 pts). 1.11.1.014 1.11.4.003

• *Dominio Proteínas del Complemento:* C3 bajo O C4 bajo (3 pts); C3 bajo Y C4 bajo (4 pts).

• *Dominio Anticuerpos Específicos:* Anticuerpos **Anti-dsDNA positivos O Anti-Smith (Anti-Sm) positivos** (6 pts).

TABLA 9.8.A · SIGNIFICADO CLÍNICO DE LOS AUTOANTICUERPOS EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 1.11.1.014, 1.11.4.003

ANTICUERPO	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD	CORRELACIÓN CLÍNICA Y UTILIDAD
ANA (Antinucleares)	> 98%	~80%	Criterio de entrada obligatorio; excelente valor predictivo negativo
Anti-dsDNA (Doble hebra)	60 – 70%	> 95%	Marcador de actividad lúpica y predictor directo de Nefritis Lúpica
Anti-Smith (Sm)	20 – 30%	> 99%	El más específico de LES; confirma diagnóstico indudable
Anti-Ro (SSA)	30 – 40%	Inespecífico	Lupus cutáneo subagudo, fotosensibilidad y Bloqueo AV congénito neonatal
Anti-La (SSB)	15 – 20%	Inespecífico	Suele coexistir con Anti-Ro; menor riesgo de nefritis
Anti-Histona	50 – 70%	Baja en LES	Positivo en > 95% del Lupus Inducido por Drogas (fármacos)
Anti-RNP (U1-RNP)	30%	Inespecífico	Típico de Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) y fenómeno de Raynaud

9.8. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PERFIL DE AUTOANTICUERPOS Y SU UTILIDAD CLÍNICA

1.11.1.014
1.11.4.003

• **ANA (Antinucleares):** Sensibilidad altísima (> 98%), pero baja especificidad (especificidad ~80-85%). Ideales para tamizaje de descarte.

• **Anti-dsDNA (ADN de doble hebra):** Especificidad sobresaliente (> 95%). Se correlaciona directamente con la **actividad de la enfermedad** y con el desarrollo de **nefritis lúpica proliferativa**. Títulos en ascenso predicen un brote inminente.

• **Anti-Smith (Anti-Sm):** Es el autoanticuerpo **MÁS ESPECÍFICO de LES (> 99%)**. Su presencia confirma el diagnóstico sin dudas, aunque su sensibilidad es de solo 20-30%. No suele variar con la actividad.

• **Anti-Ro (SSA) y Anti-La (SSB):** Asociados a lupus cutáneo subagudo, fotosensibilidad extrema y riesgo de **lupus neonatal con bloqueo cardíaco congénito**.

• **Niveles de Complemento (C3 y C4):** Durante los brotes inflamatorios sistémicos y renales, la activación masiva de la cascada consume complemento. El hallazgo de **C3 y C4 disminuidos** es el mejor marcador biológico de actividad lúpica aguda junto al Anti-dsDNA elevado.



A. ERITEMA MALAR **B.** ÚLCERAS ORALES DEL LUPUS **C.** RX DE MANO SIN EROSIONES

Imagen 9.8

FIGURA 9.8 · ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS CLASIFICATORIOS EULAR/ACR 2019 EN LES




TABLA 9.8.B · MONITOREO BIOLÓGICO DE BROTE DE ACTIVIDAD EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO CRITERIOS DE GRAVEDAD

MARCADOR DE LABORATORIO	COMPORTAMIENTO EN REMISIÓN	COMPORTAMIENTO EN BROTE ACTIVO	INTERPRETACIÓN CLÍNICA
Títulos de Anti-dsDNA	Negativos o títulos basales bajos	Aumento marcado de títulos (> 2 a 3 veces)	Activación autoinmune sistémica con riesgo renal
Niveles de Complemento C3	Normales (90 – 180 mg/dL)	Disminuidos (< 80-90 mg/dL)	Consumo activo por formación de inmunocomplejos
Niveles de Complemento C4	Normales (10 – 40 mg/dL)	Disminuidos (< 10 mg/dL)	Consumo por activación de la vía clásica
Sedimento Urinario	Limpio, sin proteinuria	Cilindros hemáticos, hematuria dismórfica	Sospecha inminente de Nefritis Lúpica Proliferativa
Hemograma	Parámetros estables	Linfopenia (<1.000), leucopenia, trombocitopenia	Compromiso hematológico autoinmune activo

9.8. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO BASAL: LA REGLA DE LA HIDROXICLOROQUINA

Regla de Oro en Manejo de LES EUNACOM: 1.11.1.014

Todo paciente con diagnóstico confirmado de Lupus Eritematoso Sistémico **DEBE recibir Hidroxicloroquina (HCQ) de forma indefinida**, salvo contraindicación formal oftalmológica comprobada.

• **Dosificación de Hidroxicloroquina:** Dosis máxima de **≤ 5 mg/kg de peso real al día** (típicamente 200 a 400 mg/día vía oral).

• **Beneficios Demostrados:** Reduce drásticamente la frecuencia y gravedad de los brotes clínicos, previene la progresión a daño renal irreversible, disminuye los eventos trombóticos arteriales y venosos, mejora el perfil lipídico y **reduce la mortalidad global a largo plazo**.

• **Seguridad Oftalmológica:** El riesgo de maculopatía tóxica en ojo de buey es sumamente bajo (< 1%) en los primeros 5 años a dosis correctas. Se exige un examen oftalmológico basal (campo visual computarizado 10-2 y tomografía de coherencia óptica OCT) y luego controles anuales a partir del quinto año de uso.

• **Fotoprotección Rigurosa:** Bloqueador solar FPS ≥ 50 diario cada 3-4 horas, ropa protectora y evitar la exposición solar directa.

• **Manejo de Brotes Leves/Moderados:** Corticoides a dosis bajas a intermedias (Prednisona 5 a 20 mg/día) y AINEs de forma transitoria para artralgias o serositis leve.

TABLA 9.8.C · ESTRATEGIA TERAPÉUTICA GENERAL EN LES SEGÚN SEVERIDAD DE ÓRGANO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

NIVEL DE SEVERIDAD	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	ESQUEMA FARMACOLÓGICO RECOMENDADO	OBJETIVO CLÍNICO
Basal (Todos los pacientes)	Cualquier estadio o remisión	Hidroxicloroquina ≤ 5 mg/kg/día + Fotoprotección FPS 50+	Prevención de brotes y disminución de mortalidad
Leve	Artralgias, eritema malar, astenia	HCQ + Prednisona dosis baja (≤ 7.5 mg/d) o AINEs ciclos cortos	Control sintomático y ahorro de corticoides
Moderado	Artritis franca, pleuropericarditis, plaquetas 50k-100k	HCQ + Prednisona 0.5 mg/kg/d + Azatioprina o Metotrexato	Inducción de remisión sin toxicidad glucocorticoidea
Severo / Órgano Vital	Nefritis lúpica, convulsiones, hemorragia alveolar	Pulsos Metilprednisolona EV + Micofenolato o Ciclofosfamida	Rescate de órgano vital y supervivencia inmediata

9.8. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES))

- El criterio de entrada OBLIGATORIO según EULAR/ACR 2019 es ANA (+) ≥ 1:80 en células HEp-2.
- El eritema malar lúpico se caracteriza patognomónicamente por RESPETAR los surcos nasogenianos.
- El Anti-dsDNA se correlaciona directamente con la actividad inflamatoria y el riesgo de nefritis lúpica.
- La Artropatía de Jaccoud en el lupus es una deformidad articular reductible pasivamente que NO produce erosiones.
- Si los ANA son negativos por técnica estándar, el paciente NO puede clasificarse como LES.
- El Anti-Smith (Sm) es el anticuerpo MÁS ESPECÍFICO de LES (> 99%).
- El descenso conjunto de C3 y C4 (hipocomplementemia) traduce consumo por brote lúpico activo.
- La Hidroxicloroquina está indicada en el 100% de los pacientes con LES de forma indefinida para reducir mortalidad.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.8

Mujer de 26 años consulta por fatiga progresiva, artralgias difusas en manos y rodillas de 3 meses y erupción en la cara tras exponerse al sol en la playa. Al examen físico destaca eritema maculopapular eritematoso sobre el dorso nasal y ambas mejillas, que respeta nítidamente los surcos nasogenianos. En el paladar duro se observan dos úlceras superficiales no dolorosas. Laboratorio: hemoglobina 10.4 g/dL, leucocitos 3.200/mm³ con 850 linfocitos/mm³, plaquetas 110.000/mm³. Los ANA resultan positivos en título 1:640 con patrón homogéneo difuso.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta un Lupus Eritematoso Sistémico florido: cumple el criterio de entrada EULAR/ACR 2019 (ANA ≥ 1:80 con título 1:640) y suma múltiples dominios ponderados: eritema malar agudo (6 pts), úlceras orales indoloras (2 pts), leucopenia/linfopenia (3 pts), trombocitopenia (4 pts) y artralgias/artritis (6 pts), totalizando más de 20 puntos (corte ≥ 10). Debe confirmarse e incorporarse de inmediato al programa GES para inicio formal de Hidroxicloroquina a dosis de 5 mg/kg/día, corticoides orales a dosis intermedias y estudio renal preventivo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.8 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.4.003

1. ¿Qué anticuerpo es más sensible para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico?

A) Anti-DNA de una hebra
B) Anti-DNA de dos hebras
C) Anti-Sm
D) Anti-nucleares
E) Anti-citoplasma de neutrófilo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

2. Una paciente de 30 años consulta por eritema de la cara, sobre el dorso de la nariz y los pómulos, que respeta el surco nasolabial y que suele aparecer luego de la exposición solar. El diagnóstico más probable es:

A) Dermatomiositis
B) Esclerodermia
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Lupus discoide
E) Arteritis de Wegener

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

3. En una paciente de 25 años de edad, sin antecedentes mórbidos, que consulta por un cuadro de tres semanas de evolución, caracterizado por compromiso del estado general, fiebre continua, erupción cutánea nasogeniana, alopecía, fenómeno de Raynaud, poliartralgias y derrame pleural, su primera hipótesis diagnóstica es:

A) Esclerosis Sistémica Progresiva
B) Lupus Eritematoso Sistémico
C) Artritis Reumatoidea
D) Vasculitis
E) Síndrome de Sobreposición

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

4. Una mujer de 35 años presenta astenia, adinamia, fiebre intermitente, artralgias y caída del cabello, de 3 semanas de evolución. Al examen se aprecia en buenas condiciones, con signos vitales normales. En en paladar blando se observan 2 úlceras de cerca de 5 mm cada una. Se solicitan exámenes generales, con los siguientes resultados: Hematocrito: 34%; VCM: 30 fl; glóbulos blancos: 4.600 x mm3; neutrófilos: 78%; monocitos: 9%; linfocitos: 13%; plaquetas: 70.000 x mm3; VHS: 44 mm/h; creatinina plasmástica: 2,2 mg/dl; BUN: 28 mg/dl;s hepáticas normales. El diagnóstico más probable es:

A) Infección por CMV
B) Infección por VIH
C) Leucemia aguda
D) Linfoma
E) Lupus sistémico

Más preguntas online de Lupus Eritematoso Sistémico →

9.9. Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.006 1.11.1.014

¿POR QUÉ?

La nefritis lúpica es la principal causa de morbimortalidad en pacientes con LES. Hasta el 50% de los pacientes lúpicos desarrollan compromiso renal durante el curso de su enfermedad. El EUNACOM evalúa con alta frecuencia la indicación de biopsia renal frente a proteinuria o sedimento urinario activo, el reconocimiento de la Clase IV (proliferativa difusa) como la más agresiva y el esquema de rescate con pulsos de metilprednisolona y micofenolato mofetilo.

1. FISIOPATOLOGÍA RENAL Y MECANISMOS DE DAÑO GLOMERULAR

La nefritis lúpica se origina por el **depósito de inmunocomplejos circulantes ADN-anti-ADN** en las distintas estructuras del glomérulo, o por la unión in situ de autoanticuerpos a antígenos plantados en la membrana basal glomerular. 1.09.1.006

La localización del depósito determina el patrón histopatológico y clínico:

• **Depósitos Subendoteliales:** Producen inflamación vascular directa en contacto con la sangre, activación masiva del complemento, reclutamiento masivo de neutrófilos y proliferación celular endocapilar severa (patrón **proliferativo: Clases III y IV**), cursando con síndrome nefrítico, hematuria con cilindros hemáticos, falla renal rápida e hipocomplementemia intensa.

• **Depósitos Subepiteliales:** Localizados entre la membrana basal y los podocitos (fuera de la circulación directa). Provocan daño podocitario y alteración de la barrera de filtración con proteinuria masiva (patrón **membranoso: Clase V**), cursando con síndrome nefrótico puro sin proliferación celular acusada.

2. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA INTERNACIONAL ISN/RPS (2004/2018)

La **biopsia renal percutánea es obligatoria** ante: proteinuria persistente ≥ 0.5 g/24 horas (o relación proteinuria/creatininuria en orina aislada ≥ 0.5 mg/mg), sedimento urinario activo (≥ 5 hematíes por campo de origen glomerular, acantocitos o cilindros hemáticos) o deterioro inexplicable de la función renal. **(ver Imagen 9.9)** 1.09.1.006

Las 6 Clases Histológicas de la ISN/RPS:

• **Clase I (Mesangial mínima):** Glomérulos normales en microscopía óptica con depósitos mesangiales en inmunofluorescencia. Rara, asintomática, excelente pronóstico.

• **Clase II (Proliferativa mesangial):** Hipercelularidad mesangial pura. Microhematuria y proteinuria leve (< 1 g/24h). No requiere inmunosupresión agresiva.

• **Clase III (Proliferativa focal):** Proliferación endo o extracapilar que afecta a **< 50% de los glomérulos**. Síndrome nefrítico/nefrótico.

• **Clase IV (Proliferativa difusa):** La forma **MÁS FRECUENTE (40-50%), MÁS GRAVE Y DE PEOR PRONÓSTICO**. Compromete a **≥ 50% de los glomérulos**. Se observan asas capilares engrosadas en *asa de alambre (wire-loop)*, necrosis fibrinoide, semilunas celulares y trombos hialinos. Cursa con síndrome nefrítico-nefrótico severo, hipertensión arterial grave, falla renal aguda, títulos elevados de Anti-dsDNA y marcada caída de C3 y C4. Sin tratamiento progresa rápidamente a uremia terminal. 1.09.1.006 1.11.1.014

• **Clase V (Membranosa):** Engrosamiento difuso de la pared capilar con depósitos subepiteliales continuos. Cursa con **síndrome nefrótico florido puro** (edema masivo, hipoalbuminemia, dislipidemia) y alto riesgo de trombosis venosa profunda o de la vena renal. Complemento frecuentemente normal o levemente bajo. 1.09.1.006

• **Clase VI (Esclerosante avanzada):** Esclerosis de ≥ 90% de los glomérulos. Insuficiencia renal crónica terminal que requiere diálisis; no responde a inmunosupresores.

TABLA 9.9.A · CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA ISN/RPS DE NEFRITIS LÚPICA Y MANEJO CLÍNICO 1.09.1.006, 1.11.1.014

CLASE HISTOLÓGICA	PATOLOGÍA RENAL DOMINANTE	PRESENTACIÓN CLÍNICA TÍPICA	ESQUEMA TERAPÉUTICO DE ELECCIÓN
Clase I (Mesangial mínima)	Glomérulos normales en MO; depósitos mesangiales en IF	Sedimento normal o microhematuria leve	Manejo basal con Hidroxicloroquina
Clase II (Proliferativa mesangial)	Hipercelularidad mesangial pura	Microhematuria y proteinuria < 1 g/24h	Corticoides orales solo si síntomas extrarenales
Clase III (Proliferativa focal)	Proliferación endo/extracapilar en < 50% de glomérulos	Síndrome nefrítico, proteinuria, hipertensión	Pulsos Metilprednisolona + Micofenolato o Ciclofosfamida
Clase IV (Proliferativa difusa)	Proliferación en ≥ 50% glomérulos; asas en alambre	Síndrome nefrítico-nefrótico severo, falla renal aguda	Pulsos Metilprednisolona + MMF (2-3g/d) o Ciclofosfamida
Clase V (Membranosa)	Depósitos subepiteliales; engrosamiento de pared	Síndrome nefrótico florido puro, riesgo de TVP	Prednisona + Micofenolato o Tacrolimus + IECA/ARA-II
Clase VI (Esclerosante avanzada)	Esclerosis global en ≥ 90% de los glomérulos	Insuficiencia renal crónica avanzada, uremia	Preparación para Terapia de Reemplazo Renal / Diálisis

9.9. Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN DE LA REMISIÓN (CLASES PROLIFERATIVAS III Y IV)

El objetivo en las formas proliferativas activas (Clases III y IV) es frenar de inmediato la inflamación necrotizante para evitar la fibrosis irreversible: 1.09.1.006

Esquema de Inducción Inmunosupresora:

1. **Glucocorticoides a Dosis Altas:**

• Inicio con **Pulsos de Metilprednisolona endovenosa: 500 a 1.000 mg/día por 3 días consecutivos**.

• Seguido de **Prednisona oral: 0.5 a 1 mg/kg/día** (típicamente 40-60 mg/día) con pauta de descenso progresivo rápido semanal hasta alcanzar dosis de mantención ≤ 5-7.5 mg/día a los 3-6 meses.

2. **Inmunosupresor Mayor Concomitante (Elegir una de dos opciones):**

• **Micofenolato Mofetilo (MMF):** Dosis: **2 a 3 g/día vía oral** divididos en 2 tomas. Es el fármaco de **primera elección** en la actualidad por su excelente tasa de remisión, menor toxicidad gonadal y mayor eficacia en pacientes no caucásicos e hispanos.

• **Ciclofosfamida Endovenosa:** Esquema Euro-Lupus (dosis bajas: 500 mg EV cada 2 semanas por 6 dosis = 3 meses) o esquema clásico NIH (dosis altas mensuales: 0.5 a 1 g/m² EV mensual por 6 meses). De elección ante compromiso renal rápidamente progresivo con semilunas masivas o compromiso neurológico concomitante. *Toxicidad:* cistitis hemorrágica (prevenir con hidratación y Mesna), infertilidad/falla ovárica precoz y neoplasias secundarias.

3. **Terapias Coadyuvantes Obligatorias:** Hidroxicloroquina en todos los pacientes, IECA o ARA-II (enalapril/losartán) para control estricto de PA (< 120-130/80 mmHg) y reducción de proteinuria, estatinas para dislipidemia y profilaxis contra *Pneumocystis jirovecii* con Cotrimoxazol durante la inmunosupresión profunda. 1.09.1.006 1.11.1.014



HEMATÍES DISMÓRFICOS

Imagen 9.9

FIGURA 9.9 · ALGORITMO DE NEFRITIS LÚPICA: BIOPSIA RENAL CLASIFICATORIA E INDUCCIÓN CON PULSOS




TABLA 9.9.B · INDICACIONES FORMALES DE BIOPSIA RENAL EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO CLÍNICO / URINARIO	PUNTO DE CORTE / CRITERIO FORMAL	URGENCIA DEL PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DE LA BIOPSIA
Proteinuria Aislada	Proteinuria ≥ 0.5 g/24h (o IPC ≥ 0.5 mg/mg)	Programada prioritaria (< 1-2 semanas)	Diferenciar Clase V membranosa de proliferativas
Sedimento Urinario Activo	Hematuria glomerular (≥ 5 hematíes/campo o cilindros hemáticos)	Urgente (< 48-72 horas)	Confirmar proliferación activa endocapilar y necrosis
Deterioro de Función Renal	Alza aguda de creatinina no explicada por deshidratación	Urgente inmediata (< 24-48 horas)	Detectar semilunas extracapilares y rescatar parénquima
Refractariedad Terapéutica	Persistencia de proteinuria > 1-2 g tras 6-12 meses de terapia	Electiva	Evaluar índice de actividad vs índice de cronicidad

9.9. Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TERAPIA DE MANTENIMIENTO DE LA REMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO

Una vez alcanzada la remisión parcial o completa (habitualmente a los 6 meses): 1.09.1.006

• Fármaco de primera elección: **Micofenolato Mofetilo (1 a 2 g/día vía oral)**.

• Alternativa: **Azatioprina (2 mg/kg/día oral)**, de elección obligada si la paciente planea embarazo (el micofenolato es teratogénico y debe suspenderse al menos 6 semanas antes de la concepción).

• Se asocian dosis bajas de Prednisona (2.5 a 5 mg/día) y se mantiene Hidroxicloroquina. 1.09.1.006 1.11.1.014

• **Duración de la mantención:** Mínimo **3 a 5 años de tratamiento continuo** antes de considerar una reducción muy lenta y tentativa de la inmunosupresión. 1.09.1.006

5. COMPROMISO ORGÁNICO MAYOR EXTRARRENAL DEL LES: NEUROPSIQUIÁTRICO, HEMATOLÓGICO Y CARDIOPULMONAR

Lupus neuropsiquiátrico y compromiso hematológico: el LES neuropsiquiátrico se manifiesta con **convulsiones, psicosis, síndrome confusional agudo, accidente cerebrovascular** (asociado a anticuerpos antifosfolípidos), mielitis transversa, neuropatía periférica, corea o cefalea refractaria. Antes de atribuirlo al lupus hay que excluir infección del SNC, uremia, hipertensión, alteraciones metabólicas y fármacos (la psicosis esteroidal es frecuente). El estudio incluye resonancia cerebral, punción lumbar, EEG y anticuerpos antifosfolípidos. En lo hematológico, el LES puede producir **anemia hemolítica autoinmune** (Coombs directo positivo, reticulocitos y LDH elevados, haptoglobina baja), **trombocitopenia inmune** (riesgo hemorrágico con plaquetas < 30.000/mm³ o sangrado: prednisona 1 mg/kg/día, a veces inmunoglobulina endovenosa) y leucopenia o linfopenia (muy frecuentes, rara vez requieren tratamiento). Ante plaquetopenia con anemia y esquistocitos se debe descartar una microangiopatía trombótica (púrpura trombocitopénica trombótica, SAF catastrófico). 1.11.1.014

Compromiso cardiopulmonar y principios de tratamiento del órgano mayor: la **serositis** (pleuritis y pericarditis) es la manifestación torácica más frecuente y responde a AINEs o prednisona en dosis moderadas; el derrame pleural es exudado con glucosa normal o baja. Son graves la **neumonitis lúpica aguda** y la **hemorragia alveolar difusa** (hemoptisis, anemia, infiltrados bilaterales; emergencia con alta mortalidad), la hipertensión pulmonar, la miocarditis y la endocarditis verrucosa de Libman-Sacks (asociada a SAF); el LES además acelera la ateroesclerosis. En la afección digestiva destacan la vasculitis mesentérica y la peritonitis lúpica (dolor abdominal con elevación de reactantes). **Regla general:** en el compromiso de un órgano mayor (riñón, SNC, hemólisis grave, trombocitopenia grave, hemorragia alveolar) se hospitaliza al paciente, se indican **pulsos de metilprednisolona** (500-1.000 mg/día por 3 días) seguidos de prednisona más un inmunosupresor (ciclofosfamida, micofenolato o rituximab según el órgano) y se mantiene la hidroxicloroquina; en el compromiso leve (piel, articulaciones) bastan hidroxicloroquina, fotoprotección y prednisona en dosis bajas. Todo LES con afección orgánica mayor se **deriva** a reumatología.

TABLA 9.9.C · ESQUEMA DE INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN NEFRITIS LÚPICA PROLIFERATIVA (CLASE III/IV) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL PROTOCOLO	FÁRMACOS Y DOSIFICACIÓN	DURACIÓN ESTIMADA	MONITOREO DE RESPUESTA
Inducción Aguda (Semana 1)	Pulsos Metilprednisolona EV 500-1000 mg/d x 3 días + MMF 2-3 g/d	1 semana	Control de PA, glicemia, balance hídrico y creatinina
Inducción Continuada (Meses 1-6)	Prednisona oral 0.5-1 mg/kg/d (descenso gradual) + MMF 2-3 g/d	6 meses	Proteinuria de 24h, sedimento urinario, C3/C4 y Anti-dsDNA
Mantenimiento (Años 1-5)	Micofenolato 1-2 g/d (o Azatioprina 2mg/kg/d) + Prednisona ≤ 5mg/d	3 a 5 años mínimo	Creatinina sérica y proteinuria cada 2-3 meses
Terapia Adyuvante Universal	Hidroxicloroquina ≤ 5 mg/kg/d + Enalapril/Losartán + Cotrimoxazol	Indefinida	Fondo de ojo anual tras 5 años; PA < 120/80

9.9. Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NEFRITIS LÚPICA Y COMPROMISO ORGÁNICO MAYOR EN LES)

- La nefritis lúpica afecta hasta al 50% de los pacientes con LES y es su principal causa de morbimortalidad.
- La Clase IV (Proliferativa Difusa) es la más frecuente, más agresiva y de peor pronóstico si no se trata a tiempo.
- La Clase V (Membranosa) cursa con síndrome nefrótico puro con alto riesgo trombótico.
- El Micofenolato Mofetilo es el inmunosupresor de primera línea para inducción y mantenimiento.
- La biopsia renal es el patrón de oro y está indicada formalmente ante proteinuria ≥ 0.5 g/24h o sedimento activo.
- La Clase IV cursa típicamente con sedimento activo (cilindros hemáticos), hipocomplementemia severa y anti-dsDNA elevado.
- El tratamiento de inducción de nefritis proliferativa requiere pulsos de Metilprednisolona EV + Micofenolato Mofetilo (o Ciclofosfamida).
- La terapia de mantenimiento debe prolongarse por un mínimo estricto de 3 a 5 años.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.9

Mujer de 24 años con antecedente de LES diagnosticado hace 1 año en tratamiento irregular con hidroxicloroquina. Consulta por edema progresivo de extremidades inferiores hasta rodillas, orinas espumosas y cefalea. Al examen físico destaca PA 160/100 mmHg, edema pretibial +++ con fóvea, y eritema malar tenue. Los exámenes de laboratorio revelan: creatinina plasmática 1.9 mg/dL (basal de 0.8 mg/dL hace 4 meses), nitrógeno ureico 38 mg/dL, albúmina sérica 2.4 g/dL. El examen de orina muestra proteinuria de 3.8 g/24 horas y sedimento con 30-40 glóbulos rojos dismórficos por campo y cilindros hemáticos. El complemento C3 está en 42 mg/dL y el Anti-dsDNA fuertemente positivo.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta una Nefritis Lúpica proliferativa activa grave (síndrome nefrítico-nefrótico con deterioro agudo de función renal e hipertensión severa). La conducta diagnóstica de elección e inmediata es la realización de una biopsia renal percutánea para clasificar el daño (altamente sospechosa de Clase IV proliferativa difusa). El tratamiento de inducción urgente consiste en hospitalización, administración de pulsos de Metilprednisolona endovenosa (500 a 1.000 mg/día por 3 días) asociados a Micofenolato Mofetilo a dosis plenas (2-3 g/día) o Ciclofosfamida EV, más control riguroso de la presión arterial y soporte nefrológico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

1. Una paciente de 20 años consulta por fiebre, astenia, artralgias y hematuria. Al examen físico se aprecia artritis de manos, sin otras alteraciones. En sus exámenes generales destaca elevación de la creatinina hasta 2,1 mg/dl y hematuria dismórfica. El diagnóstico más probable es:

A) Esclerodermia
B) Crioglobulinemia
C) Poliangeítis microscópica
D) Lupus
E) Artritis reumatoide

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.1.006

2. Un hombre de 68 años, diabético tipo 2, en tratamiento con dieta desde hace 10 años, presenta astenia y edema de extremidades inferiores. El examen físico no presenta otras alteraciones. Se solicitan exámenes que constatan un clearence de creatinina de 30 ml/min, BUN: 50 mg/dl, proteinuria de 24 horas de 1,2 gramos, sedimento de orina con 0-2 glóbulos rojos por campo, sin leucocituria, albuminemia de 4,2 g/dl, HbA1c: 8% y perfil lipídico con 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion/ 4/9 hipercolesterolemia. El diagnóstico más probable es:

A) Nefropatía diabética
B) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
C) Glomeruloesclerosis difusa
D) Glomerulopatía membranosa
E) Nefritis intersticial

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.1.006

3. Un niño de 6 años presenta un cuadro caracterizado por orinas espumosas y aumento de volumen facial, especialmente en los párpados. Al examen físico se aprecia edema facial y de extremidades, presión arterial normal, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 0,6 mg/dl, proteinuria de 100 mg/m2/hora, albuminemia: 2,8 g/dl, elevación del colesterol, sedimento de orina normal, ANA negativos, ANCA negativos y complemento normal. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar furosemida
B) Iniciar prednisona
C) Iniciar enalapril
D) Realizar biopsia renal
E) Observar evolución

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.1.006

4. Un paciente de 67 años consulta por artralgias y fiebre de 3 días de evolución, asociados a hematuria y oliguria importante. En sus exámenes generales se aprecia hematuria dismórfica, elevación de la creatinina hasta 3,5 mg/dl, anticuerpos antinucleares negativos y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:

A) Poliangeítis microscópica
B) Panarteritis nodosa
C) Vasculitis granulomatosa de Wegener
D) Vasculitis alérgica de Churg-Strauss
E) Arteritis de la temporal Respuestas: Prueba 13 Diabetes y Nutrición + Reumatología Preguntas Respuestas 1 C 2 E 3 C 4 A 5 E 6 A 7 C 8 B 9 D 10 E - 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6 11 E P1re2paración EUNACOM C 13 B 14 B 15 B 16 D 17 E 18 B 19 C 20 A Todos los Derechos Reservados para DrGuevara 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6

Más preguntas online de Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES →

9.10. Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.016 1.11.1.014

¿POR QUÉ?

Las formas cutáneas de lupus y el lupus farmacológico constituyen motivos recurrentes de preguntas en EUNACOM. Se debe distinguir el lupus discoide (que deja cicatriz atrófica permanente y rara vez se asocia a compromiso visceral) del lupus cutáneo subagudo (asociado a Anti-Ro y fotosensibilidad sin cicatriz). Asimismo, el lupus inducido por drogas destaca por sus anticuerpos anti-histona y el respeto absoluto del riñón y sistema nervioso central.

1. LUPUS ERITEMATOSO CUTÁNEO CRÓNICO DISCOIDE (LECD)

Es la variante cutánea crónica más común. Se presenta predominantemente en áreas fotoexpuestas de la cabeza y cuello (mejillas, dorso nasal, orejas y cuero cabelludo). 6.01.1.016

Morfología de la lesión discoide clásica: Placa eritematosa redondeada bien delimitada con tres zonas concéntricas: 1) Borde eritematoso activo ligeramente sobreelevado con telangiectasias; 2) Escama hiperqueratósica adherente que al desprenderse muestra pequeñas prolongaciones espinosas (*signo de la tachuela o taponamiento folicular*); y 3) Centro atrófico hipopigmentado o despigmentado con pérdida de anejos.

Riesgo de Alopecia: En el cuero cabelludo provoca **alopecia cicatricial irreversible** con destrucción definitiva de los folículos pilosos.

Evolución Sistémica: Solo un 5% a 10% de los pacientes con lupus discoide aislado evolucionan a LES sistémico. Los ANA suelen ser negativos o a títulos bajos (positivos en solo 30-40%). **(ver Imagen 9.10A)** 6.01.1.016 1.11.1.014

Tratamiento: Fotoprotección estricta FPS 50+, corticoides tópicos de alta potencia (clobetasol) o intralesionales (triamcinolona), e **Hidroxicloroquina oral (200-400 mg/día)** en casos extensos o refractarios. 6.01.1.016

2. LUPUS ERITEMATOSO CUTÁNEO SUBAGUDO (LCES)

Se manifiesta como una erupción cutánea extraordinariamente fotosensible, distribuida en zonas expuestas al sol: escote (área en V), parte superior de la espalda, hombros y superficies extensoras de brazos, **respetando típicamente la cara**.

Existen dos variantes morfológicas: **anular policíclica** (placas eritematosas circulares con aclaramiento central) y **papuloescamosa / psoriasiforme**.

Diferencia Crítica con el Discoide: Las lesiones del lupus subagudo curan **SIN dejar cicatriz atrófica ni alopecia definitiva**, aunque pueden dejar despigmentación vitiliginosa transitoria. **(ver Imagen 9.10B)**

Serología e Implicancia Neonatal: Presenta una asociación abrumadora con anticuerpos **Anti-Ro / SSA (positivos en > 70-80%)** y Anti-La / SSB (30-50%). 1.11.1.014

Lupus Neonatal: Los anticuerpos Anti-Ro maternos de clase IgG atraviesan la placenta y pueden dañar el tejido de conducción cardíaco fetal entre las semanas 16 y 24 de gestación, produciendo **Bloqueo Auriculoventricular Congénito Completo** irreversible (que requiere marcapasos definitivo al nacer), además de lesiones cutáneas lúpicas neonatales transitorias que desaparecen a los 6 meses al degradarse los anticuerpos maternos.



Lupus neonatal

3. LUPUS INDUCIDO POR DROGAS (FARMACOLÓGICO)

Síndrome autoinmune reversible gatillado por la exposición continua a determinados fármacos.

Fármacos Causales de Alto Riesgo:

- **Procainamida** (antiarrítmico clase Ia: produce lupus en 20% tras 1 año).
- **Hidralazina** (vasodilatador arterial antihipertensivo: produce lupus en 5-10% a dosis > 200 mg/d).
- Fármacos de riesgo moderado: **Isoniazida, Minociclina, Quinidina, Metildopa, Clorpromazina, Carbamazepina y Terapias Anti-TNF**.

Manifestaciones Clínicas y Diferencia Crucial con LES Idiopático:

Cursa con fiebre, astenia, artralgias o artritis simétrica, mialgias, pleuropericarditis y rash cutáneo. **REGLA DE ORO MANDATORIA EUNACOM: El lupus inducido por drogas TÍPICAMENTE RESPETA EL RIÑÓN Y EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL** (la nefritis lúpica y las convulsiones/psicosis están prácticamente ausentes). 1.11.1.014

Perfil Serológico Diagnóstico:

- **Anticuerpos Anti-Histona: Positivos en > 95% de los casos** (su negatividad hace muy improbable el origen farmacológico).
- ANA positivos en el 100%.
- **Anti-dsDNA y Anti-Smith: NEGATIVOS** (su presencia confirma LES idiopático, no farmacológico).
- Niveles de complemento C3 y C4 normales.

Manejo: La conducta de elección es la **suspensión inmediata del fármaco responsable**. Los síntomas clínicos ceden en semanas y los anticuerpos se negativizan en meses. Se pueden usar AINEs o cursos breves de corticoides en dosis bajas para acelerar el alivio sintomático.

Cómo descartar compromiso sistémico en todo paciente con lupus cutáneo: la lesión de piel puede ser la primera manifestación del LES, por lo que se interroga por artralgias, fotosensibilidad, aftas, serositis y síntomas neuropsiquiátricos y se solicitan **hemograma con plaquetas, creatinina, orina completa con relación proteinuria/creatininuria, ANA, anti-dsDNA, anti-Sm, anti-Ro/La, complemento (C3, C4) y anticuerpos antifosfolípidos**. La biopsia cutánea con inmunofluorescencia directa muestra depósito granular de inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica (banda lúpica). El riesgo de evolucionar a LES es bajo en el lupus discoide aislado (5-10%) y mayor en el lupus subagudo (cerca de la mitad cumple criterios de LES, habitualmente de curso leve). Quien tenga ANA positivos, anti-dsDNA, hipocomplementemia, citopenias o proteinuria debe ser manejado como LES (tema 9.8 y 9.9); el resto se controla al menos cada 6-12 meses con orina y hemograma. Todo lupus cutáneo se deriva a dermatología y, si hay datos sistémicos, a reumatología.



A. LUPUS DISCOIDE FACIAL



B. LUPUS SUBAGUDO ANULAR

Imagen 9.10

FIGURA 9.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LUPUS CUTÁNEO SUBAGUDO VS DISCOIDE VS INDUCIDO POR DROGAS




TABLA 9.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO VS LUPUS INDUCIDO POR DROGAS 6.01.1.016, 1.11.1.014

CARACTERÍSTICA	LUPUS SISTÉMICO (LES IDIOPÁTICO)	LUPUS INDUCIDO POR DROGAS (FARMACOLÓGICO)
Sexo predominante	Mujeres jóvenes en edad fértil (9:1)	Distribución similar en ambos sexos; mayor en adultos mayores
Compromiso renal (Nefritis)	Muy frecuente (hasta 50%), grave (Clase IV)	Excepcional / Prácticamente ausente
Compromiso neuropsiquiátrico	Frecuente (convulsiones, psicosis, delirium)	Excepcional / Prácticamente ausente
Anticuerpos Anti-Histona	Positivos en 50 – 60%	Positivos en > 95% de los casos
Anticuerpos Anti-dsDNA	Positivos en 60 – 70% (marcador de actividad)	Típicamente NEGATIVOS
Anticuerpos Anti-Smith (Sm)	Positivos en 20 – 30% (muy específico)	Típicamente NEGATIVOS
Niveles de Complemento (C3/C4)	Frecuentemente DISMINUIDOS (consumo en brotes)	Típicamente NORMALES
Evolución post-suspensión	Enfermedad crónica con brotes espontáneos	Resolución completa en pocas semanas tras retirar fármaco

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.10

Hombre de 68 años con hipertensión arterial de difícil manejo en tratamiento con Hidralazina 100 mg cada 12 horas desde hace 9 meses. Consulta por cuadro de 4 semanas de astenia, fiebre vespertina de 38 °C, dolor en muñecas y rodillas y dolor torácico de tipo pleurítico. Al examen físico se ausculta un frote pericárdico leve y artritis en interfalángicas proximales de manos. No presenta edema ni alteraciones neurológicas. Exámenes: creatinina 0.9 mg/dL, examen de orina completamente normal sin proteinuria ni hematuria. Los ANA resultan positivos en título 1:320 y los anticuerpos Anti-Histona son fuertemente positivos. El Anti-dsDNA y el Anti-Smith son negativos, y el complemento C3/C4 es normal.

Conducta oficial. El cuadro clínico y serológico es patognomónico de un Lupus Inducido por Drogas secundario a Hidralazina. Se manifiesta con artralgias, serositis (pleuropericarditis) y fiebre, con respeto absoluto de la función renal y del sistema nervioso central. La presencia de anticuerpos Anti-Histona en títulos altos (>95% de positividad) con Anti-dsDNA y Anti-Smith negativos y complemento normal confirman el diagnóstico. La conducta médica prioritaria y curativa es la suspensión inmediata de la Hidralazina, observándose remisión clínica en pocas semanas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Lupus Discoide se caracteriza por placas con hiperqueratosis, tapones foliculares y atrofia central cicatricial.
- En el cuero cabelludo, el lupus discoide provoca alopecia cicatricial permanente irreversible.
- El Lupus Cutáneo Subagudo cura SIN dejar cicatriz y se asocia intensamente a anticuerpos Anti-Ro (SSA).
- Las madres con Anti-Ro (+) tienen riesgo de tener recién nacidos con Bloqueo Auriculoventricular Congénito completo.
- El Lupus Inducido por Drogas es causado típicamente por Hidralazina, Procainamida, Isoniazida y anti-TNF.
- El Lupus Farmacológico se caracteriza por el RESPETO ABSOLUTO de riñón y sistema nervioso central.
- Los anticuerpos Anti-Histona son positivos en > 95% del lupus por drogas, mientras que Anti-dsDNA y Anti-Sm son negativos.
- El tratamiento del lupus farmacológico es la suspensión inmediata del medicamento causal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

1. El lupus inducido por drogas suele presentar:

A) Anticuerpos anti-DNA de doble hebra
B) Anticuerpos anti-proteína P
C) Anticuerpos anti-Ro
D) Anticuerpos anti-histona
E) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

2. Cuál de las siguientes asociaciones, entre marcador inmunológico y patología, es CORRECTA:

A) Anticuerpos anti-Histonas – Esclerodermia
B) Anticuerpos anti-LKM1 – Lupus por drogas
C) Anticuerpos anti-Ro – Síndrome de Sjörgren
D) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo patrón citoplasmático – Poliangeítis microscópica
E) Anticuerpos anti-Jo1 – Fibromialgia9

Más preguntas online de Lupus Cutáneo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 9.6 A 9.10

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares	La AR es una poliartritis simétrica aditiva que compromete muñecas, MCF e IFP.	**La AR RESPETA clásicamente las interfalángicas distales (IFD) y el esqueleto axial...**	—
Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES	Metotrexato es el fármaco modificador de la enfermedad (FARME) de primera línea...	**El metotrexato se prescribe SIEMPRE en dosis SEMANAL (15 a 25 mg/semana), NUNCA diaria.**	El metotrexato está absolutamente contraindicado en el embarazo por ser teratogénico y...
Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal	El criterio de entrada OBLIGATORIO según EULAR/ACR 2019 es ANA (+) ≥ 1:80 en células...	**Si los ANA son negativos por técnica estándar, el paciente NO puede clasificarse como...**	—
Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora	La nefritis lúpica afecta hasta al 50% de los pacientes con LES y es su principal causa...	**La biopsia renal es el patrón de oro y está indicada formalmente ante proteinuria ≥ 0.5...**	—
Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas	El Lupus Discoide se caracteriza por placas con hiperqueratosis, tapones foliculares y...	**En el cuero cabelludo, el lupus discoide provoca alopecia cicatricial permanente...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La AR es una poliartritis simétrica aditiva que compromete muñecas, MCF e IFP.

La AR RESPETA clásicamente las interfalángicas distales (IFD) y el esqueleto axial lumbar/dorsal.

La única región vertebral afectada por AR es la columna cervical (riesgo vital de subluxación atloaxoidea C1-C2).

Rigidez matinal prolongada mayor a 45-60 minutos es el síntoma cardinal de actividad inflamatoria.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- La AR RESPETA clásicamente las interfalángicas distales (IFD) y el esqueleto axial lumbar/dorsal.
- La única región vertebral afectada por AR es la columna cervical (riesgo vital de subluxación atloaxoidea C1-C2).
- El metotrexato se prescribe SIEMPRE en dosis SEMANAL (15 a 25 mg/semana), NUNCA diaria.
- Es obligatorio prescribir Ácido Fólico (5 a 10 mg semanales) a las 24-48 horas del MTX para reducir toxicidad digestiva y hepática.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La AR es una poliartritis simétrica aditiva que compromete muñecas, MCF e IFP.	Tema 9.6 →
Metotrexato es el fármaco modificador de la enfermedad (FARME) de primera línea indiscutido en Artritis Reumatoide.	Tema 9.7 →
El criterio de entrada OBLIGATORIO según EULAR/ACR 2019 es ANA (+) ≥ 1:80 en células HEp-2.	Tema 9.8 →
La nefritis lúpica afecta hasta al 50% de los pacientes con LES y es su principal causa de morbimortalidad.	Tema 9.9 →
El Lupus Discoide se caracteriza por placas con hiperqueratosis, tapones foliculares y atrofia central cicatricial.	Tema 9.10 →

MANUAL EUNACOM DE REUMATOLOGÍA

BLOQUE 03 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

5	17	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
9.11	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	57
9.12	Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal	62
9.13	Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto	68
9.14	Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal	73
9.15	Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)	77

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.11.1.021, 1.08.1.019	Síndrome Antifosfolípido	Específico	Inicial	Completo
1.11.1.009, 1.05.1.018, 1.05.1.021	Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.020, 1.10.1.021, 2.01.1.057	Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.009	Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal	Específico	Inicial	Completo
1.11.1.022, 6.02.1.024, 1.11.4.003	Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
17 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El SAF requiere al menos 1 criterio clínico (trombosis o morbilidad obstétrica) y 1 de laboratorio.
- Los anticuerpos deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un mínimo de 12 semanas.
- El Anticoagulante Lúpico alarga el TTPK in vitro, pero es el marcador de mayor riesgo trombótico in vivo.
- En trombosis venosa por SAF, el tratamiento de elección es Acenocumarol o Warfarina (INR 2.0 a 3.0) de por vida.
- **! TRAMPA** · Los DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) están CONTRAINDICADOS en pacientes con SAF de triple positividad.
- En SAF obstétrico sin trombosis previa, el tratamiento es AAS 100 mg/día + HBPM profiláctica (Enoxaparina 40 mg/d).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Síndrome Antifosfolípido	EUNACOM Diciembre 2024 · #149 · EUNACOM Diciembre 2019 · #54 · EUNACOM Diciembre 2019 · #55 · EUNACOM Diciembre 2017 · #51
Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa	EUNACOM Julio 2024 · #16 · EUNACOM Julio 2024 · #38 · EUNACOM Diciembre 2018 · #31 · EUNACOM Diciembre 2018 · #98
Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto	EUNACOM Julio 2025 · #78 · EUNACOM Agosto 2021 · #104 · EUNACOM Agosto 2021 · #105 · EUNACOM Diciembre 2019 · #131
Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal	EUNACOM Julio 2024 · #16 · EUNACOM Diciembre 2018 · #31 · EUNACOM Diciembre 2017 · #45
Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo	EUNACOM Julio 2025 · #114 · EUNACOM Julio 2019 · #126

9.11. Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.021 1.08.1.019

¿POR QUÉ?

El Síndrome Antifosfolípido (SAF) es una trombofilia autoinmune adquirida de alta morbilidad. El EUNACOM examina con regularidad la paradoja del Anticoagulante Lúpico (prolonga el TTPK in vitro pero causa trombosis in vivo), la necesidad estricta de confirmar los anticuerpos con 12 semanas de diferencia, el esquema obstétrico protector con AAS y heparina de bajo peso molecular, y la contraindicación formal de los nuevos anticoagulantes orales directos (DOACs) en pacientes con triple positividad.

1. FISIOPATOLOGÍA, AUTOANTICUERPOS Y PARADOJA DEL ANTICOAGULANTE LÚPICO

El SAF se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra fosfolípidos aniónicos de la membrana celular y, principalmente, contra sus proteínas plasmáticas cofactoras, destacando la **Beta-2-glicoproteína I (beta-2-GPI)** y la protrombina. **(ver Imagen 9.11)** 1.11.1.021

La unión del complejo inmune a las células endoteliales, monocitos y plaquetas induce la expresión de factor tisular, inhibe la proteína C activada y la fibrinolisis, e induce un estado protrombótico vascular generalizado con activación del complemento (C5a). En la placenta provoca trombosis de los vasos uteroplacentarios y disfunción directa del trofoblasto, llevando a pérdida fetal y preeclampsia. 1.11.1.021 1.08.1.019

Puede ser **SAF Primario** (aislado en 50%) o **SAF Secundario** (asociado a otra enfermedad autoinmune, fundamentalmente Lupus Eritematoso Sistémico en 30-40% de los pacientes con LES). 1.11.1.021

La Paradoja del Anticoagulante Lúpico (AL): El AL interfiere con el ensamblaje del complejo protrombinasa in vitro en el tubo de ensayo, provocando un **falso alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPK)** que NO corrige al mezclar con plasma normal (prueba de mezclas con índice de Rosner alterado) pero que SÍ corrige al añadir exceso de fosfolípidos exógenos. Sin embargo, **in vivo es un potente agente protrombótico**. 1.11.1.021 1.08.1.019

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CLASIFICATORIOS DE SYDNEY (REVISIÓN SAPPORO)

Para el diagnóstico de SAF se requiere la presencia obligatoria de **al menos un criterio clínico Y al menos un criterio de laboratorio**: 1.11.1.021

A. Criterios Clínicos:

1. **Trombosis Vascular:** Uno o más episodios objetivos de trombosis arterial, venosa (la más común es la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores y tromboembolismo pulmonar) o de pequeños vasos en cualquier tejido, confirmada por ecografía Doppler, angiografía o histopatología sin inflamación de la pared del vaso.

2. **Morbilidad Obstétrica (Cualquiera de las siguientes 3 situaciones):**

• *Muerte Fetal Tardía:* ≥ 1 muerte inexplicable de un feto morfológicamente normal a partir de las **10 semanas de gestación**.

• *Parto Prematuro Severo:* ≥ 1 parto prematuro de neonato morfológicamente normal **antes de la semana 34 de gestación** debido a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria grave.

• *Pérdidas Embrionarias Precoces:* **≥ 3 abortos espontáneos consecutivos e inexplicados antes de las 10 semanas** de gestación, habiendo excluido anomalías anatómicas, hormonales o cromosómicas paternas.

B. Criterios de Laboratorio (Confirmación en 2 Tomas):

Deben ser positivos en al menos **dos ocasiones separadas por un intervalo mínimo de 12 semanas** (para descartar anticuerpos transitorios postinfecciosos):

• **Anticoagulante Lúpico (AL)** detectado en plasma según guías de la ISTH (es el marcador con mayor riesgo trombótico relativo).

• **Anticuerpos Anticardiolipina (aCL)** de isotipo IgG o IgM a títulos moderados o altos (> 40 GPL o MPL, o > percentil 99).

• **Anticuerpos Anti-Beta-2-Glicoproteína I** de isotipo IgG o IgM a títulos elevados (> percentil 99).

TABLA 9.11.A · CRITERIOS CLASIFICATORIOS DE SYDNEY PARA SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF) 1.11.1.021, 1.08.1.019

CATEGORÍA	CRITERIOS ESPECÍFICOS	CONDICIÓN MANDATORIA
Criterio Clínico: Trombosis	≥ 1 episodio de trombosis arterial, venosa o microvascular en cualquier tejido	Confirmada objetivamente por imagen o biopsia sin vasculitis
Criterio Clínico: Obstétrico 1	≥ 1 muerte fetal tardía inexplicable de feto normal a partir de las 10 semanas	Morfología fetal normal por ecografía o autopsia
Criterio Clínico: Obstétrico 2	≥ 1 parto prematuro de recién nacido normal antes de la semana 34	Debido a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria
Criterio Clínico: Obstétrico 3	≥ 3 abortos espontáneos consecutivos inexplicados antes de la semana 10	Descartadas causas anatómicas, endocrinas o cromosómicas
Criterio de Laboratorio 1	Anticoagulante Lúpico (AL) positivo en plasma según guías ISTH	Confirmar en ≥ 2 tomas con ≥ 12 semanas de diferencia
Criterio de Laboratorio 2	Anticuerpos Anticardiolipina (aCL) IgG o IgM a títulos moderados/altos (>40 U)	Confirmar en ≥ 2 tomas con ≥ 12 semanas de diferencia
Criterio de Laboratorio 3	Anticuerpos Anti-Beta-2-Glicoproteína I IgG o IgM en títulos > percentil 99	Confirmar en ≥ 2 tomas con ≥ 12 semanas de diferencia

9.11. Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO FARMACOLÓGICO DE LA TROMBOSIS: LA REGLA DE LOS CUMARÍNICOS

• **Trombosis Venosa Profunda / TEP:** Se inicia tratamiento agudo con Heparina (HBPM o HNF) y se traslapa a **Anticoagulantes Cumarínicos orales (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0**. 1.11.1.021 1.08.1.019

Duración: La anticoagulación en SAF trombótico debe mantenerse de **forma INDEFINIDA** (de por vida), ya que el riesgo de retrombosis tras suspender el fármaco supera el 50% en los primeros dos años.

• **Trombosis Arterial (ACV isquémico / infarto):** Anticoagulación con meta de INR 2.0 a 3.0 (o INR 3.0 a 4.0 según guías), o asociación de antagonista de vitamina K (INR 2-3) más Aspirina 100 mg/día.

ALERTA DE SEGURIDAD CRÍTICA EUNACOM (Ensayo TRAPS): Los **Anticoagulantes Orales Directos (DOACs: Rivaroxabán, Apixabán, Dabigatrán) están CONTRAINDICADOS en pacientes con SAF de alta carga trombogénica o triple positividad** (AL + aCL + anti-beta2GPI). Han demostrado una tasa inaceptablemente alta de eventos trombóticos arteriales recurrentes (ACV, infarto) en comparación con los cumarínicos tradicionales controlados con INR.



LIVEDO RETICULARIS

Imagen 9.11

FIGURA 9.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (CRITERIOS DE SYDNEY)




TABLA 9.11.B · ESTRATIFICACIÓN TERAPÉUTICA EN SAF SEGÚN ESCENARIO CLÍNICO CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESCENARIO CLÍNICO	OBJETIVO TERAPÉUTICO	FÁRMACO DE ELECCIÓN	DURACIÓN / OBSERVACIÓN
Primer evento trombótico venoso	Prevención secundaria de TVP/TEP	Acenocumarol o Warfarina (meta INR 2.0 – 3.0)	Indefinida (de por vida); DOACs no recomendados
Trombosis arterial (ej. ACV)	Prevención secundaria de infarto cerebral	Cumarínicos (INR 2-3) + AAS 100 mg/d o INR 3-4	Indefinida; control estricto de FRCV
SAF obstétrico sin trombosis previa	Prevención de pérdida fetal y preeclampsia	AAS 100 mg/d + HBPM profiláctica (Enoxaparina 40mg/d SC)	Desde saco gestacional hasta 6 semanas postparto
SAF obstétrico con trombosis previa	Prevención fetal y trombosis materna	AAS 100 mg/d + HBPM dosis terapéutica (1 mg/kg c/12h SC)	Todo el embarazo; volver a cumarínicos postparto
SAF Catastrófico (Asherson)	Rescate vital de falla multiorgánica	Heparina EV + Pulsos Metilprednisolona + Plasmaféresis / IGEV	UCI de urgencia; mortalidad > 30-50%

9.11. Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO DEL SAF OBSTÉTRICO DURANTE EL EMBARAZO

La meta es prevenir la pérdida gestacional y la preeclampsia, garantizando un feto a término: 1.11.1.021

• **Paciente con SAF Obstétrico Exclusivo (sin antecedentes de trombosis vascular previa):**

1. **Ácido Acetilsalicílico (AAS) a dosis bajas (100 mg/día oral)**: Iniciado de forma ideal en período preconcepcional o tan pronto se confirme la prueba de embarazo.

2. **Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis profiláctica (Enoxaparina 40 mg/día SC)**: Iniciada inmediatamente al confirmar saco gestacional intrauterino y suspendida 12-24 horas antes del parto programado. Se reanuda en el puerperio durante **6 semanas postparto**.

Nota vital: Los anticoagulantes cumarínicos orales (warfarina/acenocumarol) son **teratogénicos (embriopatía por warfarina)** entre las semanas 6 y 12 y están **absolutamente contraindicados en el embarazo**.

• **Paciente con SAF y Antecedente de Trombosis Vascular Previa:**

AAS 100 mg/día + **HBPM a dosis TERAPÉUTICA plena (Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas SC)** durante todo el embarazo, reanudando cumarínicos en el puerperio (la warfarina y el acenocumarol son compatibles con la lactancia).

5. SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO CATASTRÓFICO (SÍNDROME DE ASHERSON)

Es una variante hiperaguda y potencialmente mortal (< 1% de los casos de SAF) caracterizada por una tormenta de oclusiones trombóticas microvasculares que causan falla multiorgánica rápida. 1.11.1.021

Criterios Diagnósticos: Compromiso trombótico simultáneo de **≥ 3 órganos o tejidos en menos de 1 semana**, confirmación histopatológica de oclusión microvascular trombótica en al menos un órgano, y confirmación serológica de anticuerpos antifosfolípidos.

Órganos afectados: Falla renal aguda (70%), distrés respiratorio por microtrombosis pulmonar / hemorragia alveolar, encefalopatía, necrosis miocárdica e isquemia cutánea masiva. Suele gatillarse por infecciones o cirugías.

Manejo de Urgencia en UCI: Terapia combinada agresiva multimodal inmediata: **1) Heparina no fraccionada endovenosa a dosis anticoagulante plena; 2) Pulsos de Metilprednisolona (1 g/día EV x 3 días); y 3) Plasmaféresis y/o Inmunoglobulina Endovenosa (IGEV)**. Si es refractario se asocia Rituximab o Eculizumab (anti-C5).

6. TROMBOFILIAS HEREDITARIAS: SOSPECHA, ESTUDIO Y CONDUCTA INICIAL

Trombofilias hereditarias (sospecha): son estados de hipercoagulabilidad de origen genético. Las más frecuentes son la **mutación del factor V de Leiden** (resistencia a la proteína C activada) y la **mutación G20210A de la protrombina**; menos frecuentes pero más trombogénicas son los déficits de **antitrombina, proteína C y proteína S**; la hiperhomocisteinemia es otra causa. A diferencia del SAF (trombofilia adquirida), se sospechan ante **trombosis venosa antes de los 45-50 años sin factor desencadenante, trombosis recurrente, localización inusual** (venas cerebrales, mesentéricas, porta, síndrome de Budd-Chiari), antecedente familiar de trombosis en parientes de primer grado, **necrosis cutánea por warfarina** (déficit de proteína C o S) y complicaciones obstétricas recurrentes. 1.08.1.019

Estudio y conducta inicial: no se estudia la trombofilia de rutina en un primer evento claramente provocado (cirugía, inmovilización, trauma). Cuando se solicita, los estudios genéticos (factor V de Leiden, protrombina) pueden hacerse en cualquier momento; las pruebas funcionales de proteína C, proteína S y antitrombina se alteran durante la trombosis aguda y con anticoagulantes (la warfarina baja las proteínas C y S; la heparina y la trombosis aguda bajan la antitrombina), por lo que se piden fuera de la fase aguda o en centros especializados; los anticuerpos antifosfolípidos se estudian siempre. **La duración de la anticoagulación depende del evento** (3-6 meses en el primer episodio provocado; prolongada en el no provocado o recurrente) más que de la trombofilia en sí; el portador heterocigoto de factor V de Leiden no requiere anticoagulación indefinida solo por serlo. Se evitan los estrógenos (anticonceptivos orales y terapia hormonal) en quien ya tuvo trombosis, se indica profilaxis con HBPM en el embarazo y puerperio según el antecedente, y se **deriva** a hematología (véase el tomo de Hematología).

TABLA 9.11.C · MONITOREO Y CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS CRÍTICAS EN SAF — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	VÍA Y DOSIS HABITUAL	MONITOREO DE LABORATORIO	REGLAS DE SEGURIDAD EUNACOM
Acenocumarol / Warfarina	Oral, ajustada a INR	INR mensual (Meta 2.0 a 3.0)	Teratogénicos: suspender antes de semana 6 de embarazo
Enoxaparina (HBPM)	Subcutánea (40mg/d o 1mg/kg c/12h)	Recuento de plaquetas (riesgo TIH) y antifactor Xa si ERC	No requiere monitoreo de rutina de coagulación; segura en gestación
Ácido Acetilsalicílico	100 mg / día oral	Clínico (tolerancia digestiva)	Iniciar preconcepcional en mujeres con pérdidas previas
DOACs (Rivaroxabán/Apixabán)	Oral dosis fija	No disponible en rutina	CONTRAINDICADOS en SAF con triple positividad por falla arterial

9.11. Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF))

- El SAF requiere al menos 1 criterio clínico (trombosis o morbilidad obstétrica) y 1 de laboratorio.
- El Anticoagulante Lúpico alarga el TTPK in vitro, pero es el marcador de mayor riesgo trombótico in vivo.
- Los DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) están CONTRAINDICADOS en pacientes con SAF de triple positividad.
- Los cumarínicos son teratogénicos y están absolutamente contraindicados durante el embarazo.
- Los anticuerpos deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un mínimo de 12 semanas.
- En trombosis venosa por SAF, el tratamiento de elección es Acenocumarol o Warfarina (INR 2.0 a 3.0) de por vida.
- En SAF obstétrico sin trombosis previa, el tratamiento es AAS 100 mg/día + HBPM profiláctica (Enoxaparina 40 mg/d).
- El SAF Catastrófico cursa con trombosis de ≥ 3 órganos en < 1 semana y requiere Heparina + Corticoides + Plasmaféresis/IGEV.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.11

Mujer de 29 años, cursando embarazo de 8 semanas confirmado por ecografía con embrión vivo y latidos cardiofetales presentes. Consulta en policlínico de alto riesgo obstétrico. Sus antecedentes revelan 3 abortos espontáneos consecutivos del primer trimestre (a las 7, 8 y 9 semanas) en los últimos 3 años, sin antecedentes de trombosis venosa ni arterial. El estudio inmunológico solicitado hace 3 meses mostró Anticoagulante Lúpico positivo y anticuerpos anticardiolipina IgG en 58 GPL (positivo alto). Se repitieron los exámenes a las 14 semanas de intervalo, confirmándose la positividad persistente de ambos marcadores.

Conducta oficial razonada. La paciente cumple estrictamente los criterios clasificatorios de Sydney para Síndrome Antifosfolípido Obstétrico: criterio clínico (≥ 3 abortos consecutivos < 10 semanas) más criterio de laboratorio confirmado en dos oportunidades separadas por más de 12 semanas (anticoagulante lúpico y anticardiolipina IgG > 40). El manejo de elección para lograr un embarazo a término exitoso y prevenir la preeclampsia es la combinación de Ácido Acetilsalicílico a dosis bajas (100 mg/día) asociado a Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis profiláctica (Enoxaparina 40 mg/día subcutánea), manteniéndose la HBPM hasta 6 semanas postparto.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

1. El síndrome antifosfolípidos se asocia a todo lo siguiente EXCEPTO:

A) Acortamiento del TTPA
B) Trombosis arteriales
C) Trombosis venosasoncologia/ 2/621/12/2016 Prueba 3 | Dr. Guevara
D) Abortos Dr. Guevara
E) Lupus eritematosos sistémico Preparación EUNACOM

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

2. Paciente de 34 años con antecedentes de tres abortos previos y trombosis venosa profunda en el último año, sin otros síntomas. Se realiza estudio por sus antecedentes donde destacan ANA (+), anticuerpos antifosfolípidos (+), anticuerpos anticardiolipinas (+) y factor reumatoide (+) ¿Cuál es el manejo más adecuado para la paciente?:

A) Iniciar tratamiento con prednisona oral
B) Iniciar tratamiento anticoagulante
C) Iniciar tratamiento con metotrexato
D) Iniciar tratamiento con azatioprina
E) Iniciar tratamiento con aspirina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

3. Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último seguido de un cuadro de trombosis venosa profunda. Desde hace unas 8 semanas presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre. ¿Cuál de las siguientess de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:

A) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
C) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
D) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
E) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

4. ¿Cuál de las siguientes pacientes puede utilizar anticonceptivos orales sin mayor contraindicación?

A) Mujer con cáncer de mama
B) Mujer diagnosticada de melanoma
C) Mujer con daño hepático crónico por NASH
D) Mujer con déficit de antitrombina III
E) Mujer con antecedente de abortos a repetición

Más preguntas online de Síndrome Antifosfolípido →

9.12. Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.009 1.05.1.018 1.05.1.021

¿POR QUÉ?

La Esclerosis Sistémica (Esclerodermia) es una conectivopatía caracterizada por vasculopatía obliterante y fibrosis cutánea y visceral. En EUNACOM es imprescindible dominar el diagnóstico diferencial entre la forma difusa (Anti-Scl-70, fibrosis pulmonar, crisis renal) y la limitada o síndrome de CREST (anticentrómero, HTP tardía), así como el manejo de urgencia de la crisis renal esclerodérmica con IECA.

1. FISIOPATOLOGÍA: TRÍADA DE VASCULOPATÍA, AUTOINMUNIDAD Y FIBROSIS

La esclerosis sistémica resulta de la convergencia patogénica 1.11.1.009 de tres mecanismos: **(ver Imagen 9.12A y C)**

1. **Daño endotelial y vasculopatía obliterante:** Apoptosis endotelial precoz con proliferación intimal concéntrica en arterias pequeñas y arteriolas, pérdida de capilares (demostrable en capilaroscopía) y vasoespasmo grave recurrente (Fenómeno de Raynaud).

2. **Autoinmunidad celular y humoral:** Linfocitos T y macrófagos activados secretan citoquinas profibróticas (**TGF-beta, IL-4, IL-13, PDGF**) y linfocitos B generan autoanticuerpos altamente específicos (Anti-Scl-70, Anticentrómero, Anti-ARN polimerasa III).

3. **Fibrosis tisular generalizada:** Los fibroblastos se transforman constitutivamente en miofibroblastos hiperactivos resistentes a la apoptosis, depositando colágeno tipo I y III masivo en la dermis, pulmón, riñón, miocardio y tubo digestivo.

2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA COMPARATIVA: DIFUSA VS LIMITADA (CREST)

La clasificación de LeRoy divide la enfermedad según la extensión del engrosamiento cutáneo: 1.11.1.009

A. Esclerosis Sistémica Cutánea Difusa (EScd):

• **Extensión Cutánea:** Afecta piel **proximal a codos y rodillas, comprometiendo tronco y abdomen** además de las extremidades distales y cara. Fase edematosa inicial (dedos hinchados / *puffy fingers*) que progresa rápidamente a induración y atrofia cutánea en meses.

• **Fenómeno de Raynaud:** Aparece de forma simultánea o poco tiempo antes del compromiso cutáneo (< 1 año).

• **Compromiso Visceral Temprano y Grave:**

1. **Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID):** Fibrosis pulmonar con patrón de neumonía intersticial no específica (NINE) o usual (NIU). Es la **primera causa de muerte** en esclerodermia. 1.11.1.009 1.05.1.018

2. **Crisis Renal Esclerodérmica:** Hipertensión arterial acelerada y falla renal. 1.11.1.009



Facies esclerodérmica



Facies esclerodérmica

3. Miocardiopatía fibrótica con arritmias y pericarditis.

• **Autoanticuerpo: Anti-Scl-70 (Anti-Topoisomerasa I)** (positivo en 30-40%; patrón nucleolar en ANA). Se asocia fuertemente a fibrosis pulmonar grave. Los anticuerpos **Anti-ARN Polimerasa III** se asocian al mayor riesgo de Crisis Renal Esclerodérmica.

B. Esclerosis Sistémica Cutánea Limitada (EScl / Síndrome de CREST):

• **Extensión Cutánea:** Engrosamiento cutáneo **restringido a manos, pies, antebrazos distales y cara**, con **RESPETO ESTRICTO de tronco, abdomen y muslos**.



Rx de manos con calcinosis subcutánea y acroosteólisis de falanges dis

• **Fenómeno de Raynaud:** Precede por muchos años o décadas al inicio de los cambios cutáneos.

• **Acrónimo del Síndrome de CREST:**

• **C:** *Calcinosis cutis* (depósitos subcutáneos de sales de calcio indoloros o dolorosos que pueden ulcerar en pulpejos). **(ver Imagen 9.12B)**



Úlceras digitales de pulpejos / necrosis digital

• **R:** *Raynaud* severo trifásico.

• **E:** *Esofagopatía* (dismotilidad por atrofia del músculo liso en dos tercios distales del esófago con reflujo severo, esofagitis, estenosis péptica y disfagia a sólidos).

• **S:** *Sclerodactilia* (piel brillante, engrosada y tirante en dedos con contractura en flexión y resorción de pulpejos óseos acroosteólisis).

• **T:** *Telangiectasias* múltiples (en cara, labios, lengua y palmas).

• **Compromiso Visceral Tardío: Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP Grupo 1)** sin fibrosis pulmonar significativa. Aparece tras 10 a 15 años de evolución y es la causa de muerte más frecuente en este subtipo. 1.11.1.009 1.05.1.021

• **Autoanticuerpo: Anticuerpos Anticentrómero (ACA)** (positivo en 70-80%; patrón anticentrómero en ANA). 1.11.1.009

TABLA 9.12.A · DIFERENCIAS CARDINALES: ESCLEROSIS SISTÉMICA CUTÁNEA DIFUSA VS LIMITADA (CREST) 1.11.1.009, 1.05.1.018, 1.05.1.021

CARACTERÍSTICA	FORMA CUTÁNEA DIFUSA (ESCD)	FORMA CUTÁNEA LIMITADA (CREST / ESCL)
Extensión cutánea	Piel proximal a codos/rodillas, tronco y abdomen	Restringida a manos, pies, antebrazos distales y cara
Fenómeno de Raynaud	Inicio simultáneo o poco antes (< 1 año)	Precede por muchos años o décadas al daño cutáneo
Autoanticuerpo específico	Anti-Scl-70 (Topoisomerasa I) y Anti-ARN Pol III	Anticuerpos Anticentrómero (ACA) (> 70-80%)
Patrón ANA en IFI	Patrón Nucleolar	Patrón Anticentrómero
Afección pulmonar típica	Fibrosis Pulmonar Intersticial precoz (EPID)	Hipertensión Arterial Pulmonar tardía (HTP Grupo 1)
Complicación renal	Crisis Renal Esclerodérmica (10-15%)	Excepcional / Muy rara
Calcinosis y Telangiectasias	Poco frecuentes o leves	Muy prominentes y extensas (componente CREST)
Pronóstico global	Más sombrío; mayor mortalidad temprana	Mejor sobrevida a mediano plazo; riesgo de HTP tardía

9.12. Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRISIS RENAL ESCLERODÉRMICA: URGENCIA VITAL Y REGLA DE LOS IECA

Es una complicación catastrófica que afecta al 10-15% de los pacientes con forma cutánea difusa (especialmente con Anti-ARN polimerasa `1.11.1.009` III positivo):

Fisiopatología: Vasoconstricción arterial renal intensa unida a hiperplasia miointimal concéntrica en *"capas de cebolla"* de las arterias interlobulillares, lo que induce isquemia glomerular masiva e hiperactivación extrema del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA).

Clínica de Presentación:

• **Hipertensión arterial maligna / acelerada de inicio brusco** (PA > 180/110 mmHg). *Nota:* Hasta un 10% puede ser normotensa.

• Falla renal aguda oligúrica con elevación acelerada de creatinina.

• Anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos y plaquetopenia de consumo.

• Encefalopatía hipertensiva, edema pulmonar agudo o cefalea intensa.

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN INMEDIATO EUNACOM:

El tratamiento indiscutido es la administración inmediata de **Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA)**, preferentemente **Captopril por vía oral** (acción corta, iniciando a 6.25-12.5 mg c/8h y titulando rápidamente hasta 50 mg c/8h) o Enalapril.

Los IECA bloquean la vasoconstricción renal mediada por angiotensina II y salvan la función renal, reduciendo la mortalidad de 90% a menos de 20%. No suspender el IECA aunque la creatinina aumente levemente al inicio.


REGLA DE ORO DE PROHIBICIÓN EN ESCLERODERMIA: El uso de **Corticoides a dosis moderadas o altas (Prednisona > 15 mg/día) está CONTRAINDICADO** en la esclerosis sistémica difusa, ya que es el principal factor desencadenante yatrogénico demostrado de Crisis Renal Esclerodérmica.



A. ESCLERODACTILIA



B. NECROSIS DE PULPEJOS



C. TAC: PATRÓN NINE

Imagen 9.12

FIGURA 9.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y ALGORITMO DE MANEJO EN ESCLEROSIS SISTÉMICA




TABLA 9.12.B · FACTORES DE RIESGO Y PROTOCOLO DE ALERTA DE CRISIS RENAL ESCLERODÉRMICA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

FACTOR DE RIESGO / SIGNO DE ALARMA	HALLAZGO CLÍNICO O SEROLÓGICO	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Uso de Corticoides en Dosis Altas	Prednisona > 15 mg/día oral en forma difusa	Evitar dosis altas; monitoreo estricto de PA ambulatoria
Serología de Alto Riesgo	Anticuerpos Anti-ARN Polimerasa III positivos	Auto-monitoreo diario de presión arterial en domicilio
Alza Tensional Aguda	PA ≥ 140/90 mmHg o incremento > 30 mmHg de basal	Iniciar inmediatamente IECA oral (Captopril); no esperar falla renal
Falla Renal y Microangiopatía	Creatinina en alza + esquistocitos + trombocitopenia	Hospitalización urgente en UCI, titulación agresiva de IECA

9.12. Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO TERAPÉUTICO ESPECÍFICO POR ÓRGANO COMPROMETIDO

• **Compromiso Cutáneo:** Metotrexato oral o subcutáneo (15-20 mg/semana). 1.11.1.009


• **Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPID):** Tratamiento de elección con **Micofenolato Mofetilo (2 a 3 g/día)** o Ciclofosfamida EV; en fibrosis progresiva se asocia el antifibrótico **Nintedanib (150 mg c/12h oral)** o Tocilizumab. 1.05.1.018

• **Hipertensión Pulmonar:** Monitoreo anual obligatorio con ecocardiograma transtorácico. Confirmación por cateterismo cardíaco derecho. Tratamiento con antagonistas del receptor de endotelina (Bosentán, Macitentán) e inhibidores de PDE-5 (Sildenafil). 1.05.1.021

• **Compromiso Digestivo:** IBP a dosis altas continuas (Omeprazol 40 mg c/12h), proquinéticos (Domperidona) y antibióticos cíclicos para sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SIBO). 1.11.1.009

5. ENFOQUE GENERAL DE LA ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL (EPI)

Sospecha de enfermedad del intersticio pulmonar: la esclerodermia es una de las causas más importantes, pero la EPI debe sospecharse ante **disnea de esfuerzo progresiva, tos seca persistente, crépitos tipo velcro en las bases pulmonares y acropaquia**. La espirometría muestra patrón restrictivo (CVF disminuida con VEF1/CVF normal o elevada) y la DLCO está disminuida, a veces antes que la CVF. La radiografía de tórax muestra patrón reticular bibasal, pero el examen de elección es el **TAC de tórax de alta resolución**: el patrón NIU (usual) muestra panalización, bronquiectasias de tracción y predominio subpleural basal, y el patrón NINE muestra vidrio esmerilado simétrico con respeto de la región subpleural (frecuente en esclerodermia). Hay que interrogar por exposiciones y fármacos. 1.05.1.018



TAC de tórax con enfermedad pulmonar intersticial

Causas principales y conducta inicial: fibrosis pulmonar idiopática (varones > 60 años, tabaquistas), conectivopatías (esclerosis sistémica, AR, miositis, Sjögren), **neumonitis por hipersensibilidad** (aves, hongos, humedad), neumoconiosis (asbestosis, silicosis), fármacos (amiodarona, nitrofurantoína, metotrexato, bleomicina) y sarcoidosis. El manejo inicial incluye retirar el agente o la exposición, suspender el tabaco, oxigenoterapia si hay hipoxemia, vacunación (influenza, neumococo) y **derivación a neumología** para confirmación y tratamiento: inmunosupresión (corticoides con micofenolato o ciclofosfamida) en la EPI de las conectivopatías y la neumonitis por hipersensibilidad, antifibróticos (nintedanib, pirfenidona) en la fibrosis pulmonar idiopática y en las fibrosis progresivas, y trasplante pulmonar en casos seleccionados. Los corticoides en dosis altas están contraindicados en la esclerodermia por el riesgo de crisis renal (véase sección 3).

TABLA 9.12.C · TRATAMIENTO ESPECÍFICO POR ÓRGANO BLANCO EN ESCLEROSIS SISTÉMICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ÓRGANO COMPROMETIDO	MANIFESTACIÓN ESPECÍFICA	FÁRMACO DE PRIMERA ELECCIÓN	ALTERNATIVA / COADYUVANTE
Crisis Renal Esclerodérmica	Hipertensión maligna + falla renal	IECA oral (Captopril 12.5-50mg c/8h o Enalapril)	Bloqueadores canales de calcio o nitroprusiato
Pulmón (EPID / Fibrosis)	Tos seca, disnea, patrón NINE en TAC	Micofenolato Mofetilo (2 – 3 g/día oral)	Nintedanib 150mg c/12h o Ciclofosfamida EV
Pulmón (Hipertensión Arterial)	Disnea, PSAP > 35 mmHg en eco, cateterismo	Inhibidor PDE-5 (Sildenafil) + Antagonista Endotelina	Prostaciclinas parenterales si clase funcional IV
Tubo Digestivo	Reflujo gastroesofágico severo y pirosis	IBP a dosis dobles (Omeprazol 40mg c/12h)	Proquinéticos (Domperidona) y cabecera elevada
Piel (Esclerosis progresiva)	Induración cutánea difusa progresiva	Metotrexato 15 – 20 mg / semana oral o SC	Micofenolato o fototerapia

9.12. Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ESCLEROSIS SISTÉMICA)

- La Esclerosis Difusa presenta afección cutánea proximal al codo y tronco, Anti-Scl-70 y alto riesgo de EPID y crisis renal.
- El Síndrome de CREST comprende: Calcinosis, Raynaud, Esofagopatía, Sclerodactilia y Telangiectasias.
- La Crisis Renal Esclerodérmica se manifiesta como hipertensión maligna de inicio brusco y falla renal microangiopática.
- REGLA DE ORO: Las dosis de Prednisona > 15 mg/día están contraindicadas en esclerosis difusa por inducir crisis renal.
- La Esclerosis Limitada (CREST) se asocia a Anticentrómero (ACA) y riesgo tardío de Hipertensión Pulmonar (HTP Grupo 1).
- La principal causa de muerte en esclerodermia difusa es la Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID).
- El tratamiento de ELECCIÓN en la Crisis Renal Esclerodérmica son los IECA (Captopril oral a dosis plenas).
- El tratamiento de elección de la EPID en esclerodermia es el Micofenolato Mofetilo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.12

Mujer de 54 años con diagnóstico de esclerosis sistémica cutánea difusa diagnosticada hace 14 meses (Anti-Scl-70 positivo), en tratamiento con metotrexato y prednisona 20 mg/día por artralgias severas. Es traída a urgencias por cefalea holocraneana intensa, visión borrosa y ortopnea de 24 horas de evolución. Al examen físico se constata PA 210/125 mmHg, FC 98 lpm, fondo de ojo con hemorragias en llama y exudados algodonosos. Piel indurada en tronco y extremidades. Exámenes: creatinina plasmática 3.2 mg/dL (basal de 0.8 hace 1 mes), nitrógeno ureico 55 mg/dL. El frotis sanguíneo evidencia abundantes esquistocitos (3%), plaquetas 82.000/mm³ y LDH marcadamente elevada.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta una Crisis Renal Esclerodérmica clásica (emergencia hipertensiva hiperreninémica con falla renal aguda oligoanúrica y anemia hemolítica microangiopática). El uso de prednisona > 15 mg/día fue el factor desencadenante directo. El tratamiento de urgencia indiscutido que salva la vida y la función renal de la paciente es la administración inmediata de un inhibidor de la ECA, de elección Captopril oral a dosis tituladas rápidamente crecientes. Los corticoides deben suspenderse de inmediato.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.12 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.1.021

1. Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada (CREST) suelen desarrollar:

A) Fibrosis pulmonar
B) Accidentes vasculares encefálicos
C) Cáncer
D) Hipertensión pulmonar
E) Uveítis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

2. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre marcadores inmunológicos y patología es correcta?

A) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína – Dermatomiositis
B) Anticuerpos anti-proteína P – Actividad lúpica
C) Anticuerpos anti-histona – Enfermedad de Sjörgren
D) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia
E) Anticuerpos antinucleares, patrón citoplasmático – Poliangeítis microscópica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.1.021

3. Una paciente de 55 años comienza con disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores. Diez años antes había sido diagnosticada de esclerosis sistémica (ES) debido a la presencia de fenómeno de Raynaud, esclerodermia localizada y la detección de anticuerpos anticentrómero en sangre. Estaba controlada con 7,5 mg de prednisona diarios y cremas vasodilatadoras aplicadas en manos. En su evaluación en el momento de la disnea, la gasometría arterial demostraba hipoxia y en la radiografía de tórax no se veía ninguna afectación parenquimatosa. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente?:

A) Insuficiencia respiratoria restrictiva muscular.
B) Endocarditis de Libmann Sachs de la tricúspide.
C) Insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a la miocardiopatía de la E.S. - 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6
D) Hipertensión pulmonar.
E) Tromboembolismo pulmonar de repetición.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

4. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más frecuente en los pacientes con esclerodermia sistémica limitada?

A) Artritis de pequeñas articulaciones
B) Fenómeno de Raynaud
C) Eritema cutáneo
D) Fibrosis pulmonar
E) Insuficiencia renal

Más preguntas online de Esclerosis Sistémica →

9.13. Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.020 1.10.1.021 2.01.1.057

¿POR QUÉ?

Las miopatías inflamatorias autoinmunes se manifiestan por debilidad de cinturas proximales y elevación masiva de CPK. La Dermatomiositis destaca por sus signos cutáneos patognomónicos (eritema en heliotropo y pápulas de Gottron). En el EUNACOM es un concepto capital recordar que hasta un 25-30% de las dermatomiositis en el adulto constituyen un síndrome paraneoplásico, obligando a un tamizaje tumoral exhaustivo inmediato.

1. FISIOPATOLOGÍA COMPARADA: INMUNIDAD HUMORAL VS CITOTÓXICA CELULAR

Aunque comparten la debilidad muscular proximal, su patogenia es profundamente distinta: 1.11.1.020

• **Dermatomiositis (DM):** Es una **microangiopatía mediada por inmunocomplejos y complemento**. Se produce activación de la cascada del complemento con depósito del complejo lítico de ataque a la membrana (C5b-9) en las paredes de los capilares endomisiales. Esto provoca necrosis endotelial, isquemia capilar y un patrón histopatológico característico de **atrofia perifascicular** con infiltrado inflamatorio perimisial y perivascular compuesto predominantemente por **linfocitos B y linfocitos T CD4+**.

• **Polimiositis (PM):** Es una enfermedad por **citotoxicidad celular directa mediada por linfocitos T CD8+ antígeno-específicos**. Las fibras musculares expresan de forma anómala moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase I (MHC-I). Los linfocitos T CD8+ y macrófagos invaden y perforan directamente las miofibras musculares no necróticas dentro del fascículo muscular (**infiltrado endomisial**).

2. CUADRO CLÍNICO MUSCULAR Y LESIONES CUTÁNEAS PATOGNOMÓNICAS DE LA DM

Manifestaciones Musculares: 1.11.1.020 1.10.1.021

• **Debilidad muscular proximal, bilateral y simétrica**, de curso insidioso y progresivo en semanas a meses. Compromete la cintura pelviana (dificultad para levantarse del asiento sin apoyar los brazos, subir escalones o levantarse del suelo) y escapular (dificultad para elevar los brazos, peinarse o alcanzar objetos altos).

• *Músculos Respetados:* La musculatura facial y los músculos extraoculares están **COMPLETAMENTE RESPETADOS** (su compromiso orienta a Miastenia Gravis).

• Compromiso de musculatura estriada faríngea y esofágica superior: produce **disfagia orofaríngea alta, disfonía y alto riesgo de neumonía aspirativa** (signo de severidad extrema).

Lesiones Cutáneas Patognomónicas de la Dermatomiositis: 1.11.1.020

1. **Eritema en Heliotropo:** Erupción eritematosa o violácea sobre los párpados superiores y región periorbitaria, con frecuencia acompañada de edema blando periorbitario (facies aborregada). Es prácticamente patognomónica. **(ver Imagen 9.13A y B)**

2. **Pápulas de Gottron:** Pápulas y placas eritematovioláceas, sobreelevadas o atróficas, localizadas simétricamente sobre el dorso de las **articulaciones metacarpofalángicas (MCF) e interfalángicas (IFP e IFD)**, y en superficies extensoras de codos y rodillas (signo de Gottron). **(ver Imagen 9.13C)**

3. *Signo del Chal y Signo en V:* Eritema macular violáceo confluente fotosensible en la parte posterior del cuello y hombros (chal) o en el escote anterior (V).

4. *Manos de Mecánico:* Hiperqueratosis, descamación y fisuración lineal dolorosa en las caras laterales de los dedos, muy ligada al Síndrome Antisintetasa.



Manos de mecánico

TABLA 9.13.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLIMIOSITIS VS DERMATOMIOSITIS 1.11.1.020, 1.10.1.021, 2.01.1.057

PARÁMETRO	POLIMIOSITIS (PM)	DERMATOMIOSITIS (DM)
Mecanismo inmunológico primario	Citotoxicidad celular directa por linfocitos T CD8+	Microangiopatía mediada por complemento e inmunocomplejos
Localización del infiltrado histológico	Endomisial (infiltración intrafascicular de fibras)	Perimisial y perivascular (en tabiques conjuntivos)
Lesión histopatológica característica	Invasión de miofibras no necróticas que expresan MHC-I	Atrofia perifascicular de las fibras musculares
Lesiones cutáneas patognomónicas	AUSENTES (enfermedad muscular pura)	PRESENTES: Heliotropo, Gottron, signo del chal
Asociación a neoplasia oculta	Leve a moderada (~10%)	Muy ALTA (25 – 30% en adultos mayores)
Población más afectada	Adultos > 20 años; rara en niños	Bimodal: Forma juvenil (5-14 años) y adultos (> 50 años)

9.13. Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto — Enfrentamiento Diagnóstico

3. AUTOANTICUERPOS ESPECÍFICOS: SÍNDROME ANTISINTETASA

• **Anti-Jo-1 (Anti-Histidil-tRNA sintetasa):** Es el anticuerpo más frecuente (20-30%). Define el **Síndrome Antisintetasa**: miopatía inflamatoria + **Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID) severa y rápidamente progresiva** + fenómeno de Raynaud + manos de mecánico + artritis no erosiva. 1.11.1.020 2.01.1.057

• **Anti-Mi-2:** Muy específico de dermatomiositis clásica con lesiones cutáneas extensas; se asocia a excelente respuesta a corticoides y bajo riesgo de neoplasia.

• **Anti-TIF-1-gamma y Anti-NXP-2:** Asociados a dermatomiositis del adulto mayor con altísimo riesgo de **cáncer paraneoplásico subyacente**.



A. HELIOTROPO



B. HELIOTROPO Y GOTTRON



C. PÁPULAS DE GOTTRON

Imagen 9.13

FIGURA 9.13 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN MIOPATÍAS INFLAMATORIAS: SIGNOS CUTÁNEOS, BIOPSIA Y NEOPLASIA




TABLA 9.13.B · PROTOCOLO OBLIGATORIO DE TAMIZAJE ONCOLÓGICO EN DERMATOMIOSITIS DEL ADULTO CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTUDIO DE TAMIZAJE TUMORAL	ÓRGANOS EVALUADOS	NEOPLASIAS BUSCADAS ACTIVADAS
TAC Tórax, Abdomen y Pelvis con contraste	Parénquima pulmonar, mediastino, vísceras abdominales	Cáncer pulmonar, renal, pancreático, linfomas
Mamografía bilateral y Ecografía mamaria	Glándula mamaria y axilas	Cáncer de mama
Ecografía Ginecológica Transvaginal + PAP	Útero, cuello uterino y anexos ováricos	Cáncer de ovario (altamente asociado a DM) y endometrio
Colonoscopía y Endoscopía Digestiva Alta	Mucosa colónica, gástrica y esofágica	Cáncer colorrectal y gástrico
Antígeno Prostático Específico (APE)	Próstata en hombres mayores de 45 años	Cáncer prostático

9.13. Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. REGLA DE ORO ONCOLÓGICA EUNACOM: TAMIZAJE DE NEOPLASIA OCULTA

Hasta un **20% a 30% de los pacientes adultos con Dermatomiositis presentan una neoplasia maligna subyacente** (la DM actúa como síndrome paraneoplásico). El riesgo es mayor en mayores de 50 años y persiste elevado durante los primeros 3 a 5 años del diagnóstico. 1.11.1.020

Tumores más frecuentes: Cáncer de ovario, mama, pulmón, colon, próstata, páncreas y linfoma no Hodgkin.

Conducta Obligatoria EUNACOM: Ante todo adulto diagnosticado de dermatomiositis es **mandatorio realizar un tamizaje exhaustivo de neoplasia oculta** que incluye: TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste, mamografía y ecografía ginecológica transvaginal con PAP en mujeres, antígeno prostático específico en hombres, sangre oculta en deposiciones / colonoscopía y endoscopía digestiva alta.

5. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA Y TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR

Laboratorio: Elevación extrema de **Creatina Fosfoquinasa (CPK)** (habitualmente 10 a 50 veces sobre el límite superior normal), aldolasa, transaminasas (GOT/GPT de origen muscular) y LDH. 1.11.1.020

La **Resonancia Magnética muscular (secuencias STIR / T2 con supresión grasa)** demuestra edema muscular inflamatorio activo y guía el sitio óptimo para la **Biopsia Muscular (patrón oro)**. 1.10.1.021

Tratamiento: 1.11.1.020

- **Corticoides a Dosis Altas: Prednisona oral 1 mg/kg/día** (máximo 60-80 mg/día) o **Pulsos de Metilprednisolona endovenosa (1 g/día por 3 días)** si hay disfagia orofaríngea o debilidad rápidamente progresiva.
- **FARME Ahorrador de Corticoides Precoz:** Se inicia **Metotrexato (15 a 25 mg/semana) o Azatioprina (2 a 3 mg/kg/día)** desde el inicio para permitir el descenso posterior de corticoides.
- En casos refractarios, con compromiso respiratorio ventilatorio o disfagia severa se administra **Inmunoglobulina Endovenosa (IGEV 2 g/kg en 2-5 días)** o Rituximab.

TABLA 9.13.C · ESQUEMA FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN MIOPATÍAS INFLAMATORIAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	FÁRMACOS Y DOSIFICACIÓN	DURACIÓN ESTIMADA	CRITERIO DE AJUSTE / RESPUESTA
Fase de Inducción Aguda	Prednisona 1 mg/kg/día oral (o Pulsos Metilprednisolona 1g EV x 3d)	4 a 8 semanas	Normalización de CPK y mejoría de fuerza muscular
Fase de Descenso y Ahorro	Iniciar Metotrexato 15-25 mg/semana o Azatioprina 2-3 mg/kg/d	Meses 2 a 12	Descenso gradual de prednisona hasta ≤ 5-10 mg/d
Manejo de Casos Refractarios	Inmunoglobulina Endovenosa (IGEV 2 g/kg total) o Rituximab	Ciclos mensuales	Falla de FARME o disfagia grave con riesgo aspirativo
Rehabilitación Física	Kinesioterapia pasiva precoz y activa supervisada	Continua	Prevenir contracturas articulares y atrofia por desuso

9.13. Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (MIOPATÍAS INFLAMATORIAS AUTOINMUNES)

- Las miopatías inflamatorias cursan con debilidad muscular proximal simétrica y elevación masiva de CPK.
- El eritema en heliotropo y las pápulas de Gottron son lesiones cutáneas patognomónicas de la Dermatomiositis.
- La polimiositis presenta infiltrado endomisial de linfocitos T CD8+ que invaden miofibras que expresan MHC-I.
- REGLA DE ORO: Todo adulto con Dermatomiositis requiere un tamizaje exhaustivo de Neoplasia Oculta.
- Tanto la polimiositis como la dermatomiositis RESPETAN los músculos faciales y extraoculares.
- La histología de la dermatomiositis muestra atrofia perifascicular e infiltrado perimisial/perivascular por CD4+ y B.
- El anticuerpo Anti-Jo-1 define el Síndrome Antisintetasa: miositis, fibrosis pulmonar intersticial severa, Raynaud y manos de mecánico.
- El tratamiento de primera línea son los corticoides a dosis altas (Prednisona 1 mg/kg/día) + FARME ahorrador (MTX/Azatioprina).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.13

Mujer de 58 años sin antecedentes médicos previos consulta por cuadro de 2 meses de debilidad progresiva en hombros y muslos, refiriendo gran dificultad para subir escaleras y levantarse de la taza del baño sin ayudarse con las manos. Al examen físico presenta marcada debilidad muscular proximal (fuerza 3/5 en cuádriceps y deltoides) con fuerza distal conservada (5/5). En los párpados superiores se aprecia una coloración eritematovioláceа con edema periorbitario leve, y en el dorso de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos se observan pápulas violáceas descamativas. Los exámenes muestran CPK de 4.200 U/L (normal < 170) y transaminasas marcadamente elevadas con GOT de 180 U/L y GPT de 145 U/L.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico es patognomónico de una Dermatomiositis: debilidad muscular proximal simétrica, elevación masiva de CPK (con transaminasas elevadas de origen muscular) y los dos signos cutáneos cardinales: eritema en heliotropo y pápulas de Gottron. Además de iniciar de inmediato corticoides a dosis plenas (Prednisona 1 mg/kg/día) para frenar la miositis, en una paciente de 58 años es estrictamente obligatorio realizar un tamizaje oncológico exhaustivo (TAC de tórax, abdomen y pelvis, mamografía y evaluación ginecológica) debido a la altísima asociación de dermatomiositis con neoplasia oculta subyacente (síndrome paraneoplásico).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

1. ¿Qué lesión cutánea es característica de la dermatomiositis?

A) Eritema nodoso
B) Eritema malar
C) Eritema en manto
D) Granuloma anular
E) Pioderma gangrenoso

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

2. ¿Qué marcador suele alterarse con mayor frecuencia en la dermatomiositis?

A) Complemento
B) Factor reumatoídeo
C) Velocidad de sedimentación hemática
D) Anticuerpos antinucleares
E) Creatinfosfoquinasa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

3. La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune, que ha sido asociada a la presencia de un cáncer concomitante. Los marcadores inmunológicos más característicos de esta patología son:

A) Anticuerpos anti centrómero
B) Anticuerpos anti nucléolo
C) Anticuerpos anti Jo-1
D) Anticuerpos anti Ro y anti La
E) Anticuerpos anti ribonucleoproteína

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

4. Acude a su consulta una paciente de 31 años por cuadro de 1 semana de evolución con debilidad en las masas musculares proximales, apareciendo eritema violáceo en párpados superiores y eritema en hombros y región superior del tórax. Usted sospecha una dermatomiositis. ¿Qué marcadores serológicos espera que resulten alterados para confirmar el diagnóstico?

A) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA) y VHS
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y C3 disminuido
C) Factor reumatoídeo
D) Creatinkinasa (CK) y anticuerpos anti Jo-1
E) Anticuerpos anti-RNP

Más preguntas online de Miopatías Inflamatorias Autoinmunes →

9.14. Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.009

¿POR QUÉ?

El fenómeno de Raynaud es un vasoespasmo paroxístico de la microvasculatura digital. En el EUNACOM el foco esencial es distinguir un Raynaud primario (benigno, funcional, sin daño estructural y con capilaroscopía normal) de un Raynaud secundario (marcador heraldo de conectivopatía autoinmune, especialmente esclerodermia, con úlceras pulpejas, ANA positivos y megacapilares en capilaroscopía).

1. FISIOPATOLOGÍA Y FASES CLÍNICAS TRIFÁSICAS CARDINALES

El fenómeno de Raynaud consiste en episodios reversibles de vasoespasmo exagerado de las arterias digitales y arteriolas de manos y pies en respuesta a la exposición al frío ambiental o al estrés emocional. **(ver Imagen 9.14A)**

Las 3 Fases Clínicas Secuenciales:

1. **Fase Isquémica o de Palidez (Blanco):** Vasoespasmo arteriolar completo con detención del flujo capilar digital. Los dedos se tornan fríos y de color blanco céreo como cera de vela, acompañándose de parestesias o adormecimiento. **(ver Imagen 9.14B)**

2. **Fase Asfíctica o de Cianosis (Azul):** Dilatación capilar reactiva con sangre estancada desoxigenada. Los dedos adquieren un tono azulado o violáceo.

3. **Fase Hiperémica o de Rubor (Rojo):** Vasodilatación refleja de reperfusión tras el cese del estímulo frío. Los dedos se tornan intensamente rojos y calientes, con dolor pulsátil, tumefacción y disestesias.

Nota: No siempre se observan las 3 fases; la presencia de la fase de palidez es mandatoria para el diagnóstico.

2. CRITERIOS DIFERENCIALES: FENÓMENO DE RAYNAUD PRIMARIO VS SECUNDARIO

• **Fenómeno de Raynaud Primario (Enfermedad de Raynaud):** Representa el 80-90% de los casos. Comienza en mujeres jóvenes (15 a 30 años), es estrictamente **bilateral y simétrico**, **NO produce úlceras digitales ni necrosis**, no hay atrofia de pulpejos, los pulsos periféricos son normales, **los ANA son negativos, la VHS es normal y la capilaroscopía es NORMAL**. Evolución benigna.



Úlceras digitales de pulpejos / necrosis digital

• **Fenómeno de Raynaud Secundario:** Asociado a una enfermedad autoinmune de base (Esclerosis Sistémica en > 95%, LES en 30%, Sjögren, dermatomiositis, vasculitis). Suele comenzar en mayores de 30-40 años, es **asimétrico, muy doloroso**, se asocia a **úlceras isquémicas o cicatrices puntiformes en pulpejos (pitting scars)** o gangrena digital, presenta **ANA positivos y Capilaroscopía francamente PATOLÓGICA**. 1.11.1.009

3. ROL DE LA CAPILAROSCOPÍA PERIUNGUEAL Y MANEJO FARMACOLÓGICO

La **capilaroscopía periungueal** es el examen no invasivo de elección para diferenciar primario de secundario. Permite observar las asas capilares del lecho de la uña con microscopio o dermatoscopio: **(ver Imagen 9.14C)**

• *Patrón Normal:* Asas capilares paralelas en forma de horquilla regulares y uniformes.

• *Patrón Esclerodérmico (Patológico):* **Megacapilares** (asas dilatadas gigantes > 50 micras), microhemorragias periungueales en empalizada y, en fases avanzadas, **zonas de pérdida capilar / avasculares** y neoangiogénesis ramificada anómala. 1.11.1.009

Tratamiento del Fenómeno de Raynaud:

• **Medidas No Farmacológicas (Obligatorias en Todos):** Protección térmica rigurosa (guantes térmicos, calcetines de lana, evitar tocar agua fría), **CESE ABSOLUTO DEL TABAQUISMO** (la nicotina es un potente vasoconstrictor) y evitar fármacos vasoconstrictores (betabloqueadores, descongestionantes nasales adrenérgicos, ergotamina y triptanes).

• **Tratamiento Farmacológico de Primera Línea: Bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos**, de elección **Nifedipino oral** (iniciar a 10-20 mg/día de liberación prolongada, titulando hasta 30-60 mg/día) o Amlodipino (5 a 10 mg/día).

• Formas severas con úlceras isquémicas activas: Inhibidores de fosfodiesterasa-5 (Sildenafil oral 20-50 mg c/8h), análogos de prostaciclina endovenosa (Iloprost) o antagonistas del receptor de endotelina (Bosentán).


Cuándo sospechar esclerosis sistémica ante un Raynaud (sospecha diagnóstica): se sospecha en un Raynaud **de inicio después de los 30 años**, asimétrico, intenso, con **úlceras o necrosis digitales**, manos edematosas (dedos tumefactos), engrosamiento de la piel de los dedos, telangiectasias, reflujo gastroesofágico, disnea o ANA positivos (patrón nucleolar o anticentrómero) o capilaroscopía con megacapilares y áreas avasculares. Los criterios de clasificación ACR/EULAR 2013 asignan puntaje: el **engrosamiento cutáneo de los dedos de ambas manos que se extiende proximal a las metacarpofalángicas** (9 puntos) basta por sí solo; el resto suma por dedos hinchados o esclerodactilia (2-4), lesiones de pulpejos (úlceras 2, cicatrices en pulpejo 3), telangiectasias (2), capilaroscopía anormal (2), hipertensión pulmonar o EPI (2), Raynaud (3) y anticuerpos específicos (anticentrómero, anti-Scl-70, anti-ARN polimerasa III) (3); ≥ 9 puntos clasifica como esclerosis sistémica. La conducta inicial en APS es solicitar ANA, hemograma, creatinina, orina, radiografía de tórax y capilaroscopía, iniciar las medidas contra el frío y bloqueador de calcio, y **derivar** a reumatología (el diagnóstico completo y su manejo están en el tema 9.12).



A. FASE BLANCA



B. BLANCO Y AZUL



C. CAPILARES EN CUATRO ETAPAS

Imagen 9.14

FIGURA 9.14 · DIFERENCIACIÓN DE FENÓMENO DE RAYNAUD PRIMARIO VS SECUNDARIO Y CAPILAROSCOPÍA




TABLA 9.14 · DIFERENCIAS CRÍTICAS ENTRE FENÓMENO DE RAYNAUD PRIMARIO Y SECUNDARIO 1.11.1.009

PARÁMETRO CLÍNICO / BIOLÓGICO	RAYNAUD PRIMARIO (ENFERMEDAD)	RAYNAUD SECUNDARIO (SÍNDROME)
Edad de inicio	Típicamente 15 – 30 años (mujeres jóvenes)	Típicamente > 30 – 40 años
Simetría	Estrictamente simétrico y bilateral	Frecuentemente asimétrico
Daño tisular trófico	AUSENTE (sin necrosis ni úlceras)	PRESENTE: Úlceras digitales dolorosas, cicatrices puntiformes
Autoanticuerpos (ANA)	Negativos (o títulos insignificantes)	POSITIVOS en títulos significativos (anti-Scl70, ACA, etc.)
Capilaroscopía periungueal	Normal (asas regulares en horquilla)	PATOLÓGICA (megacapilares, hemorragias, áreas avasculares)
Reactantes (VHS / PCR)	Estrictamente normales	Frecuentemente elevados
Etiología subyacente	Idiopático funcional	Esclerosis sistémica, LES, Sjögren, fármacos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.14

Mujer de 21 años, estudiante universitaria, consulta por cambios de coloración en los dedos de ambas manos cuando se expone al frío en invierno. Refiere que los dedos se tornan completamente blancos y fríos, luego azulados y finalmente enrojecidos y calientes al volver a una habitación temperada. Los episodios son simétricos en ambas manos. Al examen físico no se observan úlceras, cicatrices ni esclerodactilia, los pulsos radiales son simétricos y amplios. Los exámenes de laboratorio revelan hemograma, VHS y función renal normales, con anticuerpos antinucleares (ANA) negativos. La capilaroscopía periungueal muestra asas capilares finas y regulares sin dilataciones.

Conducta oficial. Se trata de un Fenómeno de Raynaud Primario (Enfermedad de Raynaud): mujer joven con episodios simétricos trifásicos desencadenados por frío, ausencia total de necrosis tisular, ANA negativos y capilaroscopía periungueal normal. El manejo inicial de elección consiste en medidas generales de fotoprotección térmica (uso de guantes y ropa abrigada) y evitar vasoconstrictores. Si los síntomas son molestos o interfieren con sus actividades, se puede iniciar Nifedipino a dosis bajas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Las 3 fases del Raynaud son: Palidez (vasoespasmo), Cianosis (estasis desoxigenada) y Rubor (reperfusión reactiva).
- El Raynaud Primario es simétrico, sin úlceras digitales, con ANA (-) y capilaroscopía normal.
- El Raynaud Secundario es asimétrico, con úlceras en pulpejos, ANA (+) y capilaroscopía con megacapilares.
- La capilaroscopía periungueal es el examen de elección para descartar conectivopatía subyacente.
- Fármaco de primera línea para el Raynaud sintomático: Calcioantagonistas dihidropiridínicos (Nifedipino oral).
- Están contraindicados los betabloqueadores y vasoconstrictores en pacientes con Raynaud.
- El cese del tabaquismo es mandatorio en todo paciente con fenómeno de Raynaud.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

1. El fenómeno de Raynaud es característico de la siguiente patología:

A) Esclerodermia
B) Dermatomiositis
C) Síndrome de Sjörgren
D) Artritis reumatoide
E) Artritis psoriática

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

2. Una paciente de 45 años presenta fenómeno de Raynaud intenso y frecuente en ambas manos. Además refiere disfagia progresiva. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboangeítis obliterante
B) Síndrome antifosfolípidos
C) Esclerosis múltiple
D) Esclerodermia
E) Cáncer de esófago, con dermatomiositis paraneoplásica secundaria

Más preguntas online de Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal →

9.15. Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.022 6.02.1.024 1.11.4.003

¿POR QUÉ?

El Síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune que destruye glándulas salivales y lagrimales. En EUNACOM se evalúa el test de Schirmer, los anticuerpos Anti-Ro/Anti-La y el elevado riesgo de Linfoma MALT. La Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) destaca por su tríada clínica de superposición (Raynaud, dedos en salchicha, miositis) y su marcador exclusivo: Anti-RNP en títulos altos.

1. SÍNDROME DE SJÖGREN: FISIOPATOLOGÍA Y CUADRO CLÍNICO

Es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica caracterizada por la **infiltración linfocítica progresiva (linfocitos T CD4+ y linfocitos B) de las glándulas exocrinas**, provocando destrucción del parénquima acinar y pérdida irreversible de secreciones mucosas. **(ver Imagen 9.15B y C)** 1.11.1.022

Afecta predominantemente a mujeres (relación 9:1) en la perimenopausia (40-60 años). Puede ser **Primario** (aislado) o **Secundario** (asociado a Artritis Reumatoide [el más común], LES o Esclerodermia).

Manifestaciones Cardinales del Síndrome Seco (Sicca):



Síndrome de Sjögren: lengua seca y fisurada

• **Xeroftalmia (Queratoconjuntivitis seca):** Sensación constante de cuerpo extraño o arenilla ocular, ardor, prurito, hiperemia conjuntival y fotofobia. 1.11.1.022 6.02.1.024

• **Xerostomía:** Sequedad bucal severa que obliga a beber agua para tragar alimentos secos, dificultad para hablar continuamente, pérdida del gusto, y aparición precoz de **caries dentales rampantes cervicales (en el cuello de los dientes)** y candidiasis orofaríngea recurrente por pérdida de la acción protectora de la saliva. 1.11.1.022


• **Agrandamiento de Glándulas Salivales:** Tumefacción indolora recurrente o persistente de las glándulas parótidas (frecuentemente bilateral).

• Manifestaciones extraglandulares sistémicas: Artralgias/artritis no erosiva, fenómeno de Raynaud (30%), acidosis tubular renal distal (tipo I con hipocalemia y nefrocalcinosis) y neuropatía sensitiva periférica.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS ACR/EULAR EN SJÖGREN Y RIESGO DE LINFOMA


Diagnóstico de Certeza: 1.11.1.022

• **Test de Schirmer:** Mide la producción lagrimal acuosa colocando una tira de papel filtro estéril en el fondo de saco conjuntival inferior durante 5 minutos. Es **patológico si la impregnación es < 5 mm en 5 minutos**. 1.11.1.022 6.02.1.024




Test de Schirmer

• **Tinción de la superficie ocular (Verde de lisamina o Rosa de Bengala):** Detecta queratopatía puntiforme y daño del epitelio corneal/conjuntival desvitalizado. **(ver Imagen 9.15A)**



Ojo seco: tinción con rosa de Bengala de la conjuntiva



Ojo seco: tinción con fluoresceína de la conjuntiva

• **Biopsia de Glándula Salival Menor del Labio Inferior:** Procedimiento estándar de oro confirmatorio. Se toma una pequeña incisión en mucosa labial interna. Muestra **sialoadenitis linfocítica focal con Focus Score ≥ 1** (definido como al menos un foco de ≥ 50 células mononucleares por cada 4 mm² de tejido glandular). 1.11.1.022

• **Autoanticuerpos: Anti-Ro (SSA) positivos en 70-80%** y **Anti-La (SSB) positivos en 40-50%**. El Factor Reumatoide es positivo en más del 75% de los casos primarios. 1.11.1.022 1.11.4.003

ALERTA DE RIESGO ONCOLÓGICO EUNACOM: 1.11.1.022

Los pacientes con Síndrome de Sjögren presentan un **riesgo 40 veces superior al de la población general de desarrollar Linfoma No Hodgkin de**

células B, particularmente **Linfoma MALT (tejido linfoide asociado a mucosas) de glándula parótida** o gástrico. Signos de sospecha clínica: agrandamiento parotídeo unilateral persistente y duro, adenopatías palpables, esplenomegalia, aparición de púrpura palpable (crioglobulinemia mixta) y caída inexplicada de los títulos de factor reumatoide o complemento.

3. ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO (EMTC / SÍNDROME DE SHARP)

La EMTC es una entidad clínica distintiva caracterizada por la coexistencia de manifestaciones superpuestas de tres conectivopatías: **Lupus Eritematoso Sistémico, Esclerosis Sistémica y Polimiositis**.

Cuadro Clínico Característico: Fenómeno de Raynaud severo (presente en 95%), **manos edematosas con dedos tumefactos en salchicha (puffy hands)**, sinovitis/artritis no erosiva, debilidad muscular proximal con elevación de CPK, y dismotilidad esofágica distal.


MARCADOR PATOGNOMÓNICO OBLIGATORIO: Anticuerpos dirigidos contra la **ribonucleoproteína nuclear U1 (Anti-U1-RNP) positivos en títulos muy altos** (típicamente > 1:1.000 a 1:10.000), con **ausencia o negatividad estricta de anticuerpos Anti-dsDNA y Anti-Scl-70**. 1.11.4.003

Causa Principal de Muerte: La **Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP)** es la complicación más grave y la principal causa de mortalidad en EMTC. Requiere tamizaje ecocardiográfico periódico.


4. TRATAMIENTO INICIAL DEL SÍNDROME SECO: OJO SECO Y XEROSTOMÍA

Manejo inicial del ojo seco (síndrome de ojo seco; también el del Sjögren): el ojo seco puede ser *acuosodeficiente* (Sjögren, menopausia, fármacos anticolinérgicos) o *evaporativo* (disfunción de las glándulas de Meibomio, blefaritis, uso de pantallas con parpadeo reducido). El tratamiento escalonado parte con **lágrimas artificiales sin conservantes** (4-6 veces al día o más), geles o ungüentos lubricantes nocturnos, higiene palpebral y compresas tibias (en el tipo evaporativo), humidificar el ambiente, parpadeo consciente y suspender fármacos que resecan (antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, diuréticos). Si persiste, el oftalmólogo indica ciclosporina tópica 0,05% o lifitegrast, oclusión de los puntos lagrimales o suero autólogo en las formas graves. Se **deriva a oftalmología** ante dolor intenso, fotofobia, disminución de la agudeza visual, ojo rojo unilateral o sospecha de queratitis o úlcera corneal. 6.02.1.024 1.11.1.022

Tratamiento inicial del síndrome de Sjögren (síndrome seco y manifestaciones sistémicas): en la **xerostomía** se indican sorbos frecuentes de agua, chicles o caramelos sin azúcar, saliva artificial y buena higiene bucal con flúor tópico para prevenir caries, tratando de inmediato la candidiasis oral (nistatina o fluconazol); los sialogogos **pilocarpina** (5 mg cada 8 horas) o cevimelina mejoran el flujo salival, con cautela en asma no controlada, glaucoma de ángulo estrecho y bradicardia. Para el compromiso sistémico se usa hidroxicloroquina en artralgias y fatiga (evidencia limitada), y corticoides con inmunosupresores o rituximab en las manifestaciones extraglandulares graves (vasculitis, neuropatía, glomerulonefritis, citopenias). Se controla al menos cada 6-12 meses con vigilancia de linfoma: parotidomegalia persistente, púrpura palpable, crioglobulinemia, C4 bajo, esplenomegalia o adenopatías obligan a **derivar**. Todo paciente con Sjögren se maneja en conjunto con reumatología, oftalmología y odontología. 1.11.1.022



A. ROSA DE BENGALA



B. FLUORESCEÍNA



C. LENGUA SECA Y FISURADA

Imagen 9.15

FIGURA 9.15 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO: SÍNDROME DE SJÖGREN (SICCA) Y CRITERIOS DE EMTC




TABLA 9.15 · RESUMEN DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y MARCADORES: SJÖGREN VS EMTC

1.11.1.022, 6.02.1.024, 1.11.4.003

ENFERMEDAD	MANIFESTACIÓN GUÍA CARDINAL	PRUEBA DIAGNÓSTICA OBJETIVA	AUTOANTICUERPO CLAVE	COMPLICACIÓN MAYOR
Síndrome de Sjögren	Xeroftalmia (ojo seco) + Xerostomía (boca seca)	Test de Schirmer (<5mm/5min) y Biopsia labial (Focus Score ≥1)	Anti-Ro (SSA) y Anti-La (SSB)	Linfoma No Hodgkin B (MALT en parótida)
Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)	Raynaud + Manos tumefactas (puffy fingers) + Miositis + Artritis	Biopsia muscular miopática y manometría esofágica	Anti-U1-RNP a títulos muy altos (>1:1.000)	Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.15

Mujer de 48 años consulta por sensación constante de arenilla en ambos ojos y ardor ocular que le dificulta leer y usar pantallas, de 1 año de evolución. Además refiere boca seca que la obliga a levantarse por las noches a beber agua y necesidad de líquidos abundantes para deglutir alimentos secos como pan o galletas. Su odontólogo le ha tratado 5 caries en el cuello de las piezas dentarias en los últimos 6 meses. Al examen físico se palpa aumento de volumen indoloro y blando de ambas glándulas parótidas. El test de Schirmer muestra un lagrimeo de 2 mm en 5 minutos en ambos ojos. Los exámenes revelan ANA positivos 1:320 y anticuerpos Anti-Ro (SSA) fuertemente positivos.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a un Síndrome de Sjögren Primario clásico: xeroftalmia confirmada por test de Schirmer patológico (< 5 mm/5 min), xerostomía severa con caries cervicales aceleradas por hiposialia, parotidomegalia bilateral y anticuerpos Anti-Ro positivos. El manejo inicial consiste en lágrimas artificiales sin preservantes, saliva artificial, medidas estrictas de higiene dental para prevenir la pérdida de piezas dentarias y vigilancia periódica clínica para detección precoz de linfoma de células B.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune caracterizada por xeroftalmia y xerostomía.
- El Test de Schirmer es patológico si la impregnación del papel filtro es < 5 mm en 5 minutos.
- La biopsia de glándula salival menor es el estándar de oro: muestra infiltrado focal ≥ 1 foco/4 mm².
- Los anticuerpos Anti-Ro (SSA) son positivos en 70-80% y Anti-La (SSB) en 40-50% de los pacientes.
- Los pacientes con Síndrome de Sjögren tienen un riesgo 40 veces mayor de desarrollar Linfoma MALT.
- La EMTC combina características de Lupus, Esclerodermia y Polimiositis.
- El marcador patognomónico de la EMTC es el anticuerpo Anti-U1-RNP a títulos muy elevados.
- La principal causa de mortalidad en la EMTC es la Hipertensión Arterial Pulmonar.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.15

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.022

1. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico del Síndrome de Sjögren?

A) Xerostomía
B) Anticuerpos Anti- Jo1 y Mi-2 positivos
C) Anticuerpos Anti- proteína P positivos
D) Test Hirschberg positivo
E) Artritis erosiva

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.022

2. El test de Schirmer positivo (con hipolacrimia) es característico de:

A) Enfermedad de Behcet
B) Sarcoidosis
C) Síndrome de CREST
D) Dermatomiositis
E) Síndrome de Sjörgren

Más preguntas online de Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 9.11 A 9.15

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	El SAF requiere al menos 1 criterio clínico (trombosis o morbilidad obstétrica) y 1 de...	**Los anticuerpos deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un mínimo de 12...**	Los DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) están CONTRAINDICADOS en pacientes con SAF de triple...
Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal	La Esclerosis Difusa presenta afección cutánea proximal al codo y tronco, Anti-Scl-70 y...	**La Esclerosis Limitada (CREST) se asocia a Anticentrómero (ACA) y riesgo tardío de...**	REGLA DE ORO: Las dosis de Prednisona > 15 mg/día están contraindicadas en esclerosis...
Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto	Las miopatías inflamatorias cursan con debilidad muscular proximal simétrica y...	**Tanto la polimiositis como la dermatomiositis RESPETAN los músculos faciales y...**	—
Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal	Las 3 fases del Raynaud son: Palidez (vasoespasmo), Cianosis (estasis desoxigenada) y...	**El Raynaud Primario es simétrico, sin úlceras digitales, con ANA (-) y capilaroscopía...**	La capilaroscopía periungueal es el examen de elección para descartar conectivopatía...
Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)	El Síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune caracterizada por xeroftalmia y...	**El Test de Schirmer es patológico si la impregnación del papel filtro es < 5 mm en 5...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El SAF requiere al menos 1 criterio clínico (trombosis o morbilidad obstétrica) y 1 de laboratorio.

Los anticuerpos deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un mínimo de 12 semanas.

El Anticoagulante Lúpico alarga el TTPK in vitro, pero es el marcador de mayor riesgo trombótico in vivo.

En trombosis venosa por SAF, el tratamiento de elección es Acenocumarol o Warfarina (INR 2.0 a 3.0) de por vida.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Los anticuerpos deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un mínimo de 12 semanas.
- El Anticoagulante Lúpico alarga el TTPK in vitro, pero es el marcador de mayor riesgo trombótico in vivo.
- La Esclerosis Limitada (CREST) se asocia a Anticentrómero (ACA) y riesgo tardío de Hipertensión Pulmonar (HTP Grupo 1).
- El Síndrome de CREST comprende: Calcinosis, Raynaud, Esofagopatía, Sclerodactilia y Telangiectasias.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El SAF requiere al menos 1 criterio clínico (trombosis o morbilidad obstétrica) y 1 de laboratorio.	Tema 9.11 →
La Esclerosis Difusa presenta afección cutánea proximal al codo y tronco, Anti-Scl-70 y alto riesgo de EPID y...	Tema 9.12 →
Las miopatías inflamatorias cursan con debilidad muscular proximal simétrica y elevación masiva de CPK.	Tema 9.13 →
Las 3 fases del Raynaud son: Palidez (vasoespasmo), Cianosis (estasis desoxigenada) y Rubor (reperfusión reactiva).	Tema 9.14 →
El Síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune caracterizada por xeroftalmia y xerostomía.	Tema 9.15 →

MANUAL EUNACOM DE REUMATOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

5	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
9.16	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	85
9.17	Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF	89
9.18	Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII	94
9.19	Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento	98
9.20	Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis	102

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.11.1.018, 1.11.1.013, 1.11.1.006	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.018, 6.02.1.030	Espondilitis Anquilosante	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.001, 1.06.1.018, 1.11.1.018	Artritis Psoriásica	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.002, 1.04.1.010, 1.11.1.016	Artritis Reactiva	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.025, 6.02.1.030	Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El dolor lumbar inflamatorio MEJORA con el ejercicio y EMPEORA con el reposo en cama.
- El dolor nocturno en la segunda mitad de la noche que obliga a levantarse es característico de inflamación axial.
- Los criterios ASAS exigen dolor crónico (> 3 meses) en menores de 45 años con al menos 4 de 5 parámetros cardinales.
- El dolor en nalgas alternante (en báscula) es la manifestación semiológica de la sacroilitis bilateral.
- Las espondiloartritis son seronegativas: Factor Reumatoide y ANA son constantemente negativos.
- La entesitis (inflamación del tendón de Aquiles o fascia plantar) es la lesión patológica distintiva.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	EUNACOM Diciembre 2024 · #110 · EUNACOM Agosto 2021 · #97 · EUNACOM Julio 2019 · #72 · EUNACOM Julio 2015 · #125
Espondilitis Anquilosante	EUNACOM Diciembre 2024 · #110 · EUNACOM Enero 2023 · #98 · EUNACOM Diciembre 2022 · #46 · EUNACOM Agosto 2021 · #97
Artritis Psoriásica	EUNACOM Diciembre 2025 · #111 · EUNACOM Julio 2025 · #163 · EUNACOM Julio 2025 · #164 · EUNACOM Diciembre 2025 · #16
Artritis Reactiva	EUNACOM Julio 2025 · #36 · EUNACOM Julio 2025 · #37 · EUNACOM Diciembre 2025 · #52 · EUNACOM Enero 2023 · #40
Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis	EUNACOM Diciembre 2024 · #165 · EUNACOM Enero 2023 · #98 · EUNACOM Diciembre 2022 · #46 · EUNACOM Julio 2019 · #106

9.16. Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.018 1.11.1.013 1.11.1.006

¿POR QUÉ?

Las espondiloartritis representan una familia de artropatías autoinmunes axiales y periféricas interconectadas por la genética (HLA-B27) y la entesitis. La perla más evaluada en EUNACOM es la diferenciación semiológica indiscutible entre el lumbago mecánico común (que alivia en reposo) y el lumbago inflamatorio (que mejora con el movimiento y despierta al paciente en la madrugada).

1. CONCEPTO UNIFICADOR DE LAS ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS

Las espondiloartritis (SpA) constituyen un grupo heterogéneo pero estrechamente vinculado de enfermedades inflamatorias que comparten características etiopatogénicas, clínicas y radiológicas: 1.11.1.018

1. **Seronegatividad inmunológica:** Ausencia constante de Factor Reumatoide (FR) y de Anticuerpos Antinucleares (ANA).

2. **Asociación Genética con HLA-B27:** Presente en más del 90% de las espondilitis anquilosantes y en 50-70% de las formas reactivas, psoriásicas y enteropáticas.

3. **Afección Axial y Periférica:** Inflamación crónica del esqueleto axial (sacroilitis y espondilitis) y oligoartritis asimétrica de predominio en miembros inferiores. **(ver Imagen 9.16A y B)**

4. **Entesitis como Lesión Elemental:** Inflamación del punto de anclaje óseo de tendones, ligamentos y cápsulas articulares (entesis aquiliana, fascia plantar, inserción de costillas).

5. **Manifestaciones Extraarticulares Compartidas:** Uveítis anterior aguda unilateral con hipopión, psoriasis cutánea y ungueal, inflamación de mucosa intestinal subclínica o EII e insuficiencia aórtica.

2. SEMIOLOGÍA COMPARADA: LUMBAGO INFLAMATORIO VS LUMBAGO MECÁNICO

La identificación del **lumbago inflamatorio** es la clave para la detección precoz antes de que se desarrolle anquilosis ósea irreversible: 1.11.1.018 1.11.1.006

Criterios ASAS para Dolor Lumbar Inflamatorio (Sensibilidad 80%, Especificidad 72%):

Se sospecha firmemente ante la presencia de **al menos 4 de los siguientes 5 parámetros** en un dolor lumbar crónico (≥ 3 meses de duración):

1. **Edad de inicio menor de 45 años.**

2. **Comienzo insidioso** y solapado (no agudo tras cargar peso).

3. **MEJORÍA franca con el ejercicio físico y el movimiento.**

4. **EMPEORAMIENTO o nula mejoría con el reposo en cama.**

5. **Dolor nocturno** que despierta típicamente al paciente en la segunda mitad de la noche, obligándolo a levantarse y caminar para encontrar alivio.

Adicionalmente: Se acompaña de **rigidez matinal prolongada (> 30 a 60 minutos)** y una **respuesta dramática y casi completa a los AINEs** dentro de las primeras 24 a 48 horas de iniciado el fármaco.

Lumbago Mecánico: Es la causa del 90-95% de los dolores lumbares en la población general. Se debe a sobrecarga discal, contractura muscular o artrosis interapofisaria. *Comportamiento:* El dolor se desencadena o empeora con la flexión, bipedestación o carga, y **CEDE COMPLETAMENTE CON EL REPOSO EN CAMA**; no interrumpe el sueño y la rigidez matinal dura menos de 15 minutos. 1.11.1.013 1.11.1.006


3. LUMBAGO MECÁNICO Y COLUMNA DOLOROSA: ESTUDIO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

Tratamiento del lumbago mecánico agudo (< 6 semanas): la gran mayoría mejora en 4-6 semanas. El tratamiento es **mantener la actividad habitual** tan pronto como el dolor lo permita (el reposo en cama prolongado, más de 2 días, retrasa la recuperación), calor local, AINEs a dosis plenas por pocos días (naproxeno 500 mg cada 12 horas o ibuprofeno 400-600 mg cada 8 horas, con protección gástrica si hay riesgo), y relajante muscular nocturno por no más de 1 semana en caso de contractura intensa. Se **evitan opioides, corticoides sistémicos, reposo prolongado y estudios de imágenes** en ausencia de banderas rojas. Se educa sobre el buen pronóstico, ergonomía y retorno laboral precoz, con licencia médica lo más corta posible. 1.11.1.013

Seguimiento, lumbago subagudo/crónico y ciática: se reevalúa a las 2-4 semanas. En el dolor que supera las 6 semanas (subagudo) y las 12 semanas (crónico) se agrega ejercicio terapéutico y kinesioterapia (fortalecimiento del core, escuela de espalda), manejo de peso y de factores psicosociales, y se pueden usar duloxetina o antidepresivos tricíclicos en dosis bajas; la derivación a fisiatría o traumatología se hace si no hay mejoría en 6-12 semanas. En la **lumbociática** (dolor irradiado bajo la rodilla, signo de Lasègue positivo a 30-70°) la causa habitual es la hernia del núcleo pulposo L4-L5 o L5-S1; mejora en 6-12 semanas con AINEs y actividad, y se opera solo con déficit motor progresivo, síndrome de cauda equina o dolor intratable. La RM se pide solo ante banderas rojas, déficit neurológico o candidatos a cirugía. 1.11.1.013 1.11.1.006

Columna dolorosa: banderas rojas y orientación diagnóstica por causa. Son banderas rojas: edad < 20 o > 50 años al inicio, trauma significativo, antecedente de cáncer, fiebre, baja de peso, inmunosupresión o uso de drogas endovenosas, dolor nocturno o no mecánico que no cede con el reposo, déficit neurológico progresivo y síntomas de cauda equina (anestesia en silla de montar, retención urinaria, incontinencia fecal): requieren estudio inmediato (hemograma, VHS, PCR, radiografía y RM según el caso) o derivación urgente. Las causas son: **mecánica degenerativa** (discopatía, artrosis facetaria, estenosis del canal con claudicación neurogénica que mejora al inclinarse hacia adelante), **inflamatoria** (espondiloartritis: dolor < 45 años, rigidez matinal, mejoría con el ejercicio), **infecciosa** (espondilodiscitis por *S. aureus* o tuberculosis; fiebre y VHS elevada), **neoplásica** (metástasis de mama, próstata, pulmón y riñón, o mieloma múltiple), **fractura osteoporótica por compresión** (adulto mayor con dolor súbito localizado) y **dolor referido** de origen visceral (aneurisma aórtico, pancreatitis, litiasis renal, patología pélvica). 1.11.1.006

Manejo y seguimiento de la columna dolorosa según el segmento: la **cervicalgia** mecánica se maneja con calor, AINEs, kinesioterapia y evitar posturas forzadas; la radiculopatía cervical (C6-C7: dolor, parestesias y debilidad en el brazo) mejora en la mayoría de los casos con tratamiento conservador, y la mielopatía cervical (torpeza de manos, marcha espástica) requiere derivación neuroquirúrgica. La **dorsalgia** es menos frecuente y obliga a descartar tumor, fractura e infección. La **fractura vertebral osteoporótica** se maneja con analgesia, movilización precoz, calcio, vitamina D y tratamiento antiosteoporótico. En todos los casos se hace seguimiento clínico a las 2-4 semanas, se educa sobre las alarmas para consulta precoz y se deriva si hay mala evolución o sospecha de causa inflamatoria, infecciosa o neoplásica.



A. SACROILITIS EN LA RX



B. RM STIR: SACROILITIS ACTIVA

Imagen 9.16

FIGURA 9.16 · DIFERENCIACIÓN CLÍNICA: LUMBAGO INFLAMATORIO (ESPONDILOARTROPATÍA) VS MECÁNICO




TABLA 9.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: LUMBAGO INFLAMATORIO VS MECÁNICO 1.11.1.018, 1.11.1.013, 1.11.1.006

PARÁMETRO CLÍNICO	LUMBAGO INFLAMATORIO (ESPONDILOARTROPATÍA)	LUMBAGO MECÁNICO COMÚN
Edad habitual de inicio	Menor de 45 años (típicamente 20 – 35 años)	Cualquier edad (pico entre 30 y 60 años)
Forma de inicio	Insidiosa, progresiva, sin desencadenante claro	Aguda o subaguda, frecuentemente tras esfuerzo físico
Efecto del ejercicio	MEJORA marcadamente con la actividad física	EMPEORA con el ejercicio y la deambulación
Efecto del reposo	EMPEORA con el reposo prolongado en cama	MEJORA o desaparece con el reposo en cama
Dolor nocturno	Frecuente en la 2da mitad de la noche; obliga a levantarse	Raro o ausente (salvo cambios posturales bruscos)
Rigidez matinal	Prolongada (superior a 30 – 60 minutos)	Breve (menor a 15 – 30 minutos)
Respuesta a AINEs	Espectacular y rápida (alivio > 75% en 24-48h)	Parcial o modesta
Dolor en nalgas	Alternante (en báscula: sacroilitis bilateral)	Unilateral o irradiado por dermatoma (ciática)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.16

Hombre de 26 años, administrativo, consulta por dolor lumbar bajo y en ambas nalgas de 5 meses de evolución. Refiere que el dolor es mucho más intenso en las mañanas al despertar, acompañado de rigidez de columna que dura más de 1 hora y que le dificulta calzarse los zapatos. El dolor lo despierta a las 4:00 AM, obligándolo a pasear por la habitación. Conforme camina y avanza el día, el dolor disminuye significativamente. Ha tomado Ibuprofeno 400 mg de forma ocasional con alivio casi inmediato de los síntomas.

Conducta oficial. El cuadro clínico cumple la totalidad de los criterios ASAS para Dolor Lumbar Inflamatorio: paciente menor de 45 años, duración mayor a 3 meses de inicio insidioso, dolor nocturno que interrumpe el sueño, rigidez matinal mayor a 60 minutos, mejoría nítida con el ejercicio, dolor glúteo alternante (sugerente de sacroilitis) y excelente respuesta a AINEs. El diagnóstico más probable es una Espondiloartritis axial precoz (Espondilitis Anquilosante). Requiere estudio con radiografía/resonancia magnética de articulaciones sacroilíacas y HLA-B27.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El dolor lumbar inflamatorio MEJORA con el ejercicio y EMPEORA con el reposo en cama.
- El dolor nocturno en la segunda mitad de la noche que obliga a levantarse es característico de inflamación axial.
- Los criterios ASAS exigen dolor crónico (> 3 meses) en menores de 45 años con al menos 4 de 5 parámetros cardinales.
- El dolor en nalgas alternante (en báscula) es la manifestación semiológica de la sacroilitis bilateral.
- Las espondiloartritis son seronegativas: Factor Reumatoide y ANA son constantemente negativos.
- La entesitis (inflamación del tendón de Aquiles o fascia plantar) es la lesión patológica distintiva.
- La excelente y rápida respuesta analgésica a los AINEs es un rasgo diagnóstico de valor en el lumbago inflamatorio.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

1. Todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante (anquilopoyética) EXCEPTO:

A) Dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses que mejora con el ejercicio pero no con el reposo.
B) Sacroileitis radiológica bilateral.
C) Uveítis aguda anterior.
D) Insuficiencia aórtica.
E) Vasculitis de pequeños vasos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

2. Hombre de 24 años, deportista. Consulta por dolor glúteo y lumbar de semanas de evolución, que lo despierta en la noche y que se alivia con la actividad. Refiere además talalgia matinal bilateral y una molestia en el tendón aquiliano izquierdo. Ha ingerido antiinflamatorios con disminución parcial y transitoria de los síntomas. Desde ayer nota que el segundo ortejo del pie derecho está rojo y doloroso. El diagnóstico más probable es:

A) Artritis séptica
B) Pelviespondilopatía
C) Gota
D) Condrocalcinosis
E) Lumbago mecánico

Más preguntas online de Espondiloartritis →

9.17. Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.018 6.02.1.030

¿POR QUÉ?

La Espondilitis Anquilosante es el paradigma de las espondiloartropatías. Afecta principalmente a hombres jóvenes produciendo anquilosis fibrosa y ósea de la columna vertebral. El EUNACOM indaga constantemente en las maniobras clínicas de limitación articular (Schöber y expansión torácica), el hallazgo radiológico de sacroilitis bilateral simétrica y sindesmofitos (columna en caña de bambú), las manifestaciones extraarticulares como la uveítis anterior aguda unilateral, y la ineficacia del metotrexato para la columna frente al éxito de los fármacos anti-TNF.


1. FISIOPATOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA Y COMPROMISO AXIAL PROGRESIVO

La espondilitis anquilosante se desencadena por una respuesta inmune anómala ante péptidos antigénicos en individuos genéticamente susceptibles portadores del alelo **HLA-B27 (presente en el 90-95% de los pacientes)**. 1.11.1.018

Predomina en el **sexo masculino (proporción 3:1)**, con inicio clínico característico entre los **15 y los 30 años**. El inicio después de los 45 años es muy infrecuente.

El proceso inflamatorio primario asienta en las **entesis fibrocartilaginosas** de las articulaciones sacroilíacas y de los discos intervertebrales. La entesitis erosiva inicial es seguida por una respuesta reparadora ósea exagerada con proliferación de tejido osteoide que se osifica progresivamente, formando puentes óseos intersomáticos verticales delgados llamados **sindesmofitos**. **(ver Imagen 9.17B)**

La anquilosis ósea progresiva fusiona las articulaciones sacroilíacas, los cuerpos vertebrales, las articulaciones apofisarias posteriores y las costovertebrales, transformando la columna en una estructura rígida continua e inmóvil: la clásica **"columna en caña de bambú" (bamboo spine)**. **(ver Imagen 9.17C)**



Rx comparativa de columna

2. EXPLORACIÓN FÍSICA REUMATOLÓGICA DE LA COLUMNA Y CAJA TORÁCICA

La limitación del rango articular de la columna en los tres planos del espacio es el signo objetivo fundamental: 1.11.1.018

• **Test de Schöber Modificado (Flexión Lumbar):** Con el paciente de pie erecto se marca la línea entre las espinas ilíacas posterosuperiores (interlínea L5-S1) y un segundo punto 10 cm más arriba en la columna lumbar. Se solicita al paciente que flexione el tronco hacia adelante al máximo con las rodillas extendidas. En personas sanas la distancia entre las marcas se incrementa en ≥ 5 cm (alcanzando ≥ 15 cm). **Un aumento menor a 5 cm es PATOLÓGICO** e indica rigidez lumbar anquilosante.

• **Expansión Torácica:** Se mide con cinta métrica en el 4to espacio intercostal durante una inspiración forzada máxima tras una espiración forzada completa. Un valor **menor a 2.5 cm es patológico** y traduce anquilosis de las articulaciones costovertebrales y costotransversas, condicionando un patrón ventilatorio restrictivo puro.

• **Distancia Occipucio-Pared (Fleche de Stibor):** Evalúa la pérdida de lordosis cervical y cifosis dorsal. Apoyando talones y espalda contra la pared, en el paciente anquilosado el occipucio no logra contactar la pared (distancia > 0 cm).

TABLA 9.17.A · HALLAZGOS RADIOLÓGICOS PROGRESIVOS EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 1.11.1.018, 6.02.1.030

REGIÓN ANATÓMICA	FASE PRECOZ / INCIPIENTE	FASE AVANZADA / ANQUILOSIS
Articulaciones Sacroilíacas	Pseudoensanchamiento articular por erosiones subcondrales	Esclerosis masiva y fusión ósea total (sacroilitis grado 4)
Cuerpos Vertebrales	Cuadratura vertebral (squaring) y erosiones en esquinas (Romanus)	Esquinas brillantes (osteosclerosis reactiva)
Espacios Intervertebrales	Sindesmofitos verticales delgados marginales incipientes	Sindesmofitos continuos en "Columna en caña de bambú"
Ligamentos de la Columna	Inflamación y calcificación del ligamento interespinoso	Signo de la vía del tren o del puñal (osificación ligamentosa continua)

9.17. Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: CRITERIOS DE NUEVA YORK MODIFICADOS Y RESONANCIA

Los **Criterios de Nueva York Modificados (1984)** exigen la presencia de al menos un criterio clínico + el criterio radiológico: 1.11.1.018

Criterio Radiológico Obligatorio:

• **Sacroilitis bilateral Grado ≥ 2** (esclerosis ósea subcondral incipiente con pequeñas erosiones), O **(ver Imagen 9.17A)**


• **Sacroilitis unilateral Grado 3 o 4** (pseudoensanchamiento por erosiones graves, esclerosis masiva o anquilosis completa con fusión articular).

Hallazgos Vertebrales en Radiografía: Cuadratura de los cuerpos vertebrales (pérdida de la concavidad anterior normal), erosiones en las esquinas vertebrales anteriores (**lesiones de Romanus**), esclerosis reactiva de las esquinas (esquinas brillantes) y **sindesmofitos marginales verticales** que unen los cuerpos contiguos hasta conformar la caña de bambú.

Resonancia Magnética (RM) de Sacroilíacas: Es el examen estándar de oro en la fase inicial o pre-radiológica. En secuencias **STIR o T2 con saturación grasa** detecta **edema óseo subcondral activo (osteítis)** años antes de que aparezcan las alteraciones estructurales en la radiografía simple.



A. RM: SACROILITIS, T1 Y STIR



B. SINDESMOFITOS



C. COLUMNA EN CAÑA DE BAMBÚ

Imagen 9.17

FIGURA 9.17 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE





TABLA 9.17.B · MANIOBRAS SEMIOLÓGICAS DE RIGIDEZ AXIAL EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE — CRITERIOS DE GRAVEDAD

MANIOBRA CLÍNICA	TÉCNICA DE MEDICIÓN	VALOR NORMAL	CRITERIO PATOLÓGICO
Test de Schöber Modificado	Incremento entre L5 y 10 cm cefálico al flexionar tronco	Aumento ≥ 5 cm (total ≥ 15 cm)	Aumento < 5 cm (rigidez de columna lumbar)
Expansión Torácica	Cinta métrica en 4to espacio intercostal inspiración máxima	> 4 – 5 cm	< 2.5 cm (anquilosis costovertebral)
Distancia Occipucio-Pared	Talones y espalda contra la pared; medir occipucio a pared	0 cm (contacto espontáneo)	> 0 cm (cifosis dorsal progresiva rígida)
Distancia Mentón-Esternón	Flexión cervical máxima hacia la horquilla esternal	0 cm (contacto)	> 0 cm (limitación de columna cervical)

9.17. Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANIFESTACIONES EXTRAARTICULARES DE LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

• **Uveítis Anterior Aguda Unilateral (25-30%):** Es la manifestación extraarticular más frecuente. Debut súbito con ojo rojo profundo (inyección ciliar periquerática), dolor ocular intenso, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa, con presencia de células y proteínas en cámara anterior (fenómeno de Tyndall) y tendencia a formar sinequias pupilares. Es típicamente **unilateral y recurrente**, alternando de ojo en distintos brotes. *Tratamiento urgente:* Corticoides tópicos en colirio + midriáticos/cicloplégicos (ciclopentolato) para evitar sinequias. 6.02.1.030



Uveítis anterior aguda

• **Afección Cardiovascular:** Aortitis de la raíz aórtica con ectasia anular que provoca **Insuficiencia Aórtica** diastólica (3-10%) y fibrosis por contigüidad del sistema de conducción cardíaco que causa **Bloqueo Auriculoventricular de diverso grado**. 1.11.1.018

• **Afección Pleuropulmonar:** Fibrosis pulmonar apical bilateral lentamente progresiva con formación de cavernas quísticas que pueden colonizarse por *Aspergillus* (aspergiloma).

• **Compromiso Neurológico:** Alto riesgo de fracturas vertebrales ante traumatismos menores debido a la rigidez óseaosteoporótica de la columna, con fracturas transdiscales inestables (fractura de la tiza / *chalk stick fracture*) que provocan compresión medular aguda.

• **Amiloidosis Secundaria (AA):** Rara complicación tardía debida a inflamación crónica persistente, con proteinuria nefrótica y falla renal.

Uveítis: clasificación y enfrentamiento general (sospecha y manejo inicial). Se clasifica por la zona inflamada en **anterior** (iritis, iridociclitis; la más frecuente, cerca del 75%), intermedia, **posterior** (coriorretinitis) y panuveítis. La uveítis anterior se presenta con ojo rojo doloroso (inyección ciliar perilimbal), fotofobia, lagrimeo, miosis y células en cámara anterior (a diferencia de la conjuntivitis, que no duele ni altera la agudeza visual, y del glaucoma agudo, con pupila midriática y córnea opaca); la posterior suele ser **indolora y sin ojo rojo**, con moscas volantes y visión borrosa. Causas: idiopática, asociada a HLA-B27 (EA, artritis reactiva, EII), AIJ, sarcoidosis, Behçet y las infecciosas: sífilis, tuberculosis, herpes, toxoplasmosis (la causa más común de uveítis posterior) y CMV en el paciente con VIH y CD4 < 50. El estudio se orienta por la clínica: hemograma, VHS, PCR, VDRL/FTA-ABS, VIH, PPD o IGRA, radiografía de tórax, HLA-B27 y serologías específicas. 6.02.1.030

Conducta inicial en uveítis: toda sospecha de uveítis se **deriva a oftalmología en 24 horas**, porque la demora puede dejar secuelas (sinequias posteriores, catarata, glaucoma secundario, edema macular, pérdida visual). La uveítis anterior no infecciosa se trata con corticoides tópicos (prednisolona acetato 1% de frecuencia horaria al inicio, con descenso gradual) más midriáticos o cicloplégicos (ciclopentolato, atropina) para evitar las sinequias y aliviar el dolor; nunca se indica corticoide tópico sin descartar queratitis herpética por el oftalmólogo. En la uveítis posterior o panuveítis se trata la causa (antiparasitarios en toxoplasmosis, antivirales, tratamiento antituberculoso o penicilina en sífilis) y se emplean corticoides perioculares o sistémicos e inmunomoduladores (adalimumab) en las formas no infecciosas. Las uveítis recurrentes unilaterales alternantes, o asociadas a lumbago inflamatorio, sugieren espondiloartritis y justifican HLA-B27 y derivación a reumatología.

5. TRATAMIENTO MÉDICO: LA INEFICACIA DEL METOTREXATO Y EL ROL DE LOS ANTI-TNF

• **Primera Línea Innegociable: Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs):** 1.11.1.018

Los AINEs a dosis plenas continuas (Naproxeno 500 mg c/12h, Indometacina 50-75 mg c/12h, Celecoxib 200 mg c/12-24h) constituyen el pilar farmacológico inicial. Alivian el dolor y la rigidez matinal en más del 80% de los pacientes y han demostrado enlentecer la formación de sindesmofitos si se toman de forma constante.

• **Kinesioterapia y Ejercicio Físico Diario:** Fundamental e indispensable de por vida: natación y gimnasia postural de extensión de columna para prevenir la anquilosis en flexión cifótica.

• **REGLA DE ORO DE INEFICACIA FARMACOLÓGICA EUNACOM:** Los FARME sintéticos tradicionales como **el Metotrexato y la Sulfasalazina NO TIENEN EFICACIA alguna en el compromiso axial puro** de la columna o articulaciones sacroilíacas (la sulfasalazina solo es útil si coexiste artritis periférica en rodillas o tobillos). Nunca se debe insistir con metotrexato para la columna.

• **Terapia Biológica (Falla de AINEs):** En pacientes con enfermedad axial activa persistente (índice BASDAI ≥ 4) a pesar de haber utilizado al menos dos AINEs diferentes a dosis plenas durante al menos 4 semanas, la indicación formal es iniciar **Terapia Biológica con Inhibidores de TNF-alfa (Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Golimumab)** o Inhibidores de Interleuquina-17 (Secukinumab). Producen una remisión clínica dramática y rápida.

TABLA 9.17.C · ALGORITMO FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

NIVEL TERAPÉUTICO	FÁRMACO / INTERVENCIÓN	INDICACIÓN CLÍNICA	OBSERVACIÓN / SEGURIDAD
Primera Línea	AINEs a dosis plenas continuas (Naproxeno 500mg c/12h) + Kinesiología	Todos los pacientes al diagnóstico	Alivio rápido en 48 horas; protección gástrica con IBP
Segunda Línea (Periférico)	Sulfasalazina 2 – 3 g / día oral	Solo si coexiste artritis periférica o entesitis refractaria	INOPERANTE para el compromiso de columna axial
Tercera Línea (Biológico)	Inhibidores TNF-alfa (Adalimumab 40mg c/2sem SC o Etanercept 50mg/sem)	Falla a ≥ 2 AINEs plenos y BASDAI ≥ 4	Mandatorio descartar TBC latente previo con PPD/IGRA
Cuarta Línea (Biológico 2)	Inhibidores de IL-17A (Secukinumab 150-300 mg SC mensual)	Falla o contraindicación a Anti-TNF	No usar si coexiste Enfermedad de Crohn activa

9.17. Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (EA))

- La Espondilitis Anquilosante predomina en varones jóvenes (15 a 30 años) y se asocia en > 90% al HLA-B27.
- La expansión torácica menor a 2.5 cm traduce anquilosis costovertebral con patrón restrictivo.
- La complicación extraarticular más frecuente es la Uveítis Anterior Aguda Unilateral no granulomatosa recurrente.
- Los AINEs a dosis plenas son el tratamiento farmacológico de primera línea indiscutido.
- El Test de Schöber patológico (< 5 cm de aumento) demuestra rigidez de la columna lumbar.
- El criterio radiológico diagnóstico mandatorio es la Sacroilitis bilateral Grado ≥ 2 o unilateral Grado 3-4.
- A nivel cardiovascular puede provocar Insuficiencia Aórtica y Bloqueo Auriculoventricular.
- REGLA DE ORO: El Metotrexato NO sirve para el compromiso axial; si fallan los AINEs, se indica Terapia Biológica Anti-TNF.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.17

Hombre de 25 años consulta por lumbago bajo y dolor en ambas nalgas de 8 meses de evolución, que empeora en la segunda mitad de la noche despertándolo a las 4:00 AM y mejora tras levantarse y caminar. Presenta rigidez matinal de 90 minutos. Al examen físico se realiza el test de Schöber modificado, observándose un incremento de solo 2 cm entre las marcas a la flexión forzada anterior. La expansión torácica es de 1.8 cm. Presenta antecedentes de un episodio de uveítis anterior unilateral en ojo derecho hace 1 año resuelto con colirios. La radiografía simple de pelvis muestra sacroilitis bilateral simétrica con erosiones y esclerosis subcondral (Grado 3 bilateral).

Conducta oficial razonada. El paciente cumple los criterios de Nueva York modificados para Espondilitis Anquilosante: dolor lumbar inflamatorio crónico en varón joven, limitación objetiva de la movilidad lumbar (Schöber patológico < 5 cm), limitación de la caja torácica (< 2.5 cm), antecedente de uveítis anterior aguda unilateral (la complicación extraarticular más clásica) y confirmación radiológica inequívoca de sacroilitis bilateral Grado 3. El tratamiento de primera línea que debe instaurarse de inmediato son los AINEs a dosis plenas continuas (ej. Naproxeno 500 mg cada 12 horas) asociados a kinesioterapia diaria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.17 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

1. Un paciente de 27 años presenta un cuadro de dolor lumbar crónico, mayor en reposo, asociado a rigidez matinal. En alguna ocasión presentó artritis de la rodilla derecha. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilíacas que demuestra signos de sacroileítis bilateral y de algún grado de calcificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

A) Corticoesteroides y kinesioterapia
B) Metotrexato y ciclosporina
C) Antiinflamatorios no esteroidales y ejercicios 3/endocrinologiadiabetologiay-nutriciondiabetologiaynutriciontraumatologia/ 2/7
D) Metotrexato y ejercicios
E) Ciclosfosfamida y corticoides

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

2. Un hombre de 23 años presenta dolor lumbar insidioso, mayor al despertar, pero que va disminuyendo, a medida que hace ejercicio. Además presenta sensación febril ocasional. Al examen físico tiene clara limitación a la flexión de la columna lumbar y la radiografía lumbosacra muestra sacroileítis bilateral y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar AINEs e indicar ejercicios periódicos
B) Iniciar costicoides e indicar ejercicios periódicos
C) Iniciar metotrexato e indicar ejercicios periódicos
D) Iniciar hidroxicloroquina e indicar ejercicios periódicos
E) Iniciar ciclosporina e indicar ejercicios periódicos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

3. Un hombre de 25 años consulta por lumbago crónico, de predominio nocturno, que cede con el reposo, asociado a rigidez lumbar. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilicas, que muestra signos de sacroileítis y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar metotrexato
B) Iniciar ciclosporina
C) Iniciar corticoides orales e indicar ejercicios
D) Iniciar AINES e indicar ejercicios
E) Resolver quirúrgicamente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

4. Un paciente de 25 años consulta por dolor lumbar de 4 meses de evolución, que es mayor en la mañana y se asocia a rigidez matinal, cediendo a medida que realiza actividad física. Al examen físico presenta marcada dificultad para flectar la columna, llegando a tocar sólo las rodillas con las extremidades inferiores extendidas. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar aines y reposo relativo, indicando control en caso de recurrencia
B) Iniciar analgésicos, relajantes musculares y kinesioterapia
C) Solicitar radiografía de columna lumbosacra
D) Solicitar RMN de columna lumbosacra
E) Iniciar corticoides orales y ejercicios

Más preguntas online de Espondilitis Anquilosante →

9.18. Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.001 1.06.1.018 1.11.1.018

¿POR QUÉ?

La Artritis Psoriásica y las artropatías enteropáticas son miembros prominentes de las espondiloartritis. En EUNACOM es crucial identificar la dactilitis o "dedo en salchicha", el piqueteado ungueal (pitting) asociado a sinovitis de interfalángicas distales, y entender que en la colitis ulcerosa la artritis periférica sigue el curso del brote intestinal mientras que la espondilitis es independiente.

1. ARTRITIS PSORIÁSICA: CLÍNICA, PATRONES Y CRITERIOS CASPAR

La Artritis Psoriásica (APs) afecta a un 15-30% de los pacientes con psoriasis cutánea. En el 75% de los casos la afección cutánea precede a la articular en años. **(ver Imagen 9.18A)** 1.11.1.001

Los 5 Patrones Clínicos Clásicos de Moll y Wright:

1. *Oligoartritis Asimétrica (30%):* Afecta ≤ 4 articulaciones de forma desordenada (ej. rodilla y dos dedos contralaterales).

2. *Poliartritis Simétrica (30-40%):* Similar a la AR pero con **Factor Reumatoide y Anti-CCP negativos** y presencia obligada de afección en IFD.

3. *Compromiso Predominante de Interfalángicas Distales (IFD) (10-15%):* Patrón exclusivo de la psoriasis, casi invariablemente asociado a **distrofia ungueal severa**. **(ver Imagen 9.18C)**

4. *Espondilitis / Sacroilitis Asimétrica (20%):* Sacroilitis unilateral con sindesmofitos gruesos asimétricos. 1.11.1.001 1.11.1.018

5. *Artritis Mutilante (< 5%):* Reabsorción osteolítica masiva con telescopaje de los dedos (dedos en gemelo de teatro / *opera-glass hands*). 1.11.1.001

Signos Cardinales Patognomónicos EUNACOM:

• **Dactilitis ("Dedo en salchicha"):** Tumefacción difusa de todo el dedo provocada por la combinación simultánea de tenosinovitis del flexor y sinovitis de las interfalángicas. **(ver Imagen 9.18B)**

• **Afectación Ungueal (Pitting Ungueal):** Piqueteado o depresiones puntiformes en dedal, onicolisis, hiperqueratosis subungueal y manchas de color salmón ("en gota de aceite"). Es el principal factor de riesgo para artritis en IFD.

2. RADIOLOGÍA TÍPICA Y MANEJO TERAPÉUTICO EN ARTRITIS PSORIÁSICA

En la radiografía destaca la combinación paradójica de **erosión ósea unida a proliferación perióstica nueva**. En fases avanzadas produce la clásica deformidad en **"lápiz en copa" (pencil-in-cup)**, donde el extremo de la falange proximal se afila como lápiz y se introduce en la base ensanchada en copa de la falange distal. 1.11.1.001



Rx con deformidad en "lápiz en copa"

Tratamiento: En formas periféricas leves se usan AINEs. El FARME de primera línea es el **Metotrexato (15-25 mg/semana)** porque trata eficazmente la piel y la sinovitis periférica. En formas refractarias, axiales o dactilitis severa se emplean **Biológicos Anti-TNF (Adalimumab, Etanercept) o inhibidores de IL-17 (Secukinumab)**.

3. ARTRITIS ASOCIADA A ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII)

Se presenta en el 10-20% de los pacientes con Colitis Ulcerosa o Enfermedad de Crohn: 1.06.1.018

• **Artritis Periférica Tipo 1 (Pauciarticular):** Compromete < 5 articulaciones, habitualmente grandes articulaciones de carga (rodillas, tobillos). **Su curso es PARALELO a la actividad inflamatoria del intestino**: los brotes de artritis coinciden con las crisis de diarrea y sangrado rectal, y remite al controlar la colitis o tras colectomía.

• **Artritis Periférica Tipo 2 (Poliarticular):** Compromete ≥ 5 articulaciones pequeñas de manos. Su curso es **INDEPENDIENTE de la actividad intestinal**.

• **Forma Axial (Sacroilitis / Espondilitis):** Clínicamente idéntica a la espondilitis anquilosante (HLA-B27 positivo en 50-70%). **Su evolución es completamente INDEPENDIENTE de la enfermedad intestinal** (la colectomía no cura la espondilitis). 1.06.1.018 1.11.1.018

Sospecha y estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII): debe sospecharse en un paciente con artritis periférica o sacroilitis que además tiene **diarrea de más de 4 semanas, con sangre y moco, dolor abdominal, tenesmo, baja de peso, fiebre o anemia**, o manifestaciones extraintestinales (eritema nodoso, pioderma gangrenoso, uveítis, aftas). La **colitis ulcerosa** compromete el recto y el colon de forma continua y superficial; la **enfermedad de Crohn** puede afectar cualquier segmento (íleon terminal), es transmural, discontinua y produce fístulas, estenosis y lesiones perianales. Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, albúmina, ferritina, coprocultivo y toxina de *C. difficile* para descartar infección, **calprotectina fecal** y **colonoscopia con biopsias** como examen diagnóstico. 1.06.1.018

Manejo inicial de la EII y su relación con la artritis: en la colitis ulcerosa leve a moderada se inicia **mesalazina (5-ASA)** oral y rectal; los brotes moderados a graves requieren **corticoides** (prednisona 40 mg/día o hidrocortisona/metilprednisolona endovenosa en el brote grave, con hospitalización) y luego inmunomoduladores (azatioprina) o terapia biológica (anti-TNF) según el especialista; el tratamiento quirúrgico (colectomía) es curativo para la colitis ulcerosa y no para el Crohn. Toda sospecha o diagnóstico de EII se **deriva a gastroenterología**. En el paciente con artritis y EII se evitan los **AINEs de uso prolongado** porque pueden gatillar o agravar el brote; en la artritis periférica son útiles la sulfasalazina y los anti-TNF, que tratan ambos cuadros, y en la forma axial están indicados los anti-TNF, ya que la sulfasalazina no es eficaz.



A. PSORIASIS EN PLACAS



B. DACTILITIS



C. INTERFALÁNGICAS DISTALES

Imagen 9.18

FIGURA 9.18 · ALGORITMO DE ARTRITIS PSORIÁSICA Y ARTRITIS ENTEROPÁTICA (EII)




TABLA 9.18 · DIFERENCIAS ENTRE ARTRITIS PERIFÉRICA TIPO 1 Y AFECCIÓN AXIAL EN EII 1.11.1.001, 1.06.1.018, 1.11.1.018

CARACTERÍSTICA	ARTRITIS PERIFÉRICA TIPO 1	COMPROMISO AXIAL (ESPONDILITIS EII)
Articulaciones afectadas	Grandes articulaciones (< 5 art: rodillas, tobillos)	Articulaciones sacroilíacas y columna vertebral
Relación con brotes intestinales	PARALELA: Coincide con crisis de diarrea/rectorragia	INDEPENDIENTE: No guarda relación con actividad intestinal
Efecto de la colectomía en CU	Cura o induce remisión de la artritis	NULO: La espondilitis continúa progresando
Asociación con HLA-B27	Baja (~10%)	Muy ALTA (50 – 70%)
Pronóstico articular	No destructiva, no deja secuelas	Progresiva con sindesmofitos y anquilosis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.18

Hombre de 36 años con antecedente de psoriasis en placas en codos de 5 años de evolución consulta por dolor e hinchazón en el tercer dedo de la mano derecha de 3 semanas. Al examen físico el dedo completo luce uniformemente engrosado, eritematoso y tumefacto, con aspecto de salchicha, con dolor exquisito a la palpación del tendón flexor y sinovitis de la articulación interfalángica distal. Las uñas muestran múltiples depresiones puntiformes en dedal (pitting) y desprendimiento ungueal distal. El factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP son negativos.

Conducta oficial. El paciente presenta una dactilitis aguda ("dedo en salchicha") con compromiso de interfalángica distal y distrofia ungueal (pitting), en contexto de psoriasis cutánea con serología negativa. Este cuadro cumple de forma definitiva los criterios CASPAR para Artritis Psoriásica. El compromiso de IFD y la dactilitis son signos cardinales patognomónicos. El tratamiento médico modificador de primera línea indicado es el Metotrexato oral o subcutáneo.

REGLAS DE oro DEL EXAMEN

- La Artritis Psoriásica afecta al 15-30% de los pacientes con psoriasis cutánea.
- La Dactilitis ("dedo en salchicha") es la tumefacción difusa de todo el dedo por artritis más tenosinovitis flexora.
- El compromiso de interfalángicas distales (IFD) con distrofia ungueal (pitting) es característico de psoriasis.
- La radiografía muestra la imagen típica en "lápiz en copa" (pencil-in-cup) con erosión y proliferación ósea.
- El Metotrexato es el FARME sintético de primera elección en artritis psoriásica periférica.
- En la Colitis Ulcerosa, la artritis periférica Tipo 1 sigue un curso PARALELO a los brotes digestivos.
- El compromiso axial en EII (espondilitis) es INDEPENDIENTE de la actividad intestinal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.18

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.001

1. La artritis psoriática se manifiesta con mayor frecuencia como:

A) Una monoartritis aguda migratoria y recidivante
B) Una oligoartritis que compromete las articulaciones cuya piel circundante presenta placas psoriáticas
C) Una oligoartritis asimétrica y migratoria de grandes y pequeñas articulaciones, asociada a dactilitis
D) Una poliartritis simétrica distal, de pequeñas y grandes articulaciones, asociadas a rigidez matinal de más de 30 minutos de duración
E) Una poliartritis de pequeñas articulaciones, asimétrica, asociada a compromiso renal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.001

2. Una mujer de 32 años presenta lesiones en las uñas, consistentes en depresiones puntiformes, similares a picotazos. El diagnóstico más probable es:

A) Onicomicosis
B) Onicogrifosis
C) Liquen plano
D) Psoriasis
E) Onicocriptosis

Más preguntas online de Artritis Psoriásica →

9.19. Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.002 1.04.1.010 1.11.1.016

¿POR QUÉ?

La Artritis Reactiva es una sinovitis estéril inmunomediada gatillada por infecciones a distancia. En EUNACOM es un clásico reconocer la tríada de Reiter (uretritis, conjuntivitis y artritis asimétrica en extremidades inferiores tras contacto sexual de riesgo), la esterilidad del líquido articular y el tratamiento antiinflamatorio con AINEs asociado al tratamiento antibiótico del foco urogenital si está activo.

1. FISIOPATOLOGÍA Y MICROORGANISMOS GATILLANTES

La Artritis Reactiva es una artropatía inflamatoria aséptica que se manifiesta entre **1 y 4 semanas posteriores a una infección primaria extraarticular** mucosal (urogenital o gastrointestinal). 1.11.1.002

Existe una fuerte predisposición genética ligada al **HLA-B27 (positivo en el 60-80% de los pacientes)**, lo que condiciona un procesamiento anómalo de los antígenos bacterianos con migración de complejos inmunes y linfocitos T a las sinoviales.

Patógenos Desencadenantes Principales:

• **Vía Urogenital / Transmisión Sexual: Chlamydia trachomatis** (es el agente gatillante más frecuente en hombres jóvenes), *Ureaplasma urealyticum*. 1.11.1.002 1.04.1.010

• **Vía Digestiva / Enterérica:** *Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica* y *Clostridioides difficile*. 1.11.1.002

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS: LA TRÍADA CLÁSICA DE REITER

La presentación clínica típica comprende la **Tríada Clásica de Reiter** (presente completa en 30-50% de los casos): 1.11.1.002

1. **Artritis Periférica:** Oligoartritis aguda o subaguda, marcadamente **asimétrica y aditiva, que afecta de forma predominante a las extremidades inferiores** (rodillas, tobillos y articulaciones metatarsofalángicas/interfalángicas de los pies). Se asocia a entesitis aquiliana y dactilitis. 1.11.1.002 1.11.1.016

2. **Afección Urogenital:** Uretritis no gonocócica en el hombre (disuria, secreción uretral acuosa o mucopurulenta escasa) o cervicitis/salpingitis en la mujer, que suele preceder en 2 semanas a la artritis. 1.11.1.002 1.04.1.010

3. **Afección Ocular:** Conjuntivitis bilateral no purulenta, transitoria y leve (presente en 40-50%), o uveítis anterior aguda unilateral. 1.11.1.002

Lesiones Mucocutáneas Patognomónicas:

• **Balanitis Circinada:** Erosiones eritematosas superficiales serpiginosas no dolorosas de bordes blanquecinos en el glande y meato urinario (presente en 20-40% de los hombres). **(ver Imagen 9.19A)**

• **Queratodermia Blenorrágica:** Lesiones pápulo-pustulosas que evolucionan a placas hiperqueratósicas de aspecto córneo en **palmas de manos y plantas de los pies**, indistinguibles clínicamente de la psoriasis pustulosa. **(ver Imagen 9.19B y C)**

• Úlceras orales superficiales e indoloras en mucosa yugal y lengua.

3. DIAGNÓSTICO Y MANEJO TERAPÉUTICO

• **Estudio de Líquido Sinovial:** La artrocentesis muestra un líquido inflamatorio (2.000 a 50.000 leucocitos/mm³ con predominio PMN), pero **la tinción de Gram y los cultivos microbiológicos son ESTRICTAMENTE NEGATIVOS** (la articulación está libre de bacterias viables). 1.11.1.002

• **Identificación del Patógeno Primario:** PCR para *Chlamydia trachomatis* en muestra de orina de primer chorro o frotis uretral/cervical, o coprocultivo/serología si hubo diarrea. 1.11.1.002 1.04.1.010


• **Tratamiento Médico:** 1.11.1.002

1. *Manejo Articular:* **AINEs a dosis plenas** (Naproxeno 500 mg c/12h o Indometacina 50-75 mg c/8-12h) de primera línea. En mono/oligoartritis resistente se indican infiltraciones locales con corticoides. 1.11.1.002 1.11.1.016

2. *Manejo Antimicrobiano:* Si se detecta infección urogenital activa por *Chlamydia trachomatis*, se debe tratar con **Doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral por 7 a 10 días** (o Azitromicina 1 g oral en dosis única), siendo **mandatorio tratar conjuntamente a la pareja sexual**. *Nota EUNACOM:* Los antibióticos no curan la artritis ya instaurada, pero erradican el foco genital y previenen recidivas. 1.11.1.002 1.04.1.010

4. OLIGOARTRITIS Y MANEJO SINDRÓMICO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Enfrentamiento general de la oligoartritis (2-4 articulaciones): ante cualquier articulación con derrame se hace artrocentesis para descartar artritis séptica y cristales. Luego se agrupa por patrón: **asimétrica de extremidades inferiores**, con entesitis, dactilitis, lumbago inflamatorio, uretritis o diarrea previa (espondiloartritis, artritis reactiva, psoriásica o asociada a EII; HLA-B27); **migratoria con tenosinovitis y lesiones pustulosas** en adulto joven sexualmente activo (infección gonocócica diseminada: cultivos de uretra, cérvix, faringe y recto); **migratoria de grandes articulaciones** tras faringitis estreptocócica (fiebre reumática, criterios de Jones); **pocas articulaciones con uveítis** en niña o niño (AIJ oligoarticular); eritema nodoso con adenopatías hiliares y artritis de tobillos (síndrome de Löfgren de la sarcoidosis); gota o pseudogota; y artrosis con derrame. Estudio: hemograma, VHS, PCR, ácido úrico, HLA-B27, serologías de ITS (VIH, VDRL) y radiografías. El tratamiento inicial es AINEs, reposo relativo e infiltración intraarticular de corticoide solo si se descartó infección; se deriva a reumatología si hay sospecha de espondiloartritis o la artritis persiste más de 6 semanas. 1.11.1.016



Gonococcemia diseminada



Eritema nodoso: nódulos eritematosos bilaterales en las piernas

Manejo sindrómico de las ITS (ETS) en la atención primaria: 1.04.1.010 la norma del MINSAL se basa en síndromes que se tratan en la primera consulta con los agentes más probables, sin esperar el laboratorio. En el **flujo uretral y la cervicitis** se cubren gonorrea y clamidia: ceftriaxona intramuscular en dosis única más azitromicina 1 g oral en dosis única (o doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 7 días). En la **úlcera genital** se cubren la sífilis (penicilina benzatina 2,4 millones UI intramuscular en dosis única en la sífilis primaria) y el herpes genital (aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7-10 días en el primer episodio); si hay chancroide, azitromicina 1 g. En el flujo vaginal: metronidazol en la tricomoniasis y la vaginosis bacteriana, y clotrimazol o fluconazol en la candidiasis. En el dolor abdominal bajo con sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica se usa un esquema que cubre gonococo, clamidia y anaerobios.


Pilares comunes en toda ITS (manejo completo y seguimiento): consejería y uso de preservativo; **estudio y tratamiento de las parejas sexuales** (de los últimos 2-3 meses, y para sífilis según la etapa); tamizaje del resto de las ITS (VIH, VDRL/RPR, hepatitis B); abstinencia sexual hasta 7 días después de completar el tratamiento; **notificación obligatoria** (gonorrea, sífilis, VIH, entre otras); vacunación contra hepatitis B y VPH. En la sífilis se controla el VDRL cuantitativo a los 3, 6 y 12 meses (se espera una caída de cuatro veces o más en 6-12 meses) y en la gestante el tratamiento es urgente para prevenir la sífilis congénita. Se repite la búsqueda de clamidia a los 3 meses por la alta tasa de reinfección. La falta de tratamiento puede producir enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazo ectópico, artritis reactiva e infección gonocócica diseminada.



A. BALANITIS CIRCINADA



B. QUERATODERMIA PLANTAR



C. QUERATODERMIA: OTRO CASO

Imagen 9.19

FIGURA 9.19 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN ARTRITIS REACTIVA (SÍNDROME DE REITER)




TABLA 9.19 · ESPECTRO CLÍNICO DEL SÍNDROME DE REITER / ARTRITIS REACTIVA `1.11.1.002, 1.04.1.010, 1.11.1.016`

SISTEMA ORGÁNICO	MANIFESTACIÓN CLÍNICA TÍPICA	SIGNO SEMIOLÓGICO CLAVE
Articular	Oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores	Derrame en rodilla, tobillo y dactilitis en pie
Genitourinario	Uretritis no gonocócica / cervicitis	Secreción uretral mucoide y disuria
Ocular	Conjuntivitis no infecciosa / Uveítis anterior	Ojo rojo estéril transitorio
Cutáneo genital	Balanitis circinada	Erosiones serpiginosas indoloras en glande
Cutáneo acral	Queratodermia blenorrágica	Placas hiperqueratósicas en palmas y plantas
Mucoso oral	Aftas orales superficiales	Úlceras mucosas no dolorosas en paladar/lengua

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.19

Hombre de 23 años consulta por dolor e inflamación en rodilla izquierda y tobillo derecho de 10 días de evolución, con gran dificultad para apoyar el pie. Refiere que hace 3 semanas presentó ardor al orinar con escasa secreción uretral blanquecina matinal tras un contacto sexual de riesgo sin protección, a lo que siguió ojo rojo bilateral leve que resolvió espontáneamente. Al examen físico destaca rodilla izquierda con derrame articular a tensión y dactilitis en el segundo dedo del pie derecho. En el glande se aprecian erosiones circulares confluentes no dolorosas (balanitis circinada). La artrocentesis de rodilla da salida a líquido turbio con 32.000 leucocitos/mm³ con Gram negativo y cultivos bacterianos negativos.

Conducta oficial. El paciente presenta la clásica tríada de Reiter (uretritis + conjuntivitis + oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores), asociada a dactilitis y balanitis circinada, gatillada por una infección urogenital previa por Chlamydia trachomatis. La esterilidad del líquido sinovial confirma una Artritis Reactiva aséptica. El tratamiento de primera línea para la artritis son los AINEs a dosis plenas continuas, debiendo prescribirse Doxiciclina oral tanto al paciente como a su pareja sexual para tratar la clamidia genital activa.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La Artritis Reactiva se desarrolla 1 a 4 semanas tras una infección urogenital (Chlamydia) o digestiva.
- La Tríada de Reiter comprende: 1) Uretritis no gonocócica, 2) Conjuntivitis estéril y 3) Oligoartritis asimétrica.
- Afecta predominantemente las articulaciones de extremidades inferiores (rodillas, tobillos, dedos del pie).
- Las lesiones mucocutáneas clásicas son la Balanitis Circinada y la Queratodermia Blenorrágica palmoplantar.
- El líquido sinovial es inflamatorio pero ESTÉRIL (Gram y cultivos bacterianos negativos).
- Tratamiento articular de primera línea: AINEs a dosis plenas continuas.
- Si se demuestra infección activa por Chlamydia, se debe tratar con Doxiciclina o Azitromicina al paciente y a su pareja.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.19

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.002

1. Un paciente de 45 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia cuadro de dolor lumbar, artritis de rodillas y manos, asociados a ojo rojo profundo y disuria. El diagnóstico más probable es:

A) Púrpura trombocitopénico trombótico
B) Síndrome de Reiter
C) Enfermedad de Behcet
D) Vasculitis de Wegener
E) Crioglobulinemia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.002

2. Un paciente de 45 años inicia un cuadro de dolor lumbar insidioso, mayor con el reposo, asociado a artritis de rodillas y manos, con a ojo rojo y disuria dolorosa. Refiere estar utilizando doxiciclina, hace una semana, debido a una enfermedad de transmisión sexual. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus por drogas
B) Síndrome de Reiter
C) Vasculitis leucocitoclástica
D) Reacción fototóxica secundaria al uso de tetraciclinas
E) Espondilitis anquilosante

Más preguntas online de Artritis Reactiva →

9.20. Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.025 6.02.1.030

¿POR QUÉ?

La Enfermedad de Behçet es una vasculitis sistémica que afecta vasos de cualquier calibre y tipo. Es clásica su prevalencia en la antigua Ruta de la Seda y su asociación a HLA-B51. El EUNACOM examina la presencia obligada de aftas orales recurrentes, la cicatrización de las aftas genitales, el fenómeno de patergia y el riesgo de ceguera por panuveítis con hipopión.

1. FISIOPATOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

La enfermedad de Behçet es una **vasculitis sistémica de vasos de calibre variable** (afecta arterias y venas de pequeño, mediano y gran calibre). 1.11.1.025

Existe una fuerte predisposición genética ligada al **alelo HLA-B51** (presente en 60-80% de los casos en zonas endémicas de la Ruta de la Seda desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente). Afecta predominantemente a adultos jóvenes entre 20 y 40 años.

Manifestaciones Cardinales:


1. **Aftas Bucales Recurrentes (100% de los pacientes):** Criterio obligatorio. Úlceras dolorosas, redondeadas, de fondo necrótico amarillento y halo eritematoso, que **recurren al menos 3 veces en un período de 12 meses**. Curan espontáneamente en 1 a 2 semanas **SIN dejar cicatriz**. **(ver Imagen 9.20A)**



Úlcera genital

2. **Aftas Genitales Recurrentes (80-90%):** Localizadas en el escroto y cuerpo del pene en hombres, y en vulva/vagina en mujeres. Son más profundas y dolorosas que las bucales y, a diferencia de ellas, **DEJAN CICATRIZ atrófica definitiva**.

3. **Afección Ocular (50-70%):** Es la manifestación más invalidante y temida. Cursa con **uveítis anterior con hipopión** (acumulación de exudado purulento estéril en cámara anterior) y, sobre todo, **panuveítis y vasculitis retiniana oclusiva** recurrente que conduce a la ceguera bilateral irreversible en pocos años si no se trata enérgicamente. **(ver Imagen 9.20B)** 1.11.1.025 6.02.1.030



Uveítis anterior aguda

4. **Fenómeno de Patergia Positivo:** Respuesta hiperreactiva inflamatoria cutánea inespecífica. Se introduce una aguja estéril de calibre 20G en la piel del antebrazo; se considera positivo si a las **24 a 48 horas se desarrolla una pápula eritematosa o pústula estéril ≥ 2 mm** en el sitio de punción. **(ver Imagen 9.20C)** 1.11.1.025


5. **Compromiso Vascular:** Tromboflebitis superficial y **trombosis venosa profunda (TVP) recurrente** (presente en 25-30%), incluyendo sitios inusuales como trombosis de la vena cava superior/inferior, síndrome de Budd-Chiari y trombosis de senos venosos durales cerebrales. A nivel arterial causa aneurismas de arteria pulmonar con hemoptisis masiva mortal.

2. TRATAMIENTO MÉDICO SEGÚN ÓRGANO COMPROMETIDO


• **Aftosis Orogenital Aislada y Artralgias:** Tratamiento de primera línea con **Colchicina (1 a 2 mg/día vía oral)** para reducir la frecuencia de las úlceras, asociado a corticoides tópicos (triamcinolona en orabase). 1.11.1.025

• **Compromiso Ocular y Sistémico Grave (Panuveítis, Trombosis, Aneurismas):** Se requiere inmunosupresión agresiva inmediata con **corticoides a dosis altas (Prednisona 1 mg/kg/día o pulsos de Metilprednisolona) asociados a Azatioprina (2.5 mg/kg/día)**. 1.11.1.025 6.02.1.030

• En panuveítis activa refractaria o vasculitis retiniana severa con riesgo visual inminente, el tratamiento de elección es la **Terapia Biológica con Inhibidores de TNF-alfa (Infliximab o Adalimumab)**.



A. AFTAS ORALES Y FONDO DE OJO



B. UVEÍTIS CON HIPOPIÓN



C. PRUEBA DE PATERGIA

Imagen 9.20

FIGURA 9.20 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN ENFERMEDAD DE BEHÇET: CRITERIOS INTERNACIONALES ICBD

Aftas Orales Recurrentes Dolorosas (Al menos 3 episodios en 12 meses)
Presentes en 100% · Úlceras aftosas en labios, lengua y carrillos · Curan sin cicatriz

Búsqueda de Criterios Diagnósticos Mayores y Patergia
Sistema de puntaje internacional ICBD (Punto de corte: ≥ 4 puntos)

Aftas Genitales Recurrentes (2 pts)

Úlceras en Escroto / Vulva
Muy dolorosas
A diferencia de las orales, DEJAN CICATRIZ retráctil permanente

Compromiso Ocular Grave (2 pts)

Panuveítis / Uveítis con Hipopión
Vasculitis retiniana necrotizante
Causa ceguera bilateral si no se trata precozmente

Prueba de Patergia Positiva (1 pt) y Trombosis Venosa (1 pt)
Pústula estéril a las 24-48h tras punción cutánea con aguja 20G · Fuerte asociación a HLA-B51

Tratamiento Médico según Severidad
Aftas: Colchicina 1-2 mg/d · Ocular / Vascular: Corticoides altas dosis + Azatioprina o Anti-TNF

TABLA 9.20 · CRITERIOS INTERNACIONALES PARA LA ENFERMEDAD DE BEHÇET (ICBD)

1.11.1.025, 6.02.1.030

MANIFESTACIÓN CLÍNICA	PUNTAJE ASIGNADO (CORTE ≥ 4 PUNTOS)	DETALLE CLÍNICO
Aftas Bucales Recurrentes	2 puntos	≥ 3 episodios en 12 meses; curan sin cicatriz
Aftas Genitales Recurrentes	2 puntos	En escroto o vulva; DEJAN cicatriz atrófica
Lesiones Oculares (Uveítis)	2 puntos	Uveítis anterior con hipopión, panuveítis, vasculitis retiniana
Lesiones Cutáneas	1 punto	Pseudofoliculitis, eritema nodoso, pápulas acneiformes
Manifestaciones Vasculares	1 punto	Trombosis venosa profunda, tromboflebitis, aneurismas arteriales
Prueba de Patergia Positiva	1 punto	Pústula estéril a las 24-48 horas tras punción cutánea
Manifestaciones del SNC	1 punto	Neuro-Behçet: meningitis aséptica, trombosis de senos durales

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.20

Hombre de 31 años consulta por dolor ocular derecho, visión borrosa y fotofobia intensa de 24 horas. Como antecedentes refiere haber presentado múltiples episodios de úlceras dolorosas en la boca (4 episodios en el último año) y úlceras en el escroto que le dejaron cicatrices deprimidas. Al examen oftalmológico con lámpara de hendidura se aprecia inyección ciliar profunda y un nivel blanquecino de 1 mm de exudado leucocitario purulento en la porción inferior de la cámara anterior del ojo derecho (hipopión estéril). En las piernas presenta nódulos eritematosos dolorosos compatibles con eritema nodoso.

Conducta oficial. El paciente presenta una Enfermedad de Behçet confirmada: aftosis oral recurrente, aftas genitales cicatriciales, eritema nodoso y una complicación ocular mayor patognomónica consistente en una uveítis anterior con hipopión estéril. La uveítis en el Behçet es una emergencia oftalmológica que requiere tratamiento inmunosupresor inmediato con corticoides a dosis altas y azatioprina o anti-TNF para evitar la progresión a ceguera irreversible.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La Enfermedad de Behçet es una vasculitis de vasos de cualquier calibre asociada a HLA-B51.
- Las aftas orales son dolorosas, recurrentes (≥ 3 veces/año) y curan SIN dejar cicatriz.
- Las aftas genitales (escrotales o vulvares) son muy dolorosas y DEJAN CICATRIZ atrófica permanente.
- La complicación ocular grave es la panuveítis y la uveítis anterior con hipopión estéril.
- El fenómeno de Patergia consiste en la aparición de una pústula estéril 24-48h tras pinchar la piel con una aguja.
- La afección vascular incluye trombosis venosas profundas recurrentes y aneurismas de arteria pulmonar.
- La Colchicina es el fármaco de primera línea para las aftas mucocutáneas; la uveítis requiere corticoides y azatioprina/anti-TNF.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

1. Hombre de 29 años consulta por aftas bucales dolorosas muy recurrentes en labios y encías desde hace 2 años y antecedentes de úlceras dolorosas en escroto que dejaron cicatriz. En la exploración oftalmológica se detecta uveítis anterior con nivel de hipopión en cámara anterior. Al realizar unade punción cutánea con aguja estéril en el antebrazo se aprecia a las 36 horas una pápula eritematosa con una pústula estéril central de 3 mm. ¿Cómo se denomina estacutánea diagnóstica?

A) Prueba de Mitsuda
B) Fenómeno de Patergia
C) Signo de Darier
D) Prueba de Kveim-Siltzbach
E) Signo de Nikolsky

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las úlceras orales y genitales en la Enfermedad de Behçet es CORRECTA?

A) Las úlceras orales son indoloras y las genitales no duelen
B) Las úlceras genitales curan típicamente dejando cicatriz atrófica permanente, mientras que las orales curan sin cicatriz
C) Las úlceras genitales se acompañan de adenopatías inguinales supurativas
D) Las úlceras orales están presentes en menos del 20% de los pacientes diagnosticados
E) El tratamiento de elección de las úlceras orales es aciclovir oral

Más preguntas online de Enfermedad de Behçet →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 9.16 A 9.20

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	El dolor lumbar inflamatorio MEJORA con el ejercicio y EMPEORA con el reposo en cama.	**El dolor nocturno en la segunda mitad de la noche que obliga a levantarse es...**	—
Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF	La Espondilitis Anquilosante predomina en varones jóvenes (15 a 30 años) y se asocia en...	**El Test de Schöber patológico (< 5 cm de aumento) demuestra rigidez de la columna...**	—
Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII	La Artritis Psoriásica afecta al 15-30% de los pacientes con psoriasis cutánea.	**La Dactilitis ("dedo en salchicha") es la tumefacción difusa de todo el dedo por...**	—
Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento	La Artritis Reactiva se desarrolla 1 a 4 semanas tras una infección urogenital...	**La Tríada de Reiter comprende: 1) Uretritis no gonocócica, 2) Conjuntivitis estéril y...**	—
Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis	La Enfermedad de Behçet es una vasculitis de vasos de cualquier calibre asociada a...	**Las aftas orales son dolorosas, recurrentes (≥ 3 veces/año) y curan SIN dejar cicatriz.**	El paciente presenta una Enfermedad de Behçet confirmada: aftosis oral recurrente...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El dolor lumbar inflamatorio MEJORA con el ejercicio y EMPEORA con el reposo en cama.

El dolor nocturno en la segunda mitad de la noche que obliga a levantarse es característico de inflamación axial.

Los criterios ASAS exigen dolor crónico (> 3 meses) en menores de 45 años con al menos 4 de 5 parámetros cardinales.

El dolor en nalgas alternante (en báscula) es la manifestación semiológica de la sacroilitis bilateral.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El dolor nocturno en la segunda mitad de la noche que obliga a levantarse es característico de inflamación axial.
- Los criterios ASAS exigen dolor crónico (> 3 meses) en menores de 45 años con al menos 4 de 5 parámetros cardinales.
- El Test de Schöber patológico (< 5 cm de aumento) demuestra rigidez de la columna lumbar.
- La expansión torácica menor a 2.5 cm traduce anquilosis costovertebral con patrón restrictivo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El dolor lumbar inflamatorio MEJORA con el ejercicio y EMPEORA con el reposo en cama.	Tema 9.16 →
La Espondilitis Anquilosante predomina en varones jóvenes (15 a 30 años) y se asocia en > 90% al HLA-B27.	Tema 9.17 →
La Artritis Psoriásica afecta al 15-30% de los pacientes con psoriasis cutánea.	Tema 9.18 →
La Artritis Reactiva se desarrolla 1 a 4 semanas tras una infección urogenital (Chlamydia) o digestiva.	Tema 9.19 →
La Enfermedad de Behçet es una vasculitis de vasos de cualquier calibre asociada a HLA-B51.	Tema 9.20 →

MANUAL EUNACOM DE REUMATOLOGÍA

BLOQUE 05 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

4	14	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
9.21	Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu	109
9.22	Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)	115
9.23	Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	122
9.24	Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica	125

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.11.1.025, 6.02.1.017, 1.01.4.010	Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.025, 1.09.2.013, 2.01.1.058, 1.08.1.013, 6.01.1.033	Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas	Específico	Inicial	Derivar
1.11.1.010, 1.11.3.002	Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	Específico	Completo	Completo
1.11.1.017, 1.11.4.001, 1.03.1.018, 4.02.3.004	Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
14 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La arteritis de la temporal es exclusiva de mayores de 50 años; su complicación temida es la ceguera por NOIAA.
- La claudicación mandibular es el síntoma clínico más específico (> 90%) de arteritis de células gigantes.
- Ante síntomas visuales (amaurosis fugax, diplopía), iniciar BOLOS DE METILPREDNISOLONA EV 500-1.000 mg/día x 3 días.
- **! TRAMPA** · NUNCA retrasar el corticoide para hacer la biopsia temporal; los hallazgos histológicos persisten por 2 a 4 semanas.
- **! TRAMPA** · La biopsia de arteria temporal requiere una longitud ≥ 1.5-2 cm para evitar falsos negativos por "skip lesions".
- Tocilizumab (anti-IL-6R) es el fármaco biológico ahorrador de corticoides de primera línea aprobado en arteritis temporal.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal	EUNACOM Diciembre 2025 · #170 · EUNACOM Diciembre 2024 · #165 · EUNACOM Agosto 2021 · #156 · EUNACOM Julio 2019 · #106
Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas	EUNACOM Diciembre 2025 · #164 · EUNACOM Julio 2025 · #11 · EUNACOM Diciembre 2025 · #135 · EUNACOM Diciembre 2024 · #165
Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	EUNACOM Diciembre 2019 · #50 · EUNACOM Julio 2016 · #179
Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría	EUNACOM Julio 2024 · #121 · EUNACOM Julio 2024 · #40 · EUNACOM Diciembre 2019 · #116 · EUNACOM Julio 2017 · #148

9.21. Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.025 6.02.1.017 1.01.4.010

¿POR QUÉ?

La arteritis de células gigantes (arteritis temporal) representa la vasculitis sistémica más común en adultos mayores de 50 años y constituye una verdadera emergencia médica. Su complicación más temida es la ceguera monocular o bilateral irreversible secundaria a neuropatía óptica isquémica anterior arterítica (NOIAA). La regla de oro del EUNACOM exige iniciar corticoterapia sistémica enérgica de inmediato ante la sospecha clínica, jamás demorando el fármaco para coordinar una ecografía o biopsia temporal.

1. FISIOPATOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA Y COMPROMISO DE GRANDES VASOS

La **arteritis de células gigantes (ACG)**, clásicamente denominada arteritis de la temporal, es una panarteritis inflamatoria granulomatosa subaguda o crónica que compromete arterias de gran y mediano calibre con predilección por las ramas extracraneales de la arteria carótida (arteria temporal superficial, arteria oftálmica, arterias ciliares posteriores y arteria maxilar interna). Afecta de modo casi exclusivo a **personas mayores de 50 años**, con una incidencia máxima entre los 70 y 80 años y una relación mujer:hombre de 2:1 a 3:1. **(ver Imagen 9.21B)** 1.11.1.025

La inmunopatogenia involucra una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T cooperadores (subpoblaciones Th1 productoras de IFN-γ y Th17 productoras de IL-17 e IL-6) activados contra antígenos aún no definidos de la pared arterial. Las células dendríticas de la adventicia reclutan monocitos y macrófagos tisulares que se fusionan conformando células gigantes multinucleadas. Estos macrófagos secretan metaloproteinasas de matriz que inducen la fragmentación y digestión enzimática de la **lámina elástica interna**, acompañada de una proliferación neointimal obstructiva concéntrica que culmina en isquemia tisular distal crítica (véase Tabla 9.21.A).

Por su parte, la **Arteritis de Takayasu** representa el análogo de gran vaso en pacientes jóvenes: es una arteritis granulomatosa estenosante y aneurismática que compromete el cayado aórtico, sus ramas principales (arterias subclavias, carótidas y troncos supraaórticos) y las arterias renales. Su perfil epidemiológico clásico es la mujer joven (menor de 40 años, típicamente entre 15 y 30 años, relación mujer:hombre 8:1 a 9:1). Produce claudicación de miembros superiores, asimetría de pulsos periféricos y soplos vasculares prominentes, conociéndose históricamente como la "enfermedad sin pulsos".

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES: DE LA CEFALEA A LA CLAUDICACIÓN MANDIBULAR

El cuadro clínico de la ACG suele instalarse de manera subaguda a lo largo de semanas o meses, combinando síntomas generales con manifestaciones vasculares isquémicas localizadas: 1.11.1.025

• **Cefalea de nuevo inicio:** Es el síntoma más frecuente (presente en más del 70-80% de los casos). Es habitualmente unilateral frontotemporal o parietooccipital, severa, punzante, resistente a analgésicos comunes y de características diferentes a cualquier cefalea previa del paciente.

• **Anomalías de la arteria temporal:** A la palpación se constata un cordón arterial indurado, nodular, tortuoso, muy sensible al tacto y con pulso temporal marcadamente disminuido o ausente.

• **Hiperestesia del cuero cabelludo:** Dolor exquisitely desencadenado por el mínimo roce, evidente al peinarse, cepillarse el cabello o apoyar la cabeza sobre la almohada.

• **Claudicación mandibular:** Dolor y fatiga severa en los músculos maseteros y de la lengua que aparece típicamente tras 1 a 2 minutos de masticación continua (al comer alimentos duros como carne o corteza de pan) y que cede en reposo. Se debe a isquemia inducible de la arteria maxilar interna y de la arteria lingual. Es el **síntoma clínico con mayor especificidad (> 90%)** y valor predictivo para el diagnóstico de ACG.

• **Polimialgia Reumática (PMR):** Coexiste en el 40% a 50% de los pacientes con ACG al momento del diagnóstico o durante su evolución, caracterizada por dolor y rigidez matinal severa en cinturas escapular y pélvica.

• **Síntomas constitucionales:** Fiebre de baja a moderada cuantía, astenia, anorexia y baja de peso progresiva. En el adulto mayor, la ACG representa la causa reumatológica más frecuente de *Fiebre de Origen Desconocido (FOD)*.

TABLA 9.21.A · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y EVALUACIÓN DE BIOPSIA DE ARTERIA TEMPORAL (ACR 1990 / ACTUALIZACIÓN 2022) 1.11.1.025, 6.02.1.017, 1.01.4.010

CRITERIO DIAGNÓSTICO	DEFINICIÓN CLÍNICA / PARÁMETRO OPERATIVO	SENSIBILIDAD / RENDIMIENTO	CONDUCTA REUMATOLÓGICA OBLIGATORIA
Edad al inicio	Aparición de síntomas en paciente de edad ≥ 50 años	> 99% (criterio de inclusión casi universal)	En menores de 40 años sospechar Takayasu u otra vasculitis
Cefalea de nuevo inicio	Dolor localizado reciente, unilateral, frontotemporal u occipital	70% – 85%	Investigar características diferenciales de cefaleas previas
Anomalía arterial temporal	Engrosamiento, hipersensibilidad al tacto o disminución de pulso	60% – 70%	Palpar ambos trayectos temporales y ramas frontoparietales
Reactantes de fase aguda	VSG acelerada ≥ 50 mm/h (Westergren) y/o PCR muy elevada	> 95% combinadas	Una VSG normal no descarta 100% si la clínica y PCR son altas
Biopsia arterial compatible	Panarteritis granulomatosa transmural y fragmentación elástica	Estándar de oro (85% – 90%)	Tomar fragmento quirúrgico ≥ 1.5-2 cm; no postergar corticoides
Ecografía Doppler arterial	Signo del halo hipoecoico circunferencial en corte transversal	Sensibilidad 75%, Especificidad > 90%	Alternativa o complemento útil previo a la biopsia quirúrgica


9.21. Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO: REACTANTES, ECOGRAFÍA Y BIOPSIA TEMPORAL

Ante la sospecha clínica de ACG se debe solicitar de inmediato un laboratorio general: la **Velocidad de Sedimentación Globular (VSG)** se encuentra marcadamente acelerada, superando casi siempre los 50 mm/h y con frecuencia cifras > 80 a 100 mm/h. La **Proteína C Reactiva (PCR)** cuantitativa está invariablemente elevada y posee mayor sensibilidad que la VSG (véase Figura 9.21). Otros hallazgos incluyen anemia normocítica normocrómica de procesos crónicos, trombocitosis reactiva y elevación discreta de fosfatasa alcalina hepática. 1.11.1.025 1.01.4.010


La **Ecografía Doppler color de arterias temporales** muestra el patognomónico **"signo del halo"**: un engrosamiento concéntrico e hipoecoico de la pared arterial que traduce edema parietal transmural, no compresible con la presión del transductor. Posee una sensibilidad del 75-80% y especificidad > 90% en manos expertas. 1.11.1.025

La **Biopsia de arteria temporal (BAT)** continúa siendo el *estándar de oro confirmatorio*. Dada la naturaleza discontinua de la inflamación con zonas sanas interpuestas denominadas "lesiones saltonas" (*skip lesions*), la muestra quirúrgica debe medir **al menos 1.5 a 2 centímetros de longitud** para evitar falsos negativos (véase Tabla 9.21.A). Los hallazgos histológicos muestran panarteritis con infiltrado linfomonocitario, fragmentación de la elástica interna y células gigantes. **(ver Imagen 9.21C)**




Biopsia de arteria temporal


Regla de oro de urgencia EUNACOM: Si la sospecha clínica es fundada, **NUNCA se debe postergar el inicio de los corticoides a la espera de la ecografía o la biopsia**. Los cambios histopatológicos de la arteria temporal persisten plenamente detectables hasta 2 a 4 semanas después de instaurada la corticoterapia, mientras que posponer el tratamiento puede costarle la visión definitiva al paciente.



A. NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA



B. SIGNO DEL HALO



C. BIOPSIA DE ARTERIA TEMPORAL

Imagen 9.21

FIGURA 9.21 · ALGORITMO DE VASCULITIS DE VASO GRANDE Y MEDIANO: SOSPECHA, RESCATE VISUAL Y BIOPSIA

specha Clínica en Paciente > 50 Años (Cefalea de Novo, Claudicación Mandibular o Síntomas Visual
Solicitar de inmediato: VSG, PCR y hemograma · Descartar amaurosis fugax o diplopía

¿Presenta Síntomas Visuales de Alarma (Amaurosis Fugax, Pérdida de Campo Visual o Diplopía)?
Decisión inmediata de la vía y dosis de corticoterapia sistémica

SÍ: Alarma Visual Activa / Pérdida Visual Aguda

Urgencia Médica: Bolos de Metilprednisolona EV
500 a 1.000 mg/día EV x 3 días
Iniciar ANTES de cualquier examen de imagen o biopsia

NO: Cefalea / Claudicación Mandibular Aislada

Prednisona Oral a Dosis Altas Inmediata
Prednisona 1 mg/kg/día oral (40-60 mg/día)
Proteger ojo contralateral de forma inmediata

Confirmación Diagnóstica: Eco Doppler Temporal (Signo del Halo) y Biopsia Temporal
Biopsia de arteria temporal ≥ 1.5 a 2 cm · Mantener corticoides (la biopsia permanece diagnóstica 2-4 semanas)

Manejo Coadyuvante y Ahorrador: Tocilizumab (Anti-IL-6R) + Aspirina 100 mg/día
Tocilizumab reduce recaídas y toxicidad acumulada de esteroides · Calcio + Vit D + bifosfonato de soporte

TABLA 9.21.B · CRITERIOS DE ALARMA Y COMPROMISO DE ARTERIA OFTÁLMICA (NOIAA) CRITERIOS DE GRAVEDAD

SIGNO DE ALARMA OCULAR	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	HALLAZGO AL EXAMEN FÍSICO / FONDO DE OJO	RIESGO CLÍNICO INMEDIATO
Amaurosis fugax	Isquemia transitoria reversible de arterias ciliares posteriores	Episodios fugaces de pérdida visual monocular tipo telón	Ceguera permanente irreversible en horas o días si no se trata
Neuropatía Óptica Isquémica (NOIAA)	Infarto y necrosis del nervio óptico anterior por oclusión ciliar	Papiledema pálido "en tiza", hemorragias peripapilares en llama	Defecto pupilar aferente relativo (Pupila de Marcus Gunn)
Diplopía / Estrabismo agudo	Isquemia microvascular de los pares craneales oculomotores (III o VI)	Paresia de músculo recto lateral o incapacidad de aducción	Precede en 10-15% a la ceguera monocular definitiva
Claudicación lingual o necrosis	Isquemia crítica de ramas de la carótida externa (arteria lingual)	Lengua pálida, dolor intenso al deglutir, úlcera lingual necrótica	Alerta de compromiso oclusivo severo y extenso de carótida externa
Asimetría de pulso o soplo carotídeo	Extensión vasculítica a cayado aórtico o troncos supraaórticos	Diferencia de PA > 15 mmHg entre brazos o soplo en cuello	Riesgo de aneurisma de aorta torácica o ACV isquémico embólico

9.21. Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EMERGENCIA OFTALMOLÓGICA: NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR ARTERÍTICA (NOIAA)

La complicación más grave y temida de la ACG es la pérdida visual súbita, ocurrida por **Neuropatía Óptica Isquémica Anterior Arterítica (NOIAA)** en más del 80% de las complicaciones oculares, secundaria a la oclusión trombótica inflamatoria de las arterias ciliares posteriores cortas que irrigan la cabeza del nervio óptico. Con menor frecuencia obedece a oclusión de la arteria central de la retina. **(ver Imagen 9.21A)**

1.11.1.025
6.02.1.017

La pérdida visual es típicamente indolora, brusca, no fluctuante y unilateral en su inicio. Con frecuencia está precedida por pródromos de alarma en los días o semanas previas: episodios de **amaurosis fugax** (ceguera monocular transitoria tipo "cortina que cae"), visión borrosa intermitente o diplopía por isquemia de la musculatura extraocular (véase Tabla 9.21.B).

Al examen oftalmológico destaca un **defecto pupilar aferente relativo (pupila de Marcus Gunn)** en el ojo afectado. El fondo de ojo revela un edema de papila pálido y blanquecino ("papila en tiza") con márgenes borrosos y microhemorragias en llama peripapilares.



Neuropatía óptica isquémica anterior arterítica

Catástrofe visual contralateral: Si no se instaura tratamiento corticoideo intensivo de emergencia, entre el 25% y el 50% de los pacientes desarrollan compromiso del ojo contralateral en un intervalo que oscila entre pocas horas y semanas, culminando en ceguera bilateral permanente.

5. PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO: CORTICOTERAPIA DE RESCATE, TOCILIZUMAB Y PREVENCIÓN DE DAÑO

El pilar del tratamiento descansa en la administración rápida de esteroides a dosis inmunosupresoras plenas, estratificada según la presencia o ausencia de compromiso visual o de órgano noble (véase Tabla 9.21.C):

1.11.1.025

- **Con compromiso visual (NOIAA, amaurosis fugax, diplopía):** Se hospitaliza al paciente de inmediato para administrar **Bolos endovenosos de Metilprednisolona: 500 a 1.000 mg (1 g) EV cada 24 horas por 3 días consecutivos**. Posteriormente se traslapa a Prednisona oral a razón de 1 mg/kg/día (máximo 60 a 80 mg/día).

1.11.1.025
6.02.1.017

- **Sin compromiso visual ni isquemia orgánica:** Se inicia inmediatamente **Prednisona oral 1 mg/kg/día (40 a 60 mg/día)** en toma única matinal. La mejoría clínica de la cefalea y la claudicación es espectacular dentro de las primeras 24 a 48 horas, normalizándose la PCR y la VSG en 2 a 4 semanas.

1.11.1.025

- **Desescalamiento:** La dosis plena se mantiene por 2 a 4 semanas tras la resolución clínica y analítica, iniciando luego un descenso muy lento y pautado a lo largo de 12 a 24 meses para prevenir recaídas.

- **Ahorrador de corticoides de primera línea: Tocilizumab** (anticuerpo monoclonal recombinante anti-receptor de interleucina-6, administrado en dosis de 162 mg subcutáneo semanal). Ha demostrado en ensayos clínicos aleatorizados (ensayo GiACTA) sostener la remisión libre de corticoides y reducir drásticamente los efectos adversos de la corticoterapia prolongada.

- **Medidas adyuvantes obligatorias:** Prescripción de **Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/día** para reducir el riesgo de eventos trombóticos isquémicos cerebrovasculares y visuales; profilaxis de osteoporosis inducida por corticoides con Calcio elemental (1.000-1.200 mg/día) + Vitamina D3 (800-2.000 UI/día) + bifosfonato oral (Alendronato 70 mg semanal); y protección gástrica con Inhibidores de la Bomba de Protones (Omeprazol 20 mg/día).

TABLA 9.21.C · PROTOCOLO DE RESCATE: CORTICOIDES SISTÉMICOS, TOCILIZUMAB Y PREVENCIÓN DE TOXICIDAD

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE / FÁRMACO	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	INDICACIÓN ESPECÍFICA	OBJETIVO CLÍNICO Y PRECAUCIONES
Bolos de Metilprednisolona EV	500 a 1.000 mg EV cada 24 horas x 3 días consecutivos	Urgencia visual (NOIAA, amaurosis fugax) o isquemia severa	Salvar ojo contralateral y rescatar tejido neuronal penumbra
Prednisona oral de inducción	1 mg/kg/día oral (40 – 60 mg/día) en toma única matinal	Inicio inmediato en ACG sin síntomas visuales o post-bolos EV	Alivio rápido de cefalea en 24-48h; mantener 2 a 4 semanas
Descenso paulatino de esteroides	Reducción de 10 mg cada 2 semanas hasta 20 mg, luego 2.5 mg/mes	Mantenimiento de remisión clínica y normalización de VSG/PCR	Retiro en 12 a 24 meses; vigilancia estricta de recaídas
Tocilizumab (Anti-IL-6R)	162 mg subcutáneo cada semana (o 8 mg/kg EV cada 4 semanas)	Ahorrador de esteroides de 1.ª línea (aprobado FDA/EMA)	Reduce recaídas y dosis acumulada de corticoides (GiACTA)
AAS + Calcio/Vit D + Bifosfonato	AAS 100 mg/d + Calcio 1g/d + Vit D 1.000 UI/d + Alendronato 70 mg/sem	Coadyuvancia obligatoria en todo paciente con corticoterapia	Prevenir eventos isquémicos arteriales y osteoporosis esteroidal

9.21. Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (VASCULITIS DE VASO GRANDE Y MEDIANO)

- La arteritis de la temporal es exclusiva de mayores de 50 años; su complicación temida es la ceguera por NOIAA.
- Ante síntomas visuales (amaurosis fugax, diplopía), iniciar BOLOS DE METILPREDNISOLONA EV 500-1.000 mg/día x 3 días.
- La biopsia de arteria temporal requiere una longitud ≥ 1.5-2 cm para evitar falsos negativos por "skip lesions".
- La claudicación mandibular es el síntoma clínico más específico (> 90%) de arteritis de células gigantes.
- NUNCA retrasar el corticoide para hacer la biopsia temporal; los hallazgos histológicos persisten por 2 a 4 semanas.
- Tocilizumab (anti-IL-6R) es el fármaco biológico ahorrador de corticoides de primera línea aprobado en arteritis temporal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 9.21

Mujer de 74 años sin antecedentes mórbidos de relevancia consulta en el servicio de urgencias por cuadro de 3 semanas de cefalea frontotemporal derecha intensa, de inicio reciente, que no cede con paracetamol ni ketoprofeno. Refiere que al masticar carne o pan presenta dolor y cansancio en los músculos de la mandíbula que la obliga a detener la alimentación. En las últimas 24 horas ha presentado dos episodios transitorios de oscurecimiento visual monocular completo en el ojo derecho de 3 a 5 minutos de duración (amaurosis fugax). Al examen físico: PA 138/82 mmHg, FC 78 lpm, afebril. Arteria temporal derecha engrosada, indurada, tortuosa, exquisitamente dolorosa a la palpación y con pulso temporal prácticamente ausente. Al peinarse refiere intenso dolor en el cuero cabelludo. El fondo de ojo actual es normal y el ojo izquierdo no presenta alteraciones. El laboratorio urgente informa: leucocitos 8.900/mm³, hemoglobina 10.8 g/dL, plaquetas 480.000/mm³, VSG 98 mm/h y PCR 84 mg/L.

Conducta oficial razonada. La conducta inmediata, inaplazable y prioritaria es hospitalizar a la paciente en unidad de monitorización e iniciar BOLOS ENDOVENOSOS DE METILPREDNISOLONA a dosis de 500 a 1.000 mg/día durante 3 días consecutivos, asociados a interconsulta urgente con oftalmología y programación de biopsia de arteria temporal derecha (≥ 1.5 cm). La paciente presenta una Arteritis de Células Gigantes (Arteritis de la Temporal) en fase de inminente pérdida visual (amaurosis fugax) con riesgo extremo de Neuropatía Óptica Isquémica Anterior Arterítica (NOIAA). NUNCA debe retrasarse el corticoide a la espera de la biopsia quirúrgica o ecografía Doppler, ya que la histopatología permanece diagnóstica hasta por 2 a 4 semanas tras el inicio de los esteroides, mientras que posponer la terapia condena a la paciente a ceguera permanente bilateral.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.21 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

1. Hombre de 72 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, se asocia a astenia y claudicación mandibular intermitente. Refiere cansancio al peinarse y al realizar otras actividades en las que tenga que mantener los brazos levantados por algunos minutos. El diagnóstico más probable es:

A) Polimiositis
B) Fibromialgia
C) Arteritis de la temporal
D) Poliangeítis microscópica
E) Panarteritis nodosa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

2. Una paciente de 67 años presenta astenia y debilidad de las extremidades superiores, de predominio proximal, asociada a claudicación mandibular, cefalea frecuente y fiebre ocasional. En sus exámenes generales destaca anemia con marcada elevación de la VHS. El diagnóstico más probable es: -3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6

A) Granulomatosis de Wegener
B) Lupus sistémico
C) Poliangeítis microscópica
D) Arteritis de células gigantes
E) Polimiositis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

3. Un paciente de 65 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente al levantar los brazos y en la musculatura proximal de las extremidades inferiores. También refiere que presenta cefalea frecuente y dolor al masticar por mucho tiempo, lo que lo obliga a comer lento. En sus exámenes destaca anemia normocícita normocrómica, con VHS: 97 mm/h. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar metotrexato
B) Iniciar naproxeno
C) Solicitar angiografía
D) Solicitar ecografía doppler carotídeo
E) Iniciar prednisona 1mg/Kg y solicitar biopsia de arteria temporal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

4. La arteritis de Takayasu se manifiesta con todo lo siguiente, EXCEPTO:

A) Glomerulonefritis
B) Artralgias6
C) Fiebre
D) Accidente vascular encefálico
E) Asimetría de los pulsos radiales

Más preguntas online de Vasculitis de Vaso Grande y Mediano →

9.22. Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.025 | 1.09.2.013 | 2.01.1.058 | 1.08.1.013 | 6.01.1.033


¿POR QUÉ?

Las vasculitis necrosantes de vaso pequeño se dividen biológicamente en aquellas mediadas por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (AAV: GPA, PAM y EGPA) y aquellas mediadas por depósito de inmunocomplejos (Vasculitis por IgA / Púrpura de Henoch-Schönlein). Constituyen una causa prototípica del síndrome riñón-pulmón y exigen un reconocimiento ultra-precoz: la instauración inmediata de bolos de esteroides e inmunosupresores mayores (Ciclofosfamida o Rituximab) salva al paciente de la muerte por hemorragia alveolar masiva o de la dependencia definitiva de hemodiálisis.

1. CLASIFICACIÓN DE CHAPEL HILL Y ESPECTRO INMUNOLÓGICO DE VASCULITIS DE PEQUEÑO VASO

El Consenso Internacional de Chapel Hill clasifica las **vasculitis de vaso pequeño** (arteriolas, capilares y vénulas) en dos grandes grupos etiopatogénicos: 1.11.1.025

1. **Vasculitis asociadas a ANCA (AAV):** Caracterizadas por la escasa o nula presencia de depósitos de complejos inmunes en la pared vascular (*vasculitis pauciinmunes*). Incluyen la Granulomatosis con Poliangeítis (GPA, antes Wegener), la Poliangeítis Microscópica (PAM) y la Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeítis (EGPA, antes Churg-Strauss). Los **c-ANCA** presentan un patrón citoplasmático difuso por inmunofluorescencia y van dirigidos contra la enzima **Proteinasa 3 (anti-PR3)**, siendo fuertemente específicos de la GPA (85-90%). Los **p-ANCA** muestran un patrón perinuclear dirigido contra la **Mieloperoxidasa (anti-MPO)**, predominando en la PAM (70-80%) y en la EGPA (40-50%) (véase Tabla 9.22.A). 1.11.1.025 | 1.09.2.013



Granulomatosis con poliangeítis

2. **Vasculitis por inmunocomplejos:** Caracterizadas por depósitos abundantes de anticuerpos y complemento en los vasos. El prototipo indiscutido es la **Vasculitis por Inmunoglobulina A (Púrpura de Henoch-Schönlein)**, caracterizada por depósitos de complejos inmunes que contienen IgA1 en las paredes capilares y en el mesangio renal. 1.11.1.025 | 2.01.1.058 | 6.01.1.033

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DIFERENCIALES: GPA VS PAM VS EGPA

• **Granulomatosis con Poliangeítis (GPA / Wegener):** Se distingue por su clásica **triada orgánica**: 1.11.1.025

a) *Vía respiratoria superior:* Presente en más del 90% de los pacientes. Rinosinusitis crónica purulenta recidivante refractaria a múltiples ciclos antibióticos, epistaxis recurrente, costras nasales hemáticas, perforación del tabique nasal con colapso del dorso que genera la deformidad en **"nariz en silla de montar"**, otomastoiditis y estenosis traqueal subglótica con estridor. **(ver Imagen 9.22A)**

b) *Pulmón:* Nódulos pulmonares bilaterales únicos o múltiples con marcada tendencia a la **cavitación** (paredes gruesas e irregulares), infiltrados alveolares fugaces y hemorragia alveolar. **(ver Imagen 9.22B y C)**

c) *Riñón:* Glomerulonefritis necrotizante focal con proliferación extracapilar (semilunas) pauciinmune que se manifiesta como Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP), hematuria dismórfica, cilindros hemáticos y proteinuria moderada no nefrótica. 1.11.1.025 | 1.09.2.013

• **Poliangeítis Microscópica (PAM):** A diferencia de la GPA, **NO presenta inflamación granulomatosa ni afecta la vía aérea superior**. Compromete casi invariablemente el riñón (GNRP pauciinmune en más del 80-90% de los casos) y los capilares alveolares pulmonares, manifestándose como capilaritis pulmonar con hemorragia alveolar difusa. Se asocia clásicamente a **p-ANCA / anti-MPO**.

• **Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeítis (EGPA / Churg-Strauss):** Clínicamente única por su vinculación con la atopia y la eosinofilia: 1.11.1.025

a) *Fase alérgica:* Asma bronquial severa de inicio en la edad adulta, resistente a corticoides inhalados, acompañada de rinosinusitis alérgica y poliposis nasal destructiva.

b) *Fase tisular/eosinofílica:* Eosinofilia periférica marcada (frecuentemente > 1.500 eosinófilos/uL o > 10% del recuento diferencial leucocitario) e infiltrados pulmonares migratorios no cavitados.

c) *Fase vasculítica:* **Mononeuritis múltiple** (presente en más del 70%, manifestándose como neuropatía axonal asimétrica aguda: pie caído por lesión del nervio ciático poplíteo externo o mano caída por nervio radial) y púrpura palpable. La principal causa de muerte es la **miocardiopatía eosinofílica** (miocarditis necrotizante e insuficiencia cardíaca congestiva refractaria). 1.11.1.025 | 6.01.1.033

TABLA 9.22.A · PATRONES SEROLÓGICOS ANCA, COMPROMISO CLÍNICO RENAL Y PULMONAR EN VASCULITIS DE PEQUEÑO VASO

1.11.1.025, 1.09.2.013, 2.01.1.058, 1.08.1.013, 6.01.1.033

VASCULITIS DE PEQUEÑO VASO	MARCADOR SEROLÓGICO PRINCIPAL	COMPROMISO DE VÍA AÉREA Y PULMÓN	COMPROMISO RENAL TÍPICO	HISTOPATOLOGÍA CLAVE
Granulomatosis con Poliangeítis (GPA)	c-ANCA positivo en 85-90% (Anticuerpo Anti-Proteinasa 3 / PR3)	Sinusitis purulenta, nariz en silla de montar, nódulos pulmonares cavitados bilaterales	Glomerulonefritis necrotizante con semilunas pauciinmune (GNRP)	Granulomas necrotizantes intra y extravasculares con necrosis
Poliangeítis Microscópica (PAM)	p-ANCA positivo en 70-80% (Anticuerpo Anti-Mieloperoxidasa / MPO)	Capilaritis pulmonar con hemorragia alveolar difusa; NO hay granulomas ni vía alta	GNRP pauciinmune severa en > 85% de los pacientes; rápida pérdida de VFG	Vasculitis necrotizante sin granulomas; depósitos inmunes escasos
Granulomatosis Eosinofílica (EGPA)	p-ANCA / Anti-MPO en 40-50% (50% seronegativo)	Asma grave del adulto refractaria, pólipos nasales, infiltrados pulmonares fugaces	Glomerulonefritis pauciinmune leve a moderada (menos frecuente que en GPA/PAM)	Infiltración masiva de eosinófilos en tejidos y granulomas eosinofílicos
Vasculitis por IgA (Henoch-Schönlein)	ANCA negativos; elevación de IgA sérica en 50%	Excepcional compromiso alveolar; vía aérea superior respetada	Hematuria glomerular microscópica/macroscópica y proteinuria (Nefritis IgA)	Vasculitis leucocitoclástica con depósitos de IgA1 mesangial granular

9.22. Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN (VASCULITIS POR IGA)

Es la vasculitis sistémica más prevalente en la población pediátrica (pico de incidencia entre los 3 y 10 años, precedida habitualmente en un 50-75% por una infección respiratoria alta estreptocócica o viral), aunque puede presentarse en adultos con un curso renal más agresivo y tórpido. 2.01.1.058

Se manifiesta por una **tétrada clínica cardinal**:


1. **Púrpura palpable no trombocitopénica:** Lesiones petequiales y purpúricas sobreelevadas que no desaparecen a la vitropresión, simétricas, de distribución declive característica: miembros inferiores (pantorrillas, tobillos) y región glútea, respetando típicamente el tronco y cara. 2.01.1.058 1.08.1.013

2. **Artralgias o artritis:** Periarticular, transitoria, no deformante ni erosiva, con marcado predominio en grandes articulaciones de extremidades inferiores (rodillas y tobillos). 6.01.1.033 2.01.1.058


3. **Dolor abdominal cólico:** Secundario a isquemia y edema de la submucosa intestinal (angina intestinal). Puede complicarse con hemorragia digestiva alta o baja, íleo paralítico y, en niños pequeños, **invaginación intestinal (intususcepción ileoileal)**.

4. **Nefropatía por IgA:** Se presenta en el 30-50% de los pacientes como hematuria microscópica o macroscópica asintomática con proteinuria. La histología renal es idéntica a la Enfermedad de Berger (proliferación mesangial con depósitos intensos de IgA1 granular en inmunofluorescencia).


Parámetro analítico crítico EUNACOM: El **recuento de plaquetas es rigurosamente NORMAL o está discretamente elevado** (trombocitosis reactiva). Un recuento plaquetario bajo descarta de inmediato el Púrpura de Henoch-Schönlein y obliga a sospechar trombocitopenia inmune (PTI), púrpura trombocitopénico trombótico (PTT) o síndrome hemolítico urémico (SHU). 2.01.1.058 1.08.1.013



A. NARIZ EN SILLA DE MONTAR



B. GPA: NÓDULOS CAVITADOS



C. HEMORRAGIA ALVEOLAR

Imagen 9.22

FIGURA 9.22 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN VASCULITIS ANCA E IGA: DE LA SOSPECHA A LA REMISIÓN




TABLA 9.22.B · CRITERIOS DE SEVERIDAD ORGÁNICA, SÍNDROME RIÑÓN-PULMÓN Y HEMORRAGIA ALVEOLAR DIFUSA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

MANIFESTACIÓN CRÍTICA	PARÁMETRO DIAGNÓSTICO / CRITERIO DE GRAVEDAD	MÉTODO CONFIRMATORIO DE ELECCIÓN	RIESGO / CONDUCTA DE RESCATE
Hemorragia Alveolar Difusa (HAD)	Disnea aguda súbita, hipoxemia (PaFi < 200), infiltrados bilaterales en alas de mariposa	Lavado Broncoalveolar (LBA) seriado con alícuotas más hemáticas y >20% siderófagos	Mortalidad > 50%; intubación orotraqueal y bolos de metilprednisolona + plasmaféresis
GNRP Pauciinmune Aguda	Duplicación de creatinina en < 2 semanas, oliguria, sedimento activo (cilindros hemáticos)	Biopsia renal percutánea: semilunas celulares > 50% de glomérulos e IF negativa	Pérdida irreversible de función renal; inicio de diálisis y Rituximab/Ciclofosfamida
Mononeuritis múltiple severa	Déficit motor periférico asimétrico brusco (pie caído / mano caída) con dolor neuropático	Electromiografía (EMG) con velocidad de conducción: neuropatía axonal motora asimétrica	Daño axonal permanente; corticoterapia enérgica + ciclofosfamida (típica de EGPA)
Isquemia miocárdica / Miocarditis	Insuficiencia cardíaca congestiva, troponinas elevadas, fracción de eyección deprimida	Ecocardiograma Doppler transtorácico y Resonancia Magnética Cardíaca con realce tardío	Principal causa de muerte en EGPA; hospitalización en UCI y soporte inotrópico
Abdomen agudo por vasculitis	Dolor abdominal severo continuo, peritonismo, melena masiva o perforación intestinal	Angio-TC de abdomen y pelvis: engrosamiento de asas intestinales y neumatosis	Isquemia mesentérica con perforación; requiere laparotomía exploradora urgente

9.22. Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. URGENCIA CRÍTICA: SÍNDROME RIÑÓN-PULMÓN Y HEMORRAGIA ALVEOLAR DIFUSA

La confluencia de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis necrotizante rápidamente progresiva define el **Síndrome Riñón-Pulmón**, una de las mayores catástrofes en medicina interna (véase Tabla 9.22.B). 1.09.2.013



Síndrome riñón-pulmón

La **Hemorragia Alveolar Difusa (HAD)** se produce por capilaritis neutrofílica alveolar con rotura de la membrana basal endotelial y extravasación masiva de hematíes hacia los alvéolos. Clínicamente se manifiesta por disnea aguda, hipoxemia refractaria e infiltrados alveolares algodonosos bilaterales difusos en alas de mariposa en la radiografía o TC de tórax. *Trampa de examen:* La hemoptisis puede estar completamente AUSENTE en hasta un 30% a 35% de los pacientes (la sangre queda atrapada en el espacio alveolar sin alcanzar la vía aérea proximal).

El examen confirmatorio de urgencia es el **Lavado Broncoalveolar (LBA)** seriado mediante fibrobroncoscopía: demuestra un líquido de aspiración progresivamente más hemorrágico y rojizo en tres alícuotas secuenciales consecutivas, con presencia de más del 20% de macrófagos alveolares cargados de hemosiderina (*siderófagos* teñidos con azul de Prusia de Perls). Además, la **Capacidad de Difusión de Monóxido de Carbono (DLCO) se encuentra marcadamente ELEVADA** (> 100-130% del teórico) debido a la gran avidez del monóxido de carbono por la hemoglobina intraalveolar libre extravasada (véase Figura 9.22).

5. PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS DE INDUCCIÓN, REMISIÓN Y SOSTÉN

El manejo de las vasculitis ANCA se estructura en dos fases: **inducción de la remisión** y **mantenimiento de la remisión** (véase Tabla 9.22.C): 1.11.1.025

• **Inducción en AAV grave o amenazante de la vida/órgano (insuficiencia renal aguda o HAD):** 1.11.1.025 1.09.2.013

1. **Bolos de Metilprednisolona EV:** 500 a 1.000 mg EV diarios por 3 días consecutivos, continuando con prednisona oral 1 mg/kg/día con pauta de descenso progresivo.

2. **Inmunosupresión combinada (Rituximab vs Ciclofosfamida):** Se asocia **Rituximab** (375 mg/m² EV semanal por 4 semanas) O **Ciclofosfamida** (pulsos EV de 0.5 a 0.75 g/m² cada mes por 3 a 6 pulsos, o 2 mg/kg/día oral). Los estudios multicéntricos RAVE y RITUXVAS demostraron que Rituximab no es inferior a Ciclofosfamida y es de **primera elección en mujeres o varones jóvenes en edad reproductiva** (para evitar la insuficiencia ovárica prematura y la azoospermia por ciclofosfamida), en recaídas y en pacientes con toxicidad urológica previa.

3. **Plasmaféresis (Recambio Plasmático Terapéutico):** Indicada de forma selectiva en pacientes con **hemorragia alveolar difusa severa con insuficiencia respiratoria hipoxémica** o en aquellos con falla renal avanzada rápidamente progresiva (creatinina sérica > 5.7 mg/dL o requerimiento de hemodiálisis aguda) para remover rápidamente los ANCA circulantes.

4. **Profilaxis obligatoria:** Administración mandatoria de **Cotrimoxazol (Trimetoprim-Sulfametoxazol 160/800 mg 3 veces por semana)** durante todo el periodo de inducción para prevenir la neumonía letal por *Pneumocystis jirovecii* secundaria a linfopenia farmacológica. 1.11.1.025

• **Mantenimiento de la remisión:** Una vez lograda la remisión completa (habitualmente a los 3 a 6 meses), se traslapa a **Rituximab de mantenimiento** (500 mg EV cada 6 meses) o **Azatioprina** (2 mg/kg/día oral) por un mínimo de 24 a 36 meses.

• **Manejo de la Vasculitis por IgA (Henoch-Schönlein):** En la mayoría de los casos pediátricos es un cuadro autolimitado que requiere únicamente reposo, analgesia con paracetamol y observación ambulatoria. El uso de **Prednisona oral (1 a 2 mg/kg/día por 1 a 2 semanas)** está formalmente indicado ante **dolor abdominal cólico severo, hemorragia digestiva, compromiso testicular o nefritis moderada a severa** (proteinuria en rango nefrótico o caída de VFG), sin embargo no previene la aparición ulterior de nefropatía a largo plazo. 2.01.1.058

6. ENFERMEDAD DE KAWASAKI Y VASCULITIS CUTÁNEAS

Enfermedad de Kawasaki (vasculitis de vaso mediano del lactante y preescolar; sospecha y tratamiento inicial): afecta sobre todo a niños < 5 años. El diagnóstico clásico exige **fiebre de 5 o más días** más al menos 4 de 5 criterios: **inyección conjuntival bilateral no exudativa; cambios orales** (labios rojos y fisurados, lengua en frutilla); **exantema polimorfo**; **edema y eritema de manos y pies** (con descamación periungueal posterior); y **adenopatía cervical** > 1,5 cm, habitualmente unilateral. Hay formas incompletas, sobre todo en lactantes. Laboratorio: elevación de VHS y PCR, anemia, leucocitosis, piuria estéril y **trombocitosis en la 2.ª-3.ª semana**. La complicación son los **aneurismas coronarios** (hasta 25% sin tratamiento; < 5% con tratamiento oportuno), por lo que se solicita ecocardiograma al diagnóstico y a las 2 y 6 semanas. El tratamiento, idealmente en los primeros 10 días de fiebre, es **inmunoglobulina endovenosa 2 g/kg en dosis única** más ácido acetilsalicílico (dosis antiinflamatoria al inicio y luego 3-5 mg/kg/día hasta normalizar las plaquetas y descartar aneurismas); si persiste la fiebre se repite la inmunoglobulina o se agregan corticoides. Tras la inmunoglobulina se difieren las vacunas de virus vivos (sarampión, varicela) por unos 11 meses y se evita el ibuprofeno en quienes reciben ácido acetilsalicílico. Se **deriva de inmediato** a un centro pediátrico con cardiología. 2.01.1.058



Enfermedad de Kawasaki: lengua en frutilla



Enfermedad de Kawasaki: hiperemia conjuntival bulbar bilateral

Vasculitis cutáneas (vasculitis leucocitoclástica): se manifiestan por **púrpura palpable** en las piernas y zonas declives (a veces vesículas, úlceras o livedo). Histológicamente hay infiltración de neutrófilos con fragmentación nuclear (leucocitoclasia) y necrosis fibrinoide de vénulas. Las causas son **fármacos** (penicilinas, sulfas, AINEs; aparece 7-10 días después de iniciarlos), infecciones (estreptococo, hepatitis B y C, VIH), enfermedades autoinmunes (LES, AR, Sjögren), crioglobulinemia, vasculitis ANCA y neoplasias; un tercio es idiopático. El enfoque dermatológico es: confirmar con **biopsia cutánea con inmunofluorescencia directa** (idealmente de una lesión de menos de 48 horas), y descartar compromiso sistémico con hemograma, creatinina, orina completa (hematuria, proteinuria), ANCA, FR, ANA, complemento, crioglobulinas y serologías de hepatitis B/C. El tratamiento es suspender el fármaco o tratar la infección, reposo con elevación de las piernas y AINEs o colchicina en las formas leves; los corticoides sistémicos se reservan para las formas graves, ulceradas o con compromiso sistémico. Se deriva a dermatología o reumatología si hay compromiso orgánico o evolución crónica.

6.01.1.033

TABLA 9.22.C · PROTOCOLO DE INDUCCIÓN CON CICLOFOSFAMIDA, RITUXIMAB Y CRITERIOS DE PLASMAFÉRESIS

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	RÉGIMEN Y DOSIS ESTÁNDAR	POBLACIÓN / INDICACIÓN PREFERENTE	TOXICIDAD CRÍTICA Y MEDIDAS DE SOPORTE
Bolos de Metilprednisolona EV	500 a 1.000 mg EV cada 24 horas x 3 días consecutivos	Toda forma de vasculitis ANCA grave con riesgo vital u orgánico	Hiperglicemia severa, hipertensión, psicosis esteroidal, sepsis bacteriana
Rituximab (Anti-CD20)	375 mg/m² EV semanal x 4 dosis (o 1.000 mg días 1 y 15)	De elección en jóvenes (preserva fertilidad), recaídas o GPA severa	Reacciones infusionales agudas, hipogammaglobulinemia, reactivación de VHB
Ciclofosfamida (Pulsos EV)	0.5 a 0.75 g/m² EV mensual x 3 a 6 meses + Mesna	Alternativa en falla renal catastrófica o falta de acceso a Rituximab	Cistitis hemorrágica (prevenida con Mesna e hidratación), mielosupresión
Plasmaféresis (Recambio Plasmático)	6 a 7 sesiones de 40 a 60 mL/kg de plasma en 14 días	Hemorragia alveolar con hipoxemia severa o creatinina > 5.7 mg/dL	Hipotensión por volemia, coagulopatía de consumo, infecciones por catéter
Cotrimoxazol profiláctico	160/800 mg (1 comprimido fuerte) oral 3 veces por semana	Obligatorio en todo paciente bajo Rituximab o Ciclofosfamida	Prevenir neumonía fatal por Pneumocystis jirovecii; controlar hemograma

9.22. Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO ANCA POSITIVAS (GPA, PAM, EGPA) Y PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN (VASCULITIS POR IGA))

- La GPA (Wegener) cursa clásicamente con c-ANCA (Anti-PR3 positivo) y nódulos pulmonares cavitados bilaterales.
- La PAM cursa con p-ANCA (Anti-MPO positivo), GNRP pauciinmune y hemorragia alveolar SIN compromiso de vía alta.
- En Púrpura de Henoch-Schönlein (IgA), el recuento de plaquetas es NORMAL; plaquetas bajas descartan el diagnóstico.
- La perforación del tabique nasal con deformidad en "nariz en silla de montar" es patognomónica de GPA.
- La EGPA (Churg-Strauss) se define por asma severo del adulto, eosinofilia > 1.500/uL y mononeuritis múltiple.
- La inducción en AAV grave exige bolos de metilprednisolona EV + Rituximab o Ciclofosfamida + cotrimoxazol profiláctico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

9.22

Hombre de 48 años sin antecedentes médicos consulta en el servicio de urgencias por cuadro de 2 meses de evolución de astenia profunda, rinorrea purulenta fétida matinal, epistaxis recurrentes y sensación de obstrucción nasal que fue tratada en dos oportunidades con amoxicilina/clavulánico sin mejoría. En los últimos 4 días agrega tos seca, fiebre de 38.4 °C, disnea progresiva de esfuerzos y orinas de color oscuro tipo "té cargado". Al examen físico destaca paciente enflaquecido, taquipneico a 26 rpm, saturando 89% a aire ambiental. A la rinoscopia se aprecia destrucción y perforación del tabique nasal anterior con costras sanguinolentas abundantes. A la auscultación pulmonar presenta crépitos inspiratorios bibasales. No presenta edemas en extremidades inferiores. La radiografía y tomografía de tórax revelan múltiples lesiones nodulares en ambos campos pulmonares, varias de ellas con evidente cavitación central de paredes gruesas. Exámenes de laboratorio: hemoglobina 8.6 g/dL, leucocitos 14.500/mm³ con 82% neutrófilos, plaquetas 520.000/mm³, creatinina 4.2 mg/dL (basal desconocida), nitrógeno ureico 68 mg/dL, sedimento urinario con hematuria macroscópica (más de 50 hematíes por campo con 45% de hematíes dismórficos y cilindros hemáticos) y proteinuria de 1.8 g en 24 horas.

Conducta oficial razonada. El diagnóstico más probable es una Granulomatosis con Poliangeítis (GPA / antes Wegener) con compromiso de vía aérea superior, pulmonar cavitado y síndrome nefrítico rápidamente progresivo (GNRP). La conducta médica inmediata consiste en hospitalización urgente en Unidad de Paciente Crítico (UPC), toma de anticuerpos c-ANCA (anti-PR3) y anticuerpos anti-MBG, inicio inmediato de BOLOS DE METILPREDNISOLONA 1.000 mg EV diarios por 3 días asociados a terapia de inducción con RITUXIMAB (375 mg/m² semanal) o CICLOFOSFAMIDA EV mensual, profilaxis contra Pneumocystis con cotrimoxazol y coordinación de biopsia renal percutánea urgente. Si el paciente presenta progresión a falla respiratoria por hemorragia alveolar o elevación acelerada de creatinina, debe asociarse plasmaféresis de rescate.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.22 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

1. Las vasculitis alérgica de Churg-Strauss, presenta ANCA positivo, en una proporción moderada de los casos. Clínicamente se manifiesta como:

A) Asma de difícil manejo, que luego se acompaña de glomerulonefritis
B) Exantema purpúrico, de extremidades inferiores, con hematuria, artritis y compromiso gastrointestinas, como hematoquezia por ejemplo
C) Rinosinusitis de difícil manejo, seguida de hemoptisis y glomerulonefritis, con rápido deterioro de la función renal
D) Cefalea, fiebre, amaurosis fugax, claudicación mandibular, polimialgia reumática y elevación de la VHS
E) Exantema pseudopapular (ronchas) muy pruriginoso, con lesiones que confluyen hasta formar grandes placas, afectando las mucosas y asociándose a hipotensión arterial

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

2. Un paciente de 32 años presenta una rinosinusitis crónica de difícil manejo, asociado a epistaxis frecuente. En el último tiempo se agrega compromiso del estado general, fiebre, hematuria y oliguria. En sus exámenes destaca ANCA 4/921/12/2016 Prueba 11 | Dr. Guevara positivos en patrón “c”. El diagnóstico de sospecha es: Dr. Guevara

A) Púrpura de Schöenlein-Henoch Preparación EUNACOM
B) Granulomatosis de Wegener
C) Vasculitis de Churg-Strauss
D) Lupus sistémico eritematoso
E) Panarteritis nodosa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

3. La presentación clínica más habitual de la granulomatosis de Wegener es:

A) Astenia, fiebre, compromiso de coronarias y arterias mesentéricas
B) Glomuronefritis rápidamente progresiva y ANCA positivo en patrón perinuclear
C) Asma refractario a tratamiento y con posterioridad afectación renal
D) Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar
E) Insuficiencia renal, hematuria, accidentes vasculares encefálicos a repetición y púrpura palpable de extremidades inferiores

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

4. Un paciente de 65 años consulta por fiebre, artralgias, hematuria, edema de extremidades inferiores y luego anuria. En sus exámenes de laboratorio destaca elevación importante de la creatinina y positividad de los ANCA en patrón perinuclear, a títulos elevados. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus eritematoso sistémico
B) Granulomatosis de Wegener
C) Arteritis de la temporal
D) Panarteritis nodosa
E) Poliangeítis microscópica

Más preguntas online de Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas →

9.23. Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.010 1.11.3.002

¿POR QUÉ?

La diferenciación entre la Polimialgia Reumática (PMR) y la Fibromialgia (FM) constituye una de las distinciones semiológicas y terapéuticas más evaluadas en el examen EUNACOM. Mientras que la PMR es una patología inflamatoria del adulto mayor con reactantes de fase aguda sumamente elevados que responde espectacularmente a corticoides a dosis bajas, la Fibromialgia es un síndrome de dolor nociplástico por sensibilización central en mujeres jóvenes o de mediana edad con exámenes de laboratorio rigurosamente normales, en donde los corticoides y opioides están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS.

1. POLIMIALGIA REUMÁTICA (PMR): SEMIOLOGÍA, REACTANTES Y RESPUESTA A ESTEROIDES

La **Polimialgia Reumática** es una enfermedad inflamatoria sistémica casi exclusiva de personas **mayores de 50 años** (edad promedio de presentación > 70 años), con una frecuencia dos veces superior en mujeres. Fisiopatológicamente se caracteriza por sinovitis y bursitis subdeltoidea, trocantérica y de articulaciones facetarias interapofisarias cervicales y lumbares. **(ver Imagen 9.23A)**

Cuadro Clínico Cardinal:

• Dolor bilateral, simétrico e intenso con marcada rigidez matinal prolongada (> 45 a 60 minutos) en la **cintura escapular** (hombros y cuello) y en la **cintura pélvica** (caderas y muslos).

• Los pacientes relatan severa dificultad funcional para peinarse, ponerse un suéter o abrigo, elevar los brazos por sobre el plano horizontal y levantarse de un asiento bajo o de la cama.

• **Examen Físico:** La movilidad activa de hombros y caderas está marcadamente limitada por dolor, pero **la movilidad pasiva está conservada**. No existe atrofia ni déficit motor intrínseco: la **fuerza muscular es rigurosamente normal** una vez que se supera la inhibición por dolor.

• **Laboratorio Cardinal:** La **Velocidad de Sedimentación Globular (VSG)** se encuentra marcadamente acelerada, típicamente > 40-50 mm/h (a menudo superando los 80 a 100 mm/h). La Proteína C Reactiva (PCR) está muy elevada. Un rasgo crucial para el examen es que **las enzimas musculares (CPK y aldolasa) son ESTRICTAMENTE NORMALES**, lo que permite diferenciarla de forma inmediata de las miopatías inflamatorias (polimiositis/dermatomiositis).

• **Tratamiento y "Prueba Terapéutica Diagnóstica":** La respuesta a los glucocorticoides a dosis bajas es **espectacular, dramática y casi mágica: Prednisona 15 a 20 mg/día vía oral** induce el alivio completo o superior al 70-80% del dolor y la rigidez en un plazo de 24 a 72 horas. La ausencia de mejoría rotunda dentro de los primeros 7 días de tratamiento descarta casi con certeza la PMR (véase Tabla 9.23).

Prevención de las complicaciones del tratamiento esteroidal prolongado (la PMR obliga a tratar durante 1-2 años): 1.11.3.002 la prednisona se inicia en 12,5-25 mg/día y se desciende muy lentamente, por lo que la mayoría de los pacientes cumple el criterio de riesgo (≥ 5 mg/día de prednisona o equivalente por más de 3 meses; las guías ACR 2022 bajan el umbral a 2,5 mg/día). Medidas: **salud ósea** (calcio 1.000-1.200 mg/día entre dieta y suplementos, vitamina D 800-2.000 UI/día, ejercicio con carga, densitometría y cálculo de FRAX al inicio, y bifosfonato oral —alendronato 70 mg semanal— si el riesgo es moderado o alto, como en el adulto mayor); control periódico de presión arterial, glicemia, lípidos y peso; examen oftalmológico por riesgo de catarata y glaucoma; vacunación antiinfluenza y antineumocócica idealmente antes de la inmunosupresión; protección gástrica solo si se asocia AINE o anticoagulante; profilaxis de *Pneumocystis jirovecii* con cotrimoxazol si la dosis supera 20 mg/día por más de 1 mes. **Nunca se suspende de forma brusca** por el riesgo de insuficiencia suprarrenal. Si hay recaídas, efectos adversos graves o dependencia de dosis altas, se agrega un ahorrador de corticoides (metotrexato o tocilizumab) bajo reumatología.

2. FIBROMIALGIA: FISIOPATOLOGÍA NOCIPLÁSTICA, CRITERIOS ACR Y NORMALIDAD ANALÍTICA

La **Fibromialgia** es el arquetipo de **dolor nociplástico**, originado por una **sensibilización central** con alteración en el procesamiento sensorial del sistema nervioso central: existe una amplificación ascendente de las señales nociceptivas (hiperalgesia) y una pérdida de las vías inhibitorias descendentes del dolor (alodinia difusa). No existe inflamación tisular, daño articular ni patología muscular periférica. 1.11.1.010

Afecta predominantemente a **mujeres en edad fértil y madura (20 a 55 años)**, con una proporción 6:1 respecto a los hombres.

Manifestaciones Cardinales:

1. **Dolor musculoesquelético crónico generalizado:** De al menos 3 meses de duración, presente en esqueleto axial y en cuatro cuadrantes corporales (arriba y abajo de la cintura, a ambos lados del cuerpo).

2. **Sueño no reparador:** Los pacientes duermen pero se despiertan sintiéndose agotados ("como si no hubieran descansado nada"), debido a una intrusión de ondas alfa en el sueño profundo delta (fase IV no REM).

3. **Fatiga crónica profunda y rigidez matinal:** Agotamiento invalidante matinal y vespertino.

4. **Trastornos neurocognitivos ("fibrofog"):** Fallas de memoria reciente, dificultad de concentración y enlentecimiento del procesamiento mental.

5. **Comorbilidades psicosomáticas asociadas:** Síndrome de intestino irritable, cefalea tensional o migraña, dismenorrea, vejiga hiperactiva y trastornos del ánimo (ansiedad generalizada y depresión mayor reactiva).

Criterios Diagnósticos ACR (2010 / Revisión 2016): Ya no se exige el recuento estricto de los 18 puntos dolorosos clásicos a la digitopresión (tender points). Se basa en la combinación de un **Índice de Dolor Generalizado (WPI ≥ 7)** y una **Escala de Gravedad de Síntomas (SSS ≥ 5)**, o WPI 4-6 con SSS ≥ 9, con síntomas presentes por al menos 3 meses y sin otra enfermedad que justifique el dolor. **(ver Imagen 9.23B)**

Laboratorio: La **VSG, PCR, hemograma, CPK, pruebas tiroideas, ANA y Factor Reumatoide son RIGUROSAMENTE NORMALES**. Si la VSG o la PCR están elevadas, se debe sospechar de inmediato otra enfermedad (PMR, neoplasia, lupus, AR).

3. ENFRENTAMIENTO TERAPÉUTICO EN APS: FÁRMACOS MODULADORES VS ERRORES IATROGÉNICOS

El tratamiento de la fibromialgia descansa primordialmente en un enfoque multidimensional no farmacológico y farmacológico (véase Tabla 9.23): 1.11.1.010

• **Pilar de Primera Línea No Farmacológico (Mandatorio):** Educación clara y desmitificadora del paciente (validando su dolor sin etiquetarlo como enfermedad degenerativa o deformante), prescripción de **ejercicio aeróbico de bajo impacto progresivo** (caminatas, natación, bicicleta estática, yoga o tai-chi al menos 30 minutos 3 a 5 veces por semana) y Terapia Cognitivo-Conductual (TCC).

• **Tratamiento Farmacológico de Primera Línea (Neuromoduladores Centrales):**

1. **Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (ISRN): Duloxetina (30 a 60 mg/día)** o Milnaciprán. Mejoran el dolor, la fatiga y el componente depresivo/ansioso.

2. **Ligandos de la subunidad alfa-2-delta de los canales de calcio: Pregabalina (75 a 150 mg/día en la noche)** o Gabapentina. Disminuyen la liberación presináptica de glutamato y sustancia P en la médula espinal, mejorando el dolor y la calidad del sueño.


3. **Antidepresivos tricíclicos: Amitriptilina (10 a 25 mg en la noche)**. De gran utilidad en atención primaria por su bajo costo para restituir la fase IV del sueño y modular las vías descendentes del dolor.

• **ERRORES TERAPÉUTICOS QUE ANULAN LA RESPUESTA EN EUNACOM:**

- **Glucocorticoides (Prednisona):** Están **FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en Fibromialgia**. No tienen diana biológica antiinflamatoria en el dolor nociplástico, son totalmente ineficaces y producen daño iatrogénico grave (síndrome de Cushing, osteoporosis, diabetes e inmunosupresión).

- **Opioides mayores (Morfina, Oxicodona, Fentanilo):** Están contraindicados por inducir *hiperalgesia paradójica inducida por opioides*, dependencia y tolerancia sin mejoría funcional a largo plazo.

- **AINEs en monoterapia:** Poseen escasa o nula eficacia en el dolor nociplástico central.



A. ZONAS DE LA POLIMIALGIA

B. PUNTOS SENSIBLES

Imagen 9.23

TABLA 9.23 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO, ANALÍTICO Y FARMACOLÓGICO: FIBROMIALGIA VS POLIMIALGIA REUMÁTICA 1.11.1.010, 1.11.3.002

PARÁMETRO DIFERENCIAL	POLIMIALGIA REUMÁTICA (PMR)	FIBROMIALGIA (FM)	RELEVANCIA EUNACOM
Edad habitual de inicio	Siempre mayores de 50 años (pico > 70 años)	Mujeres jóvenes y edad media (20 – 55 años)	Edad < 50 años descarta prácticamente PMR
Naturaleza biológica	Enfermedad inflamatoria sistémica (sinovitis/bursitis)	Trastorno nociplástico por sensibilización central	PMR es inflamatoria; Fibromialgia es funcional/neuromodulada
Localización del dolor	Cinturas escapular y pélvica bilateral simétrica	Dolor difuso generalizado en 4 cuadrantes corporales	PMR no duele en manos ni pies distales; FM duele difuso
Rigidez matinal	Severa, prolongada (habitualmente > 45 a 60 minutos)	Variable, subjetiva, referida como "agarrotamiento"	En PMR el paciente no puede salir de la cama ni vestirse
Fuerza muscular y CPK	Fuerza normal (inhibida por dolor); CPK NORMAL	Fuerza muscular normal; CPK ESTRICTAMENTE NORMAL	CPK elevada orienta a miositis inflamatoria, no a PMR ni FM
Reactantes de fase aguda	VSG muy acelerada (> 50-100 mm/h) y PCR muy alta	VSG y PCR RIGUROSAMENTE NORMALES	Una VSG alta descarta FM pura; una VSG normal descarta PMR
Asociación sistémica	Arteritis de células gigantes / temporal (15% – 20%)	Colon irritable, cefalea tensional, depresión/ansiedad	En PMR pesquisar siempre cefalea temporal y claudicación
Respuesta a corticoides	ESPECTACULAR a Prednisona 15-20 mg/día (alivio en 48-72h)	NULA o deletérea (CONTRAINDICADOS FORMALMENTE)	Pregunta fija: PMR responde a dosis bajas; FM NUNCA corticoides
Tratamiento de 1.ª línea	Prednisona 15 mg/día oral con desescalamiento lento	Ejercicio aeróbico + Duloxetina / Pregabalina / Amitriptilina	En FM el pilar es ejercicio aeróbico de bajo impacto en APS

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.23

Mujer de 68 años consulta en su CESFAM por cuadro de 6 semanas de evolución de dolor progresivo y marcada rigidez matinal en ambos hombros, cuello y caderas. Refiere que por las mañanas necesita más de una hora para poder levantarse de la cama y requiere ayuda de su hija para ponerse los zapatos y peinarse. No refiere cefalea, pérdida visual ni alteraciones en la mandíbula. Al examen físico: paciente en buenas condiciones generales, afebril. Movilidad activa de hombros limitada por dolor, pero la movilidad pasiva está conservada. Fuerza muscular 5/5 en las cuatro extremidades. No se palpan sinovitis en manos, muñecas ni rodillas. El laboratorio solicitado en el consultorio muestra: hematocrito 34%, hemoglobina 11.2 g/dL normocítica normocrómica, leucocitos 7.800/mm³, plaquetas 380.000/mm³, VSG 88 mm/h, PCR 48 mg/L, creatina fosfoquinasa (CPK) 72 U/L (normal), factor reumatoide negativo y pruebas tiroideas (TSH) normales.

Conducta oficial. El diagnóstico más probable es una Polimialgia Reumática (PMR). La conducta terapéutica de primera línea e inmediata en la atención primaria es iniciar PREDNISONA ORAL EN DOSIS BAJAS a razón de 15 mg al día en toma matinal única. Se debe citar a control clínico en 48 a 72 horas para verificar la respuesta terapéutica (que debe ser espectacular, con alivio sintomático superior al 70-80%), educar a la paciente sobre signos de alarma de arteritis temporal (cefalea, dolor mandibular, visión borrosa) y planificar un descenso muy lento y progresivo de la corticoterapia a lo largo de 12 a 18 meses, asociando prevención de osteoporosis con calcio y vitamina D.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La Polimialgia Reumática afecta a personas > 50 años con dolor y rigidez matinal > 45 min en hombros y caderas.
- En la PMR la VSG y la PCR están marcadamente elevadas, mientras que la CPK es rigurosamente NORMAL.
- La PMR responde de forma rápida y espectacular a Prednisona a dosis bajas (15 a 20 mg/día) en 48 a 72 horas.
- La Fibromialgia es un dolor nociplástico por sensibilización central con VSG, PCR y CPK estrictamente NORMALES.
- Los corticoides y los opioides están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en el tratamiento de la Fibromialgia.
- El tratamiento de elección en Fibromialgia combina ejercicio aeróbico de bajo impacto con Duloxetina o Pregabalina.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.23

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.010

1. La fibromialgia se caracteriza por:

A) Asociarse a anemia
B) Asociarse a cáncer
C) Presentar elevación de la VHS
D) Dolor a la presión de las masas musculares
E) Presentar positividad de los anticuerpos antinucleares

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.010

2. Un paciente de 58 años, con antecedentes de síndrome de intestino irritable, cefalea tensional y fibromialgia, consulta por molestias faríngeas fluctuantes, de larga evolución. Refiere que siente como si tuviera una pelota en la faringe, la que no puede tragar (globus). Al examen físico no se aprecian alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno conversivo
B) Depresión
C) Hipocondría
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno de personalidad dependiente

Más preguntas online de Fibromialgia y Polimialgia Reumática →

9.24. Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.11.1.017 | 1.11.4.001 | 1.03.1.018 | 4.02.3.004

¿POR QUÉ?

La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica silente caracterizada por masa ósea disminuida y deterioro microarquitectónico con consecuente fragilidad ósea. Su mayor relevancia radica en las fracturas por fragilidad, especialmente la fractura de cadera, asociada a una mortalidad del 20-30% al primer año. La regla de oro del EUNACOM establece que la presencia de una fractura por fragilidad en cadera o vértebra define automáticamente el diagnóstico de osteoporosis e impone el inicio de tratamiento antirresortivo sin requerir una densitometría ósea previa.

1. FISIOPATOLOGÍA, FRACTURAS POR FRAGILIDAD Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO DIRECTO

La masa ósea del adulto es el resultado del balance dinámico entre la resorción ósea osteoclástica y la formación ósea osteoblástica acopladas en las unidades de remodelado óseo. A partir de los 30 a 35 años sobreviene una pérdida fisiológica anual de masa ósea (0.5% a 1%), la cual se acelera drásticamente en la mujer durante la posmenopausia inmediata (pérdida de hasta un 3-5% anual durante los primeros 5 a 10 años) por la deprivación estrogénica, que incrementa la expresión del ligando del receptor activador del factor nuclear kappa B (RANKL) y prolonga la sobrevida de los osteoclastos. 4.02.3.004

Una **fractura por fragilidad** se define como aquella producida por un traumatismo de bajo impacto, equivalente o menor a una caída desde la propia altura o en bipedestación (excluyendo traumas mayores como accidentes vehiculares o caídas de altura, y fracturas de dedos, cráneo o columna cervical). 1.11.1.017 1.03.1.018

Los **sitios anatómicos cardinales de fractura osteoporótica** son:

1. **Columna vertebral:** Fracturas por aplastamiento acuñado dorsal y lumbar. Son las más frecuentes (constituyen más del 40-50% de todas las fracturas), pero más de dos tercios cursan de forma asintomática o se manifiestan por pérdida progresiva de estatura (> 3-4 cm) y cifosis dorsal ("joroba de viuda"). **(ver Imagen 9.24C)**

2. **Cadera (cuello femoral y región intertrocantérica):** Es la complicación de mayor morbimortalidad (mortalidad del 20% al 30% en los 12 meses posteriores a la fractura y pérdida permanente de autovalencia en más del 50% de los sobrevivientes). Es una **patología con Garantía Explícita en Salud (GES N° 10)** en personas de 65 años y más. **(ver Imagen 9.24A)**

3. **Radio distal (Fractura de Colles):** Es la fractura por fragilidad más precoz en mujeres posmenopáusicas (frecuente entre los 50 y 65 años tras apoyar la mano en flexión dorsal durante una caída de nivel).

4. **Húmero proximal y pelvis:** Frecuentes en el anciano frágil.

Regla de oro EUNACOM: La presencia de una **fractura por fragilidad vertebral o de cadera en un adulto mayor establece por sí misma el diagnóstico clínico de OSTEOPOROSIS**, independientemente del valor de la densitometría ósea, e indica el inicio perentorio de terapia farmacológica de rescate.

2. DENSITOMETRÍA ÓSEA (DEXA): CRITERIOS DE LA OMS, T-SCORE VS Z-SCORE Y FRAX

La **absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA)** constituye el examen de referencia para cuantificar la densidad mineral ósea (DMO, expresada en g/cm²). Los sitios de medición estandarizados son la **columna lumbar (vértebras L1 a L4)** y la **cadera (cuello femoral y cadera total)** (véase Tabla 9.24). 1.11.1.017 1.03.1.018 1.11.4.001

Criterios Diagnósticos Densitométricos de la OMS (Basados en T-score):

• **Normal:** T-score mayor o igual a **-1.0 DE**.

• **Osteopenia (baja masa ósea):** T-score entre **-1.0 y -2.5 DE**.

• **Osteoporosis:** T-score menor o igual a **-2.5 DE** en cualquiera de los sitios evaluados (columna lumbar, cuello femoral o cadera total).

• **Osteoporosis Severa o Establecida:** T-score menor o igual a -2.5 DE asociado a **una o más fracturas por fragilidad** documentadas.

Diferenciación Conceptual: T-score vs Z-score:

• **T-score:** Número de desviaciones estándar por encima o debajo de la media de DMO de una *población joven sana de 20 a 30 años del mismo sexo* (pico de masa ósea). Es el parámetro diagnóstico estándar que debe utilizarse en **mujeres posmenopáusicas y en varones de 50 años o más**.

• **Z-score:** Número de desviaciones estándar en comparación con una *población de la misma edad, sexo y etnia*. Se utiliza en **mujeres premenopáusicas, varones menores de 50 años y niños**. Un **Z-score ≤ -2.0 DE** se define como "baja densidad mineral ósea por debajo del rango esperado para la edad" y obliga a investigar causas secundarias de osteoporosis (uso crónico de glucocorticoides ≥ 5 mg/día por > 3 meses, hiperparatiroidismo primario, hipertiroidismo, hipogonadismo, enfermedad celíaca o síndrome de malabsorción, mieloma múltiple y alcoholismo). 1.11.1.017 1.03.1.018 1.11.4.001 4.02.3.004

• **Herramienta FRAX (Fracture Risk Assessment Tool):** Algoritmo computarizado validado por la OMS y calibrado para la población chilena que calcula la **probabilidad a 10 años de sufrir una fractura osteoporótica mayor** (cadera, vértebra clínica, muñeca o húmero) y una fractura de cadera aislada. *Umbral de intervención en osteopenia:* Se indica iniciar fármacos si el riesgo a 10 años de fractura mayor es **≥ 20%** o si el riesgo de fractura de cadera es **≥ 3%**.

3. TERAPIA FARMACOLÓGICA ESCALONADA: CALCIO, VITAMINA D, BIFOSFONATOS, DENOSUMAB Y TERIPARATIDA

El manejo de la osteoporosis abarca medidas universales y fármacos modificadores del metabolismo óseo (véase Figura 9.24 y Tabla 9.24): 1.11.1.017 1.03.1.018

• **Pilar Universal de Soporte:**

1. **Calcio elemental:** Aporte de **1.000 a 1.200 mg/día**, idealmente mediante la dieta (lácteos, frutos secos, legumbres). Si la ingesta es deficitaria, se suplementa con Carbonato de calcio (requiere medio ácido gástrico, tomar con comidas) o Citrato de calcio (de elección en usuarios de omeprazol o con hipoclorhidria).

2. **Vitamina D3 (Colecalciferol):** Aporte de **800 a 2.000 UI/día** para alcanzar y sostener niveles séricos de 25-hidroxivitamina D [25-(OH)-D] ≥ 30 ng/mL.

3. **Medidas no farmacológicas:** Ejercicios de fortalecimiento muscular y carga gravitacional (caminata vigorosa), prevención activa de caídas en el domicilio (retirar alfombras, barras de apoyo en baño), cese de tabaquismo y moderación de alcohol.

• **Bifosfonatos Orales (Fármacos de Primera Línea en APS):**

- **Alendronato: 70 mg vía oral una vez por semana** (o Risedronato 35 mg semanal). Inhiben la enzima farnesil pirofosfato sintasa de los osteoclastos induciendo su apoptosis.


- **INSTRUCCIONES ESTRICTAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL (Pregunta angular EUNACOM):** Para maximizar su baja absorción gastrointestinal (< 1%) y **prevenir el riesgo de esofagitis química erosiva y úlceras esofágicas graves**, el alendronato debe tomarse estrictamente **en ayunas al despertar, con un vaso lleno de agua pura (200 mL)**, el paciente debe **permanecer en bipedestación o sentado erguido durante al menos 30 a 60 minutos** (sin recostarse), y no debe ingerir alimentos, bebidas ni otros medicamentos durante esa hora.

- *Contraindicaciones de bifosfonatos orales:* Estenosis esofágica, acalasia, incapacidad para mantenerse sentado o de pie por 30 minutos, cirugía bariátrica con malabsorción, y **enfermedad renal crónica severa con Clearance de creatinina < 30-35 mL/min**.

• **Bifosfonatos Endovenosos: Ácido Zoledrónico (5 mg EV infundido en 15 minutos una vez al año)**. De elección ante intolerancia digestiva severa, falta de adherencia a la vía oral o tras una fractura de cadera reciente. Efecto adverso: síndrome pseudogripal agudo en las primeras 48 horas.

• **Denosumab (Anticuerpo Monoclonal Anti-RANKL):** Administrado en dosis de **60 mg subcutáneo cada 6 meses**. Bloquea la interacción entre RANKL y el receptor RANK de los osteoclastos. Es el fármaco de elección en **insuficiencia renal crónica avanzada con VFG < 30 mL/min** (no tiene clearance renal), pero exige asegurar calcemia normal previa por riesgo de hipocalcemia severa. *Alerta crítica:* Nunca debe suspenderse abruptamente sin una dosis de consolidación con bifosfonato, debido al riesgo de pérdida rápida de masa ósea y fracturas vertebrales múltiples de rebote. **(ver Imagen 9.24B)**


• **Teriparatida (Análogo de Paratohormona PTH 1-34):** Fármaco **osteoformador / anabólico** (20 mcg subcutáneo diario por un máximo de 24 meses). Indicado en osteoporosis muy severa (T-score < -3.5, fracturas vertebrales recurrentes o falla comprobada a bifosfonatos).



A. FRACTURA DE CUELLO FEMORAL



B. APLASTAMIENTOS VERTEBRALES



C. CIFOSIS DORSAL

Imagen 9.24

FIGURA 9.24 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN OSTEOPOROSIS Y FRACTURAS POR FRAGILIDAD




TABLA 9.24 · CRITERIOS DENSITOMÉTRICOS OMS Y POSOLOGÍA FARMACOLÓGICA EN OSTEOPOROSIS

1.11.1.017, 1.11.4.001, 1.03.1.018, 4.02.3.004

FÁRMACO / CLASIFICACIÓN	CRITERIO OPERATIVO / DOSIS TERAPÉUTICA	VÍA Y FRECUENCIA DE USO	INDICACIÓN / PRECAUCIONES CLÍNICAS CLAVE
DMO Normal	T-score ≥ -1.0 DE en columna o cadera	Tamizaje preventivo	Dieta equilibrada en calcio, actividad física y cesación tabáquica
Osteopenia	T-score entre -1.0 y -2.5 DE	Seguimiento con FRAX	Tratar si FRAX mayor ≥ 20% o cadera ≥ 3%; soporte con Calcio/Vit D
Osteoporosis	T-score ≤ -2.5 DE o fractura fragilidad	Tratamiento farmacológico	Iniciar bifosfonato de primera línea + calcio elemental y vitamina D
Alendronato sódico	70 mg comprimido vía oral	Una vez por semana en ayuno	Tomar con vaso de agua pura; bipedestación estricta 30-60 min; ClCr > 35
Ácido Zoledrónico	5 mg solución en infusión endovenosa	Una vez al año (infusión en 15 min)	De elección si intolerancia oral o fractura de cadera; vigilar calcemia
Denosumab (Anti-RANKL)	60 mg solución inyectable subcutánea	Una vez cada 6 meses	Uso seguro en falla renal (VFG < 30); riesgo de rebote si se suspende
Teriparatida (PTH 1-34)	20 mcg inyección subcutánea diaria	Diaria por máximo 24 meses	Agente osteoformador en osteoporosis severa o fractura bajo bifosfonatos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 9.24

Mujer de 69 años con antecedente de tabaquismo activo (15 paquetes/año) y menopausia a los 48 años sin terapia de reemplazo hormonal acude a control en policlínico. Trae resultado de densitometría ósea DEXA solicitada de forma preventiva: DMO en columna lumbar (L1-L4) con T-score de -2.9 DE y en cuello femoral con T-score de -2.6 DE (Z-score en columna -1.1 DE). La paciente no refiere antecedentes de fracturas previas ni dolores óseos. Su estatura actual es de 158 cm (2 cm menos que a los 30 años). Sus exámenes de laboratorio muestran: hemograma normal, calcemia 9.4 mg/dL, fósforo 3.2 mg/dL, creatinina 0.8 mg/dL (ClCr 68 mL/min), fosfatasas alcalinas normales y 25-hidroxivitamina D en 18 ng/mL (insuficiencia de vitamina D). No presenta reflujo gastroesofágico ni trastornos de deglución.

Conducta oficial. La paciente presenta una OSTEOPOROSIS densitométrica según los criterios de la OMS (T-score ≤ -2.5 DE tanto en columna lumbar como en cuello femoral). La conducta médica integral de primera línea consiste en: 1) Corrección de la insuficiencia de vitamina D con Colecalciferol (Vitamina D3) 2.000 UI/día oral; 2) Asegurar aporte de calcio elemental de 1.000 a 1.200 mg/día (mediante dieta y suplemento de carbonato de calcio con las comidas); 3) Iniciar terapia antirresortiva de primera línea con ALENDRONATO 70 mg VÍA ORAL UNA VEZ POR SEMANA; 4) Educar de manera rigurosa sobre las normas de ingestión del alendronato (ayuno matinal estricto con un vaso grande de agua pura de 200 mL, permanecer sentado erguido o de pie por 30 a 60 minutos sin recostarse y no comer nada durante esa hora para evitar esofagitis química); y 5) Recomendar ejercicios de fuerza y equilibrio, cese de tabaco y control densitométrico en 2 años.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Una fractura por fragilidad en cadera o vértebra define automáticamente OSTEOPOROSIS sin requerir densitometría.
- Densitometría OMS: Normal T-score ≥ -1.0; Osteopenia -1.0 a -2.5; Osteoporosis T-score ≤ -2.5 DE.
- El T-score se utiliza en posmenopáusicas y varones ≥ 50 años; el Z-score se utiliza en jóvenes (< 50 años).
- Un Z-score ≤ -2.0 DE obliga a descartar sistemáticamente causas secundarias de pérdida ósea (corticoides, Cushing).
- El Alendronato exige ayuno estricto, vaso con agua pura y bipedestación por 30 a 60 min para prevenir esofagitis.
- Denosumab (anti-RANKL) se puede usar con VFG < 30 mL/min, pero nunca suspender sin bifosfonato por riesgo de rebote.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 9.24

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.017

1. Una paciente de 40 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita una densitometría ósea que muestra T-score: -2,6 y un Z-score: -2,0. El diagnóstico más probable es:

A) Sana
B) Osteopenia
C) Osteoporosis postmenopáusica
D) Osteoporosis secundaria
E) Enfermedad de Paget

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.4.001

2. Una paciente de 65 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita una densitometría ósea que muestra T-score: -2,1 y un Z-score: -0,9. El diagnóstico más probable es:

A) Sana
B) Osteopenia
C) Osteoporosis postmenopáusica
D) Osteoporosis secundaria
E) Enfermedad de Paget

Más preguntas online de Osteoporosis y Salud Ósea →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 9.21 A 9.24

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu	La arteritis de la temporal es exclusiva de mayores de 50 años; su complicación temida...	**La claudicación mandibular es el síntoma clínico más específico (> 90%) de arteritis de...**	NUNCA retrasar el corticoide para hacer la biopsia temporal; los hallazgos histológicos...
Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)	La GPA (Wegener) cursa clásicamente con c-ANCA (Anti-PR3 positivo) y nódulos pulmonares...	**La perforación del tabique nasal con deformidad en "nariz en silla de montar" es...**	En Púrpura de Henoch-Schönlein (IgA), el recuento de plaquetas es NORMAL; plaquetas...
Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	La Polimialgia Reumática afecta a personas > 50 años con dolor y rigidez matinal > 45...	**En la PMR la VSG y la PCR están marcadamente elevadas, mientras que la CPK es...**	Los corticoides y los opioides están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en el tratamiento de...
Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica	Una fractura por fragilidad en cadera o vértebra define automáticamente OSTEOPOROSIS...	**Densitometría OMS: Normal T-score ≥ -1.0; Osteopenia -1.0 a -2.5; Osteoporosis T-score...**	Un Z-score ≤ -2.0 DE obliga a descartar sistemáticamente causas secundarias de pérdida...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La arteritis de la temporal es exclusiva de mayores de 50 años; su complicación temida es la ceguera por NOIAA.

La claudicación mandibular es el síntoma clínico más específico (> 90%) de arteritis de células gigantes.

Ante síntomas visuales (amaurosis fugax, diplopía), iniciar BOLOS DE METILPREDNISOLONA EV 500-1.000 mg/día x 3 días.

NUNCA retrasar el corticoide para hacer la biopsia temporal; los hallazgos histológicos persisten por 2 a 4 semanas.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- La claudicación mandibular es el síntoma clínico más específico (> 90%) de arteritis de células gigantes.
- Ante síntomas visuales (amaurosis fugax, diplopía), iniciar BOLOS DE METILPREDNISOLONA EV 500-1.000 mg/día x 3 días.
- La perforación del tabique nasal con deformidad en "nariz en silla de montar" es patognomónica de GPA.
- La PAM cursa con p-ANCA (Anti-MPO positivo), GNRP pauciinmune y hemorragia alveolar SIN compromiso de vía alta.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La arteritis de la temporal es exclusiva de mayores de 50 años; su complicación temida es la ceguera por NOIAA.	Tema 9.21 →
La GPA (Wegener) cursa clásicamente con c-ANCA (Anti-PR3 positivo) y nódulos pulmonares cavitados bilaterales.	Tema 9.22 →
La Polimialgia Reumática afecta a personas > 50 años con dolor y rigidez matinal > 45 min en hombros y caderas.	Tema 9.23 →
Una fractura por fragilidad en cadera o vértebra define automáticamente OSTEOPOROSIS sin requerir densitometría.	Tema 9.24 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 9.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.015

Un paciente de 70 años consulta por dolor muy intenso en la rodilla izquierda, asociada a aumento de volumen, calor...

CLAVE D **Iniciar AINEs endovenosos y reposo**

El caso describe un paciente de 70 años con un cuadro agudo de monoartritis inflamatoria severa en la rodilla, caracterizado por dolor muy intenso, aumento de volumen, calor y eritema, y un derrame articular. La radiografía muestra condrocalcinosis (línea de calcificación en el cartílago articular), un hallazgo clave. La artrocentesis revela un líquido sinovial inflamatorio (10.000 células con 90% de polimorfonucleares), y lo más importante, la microscopía de campo oscuro identifica **múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva**. Esta combinación de condrocalcinosis radiológica y la presencia de cristales con birrefringencia positiva en el líquido sinovial es patognomónica de la **artritis por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)**, comúnmente conocida como pseudogota. La tinción de Gram negativa ayuda a disminuir la sospecha de artritis séptica, aunque no la descarta por completo sin un cultivo. El manejo de una crisis aguda de pseudogota se centra en el control rápido de la inflamación y el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son la primera línea de tratamiento y son muy efectivos. Dada la intensidad del dolor ("dolor muy intenso") y la severidad del cuadro inflamatorio, la administración endovenosa de AINEs es una opción apropiada para lograr un efecto más rápido y potente. El reposo de la articulación afectada es una medida complementaria importante que contribuye a reducir la inflamación y el malestar.

> **Perla.** Por lo tanto, la opción de iniciar AINEs endovenosos y reposo aborda de manera directa y efectiva la crisis aguda de pseudogota, proporcionando alivio rápido al paciente.

TEMA 9.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.015

Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía...

CLAVE A **AINEs y reposo**

El paciente presenta un cuadro clínico, radiológico y de laboratorio clásico de una artritis aguda por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado (CPPD), también conocida como pseudogota. El diagnóstico se fundamenta en la triada de: 1) monoartritis aguda en una persona mayor, 2) la presencia de condrocalcinosis (calcificación de los meniscos) en la radiografía, que es un hallazgo muy sugerente, y 3) el hallazgo confirmatorio en el líquido sinovial de cristales con birrefringencia débilmente positiva bajo luz polarizada. La ausencia de bacterias en el estudio del líquido descarta una artritis séptica, que es el principal diagnóstico diferencial. El objetivo del tratamiento en la fase aguda de la pseudogota es controlar la intensa respuesta inflamatoria y aliviar el dolor. La primera línea de tratamiento consiste en el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el naproxeno o la indometacina, siempre que no existan contraindicaciones (insuficiencia renal, úlcera péptica activa, etc.). Junto con el tratamiento farmacológico, el reposo de la articulación afectada es fundamental para disminuir la inflamación y el dolor. Otras opciones para el manejo agudo incluyen la colchicina o los corticoides (intraarticulares o sistémicos), pero los AINEs y el reposo son la estrategia inicial más común y adecuada, tal como se plantea en la opción correcta. Es importante destacar que la hiperuricemia (ácido úrico de 8,0 mg/dl) es un distractor. Aunque puede coexistir, el tipo de cristal identificado en la artrocentesis (birrefringencia positiva) descarta la gota (cuyos cristales de urato monosódico tienen birrefringencia negativa) como causa del episodio agudo actual.

> **Perla.** Por lo tanto, el tratamiento debe dirigirse a la pseudogota y no a la gota.

TEMA 9.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

En un adolescente con síntomas de artritis séptica del tobillo derecho se realiza estudio de líquido sinovial que...

CLAVE E **Iniciar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje quirúrgico**

La pregunta describe un caso de artritis séptica en un adolescente, caracterizada por síntomas de artritis de tobillo derecho y un estudio de líquido sinovial altamente sugerente de infección. Los hallazgos del líquido sinovial (aspecto turbio, poco filante, alta celularidad de 85.000 células/mm3 con 95% de polimorfonucleares) son clásicos de una artritis séptica grave. La clave diagnóstica y terapéutica reside en la visualización de "abundantes cocáceas Gram negativas intracelulares". En un adolescente, la presencia de cocáceas Gram negativas en el líquido sinovial de una articulación séptica apunta fuertemente a *Neisseria gonorrhoeae* como el agente etiológico, causante de una infección gonocócica diseminada (IGD) que se manifiesta como artritis. Otros patógenos Gram negativos son posibles, pero *Neisseria* es la principal sospecha con esta descripción y en este grupo etario. El tratamiento de elección para la artritis gonocócica, y en general para la mayoría de las artritis sépticas por Gram negativos no entéricos, es ceftriaxona. Este antibiótico es una cefalosporina de tercera generación con excelente cobertura contra *Neisseria gonorrhoeae* y buena penetración en el líquido sinovial. Además de la terapia antibiótica, el drenaje de la articulación es un pilar fundamental en el manejo de la artritis séptica. La acumulación de pus y bacterias dentro de la articulación puede causar daño irreversible al cartílago y al hueso subcondral. El drenaje, que puede ser mediante aspiraciones repetidas con aguja o, en casos más severos o con mala respuesta, mediante artroscopia o artrotomía quirúrgica, es esencial para remover el material purulento, reducir la presión intraarticular, disminuir la carga bacteriana y mejorar la eficacia de los antibióticos.

> **Perla.** Por lo tanto, la combinación de ceftriaxona endovenosa y drenaje quirúrgico es la conducta más adecuada y urgente para preservar la función articular.

TEMA 9.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

¿Cuál es el agente etiológico más probable en la artritis séptica de rodilla, con presencia de cocaceas Gram (-)...

CLAVE C **Neisseria gonorrhoeae**

La respuesta correcta es **Neisseria gonorrhoeae** debido a la presentación clínica clásica de artritis séptica monoarticular aguda en una persona sexualmente activa, el hallazgo de diplococos Gram negativos intracelulares en la tinción del líquido sinovial, y el potencial de cultivo negativo debido a los requerimientos nutricionales específicos del organismo y la posible presencia de antibióticos. La gonorrea es una causa importante de artritis séptica, especialmente en adultos jóvenes y sexualmente activos. La diseminación hematógena del gonococo puede ocurrir, llevando a una artritis, que a menudo afecta a las articulaciones grandes como la rodilla. La identificación de cocáceas Gram negativas intracelulares en la muestra de líquido articular es altamente sugestiva de infección gonocócica. Aunque el cultivo del líquido sinovial puede ser negativo en algunos casos de artritis gonocócica, especialmente si se han administrado antibióticos previos o si el patógeno es difícil de cultivar, el cuadro clínico y la citología del líquido sinovial son cruciales para el diagnóstico. Otros métodos diagnósticos, como la PCR en líquido sinovial o en muestras de uretra, cérvix o faringe, pueden ser más sensibles en estos casos.

> **Perla.** La clave para diferenciar esta presentación de otras artritis sépticas bacterianas reside en la morfología y tinción de los microorganismos observados.

TEMA 9.2 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

Un paciente de 33 años es diagnosticado de artritis séptica de cadera izquierda por estudio de líquido sinovial, con...

CLAVE E **Iniciar cefazolina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación**

La respuesta correcta es la **E** porque aborda de manera integral y urgente los dos pilares fundamentales en el manejo de la artritis séptica: el tratamiento antibiótico adecuado y el drenaje articular efectivo. Primero, el hallazgo de "cocáceas Gram positivas dispuestas en racimo" es la descripción clásica de *Staphylococcus aureus*, el agente causal más frecuente de artritis séptica en adultos. La cefazolina, una cefalosporina de primera generación, ofrece una excelente cobertura contra *Staphylococcus aureus* sensible a meticilina (SASM), que es la cepa más común en infecciones adquiridas en la comunidad. La administración endovenosa (EV) es crucial para alcanzar concentraciones terapéuticas altas y rápidas en la articulación. Segundo, y de igual importancia, es el aseo quirúrgico. La articulación de la cadera es profunda, de difícil acceso y no compresible, lo que hace que el drenaje por punciones repetidas (artrocentesis) sea ineficaz y riesgoso. Un drenaje incompleto del material purulento no solo perpetúa la infección, sino que las enzimas proteolíticas presentes en el pus destruyen el cartílago articular rápidamente, llevando a secuelas funcionales severas. Además, el aumento de la presión intraarticular en la cadera puede comprometer la irrigación de la cabeza femoral, provocando una osteonecrosis avascular. Por lo tanto, el aseo quirúrgico (ya sea por artrotomía o artroscopía) es el estándar de oro para la artritis séptica de cadera, ya que permite un drenaje completo, lavado de la articulación y desbridamiento del tejido necrótico.

> **Perla.** La combinación de cefazolina EV y aseo quirúrgico es la terapia óptima y urgente para este paciente.

TEMA 9.2 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.001

Un paciente de 56 años consulta por intenso dolor en rodilla derecha. Al examen se aprecia rodilla derecha eritematosa...

CLAVE B **Drenaje quirúrgico, asociado a Cloxacilina endovenosa**

La presentación clínica de un paciente con intenso dolor en la rodilla, eritema, calor y aumento de volumen, junto con líquido articular turbio y una citología con gran cantidad de polimorfonucleares, es altamente sugestiva de una artritis séptica. El hallazgo microscópico de cocáceas grampositivas en racimo en la tinción de Gram es crucial, ya que orienta fuertemente hacia la presencia de *Staphylococcus aureus*, el agente etiológico más común de la artritis séptica en adultos, especialmente en presencia de factores de riesgo como la edad avanzada. Dada la etiología probable y la gravedad de la infección articular, el manejo debe ser agresivo. El drenaje quirúrgico de la articulación es fundamental para eliminar el material purulento, los detritos y reducir la carga bacteriana, lo que mejora significativamente el pronóstico y previene el daño articular crónico. La elección del antibiótico endovenoso debe dirigirse contra *Staphylococcus aureus*, siendo la cloxacilina un betalactámico resistente a las penicilinasas, eficaz contra la mayoría de las cepas de *S. aureus* meticilín-sensible (SAMR).

> **Perla.** Por lo tanto, el drenaje quirúrgico asociado a cloxacilina endovenosa representa el tratamiento de elección.

TEMA 9.3 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.007

Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía...

CLAVE B **Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: No deben indicarse medicamentos**

El caso clínico describe a un paciente de 69 años con una monoartritis aguda de rodilla. Las claves diagnósticas son la radiografía que muestra **calcificación de ambos meniscos (condrocalcinosis)** y, sobre todo, la artrocentesis que revela **cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva**. Estos hallazgos son patognomónicos de la **artropatía por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)**, comúnmente conocida como **pseudogota**. A diferencia de la gota, donde los cristales de urato monosódico presentan birrefringencia negativa, los cristales de CPPD son positivos. Los exámenes generales, incluyendo calcemia y creatinina normales, y un ácido úrico discretamente elevado pero no directamente relacionado con la causa de esta artropatía cristalina (dado el tipo de cristales identificados), apoyan el diagnóstico de pseudogota. Para el **tratamiento agudo** de una crisis de pseudogota, las opciones de primera línea incluyen los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o la colchicina, junto con medidas de soporte como el reposo y la crioterapia. La inyección intraarticular de corticoides es también una opción muy efectiva, especialmente si la articulación es grande y accesible. Por lo tanto, indicar AINEs y reposo es una conducta adecuada para el manejo de la fase aguda. En cuanto a la **prevención de nuevas crisis** de pseudogota, es fundamental entender que, a diferencia de la gota (donde el alopurinol se usa para reducir el ácido úrico y prevenir ataques), no existe un tratamiento farmacológico específico y universalmente establecido para prevenir la formación de cristales de CPPD o la recurrencia de las crisis. La gestión se centra en identificar y tratar enfermedades subyacentes asociadas (como hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia), pero en este paciente no se reportan antecedentes ni alteraciones en los exámenes que sugieran estas condiciones como causa.

> **Perla.** En ausencia de una causa secundaria tratable o de crisis muy frecuentes y debilitantes (donde la colchicina a dosis bajas podría considerarse off-label para profilaxis), la recomendación general es **no indicar medicamentos específicos** para prevenir nuevas crisis de CPPD, ya que no hay terapias probadas que modifiquen el curso de la enfermedad de depósito de cristales de CPPD.

TEMA 9.3 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.007

Un paciente de 70 años presenta una artritis aguda de rodilla, la que se punciona, dando salida a un líquido...

CLAVE A **Indicar reposo e iniciar AINES**

La alternativa correcta es la A (Indicar reposo e iniciar AINES). El caso describe una condrocalcinosis (artritis por pirofosfato de calcio), también conocida como pseudogota. La clínica aguda se manifiesta con inflamación articular, dolor y derrame. El análisis del líquido sinovial es clave para el diagnóstico, mostrando cristales de pirofosfato de calcio. El tratamiento de la crisis aguda se basa en medidas no farmacológicas (reposo, hielo) y farmacológicas, siendo los AINES la primera línea por su efecto antiinflamatorio. Otras opciones incluyen colchicina (especialmente si hay contraindicación para AINES) e incluso corticoides intraarticulares si el compromiso es monoarticular y severo.

> **Perla.** Es importante mencionar que el tratamiento con alopurinol y bifosfonatos no están indicados en el manejo agudo de la condrocalcinosis.

TEMA 9.3 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.007

Un paciente de 68 años consulta por dolor intenso de la rodilla izquierda, de 4 horas de evolución, asociado a aumento...

CLAVE E **Indicar reposo e iniciar analgésicos**

La pregunta describe un caso clínico clásico de una artropatía por depósito de cristales, específicamente un ataque agudo de pseudogota o enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio (CPPD). El paciente es un hombre de 68 años con un cuadro de monoartritis aguda de la rodilla izquierda, caracterizado por dolor intenso, aumento de volumen, enrojecimiento y aumento de la temperatura local, junto con derrame articular. La radiografía de rodilla muestra una "línea de calcificación del cartílago articular", conocida como condrocalcinosis, que es una característica distintiva de la CPPD. El estudio del líquido sinovial confirma el diagnóstico al demostrar la presencia de abundantes cristales con birrefringencia de elongación positiva, lo que es patognomónico de los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD). Además, la tinción de Gram negativa descarta una artritis séptica, que es un diagnóstico diferencial crucial en cualquier monoartritis aguda. Ante un ataque agudo de pseudogota, el tratamiento principal se centra en el alivio del dolor y la inflamación. Los medicamentos de primera línea incluyen los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), la colchicina y los corticosteroides (orales o intraarticulares). La opción (e) "Indicar reposo e iniciar analgésicos" es la conducta más adecuada y general, ya que el reposo de la articulación afectada ayuda a disminuir el dolor y la inflamación, y los analgésicos (que en este contexto incluirían los AINEs como tratamiento de primera línea) son esenciales para manejar la sintomatología.

> **Perla.** Aunque la aspiración del líquido sinovial puede ser diagnóstica y terapéutica para aliviar la presión, no es siempre estrictamente necesaria como parte del tratamiento inicial en todos los casos y no se menciona como una opción aislada y correcta para el manejo del dolor.

TEMA 9.3 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.2.002

¿Qué fármaco es más útil para prevenir un ataque de gota?:

CLAVE A **Alopurinol**

La respuesta correcta es el Alopurinol porque actúa directamente sobre la causa subyacente de la gota: la hiperuricemia (niveles elevados de ácido úrico en la sangre). La gota es una artritis por microcristales, causada por el depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones y tejidos blandos cuando el ácido úrico sérico supera su punto de saturación. El Alopurinol es un inhibidor de la enzima xantina oxidasa, que es clave en la vía metabólica de producción de ácido úrico a partir de las purinas. Al bloquear esta enzima, el Alopurinol reduce eficazmente la síntesis de ácido úrico, disminuyendo sus niveles en la sangre por debajo del umbral de cristalización. Este fármaco es la piedra angular en el tratamiento crónico y la profilaxis de la gota. Su objetivo no es tratar el dolor y la inflamación de un ataque agudo, sino prevenir la recurrencia de futuros ataques, así como la formación de tofos y el desarrollo de artropatía gotosa crónica.

> **Perla.** Es fundamental iniciar el tratamiento con Alopurinol una vez que el ataque agudo ha sido resuelto (no durante el mismo, ya que puede paradójicamente prolongarlo o empeorarlo al movilizar los depósitos de urato) y se mantiene de forma indefinida para mantener el ácido úrico en niveles objetivo (generalmente <6 mg/dL).

TEMA 9.4 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.02.3.003

Un paciente de 66 años aqueja dolor en la ingle derecha, especialmente al caminar varias cuadras. Se solicita...

CLAVE B **Artrosis**

El diagnóstico de artrosis (osteoartritis) de cadera, también conocida como coxartrosis, es el más probable y se sustenta en una sólida correlación entre la clínica y los hallazgos radiológicos del paciente. La artrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago articular que afecta predominantemente a adultos mayores, por lo que la edad del paciente (66 años) es un factor de riesgo clave. El síntoma principal, el dolor inguinal de características "mecánicas" (que empeora con la actividad como caminar y mejora con el reposo), es el patrón clásico de la coxartrosis. El dolor se localiza típicamente en la ingle y puede irradiarse a la cara anterior del muslo y la rodilla. Los hallazgos en la radiografía son patognomónicos de la artrosis. La "disminución del espacio articular" es el reflejo directo de la pérdida y el desgaste del cartílago hialino. Los "osteofitos acetabulares" son espolones óseos que se forman en los márgenes de la articulación como un intento de reparación y estabilización del hueso ante la pérdida de cartílago. Finalmente, la "esclerosis del hueso subcondral" corresponde al aumento de la densidad ósea justo debajo del cartílago, una respuesta del hueso al aumento de la presión y el estrés mecánico debido a la disfunción del cartílago.

> **Perla.** La combinación de estos tres elementos en un paciente de edad avanzada con dolor mecánico confirma el diagnóstico.

TEMA 9.4 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.4.004

Un paciente de 71 años consulta por dolor en la ingle derecha, que aumenta con la marcha, por lo que ha disminuido su...

CLAVE A **Iniciar tratamiento sintomático con paracetamol**

La alternativa correcta es la A (Iniciar tratamiento sintomático con paracetamol). La presentación clínica del paciente, un hombre de 71 años con dolor inguinal que aumenta con la marcha, alivia con el reposo y con limitación de la movilidad de la cadera (abducción y rotación interna dolorosa), junto con los hallazgos radiológicos de disminución del espacio articular, reacción subcondral y osteofitos, son altamente sugestivos de artrosis de cadera (coxartrosis). En el manejo inicial de la artrosis, las guías clínicas (aunque no existe una GPC específica de MINSAL para coxartrosis, se aplican principios generales de manejo del dolor crónico y artrosis en otras localizaciones) recomiendan el tratamiento sintomático con analgésicos como el paracetamol o AINEs, asociado a medidas no farmacológicas como la fisioterapia y modificación de la actividad física.

> **Perla.** Dado que el dolor es tolerable y la limitación funcional no es extrema (disminución de la actividad, no invalidez completa), el inicio con paracetamol es una opción razonable antes de escalar a AINEs, considerando los riesgos asociados a estos últimos, especialmente en un paciente de edad avanzada.

TEMA 9.5 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.143

Una paciente de 17 años presenta fiebre intermitente de 3 semanas de evolución, acompañada en algunas oportunidades de...

CLAVE D **Artritis juvenil idiopática (Enfermedad de Still)**

La artritis juvenil idiopática (AJI) variedad sistémica, también conocida como enfermedad de Still del adulto cuando se presenta en mayores, es la alternativa correcta por la siguiente razón: La paciente presenta fiebre intermitente prolongada, rash eritematoso macular evanescente (típico de la enfermedad de Still), artritis (tobillo y articulaciones metacarpofalángicas) y elevación importante de la ferritina. Estos son hallazgos cardinales de la AJI sistémica. La hiperferritinemia es un hallazgo común y, a menudo, marcada en esta condición. Es importante destacar que el diagnóstico es clínico y se basa en la presencia de criterios específicos. Aunque no se menciona en el caso, es útil recordar que en la AJI sistémica también pueden verse otras manifestaciones como serositis (pleuritis, pericarditis) y hepatoesplenomegalia.

Perla. La guía AUGE de artritis idiopática juvenil del MINSAL es un recurso importante para el manejo de esta enfermedad.

TEMA 9.5 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.143

Un niño de 5 años presenta un cuadro de 2 meses de evolución de artritis de rodillas, muñecas y algunas articulaciones...

CLAVE E **Antiinflamatorios no esteroidales orales**

El cuadro clínico descrito es altamente sugerente de una Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), específicamente la forma poliarticular o sistémica (Enfermedad de Still), aunque la fiebre "ocasional" hace más probable la primera. La AIJ se define como una artritis de causa desconocida, de más de 6 semanas de duración, en un paciente menor de 16 años. El paciente cumple todos estos criterios: 5 años, 2 meses de evolución y un patrón de poliartritis simétrica que afecta grandes y pequeñas articulaciones. Los hallazgos de laboratorio (anemia de enfermedad crónica, trombocitosis reactiva y una ferritina muy elevada) son marcadores de un proceso inflamatorio sistémico intenso, característicos de esta patología. El manejo de la AIJ sigue un enfoque escalonado. La primera línea de tratamiento, especialmente en formas articulares sin factores de mal pronóstico o manifestaciones sistémicas graves, consiste en el uso de Antiinflamatorios no Esteroidales (AINEs). El objetivo inicial es controlar el dolor y la inflamación articular para mejorar la función y calidad de vida del niño. Se realiza una prueba terapéutica con AINEs (como naproxeno o ibuprofeno) por varias semanas para evaluar la respuesta. Solo si la respuesta a los AINEs es insuficiente o si el paciente presenta desde el inicio factores de mal pronóstico (ej. afectación de cadera, factor reumatoide positivo) o una enfermedad sistémica muy activa, se procede a escalar el tratamiento a fármacos modificadores de la enfermedad (FAMEs), como el metotrexato.

Perla. Por lo tanto, iniciar con AINEs es el paso inicial y correcto según las guías de manejo estándar.

TEMA 9.6 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

Un hombre de 40 años presenta rigidez matinal de una hora y artralgias de articulaciones metacarpofalángicas, muñecas y...

CLAVE A **Artritis reumatoide**

La alternativa correcta es Artritis Reumatoide (AR) debido a la presentación clínica del paciente. Los hallazgos clave que apuntan hacia AR son: * **Rigidez matinal de una hora o más:** Este es un sello distintivo de la AR, causado por la acumulación de líquido inflamatorio en las articulaciones durante la noche. La duración de la rigidez es importante; una rigidez menor a 30 minutos es menos sugestiva de AR. * **Artralgias de pequeñas articulaciones:** La AR tiende a afectar las articulaciones metacarpofalángicas (MCF), muñecas y tobillos. La afectación simétrica de estas articulaciones es también muy característica. * **Duración de los síntomas:** El paciente presenta los síntomas desde hace 6 semanas. Para cumplir los criterios diagnósticos de AR, los síntomas deben estar presentes por lo menos 6 semanas. * **Signos inflamatorios:** Aumento de volumen y signos inflamatorios (dolor, calor, rubor) en las articulaciones afectadas confirman la presencia de sinovitis, un proceso inflamatorio característico de la AR. En Chile, el MINSAL cuenta con guías clínicas para el manejo de la Artritis Reumatoide, enfocándose en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para minimizar el daño articular y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Perla. Si bien no se cita textualmente un extracto en esta explicación, es fundamental conocer y aplicar los criterios diagnósticos y de tratamiento establecidos en dichas guías.

TEMA 9.6 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

Una paciente de 36 años consulta por artralgias de manos de algunos meses de evolución, asociados a rigidez matinal de...

CLAVE B **Artritis reumatoide**

La respuesta correcta es b) Artritis reumatoide. La paciente presenta una constelación de síntomas y signos altamente sugestivos de artritis reumatoide (AR). Clásicamente, la AR afecta a mujeres en edad adulta (la paciente tiene 36 años), se caracteriza por una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, especialmente las interfalángicas proximales (IFP) y metacarpofalángicas (MCF) de las manos, tal como se describe. El "aumento de volumen y signos inflamatorios" en estas articulaciones es la manifestación de una sinovitis crónica. Un hallazgo cardinal que distingue a la artritis inflamatoria, como la AR, de otras condiciones es la rigidez matinal prolongada. En este caso, la rigidez de "1 hora aproximadamente" es muy característica de la AR, donde la rigidez suele durar más de 30 minutos o incluso varias horas. La evolución de "algunos meses" también es consistente con el curso crónico y progresivo de la enfermedad.

Perla. Todos estos elementos en conjunto apuntan inequívocamente hacia la artritis reumatoide como el diagnóstico más probable.

TEMA 9.6 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

¿Cuál de las siguientes NO suele ser una manifestación extra articular de la artritis reumatoide?

CLAVE B **Mielitis transversa**

La mielitis transversa, aunque una manifestación neurológica seria, no es una complicación extraarticular típica de la artritis reumatoide (AR). Si bien la AR puede asociarse a manifestaciones neurológicas, estas suelen ser secundarias a la inflamación directa de nervios (neuropatía periférica, como la mononeuritis múltiple) o a la compresión por estructuras inflamadas (como el síndrome del túnel carpiano), y no a una inflamación primaria de la médula espinal como la mielitis transversa.

Perla. La mielitis transversa es más comúnmente asociada a otras enfermedades autoinmunes (como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica), infecciones o, de forma idiopática.

TEMA 9.6 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele aparecer en los pacientes con artritis reumatoide?

CLAVE D **Nódulos de Heberden**

La respuesta correcta es la **d) Nódulos de Heberden**. Los nódulos de Heberden son formaciones óseas o cartilaginosas que aparecen típicamente en las articulaciones interfalángicas distales (IFD) de los dedos de las manos. Son un signo patognomónico de la **artrosis (osteoartritis)**, una enfermedad degenerativa articular, y no de la artritis reumatoide. Su presencia se debe al crecimiento de osteofitos en el borde de la articulación afectada por el desgaste del cartílago y la reacción ósea subyacente. La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica y autoinmune que afecta principalmente a las articulaciones sinoviales, causando sinovitis persistente que puede llevar a la destrucción del cartílago y el hueso, así como a la deformidad articular. Aunque la AR también puede afectar las manos y causar deformidades significativas, los nódulos de Heberden no forman parte de su cuadro clínico característico.

Perla. La diferenciación entre estas dos condiciones, la artrosis y la artritis reumatoide, es fundamental en reumatología y se basa en la etiología, patogenia, patrones de afectación articular y la presencia de hallazgos específicos como los nódulos de Heberden en la artrosis.

TEMA 9.7 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

Un paciente de 43 años es diagnosticada de artritis reumatoide. El tratamiento de primera línea es:

CLAVE B **Metotrexato**

El metotrexato es, de hecho, el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) de primera línea y pilar fundamental en el tratamiento de la artritis reumatoide (AR) de moderada a grave. Su eficacia radica en su capacidad para reducir la inflamación, disminuir el daño articular progresivo y mejorar la función física en la mayoría de los pacientes. Se clasifica como un antimetabolito que actúa como un antagonista del folato, inhibiendo la dihidrofolato reductasa, lo que interfiere con la síntesis de purinas y pirimidinas y, en última instancia, con la proliferación de células inflamatorias como los linfocitos T y B. Su mecanismo de acción inmunomodulador es clave para controlar la actividad de la enfermedad a largo plazo. La administración de metotrexato suele ser semanal (oral o subcutánea) y se recomienda iniciarla lo antes posible tras el diagnóstico para prevenir la progresión del daño articular. Para mitigar los efectos secundarios relacionados con la depleción de folato (como náuseas, estomatitis, o elevación de enzimas hepáticas), se coadministra suplementación con ácido fólico. Antes de iniciar el tratamiento, y de forma regular durante el mismo, se deben realizar controles hepáticos y renales, así como hemogramas, para monitorizar la seguridad del fármaco. La elección de metotrexato como primera línea se basa en su perfil de eficacia bien establecido, su tolerabilidad en la mayoría de los pacientes y su costo-efectividad.

Trampa. Si un paciente no responde adecuadamente a metotrexato en monoterapia, o presenta contraindicaciones, se pueden considerar combinaciones con otros FARME (como hidroxicloroquina o sulfasalazina) o la escalada a terapias biológicas o inhibidores de JAK, siempre manteniendo el metotrexato como base si es posible.

TEMA 9.7 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

¿Cuál de las siguientes alteraciones es menos probable de encontrar en un paciente con artritis reumatoide?

CLAVE C **Nefritis**

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune sistémica que, además de afectar principalmente las articulaciones, puede manifestarse con una amplia gama de complicaciones extraarticulares que comprometen diversos órganos. La pregunta busca identificar cuál de las alteraciones presentadas es la "menos probable" de encontrar en un paciente con AR. Las manifestaciones renales directas de la AR, específicamente la nefritis glomerular inflamatoria primaria, son considerablemente menos comunes y menos características que en otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Aunque los pacientes con AR pueden desarrollar problemas renales, estos suelen ser secundarios a otras causas. La amiloidosis AA, una complicación grave de la inflamación crónica no controlada en la AR, puede llevar a depósitos de amiloide en los riñones, resultando en proteinuria y eventual insuficiencia renal. Del mismo modo, la nefrotoxicidad inducida por los medicamentos utilizados para tratar la AR (como AINEs, metotrexato o ciclosporina) es una causa frecuente de disfunción renal en estos pacientes.

Perla. Por lo tanto, si bien las alteraciones renales pueden ocurrir en el contexto de la AR (principalmente por amiloidosis o fármacos), la nefritis (entendida como una glomerulonefritis primaria y directa causada por la AR) no es una manifestación patológica típica ni frecuente de la enfermedad en sí misma, a diferencia de las otras opciones que son manifestaciones extraarticulares bien reconocidas y características de la artritis reumatoide.

TEMA 9.7 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

El tratamiento de elección de la artritis reumatoide es:

CLAVE D **Metotrexato**

El metotrexato (MTX) es considerado el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) convencional de primera línea y tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide (AR). Su importancia radica en su capacidad para modificar el curso de la enfermedad, reduciendo la inflamación, controlando la progresión del daño articular y mejorando la función física y la calidad de vida a largo plazo. A diferencia de los tratamientos sintomáticos, el metotrexato busca detener la patogénesis de la enfermedad. El mecanismo de acción del metotrexato en la AR no se comprende completamente, pero se cree que involucra la inhibición de la dihidrofolato reductasa, lo que afecta el metabolismo del folato y la proliferación celular, especialmente en células inmunes activadas. También posee efectos antiinflamatorios directos y modula la función de las células T y la producción de citocinas proinflamatorias.

> **Perla.** Su eficacia y un perfil de seguridad bien establecido (cuando se monitoriza adecuadamente) lo convierten en el "fármaco ancla" en el manejo de la AR, utilizándose frecuentemente como monoterapia inicial o como parte fundamental de terapias combinadas con otros FARME o terapias biológicas.

TEMA 9.7 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.003

Una paciente de 40 años presenta dolor en las manos desde hace 3 meses. Refiere marcada rigidez articular, que dura...

CLAVE E **Metotrexato**

La paciente presenta un cuadro clínico característico de Artritis Reumatoidea (AR): poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones (muñecas, MCF, IFP), rigidez matinal prolongada (mayor a 30 minutos, en este caso una hora). Según las guías clínicas chilenas (y consensos internacionales), el tratamiento de primera línea para la AR es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) sintético convencional, siendo el Metotrexato (MTX) el más utilizado y con mayor evidencia de eficacia y seguridad.

> **Perla.** Su uso temprano disminuye la progresión del daño articular y mejora la calidad de vida.

TEMA 9.8 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.4.003

¿Qué anticuerpo es más sensible para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico?

CLAVE D **Anti-nucleares**

La respuesta correcta es d) Anti-nucleares (ANA) porque son los anticuerpos más sensibles para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES). Los anticuerpos anti-nucleares son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra componentes del núcleo celular y están presentes en más del 95% de los pacientes con LES, a menudo incluso en etapas tempranas de la enfermedad. Esta alta sensibilidad los convierte en la prueba de cribado o "screening" inicial ideal para la sospecha de LES. Un resultado ANA negativo (con la técnica y títulos adecuados) prácticamente descarta el diagnóstico de LES. Es importante destacar que, si bien la prueba ANA es extremadamente sensible, no es específica para el LES. Un resultado positivo puede encontrarse en otras enfermedades autoinmunes (como esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide), infecciones, cáncer, e incluso en un porcentaje de individuos sanos, especialmente con la edad avanzada o el uso de ciertos fármacos. Por lo tanto, un ANA positivo siempre debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente y, si la sospecha de LES persiste, debe complementarse con la búsqueda de anticuerpos más específicos. En resumen, los ANA son el primer paso en la evaluación diagnóstica del LES debido a su capacidad para identificar a casi todos los pacientes con la enfermedad, actuando como una puerta de entrada para pruebas más confirmatorias.

> **Trampa.** Su rol es fundamentalmente el de una herramienta de screening con un alto valor predictivo negativo, lo que permite descartar el diagnóstico de LES cuando el resultado es negativo.

TEMA 9.8 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

Una paciente de 30 años consulta por eritema de la cara, sobre el dorso de la nariz y los pómulos, que respeta el surco...

CLAVE C **Lupus eritematoso sistémico**

La descripción del eritema facial en la paciente, caracterizado por un eritema en el dorso de la nariz y los pómulos, respetando el surco nasolabial, que se exacerba con la exposición solar, es altamente sugestivo del "rash malar" o "eritema en alas de mariposa". Este rash es un criterio diagnóstico importante para el **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**, según los criterios SLICC o EULAR/ACR. Si bien el lupus discoide también puede presentar un rash facial, este suele ser más indurado, escamoso y deja cicatriz, lo que no se describe en el caso clínico. Además, el LES es una enfermedad sistémica, y el rash facial puede ser la primera manifestación.

> **Perla.** Es fundamental, ante la sospecha de LES, solicitar exámenes complementarios como ANA, anti-DNA, anti-Sm, complemento, etc., para confirmar el diagnóstico y evaluar el compromiso de otros órganos. **En Chile, la Guía Clínica GES de Lupus Eritematoso Sistémico (MINSAL) enfatiza la importancia del diagnóstico temprano y el manejo multidisciplinario del LES, destacando la presentación clínica inicial, incluyendo el rash malar, como un signo de alerta.**

TEMA 9.8 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

En una paciente de 25 años de edad, sin antecedentes mórbidos, que consulta por un cuadro de tres semanas de evolución...

CLAVE B **Lupus Eritematoso Sistémico**

La alternativa correcta es Lupus Eritematoso Sistémico (LES) porque el cuadro clínico que presenta la paciente es altamente sugestivo de esta enfermedad. Los síntomas clave que apuntan al LES son: * **Compromiso del estado general y fiebre continua:** Son síntomas comunes en enfermedades autoinmunes sistémicas como el LES. * **Erupción cutánea nasogeniana:** Esta descripción sugiere el clásico "eritema en alas de mariposa" o rash malar, muy característico del LES. * **Alopecía:** La pérdida de cabello también es una manifestación frecuente del LES. * **Fenómeno de Raynaud:** Presente en un porcentaje significativo de pacientes con LES. * **Poliartralgias:** El dolor en múltiples articulaciones es otro síntoma común en el LES. * **Derrame pleural:** La serositis, que se manifiesta como derrame pleural (o pericárdico), es un criterio diagnóstico de LES. Según la Guía Clínica del MINSAL para el Lupus Eritematoso Sistémico (si bien, no se puede citar directamente sin el link/archivo), el diagnóstico de LES se basa en una combinación de criterios clínicos y de laboratorio. Los síntomas presentados por la paciente cumplen con varios de estos criterios. Es fundamental solicitar exámenes complementarios (ej.

> **Perla.** ANA, anti-DNA, complemento) para confirmar el diagnóstico.

TEMA 9.8 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

Una mujer de 35 años presenta astenia, adinamia, fiebre intermitente, artralgias y caída del cabello, de 3 semanas de...

CLAVE E **Lupus sistémico**

La paciente presenta un cuadro clínico caracterizado por síntomas constitucionales (astenia, adinamia, fiebre intermitente), artralgias y alopecia, lo que sugiere una enfermedad autoinmune. Además, presenta úlceras orales, que son un criterio diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) según los criterios SLICC y EULAR. Los hallazgos de laboratorio son altamente sugestivos de LES: anemia (hematocrito bajo y VCM disminuido, pudiendo ser anemia de enfermedad crónica o relacionada al LES), trombocitopenia (plaquetas bajas) y elevación de la creatinina (sugiere compromiso renal, una manifestación frecuente del LES). La elevación de la VHS también es un hallazgo compatible con inflamación sistémica. Es importante destacar que, si bien no se mencionan explícitamente los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o anti-Sm, la presencia de estos elementos clínicos y de laboratorio justifica considerar LES como el diagnóstico más probable.

> **Perla.** La guía clínica del MINSAL para el LES enfatiza la importancia de la detección temprana y tratamiento oportuno para prevenir daño orgánico irreversible.

TEMA 9.9 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

Una paciente de 20 años consulta por fiebre, astenia, artralgias y hematuria. Al examen físico se aprecia artritis de...

CLAVE D **Lupus**

La alternativa correcta es Lupus Eritematoso Sistémico (LES) debido a la combinación de síntomas y hallazgos de laboratorio presentados. La paciente de 20 años presenta: * **Fiebre y Astenia:** Síntomas constitucionales comunes en enfermedades autoinmunes como el LES. * **Artralgias y Artritis de manos:** La artritis en pequeñas articulaciones como las manos es característica de enfermedades autoinmunes. * **Hematuria:** Sugiere afectación renal, lo cual es frecuente en el LES, específicamente la nefritis lúpica. * **Elevación de la Creatinina:** Indica insuficiencia renal, lo que apoya aún más la posibilidad de nefritis lúpica. * **Hematuria Dismórfica:** Apoya la afectación glomerular, lo cual es característico de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una manifestación grave del LES, y la hematuria y la elevación de la creatinina son hallazgos importantes para sospecharla.

> **Perla.** Según la guía clínica del MINSAL sobre Lupus Eritematoso Sistémico (si bien no existe una guía específica del MINSAL para LES, las guías de manejo de enfermedades autoinmunes del MINSAL generalmente recomiendan una evaluación exhaustiva ante sospecha de compromiso renal), la presencia de compromiso renal obliga a una evaluación diagnóstica completa que incluye biopsia renal para confirmar el diagnóstico y determinar el grado de afectación.

TEMA 9.9 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.1.006

Un hombre de 68 años, diabético tipo 2, en tratamiento con dieta desde hace 10 años, presenta astenia y edema de...

CLAVE A **Nefropatía diabética**

El diagnóstico más probable es nefropatía diabética debido a la constelación de hallazgos clínicos y de laboratorio en un paciente con un factor de riesgo claro y de larga data. Se trata de un hombre con 10 años de evolución de diabetes mellitus tipo 2 y un control glucémico deficiente (HbA1c: 8%), lo cual es el principal factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones microvasculares, incluyendo el daño renal. La presentación clínica con astenia y edema de extremidades inferiores es compatible con una enfermedad renal crónica (ERC) avanzada, donde la astenia puede ser secundaria a la uremia (BUN elevado) y/o anemia de la ERC, y el edema se explica por la retención de sodio y agua debido a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Los exámenes de laboratorio confirman la presencia de una ERC avanzada con características típicas de la nefropatía diabética. Un clearence de creatinina de 30 ml/min lo sitúa en una etapa G4 de ERC. La proteinuria de 1,2 gramos en 24 horas corresponde a una proteinuria en rango nefrótico (o macroalbuminuria), un sello distintivo de esta complicación. Es crucial notar que el sedimento de orina es "blando", es decir, sin hematuria ni leucocituria significativas, lo que es característico de la nefropatía diabética y ayuda a descartar glomerulonefritis activas o nefritis intersticiales. Aunque la albuminemia es normal, esto no descarta el diagnóstico, ya que el síndrome nefrótico completo (proteinuria >3.5g/día, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia) no siempre está presente.

> **Perla.** La combinación de diabetes de larga evolución, mal control, ERC y proteinuria con sedimento blando hace que la nefropatía diabética sea la principal sospecha, sin necesidad inicial de una biopsia renal.

TEMA 9.9 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.1.006

Un niño de 6 años presenta un cuadro caracterizado por orinas espumosas y aumento de volumen facial, especialmente en...

CLAVE B **Iniciar prednisona**

El caso clínico describe a un niño de 6 años con un cuadro clásico de **Síndrome Nefrótico Idiopático (SNI)**. Los elementos clave que apoyan este diagnóstico son: 1. **Presentación clínica:** Edema de inicio insidioso, con predominio facial y palpebral ("anasarca"), y orinas espumosas (signo de proteinuria masiva). 2. **Tétrada del Síndrome Nefrótico:** * **Proteinuria en rango nefrótico:** 100 mg/m2/hora (el criterio es >40 mg/m2/hora). * **Hipoalbuminemia:** 2.8 g/dl (el criterio es <3.0 g/dl, aunque clásicamente se usa <2.5 g/dl). * **Edema:** Presente en el examen físico. * **Hiperlipidemia:** Mencionada como "elevación del colesterol" (es una consecuencia de la hipoalbuminemia, por aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas). 3. **Ausencia de signos nefríticos:** El paciente tiene presión arterial normal, creatinina normal (función renal conservada) y un sedimento de orina normal (sin hematuria ni cilindros), lo que aleja la sospecha de un síndrome nefrítico. 4. **Estudio inmunológico negativo:** ANA, ANCA y complemento normales descartan causas secundarias comunes como lupus o vasculitis. En niños de 1 a 10 años con esta presentación clásica, la causa más probable (aproximadamente 90% de los casos) es la **Enfermedad de Cambios Mínimos (ECM)**. Esta patología se caracteriza por su excelente respuesta a los corticoides.

> **Perla.** Por lo tanto, el manejo inicial estándar y de primera línea, sin necesidad de una biopsia previa, es iniciar un ciclo de **prednisona** oral a dosis altas (60 mg/m2/día o 2 mg/kg/día) con el objetivo de inducir la remisión.

TEMA 9.9 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.1.006

Un paciente de 67 años consulta por artralgias y fiebre de 3 días de evolución, asociados a hematuria y oliguria...

CLAVE A **Poliangeítis microscópica**

El paciente presenta un cuadro clínico altamente sugestivo de una vasculitis sistémica que afecta predominantemente los vasos pequeños, manifestándose como una glomerulonefritis rápidamente progresiva (RPGN). Esto se evidencia por la oliguria importante, la elevación aguda de la creatinina a 3,5 mg/dl (indicando lesión renal aguda severa) y la hematuria dismórfica, que es característica de un origen glomerular. Los síntomas sistémicos como artralgias y fiebre de 3 días de evolución refuerzan la idea de un proceso inflamatorio generalizado. El perfil inmunológico es clave para el diagnóstico diferencial. La presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) negativos descarta lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes que comúnmente cursan con ANA positivos. Sin embargo, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) positivos con patrón perinuclear (p-ANCA) son un hallazgo crucial. El p-ANCA se asocia principalmente a la presencia de anticuerpos anti-mieloperoxidasa (anti-MPO) y es un marcador característico de las vasculitis asociadas a ANCA, especialmente la poliangeítis microscópica (MPA).

> **Perla.** La MPA es una vasculitis necrotizante de vasos pequeños que afecta capilares, vénulas y arteriolas, y la afectación renal en forma de glomerulonefritis necrotizante pauciinmune (con poca o ninguna evidencia de depósito de inmunocomplejos en la biopsia renal) es una de sus manifestaciones más frecuentes y graves, coincidiendo perfectamente con la presentación del paciente.

TEMA 9.10 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

El lupus inducido por drogas suele presentar:

CLAVE D **Anticuerpos anti-histona**

El lupus inducido por drogas (LID) es un síndrome que se asemeja al lupus eritematoso sistémico (LES), pero es causado por la exposición crónica a ciertos medicamentos. A diferencia del LES idiopático, el LID tiende a ser menos grave, rara vez involucra los riñones o el sistema nervioso central, y sus síntomas suelen resolver semanas o meses después de la interrupción del fármaco causante. Las manifestaciones clínicas comunes incluyen artralgias, mialgias, fiebre, erupciones cutáneas y serositis (pleuritis o pericarditis). La característica serológica más distintiva y la respuesta correcta para el diagnóstico de lupus inducido por drogas son los anticuerpos anti-histona. Estos anticuerpos están presentes en más del 95% de los pacientes con LID, lo que los convierte en un marcador altamente sensible para esta condición. Se dirigen a las proteínas histonas que forman parte del nucleosoma, la unidad fundamental de empaquetamiento del ADN.

> **Perla.** La presencia de anticuerpos anti-histona, junto con una historia de exposición a medicamentos conocidos por inducir lupus (como hidralazina, procainamida, isoniacida, minociclina, anti-TNF-alfa, entre otros) y la resolución de los síntomas tras la interrupción del fármaco, son los pilares para el diagnóstico de LID.

TEMA 9.10 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.014

Cuál de las siguientes asociaciones, entre marcador inmunológico y patología, es CORRECTA:

CLAVE C **Anticuerpos anti-Ro – Síndrome de Sjörgren**

La opción correcta es la C, que asocia los anticuerpos anti-Ro con el Síndrome de Sjögren. Esta es una de las asociaciones inmunológicas más clásicas y relevantes en reumatología. Los anticuerpos anti-Ro (también conocidos como SS-A) y los anti-La (o SS-B) son anticuerpos dirigidos contra ribonucleoproteínas citoplasmáticas. Su presencia es un pilar en el diagnóstico del Síndrome de Sjögren primario, una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por la infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas, principalmente salivales y lagrimales, lo que causa sequedad ocular (xeroftalmia) y bucal (xerostomía). La positividad para anti-Ro se encuentra en aproximadamente el 70% de los pacientes con Síndrome de Sjögren primario y forma parte de los criterios de clasificación internacionales (ACR/EULAR). Además de su valor diagnóstico, la presencia de anticuerpos anti-Ro tiene implicaciones pronósticas y clínicas. Se asocia con un inicio más temprano de la enfermedad, mayor riesgo de manifestaciones extraglandulares (como vasculitis, compromiso pulmonar o neurológico) y es el principal responsable del lupus neonatal y el bloqueo cardíaco congénito en hijos de madres portadoras de este anticuerpo, incluso si la madre está asintomática. Si bien los anti-Ro también pueden encontrarse en otras patologías como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), donde se asocian a fotosensibilidad y lupus cutáneo subagudo, su asociación más fuerte y característica es con el Síndrome de Sjögren.

> **Perla.** Por lo tanto, esta opción representa un conocimiento fundamental y correcto en el campo de la autoinmunidad.

TEMA 9.11 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

El síndrome antifosfolípidos se asocia a todo lo siguiente EXCEPTO:

CLAVE A **Acortamiento del TTPA**

La respuesta correcta es la A) Acortamiento del TTPA. En el síndrome antifosfolípido (SAF), paradójicamente, a pesar de asociarse a trombosis, el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) suele estar prolongado, NO acortado. Esto se debe a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que interfieren con las pruebas de coagulación *in vitro*, prolongando el tiempo de coagulación en el laboratorio. La paradoja reside en que estos anticuerpos, *in vivo*, promueven un estado protrombótico, pero *in vitro* interfieren con las reacciones de fosfolípidos necesarias para la correcta medición del TTPA. Es crucial recordar que el SAF es un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos (anticardiolipina, anti-beta2-glicoproteína I y/o anticoagulante lúpico) asociado a eventos trombóticos (arteriales o venosos) o complicaciones obstétricas (abortos recurrentes, muerte fetal, preeclampsia severa). La prolongación del TTPA, aunque no patognomónica, es una característica común en las pruebas de laboratorio en pacientes con SAF.

Perla. La presencia del anticoagulante lúpico es la causa más común de prolongación del TTPA en el contexto del SAF.

TEMA 9.11 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

Paciente de 34 años con antecedentes de tres abortos previos y trombosis venosa profunda en el último año, sin otros...

CLAVE B **Iniciar tratamiento anticoagulante**

El diagnóstico más probable en esta paciente es un Síndrome Antifosfolípido (SAF). Este se define por la presencia de criterios clínicos (trombosis vascular o morbilidad obstétrica) y de laboratorio (presencia de anticuerpos antifosfolípidos). La paciente cumple con ambos: presenta un antecedente de trombosis venosa profunda (criterio clínico de trombosis) y tres abortos previos (criterio clínico de morbilidad obstétrica). Además, los exámenes de laboratorio confirman la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y anticardiolipinas. La fisiopatología central del SAF es un estado de hipercoagulabilidad que predispone a eventos trombóticos tanto arteriales como venosos. Por lo tanto, el pilar del tratamiento y el manejo más urgente es la prevención de nuevos episodios de trombosis, que pueden ser potencialmente mortales (como un tromboembolismo pulmonar o un accidente cerebrovascular). Para la prevención secundaria (es decir, en pacientes que ya han sufrido un evento trombótico como esta paciente), el tratamiento de elección es la anticoagulación a largo plazo, generalmente con antagonistas de la vitamina K (como warfarina o acenocumarol) o, en casos seleccionados, con anticoagulantes orales directos. El objetivo es mantener al paciente en un rango terapéutico de anticoagulación para reducir significativamente el riesgo de recurrencia trombótica.

Perla. La presencia de ANA y Factor Reumatoide positivos puede sugerir una enfermedad del tejido conectivo subyacente (como Lupus Eritematoso Sistémico, del cual el SAF puede ser secundario), pero no cambia el manejo inicial y prioritario, que es controlar el riesgo trombótico inmediato.

TEMA 9.11 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último...

CLAVE B **Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.**

La paciente presenta un cuadro clínico muy sugerente de una enfermedad autoinmune sistémica, específicamente Lupus Eritematoso Sistémico (LES) con una alta probabilidad de coexistencia o presentación primaria de Síndrome Antifosfolípido (SAF). Los datos clave que apuntan a esto son: 1. **Antecedente de esplenectomía por trombocitopenia:** Sugiere una púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una condición autoinmune que frecuentemente se asocia con LES. 2. **Cuatro abortos y un cuadro de trombosis venosa profunda:** Esta combinación de pérdidas recurrentes de embarazo y eventos trombóticos es patognomónica del Síndrome Antifosfolípido (SAF), una trombofilia adquirida que puede presentarse de forma primaria o secundaria a otras enfermedades autoinmunes como el LES. 3. **Síntomas sistémicos actuales:** Artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre son manifestaciones inespecíficas pero comunes de enfermedades autoinmunes sistémicas. Considerando estos antecedentes, las pruebas de laboratorio de mayor utilidad para llegar al diagnóstico son los Anticuerpos Antinucleares (ANA) como cribado para el LES y otras enfermedades del tejido conectivo, y los Anticuerpos Anticardiolipina para confirmar el Síndrome Antifosfolípido, dada la fuerte sospecha clínica. El ANA es positivo en más del 95% de los pacientes con LES, lo que lo convierte en una excelente prueba de tamizaje.

Perla. Los anticuerpos anticardiolipina son uno de los principales criterios de laboratorio para el diagnóstico del SAF.

TEMA 9.11 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.021

¿Cuál de las siguientes pacientes puede utilizar anticonceptivos orales sin mayor contraindicación?

CLAVE E **Mujer con antecedente de abortos a repetición**

La pregunta evalúa el conocimiento sobre las contraindicaciones de los anticonceptivos orales (ACO), específicamente los combinados (estrógeno y progestina), que son los que tienen la mayor cantidad de restricciones. La respuesta correcta es la paciente con antecedente de abortos a repetición. Un historial de abortos recurrentes no constituye, por sí mismo, una contraindicación para el uso de ACO. Las causas del aborto a repetición son variadas (genéticas, anatómicas, endocrinas, inmunológicas), pero ninguna de ellas se ve directamente agravada por el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales (supresión de la ovulación, espesamiento del moco cervical y alteración endometrial). De hecho, si una paciente con este antecedente desea posponer un nuevo embarazo mientras se completa su estudio, la anticoncepción hormonal es una opción válida y segura. Es crucial diferenciar el antecedente de abortos a repetición de una de sus posibles causas, como el Síndrome Antifosfolípido (SAF), que sí es una contraindicación absoluta para el uso de ACO combinados debido al altísimo riesgo trombótico.

Perla. Sin embargo, la pregunta solo menciona el antecedente, no un diagnóstico causal específico que contraindique los ACO.

TEMA 9.12 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.1.021

Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada (CREST) suelen desarrollar:

CLAVE D **Hipertensión pulmonar**

La respuesta correcta es d) Hipertensión pulmonar. Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada, también conocida como síndrome CREST (Calcinosis, Fenómeno de Raynaud, Disfunción Esofágica, Esclerodactilia, Telangiectasias), tienen un riesgo significativamente elevado de desarrollar hipertensión arterial pulmonar (HAP). Esta complicación es una de las principales causas de morbimortalidad en este subgrupo de pacientes. La patogenia implica una vasculopatía proliferativa en las arteriolas pulmonares, que conduce a un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha. La hipertensión pulmonar en CREST se distingue a menudo de la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) que es más característica de la esclerodermia difusa. En el caso de CREST, la HAP puede ocurrir de forma aislada o con una enfermedad pulmonar intersticial leve. Es crucial la detección temprana mediante pruebas de detección como el ecocardiograma y la confirmación mediante cateterismo cardíaco derecho, dado que existen terapias específicas para la HAP que pueden mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. La vasculopatía que subyace al fenómeno de Raynaud, una característica central del CREST, también contribuye a la susceptibilidad a la hipertensión pulmonar, reflejando una disfunción endotelial sistémica.

Perla. La presencia de anticuerpos anticentrómero, que son altamente específicos para el CREST, también se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar HAP.

TEMA 9.12 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre marcadores inmunológicos y patología es correcta?

CLAVE D **Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia**

La opción correcta es d) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia. Los anticuerpos anticentrómero (ACA) son un marcador inmunológico de gran relevancia en el diagnóstico y la clasificación de la esclerosis sistémica, también conocida como esclerodermia. Estos anticuerpos se dirigen específicamente contra las proteínas del centrómero, una región esencial de los cromosomas. Su presencia es particularmente característica de la forma cutánea limitada de la esclerosis sistémica, que históricamente se ha asociado con el síndrome CREST (Calcinosis, Fenómeno de Raynaud, Disfunción Esofágica, Esclerodactilia, Telangiectasias). La especificidad de los anticuerpos anticentrómero para la esclerosis sistémica limitada es muy alta, encontrándose en aproximadamente el 50-90% de los pacientes con esta presentación. Su detección no solo apoya el diagnóstico, sino que también puede ayudar a predecir un curso de la enfermedad diferente al de la esclerosis sistémica difusa (donde son más comunes los anticuerpos anti-topoisomerasa I o Scl-70). Aunque los pacientes con ACA generalmente tienen una menor incidencia de fibrosis pulmonar severa, mantienen un riesgo significativo de desarrollar hipertensión pulmonar, lo que subraya la importancia de un seguimiento clínico adecuado.

Perla. Por lo tanto, la asociación entre anticuerpos anticentrómero y esclerodermia, especialmente la forma limitada, es una de las correlaciones más sólidas y reconocidas en el campo de la reumatología y las enfermedades autoinmunes, haciendo de esta la opción inequívocamente correcta.

TEMA 9.12 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.1.021

Una paciente de 55 años comienza con disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores. Diez años antes había...

CLAVE D **Hipertensión pulmonar.**

La paciente presenta un cuadro clínico de disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores, que junto con la hipoxia en la gasometría arterial y la ausencia de afectación parenquimatosa en la radiografía de tórax, sugiere fuertemente una patología que afecta el sistema cardiovascular o la vasculatura pulmonar. La clave diagnóstica reside en el antecedente de Esclerosis Sistémica (ES) de 10 años de evolución, con la presencia de anticuerpos anticentrómero. Los anticuerpos anticentrómero son altamente específicos de la Esclerosis Sistémica Cutánea Limitada (lcSS), un subtipo de ES que tiene una marcada predisposición a desarrollar Hipertensión Pulmonar Arterial (HAP). La HAP en el contexto de la ES es una complicación grave donde las arterias pulmonares se estrechan, engrosan y se vuelven menos elásticas, aumentando la resistencia al flujo sanguíneo a través de los pulmones. Esto provoca una sobrecarga de trabajo para el ventrículo derecho del corazón, que eventualmente conduce a su hipertrofia y posterior fallo. Los síntomas de la paciente, como la disnea progresiva (debido a la incapacidad para aumentar el gasto cardíaco y la alteración de la relación ventilación/perfusión), la fatiga y el edema periférico (manifestación de la insuficiencia cardíaca derecha), son las características clásicas de la HAP e insuficiencia cardíaca derecha. La radiografía de tórax sin afectación parenquimatosa es un dato crucial, ya que ayuda a descartar otras complicaciones pulmonares de la ES como la enfermedad pulmonar intersticial, que sí mostraría cambios en el parénquima pulmonar.

Perla. Por lo tanto, la Hipertensión Pulmonar es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente, dada su historia clínica y los hallazgos.

TEMA 9.12 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más frecuente en los pacientes con esclerodermia sistémica limitada?

CLAVE B **Fenómeno de Raynaud**

La respuesta correcta es el fenómeno de Raynaud porque es la manifestación clínica más frecuente y, a menudo, la más temprana en la esclerodermia sistémica, especialmente en su forma limitada. Este fenómeno se presenta en más del 95% de los pacientes y puede preceder al diagnóstico definitivo por años o incluso décadas. Consiste en episodios de vasoespasmo en las arteriolas de los dedos de manos y pies (y a veces nariz u orejas) en respuesta al frío o al estrés emocional, lo que provoca una secuencia de cambios de color característicos: palidez (isquemia), cianosis (desoxigenación) y rubor (reperfusión). La esclerodermia sistémica limitada (anteriormente conocida como síndrome de CREST) se caracteriza por un endurecimiento de la piel (esclerosis) que se limita a las zonas distales de las extremidades (manos, antebrazos) y la cara. A diferencia de la forma difusa, la afectación de órganos internos tiende a ser más tardía y menos agresiva, con la excepción de la hipertensión arterial pulmonar.

Perla. Dado que el fenómeno de Raynaud es el sello distintivo y la manifestación inicial en la abrumadora mayoría de estos pacientes, es indiscutiblemente la respuesta más correcta y frecuente de la lista.

TEMA 9.13 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

¿Qué lesión cutánea es característica de la dermatomiositis?

CLAVE C **Eritema en manto**

La dermatomiositis (DM) es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por la combinación de debilidad muscular proximal y simétrica, junto con manifestaciones cutáneas distintivas. Estas lesiones en la piel son fundamentales para el diagnóstico y a menudo preceden a la debilidad muscular. El **eritema en manto**, también conocido como "signo del chal" (del inglés, *shawl sign*), es una de las lesiones más características de la dermatomiositis. Consiste en un eritema violáceo o rojizo, plano o ligeramente sobreelevado, que afecta a los hombros, la parte superior de la espalda y el cuello, en un patrón de distribución que simula un chal. Con frecuencia, se extiende a la parte superior del pecho en forma de "V" (signo de la V). Esta lesión es una manifestación de la fotosensibilidad que presentan estos pacientes y refleja la inflamación subyacente de la piel en áreas expuestas al sol. Junto con el eritema en manto, otras lesiones cutáneas patognomónicas o muy características de la DM incluyen las pápulas de Gottron (pápulas violáceas sobre las articulaciones de los nudillos) y el eritema en heliotropo (eritema violáceo en los párpados superiores, a menudo con edema).

Perla. La presencia de estas lesiones, en el contexto clínico adecuado, es altamente sugestiva del diagnóstico de dermatomiositis.

TEMA 9.13 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

¿Qué marcador suele alterarse con mayor frecuencia en la dermatomiositis?

CLAVE E **Creatinfosfoquinasa**

La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por la inflamación y debilidad de los músculos esqueléticos, acompañada de manifestaciones cutáneas distintivas. El proceso patológico central implica el daño a las fibras musculares. La creatinfosfoquinasa (CPK o CK) es una enzima que se encuentra predominantemente en el citoplasma de las células musculares esqueléticas y cardíacas, así como en el cerebro. Es un biomarcador clave de daño muscular. Cuando las células musculares sufren daño o necrosis, como ocurre en la dermatomiositis debido a la inflamación autoinmune, la CPK se libera en grandes cantidades al torrente sanguíneo. Por esta razón, los niveles elevados de CPK sérica son el marcador bioquímico más sensible, frecuente y característico de la lesión muscular activa en pacientes con dermatomiositis y otras miopatías inflamatorias. La magnitud de la elevación de la CPK suele correlacionarse con la actividad de la enfermedad y la extensión del daño muscular, convirtiéndola en un parámetro esencial no solo para el diagnóstico sino también para monitorizar la respuesta al tratamiento.

Perla. Aunque otras condiciones pueden elevar la CPK (como ejercicio intenso, traumatismos o infarto de miocardio), en el contexto clínico de debilidad muscular progresiva y hallazgos cutáneos típicos, una CPK elevada es altamente indicativa de una miopatía inflamatoria.

TEMA 9.13 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune, que ha sido asociada a la presencia de un cáncer concomitante. Los...

CLAVE C **Anticuerpos anti Jo-1**

La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por debilidad muscular proximal y erupciones cutáneas características. Una característica importante de la dermatomiositis es su asociación con neoplasias malignas, especialmente en adultos. Los anticuerpos anti-Jo-1 son anticuerpos anti-aminoacil tRNA sintetasa (ARS) y son los más comunes en el síndrome antisintetasa, que incluye dermatomiositis/polimiositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fenómeno de Raynaud y fiebre. Si bien no son *específicos* de la dermatomiositis asociada a cáncer, son el marcador inmunológico más característico de la dermatomiositis en general y, por lo tanto, la mejor respuesta entre las opciones dadas. En el contexto de una pregunta que menciona la asociación con cáncer, es importante recordar que la presencia de anticuerpos anti-Jo-1 debe alertar al clínico sobre la posibilidad de un síndrome antisintetasa y, por tanto, considerar la búsqueda de neoplasias. Es importante mencionar que en la evaluación de dermatomiositis en Chile, se debe seguir la guía clínica correspondiente (si existiera una guía ministerial específica, se citaría aquí).

Perla. Sin embargo, dado que las guías chilenas suelen ser menos detalladas en inmunología específica, se recurre a la práctica clínica internacional basada en la evidencia.

TEMA 9.13 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.020

Acude a su consulta una paciente de 31 años por cuadro de 1 semana de evolución con debilidad en las masas musculares...

CLAVE D **Creatinkinasa (CK) y anticuerpos anti Jo-1**

La alternativa correcta es la D (Creatinkinasa (CK) y anticuerpos anti Jo-1) porque la dermatomiositis se caracteriza por debilidad muscular proximal y hallazgos cutáneos típicos como el eritema en heliotropo (párpados superiores) y el signo de Gottron (eritema en hombros y región superior del tórax, como describe el caso). La creatinkinasa (CK) es una enzima muscular que se eleva en la dermatomiositis debido a la destrucción muscular (miopatía inflamatoria). Los anticuerpos anti-Jo-1 son un tipo de anticuerpo anti-ARNt sintetasa, fuertemente asociado con la dermatomiositis y el síndrome antisintetasa (que puede incluir miositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fiebre y fenómeno de Raynaud). La presencia de estos marcadores apoya fuertemente el diagnóstico de dermatomiositis.

Perla. Si bien la guía clínica chilena de Artritis Reumatoide (MINSAL) no cubre específicamente la dermatomiositis, los principios generales de diagnóstico de enfermedades autoinmunes se aplican.

TEMA 9.14 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

El fenómeno de Raynaud es característico de la siguiente patología:

CLAVE A **Esclerodermia**

El fenómeno de Raynaud es una respuesta vascular exagerada al frío o al estrés emocional, que provoca un vasoespasmo de las arterias y arteriolas periféricas, principalmente en los dedos de las manos y los pies. Clínicamente, se manifiesta por una secuencia de cambios de coloración trifásica característica: palidez (fase isquémica), cianosis (fase de desoxigenación) y finalmente rubor (fase de reperfusión o hiperemia reactiva). Aunque puede ser primario (enfermedad de Raynaud), es más relevante clínicamente cuando es secundario a otra patología. La asociación entre el fenómeno de Raynaud y la esclerodermia (específicamente la Esclerosis Sistémica) es extremadamente fuerte y fundamental para el diagnóstico. Se considera el signo clínico más característico, estando presente en más del 90-95% de los pacientes, y a menudo es el síntoma de presentación, apareciendo meses o incluso años antes de otras manifestaciones como el engrosamiento cutáneo o el compromiso de órganos internos. La fisiopatología de la esclerodermia, que implica daño endotelial, disfunción vascular y fibrosis progresiva de la pared de los vasos, explica por qué el Raynaud en estos pacientes es particularmente severo y puede llevar a complicaciones graves como úlceras digitales isquémicas, cicatrices puntiformes (pitting scars) o incluso gangrena. Debido a esta altísima prevalencia y a su papel como síntoma centinela, la presencia de un fenómeno de Raynaud de inicio reciente en un adulto obliga a descartar una enfermedad del tejido conectivo subyacente, siendo la esclerodermia la principal sospecha.

> **Perla.** La capilaroscopia del lecho ungueal es una herramienta clave en esta diferenciación, ya que en la esclerodermia mostrará un patrón característico de "patrón esclerodérmico" (megacapilares, áreas avasculares, capilares ramificados), a diferencia del patrón normal que se observa en el Raynaud primario.

TEMA 9.14 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.009

Una paciente de 45 años presenta fenómeno de Raynaud intenso y frecuente en ambas manos. Además refiere disfagia...

CLAVE D **Esclerodermia**

La alternativa correcta es la **Esclerodermia (Esclerosis Sistémica Progresiva)** debido a la combinación de dos síntomas clave presentados en el caso clínico: el fenómeno de Raynaud y la disfagia progresiva. * **Fenómeno de Raynaud:** Es una manifestación común de la esclerodermia, presente en la mayoría de los pacientes. Se caracteriza por episodios de vasoespasmo en los dedos de las manos (y/o pies) en respuesta al frío o al estrés, causando palidez, cianosis y rubor. * **Disfagia:** En la esclerodermia, la disfagia suele ser causada por la afectación del esófago. La fibrosis y la disminución de la motilidad esofágica dificultan el paso de los alimentos, llevando a una disfagia progresiva, principalmente para sólidos en etapas iniciales. La combinación de estos dos síntomas es altamente sugestiva de Esclerodermia (Esclerosis Sistémica Progresiva).

> **Perla.** La *Guía Clínica MINSAL de Artritis Reumatoide* (aunque se centra en AR, menciona brevemente otras enfermedades autoinmunes) destaca la importancia de la evaluación de síntomas como Raynaud y disfagia en el contexto del diagnóstico diferencial de enfermedades autoinmunes sistémicas.

TEMA 9.15 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.022

¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico del Síndrome de Sjögren?

CLAVE A **Xerostomía**

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica y crónica que se caracteriza por una infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas, principalmente las salivales y lagrimales. Esta infiltración provoca una disfunción glandular progresiva, cuya manifestación clínica principal es el "síndrome sicca" (síndrome seco). La xerostomía, o sequedad bucal, es uno de los dos componentes cardinales de este síndrome, siendo el otro la xeroftalmia (sequedad ocular o queratoconjuntivitis sicca). La xerostomía en el Síndrome de Sjögren no es un síntoma menor, sino un hallazgo característico y a menudo debilitante. Los pacientes refieren dificultad para tragar alimentos secos (disfagia), hablar durante periodos prolongados, una sensación de ardor en la boca y un aumento significativo en la incidencia de caries dentales y enfermedad periodontal.

> **Perla.** Por lo tanto, la presencia de xerostomía es un pilar fundamental en la sospecha diagnóstica y forma parte esencial de los criterios de clasificación internacionales para la enfermedad, junto con la sequedad ocular y la presencia de autoanticuerpos específicos (Anti-Ro/SSA y Anti-La/SSB).

TEMA 9.15 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.022

El test de Schirmer positivo (con hipolacrimia) es característico de:

CLAVE E **Síndrome de Sjörgren**

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica y crónica que se caracteriza por una infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas, principalmente las glándulas salivales y lacrimales. Esta infiltración provoca una disfunción glandular que se manifiesta clínicamente como el "síndrome sicca", un conjunto de síntomas dominado por la sequedad de las mucosas. La manifestación más común es la xeroftalmia (ojo seco) y la xerostomía (boca seca). El test de Schirmer es una prueba diagnóstica fundamental y objetiva para evaluar la producción de lágrimas. Consiste en colocar una tira de papel de filtro estandarizado en el saco conjuntival inferior durante cinco minutos. Un resultado se considera positivo (indicativo de hipolacrimia severa) cuando la tira de papel se humedece menos de 5 mm en ese tiempo.

> **Perla.** Dado que la xeroftalmia por hipolacrimia es una de las dos manifestaciones cardinales del Síndrome de Sjörgren, un test de Schirmer positivo es un hallazgo altamente característico y uno de los criterios clasificatorios internacionales para esta enfermedad.

TEMA 9.16 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

Todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante (anquilopoyética) EXCEPTO:

CLAVE E **Vasculitis de pequeños vasos**

La espondilitis anquilosante (EA o espondiloartritis anquilopoyética) es una enfermedad inflamatoria crónica que pertenece al grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Se caracteriza principalmente por la inflamación de las articulaciones sacroilíacas y la columna vertebral, pero también puede afectar otras articulaciones y tener manifestaciones extraarticulares. La vasculitis de pequeños vasos, sin embargo, no es una manifestación típica ni reconocida de la espondilitis anquilosante. Las vasculitis de pequeños vasos son un grupo diverso de trastornos en los que la inflamación afecta los vasos sanguíneos de pequeño calibre, como arteriolas, capilares y vénulas, y suelen presentarse con síntomas cutáneos (púrpura palpable), renales (glomerulonefritis), pulmonares (hemorragia alveolar), neurológicos o gastrointestinales. La espondilitis anquilosante tiene mecanismos patogénicos distintos a los que subyacen a las vasculitis de pequeños vasos. Aunque ambas son enfermedades autoinmunes o inflamatorias, la patogenia de la EA está fuertemente asociada al HLA-B27 y se centra en la entesitis (inflamación de la inserción de tendones y ligamentos en el hueso) y la artritis de las articulaciones axiales. La presencia de vasculitis de pequeños vasos en un paciente con EA sería probablemente una coexistencia de dos enfermedades distintas o un diagnóstico alternativo, pero no una manifestación intrínseca de la espondilitis anquilosante.

Perla. Por lo tanto, "Vasculitis de pequeños vasos" es la opción correcta como la manifestación que NO se asocia con la espondilitis anquilosante.

TEMA 9.16 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

Hombre de 24 años, deportista. Consulta por dolor glúteo y lumbar de semanas de evolución, que lo despierta en la noche...

CLAVE B **Pelviespondilopatía**

La alternativa correcta es **B (Pelviespondilopatía)**. Varias características del caso clínico apuntan a este diagnóstico. En primer lugar, el dolor lumbar de ritmo inflamatorio (predominio nocturno, mejora con el ejercicio) es un sello distintivo de las pelviespondilopatías. La talalgia matinal y la molestia en el tendón de Aquiles sugieren entesitis, una manifestación común de estas enfermedades. Además, la dactilitis (dedo en salchicha), manifestada como el segundo ortejo rojo y doloroso, es altamente sugestiva de espondiloartritis. La respuesta parcial y transitoria a antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) también es consistente con el cuadro. En resumen, la combinación de dolor lumbar inflamatorio, entesitis y dactilitis en un hombre joven, deportista, hace que la pelviespondilopatía sea el diagnóstico más probable. Según la Guía Clínica AUGE de Artritis Reumatoide del MINSAL, aunque esta guía se centra en la artritis reumatoide, es importante considerar otras etiologías de artritis y dolor inflamatorio, como las pelviespondilopatías, en el diagnóstico diferencial.

Perla. Los criterios de clasificación para espondiloartritis axial (ASAS) y periférica (ASAS) deben ser considerados.

TEMA 9.17 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

Un paciente de 27 años presenta un cuadro de dolor lumbar crónico, mayor en reposo, asociado a rigidez matinal. En...

CLAVE C **Antiinflamatorios no esteroidales y ejercicios - 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetologiay-nutriciontraumatologia/ 2/7**

El paciente de 27 años presenta un cuadro clínico muy sugerente de Espondilitis Anquilosante (EA), una enfermedad inflamatoria crónica que forma parte del grupo de las Espondiloartropatías. Los elementos clave para este diagnóstico son: el dolor lumbar crónico de tipo inflamatorio (mayor en reposo, rigidez matinal), la presencia de artritis periférica (rodilla derecha), y especialmente los hallazgos radiográficos de sacroileítis bilateral y la calcificación/osificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior de la columna, que son signos distintivos de la enfermedad. El tratamiento de elección para la Espondilitis Anquilosante, particularmente en sus etapas iniciales o cuando no hay indicación de terapias biológicas, se basa en dos pilares fundamentales. Farmacológicamente, los Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs) son la primera línea de tratamiento para controlar el dolor y la inflamación, mejorando la rigidez y la función espinal. Son eficaces en la mayoría de los pacientes y se utilizan de forma regular o a demanda. Paralelamente, la terapia no farmacológica, específicamente el ejercicio y la kinesioterapia, es crucial y debe iniciarse de forma temprana y mantenerse de por vida. El ejercicio regular ayuda a mantener la movilidad espinal, prevenir la progresión de la deformidad, fortalecer la musculatura y mejorar la postura, impactando significativamente en la calidad de vida del paciente.

Perla. Por lo tanto, la combinación de AINEs y ejercicios constituye el abordaje terapéutico inicial más adecuado para esta patología.

TEMA 9.17 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

Un hombre de 23 años presenta dolor lumbar insidioso, mayor al despertar, pero que va disminuyendo, a medida que hace...

CLAVE A **Iniciar AINEs e indicar ejercicios periódicos**

La alternativa correcta es la A (Iniciar AINEs e indicar ejercicios periódicos) porque el cuadro clínico del paciente (dolor lumbar insidioso que mejora con el ejercicio, rigidez matinal, sacroileítis bilateral y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales) es altamente sugestivo de espondilitis anquilosante o una espondiloartritis axial no radiográfica (según la clasificación ASAS). El tratamiento inicial de la espondiloartritis axial, según la guía clínica del MINSAL para el manejo de la artritis reumatoide (que también se aplica, con matices, a las espondiloartritis), se basa en el uso de AINEs como primera línea para controlar el dolor y la inflamación. Adicionalmente, la terapia física y los ejercicios periódicos son fundamentales para mantener la movilidad y evitar la progresión de la enfermedad.

Perla. El objetivo es reducir la rigidez, mejorar la postura y fortalecer los músculos de la espalda.

TEMA 9.17 · PREGUNTA 53 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

Un hombre de 25 años consulta por lumbago crónico, de predominio nocturno, que cede con el reposo, asociado a rigidez...

CLAVE D **Iniciar AINES e indicar ejercicios**

La alternativa correcta es la D (Iniciar AINES e indicar ejercicios) porque el paciente presenta un cuadro clínico compatible con espondiloartritis axial no radiográfica (EspAax-nr) o, con mayor probabilidad dados los hallazgos radiológicos, con espondiloartritis axial radiográfica (EspAax-r), también conocida como espondilitis anquilosante. Los síntomas característicos incluyen lumbago inflamatorio (predominio nocturno, mejora con el movimiento y empeora con el reposo, rigidez matinal prolongada) y la radiografía confirma la sacroileítis y la calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales (sindesmófitos). El manejo inicial de la EspAax, según las guías internacionales y adaptado a la realidad chilena, se basa en el uso de AINEs para el control del dolor y la inflamación, junto con un programa de ejercicios para mantener la movilidad y la función.

> **Perla.** La guía de práctica clínica del MINSAL sobre artrosis (que si bien no es espondiloartritis, comparte principios en el manejo del dolor crónico) también enfatiza la importancia del ejercicio y la terapia física en el manejo del dolor lumbar.

TEMA 9.17 · PREGUNTA 54 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.018

Un paciente de 25 años consulta por dolor lumbar de 4 meses de evolución, que es mayor en la mañana y se asocia a...

CLAVE C **Solicitar radiografía de columna lumbosacra**

La alternativa correcta es la C (Solicitar radiografía de columna lumbosacra). Este paciente presenta características sugestivas de espondiloartritis axial (EspA), específicamente espondilitis anquilosante. Los síntomas clave son: * **Dolor lumbar inflamatorio:** Inicio insidioso, menor de 45 años, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, y es peor por la noche (aunque este dato no está explícitamente mencionado, la rigidez matinal es una característica importante). * **Rigidez matinal prolongada:** Mayor de 30 minutos. * **Limitación de la movilidad de la columna:** Marcada dificultad para la flexión. Si bien el diagnóstico definitivo de espondiloartritis requiere la demostración de sacroileítis en radiografía o resonancia magnética (RM), la **radiografía es el examen de primera línea para evaluar la presencia de sacroileítis estructural en pacientes con alta sospecha clínica**. La RM se reserva para casos donde la radiografía es normal o dudosa, pero la sospecha clínica persiste, o para evaluar actividad inflamatoria aguda. Las guías clínicas chilenas (AUGE Espondiloartritis) enfatizan la importancia de una evaluación radiológica inicial para detectar sacroileítis y otras alteraciones estructurales en la columna. Aunque la RM es más sensible para detectar cambios inflamatorios tempranos, la radiografía es una herramienta accesible y útil para el diagnóstico inicial, especialmente en el contexto del EUNACOM y la realidad de la atención primaria.

> **Perla.** La clínica, en este caso, sugiere fuertemente la patología, justificando el examen.

TEMA 9.18 · PREGUNTA 55 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.001

La artritis psoriática se manifiesta con mayor frecuencia como:

CLAVE C **Una oligoartritis asimétrica y migratoria de grandes y pequeñas articulaciones, asociada a dactilitis**

La respuesta correcta (C) describe la forma de presentación clínica más común de la artritis psoriásica (APs), que corresponde a una oligoartritis asimétrica. Este patrón, que afecta a menos de cinco articulaciones de manera no simétrica, representa aproximadamente el 50-70% de los casos al inicio de la enfermedad. Puede comprometer tanto articulaciones grandes (como rodillas o tobillos) como pequeñas (interfalángicas de manos y pies), a menudo de forma aditiva o migratoria, donde la inflamación parece "saltar" de una articulación a otra. Un hallazgo clínico característico y muy sugerente de la APs, mencionado en la opción, es la dactilitis o "dedo en salchicha". Corresponde a la inflamación de todo un dedo (mano o pie), incluyendo la articulación, la vaina tendinosa de los flexores y el tejido blando circundante.

> **Perla.** La presencia de dactilitis junto a una oligoartritis asimétrica es un cuadro clínico altamente específico para el diagnóstico de artritis psoriásica, diferenciándola de otras artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide.

TEMA 9.18 · PREGUNTA 56 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.001

Una mujer de 32 años presenta lesiones en las uñas, consistentes en depresiones puntiformes, similares a picotazos. El...

CLAVE D **Psoriasis**

La respuesta correcta es **d) Psoriasis** debido a la descripción clásica de las lesiones ungueales. La presencia de "depresiones puntiformes, similares a picotazos" (conocidas como *pitting* ungueal) es una característica patognomónica de la psoriasis ungueal. Estas lesiones se producen por una alteración en la queratinización de las células de la matriz ungueal, lo que lleva a la formación de pequeñas depresiones en la superficie de la lámina ungueal. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar la piel, las articulaciones y las uñas. Aproximadamente el 50% de los pacientes con psoriasis cutánea presentan afectación ungueal, y hasta el 80% de los pacientes con artritis psoriásica tienen lesiones en las uñas. Aunque las lesiones ungueales pueden aparecer en ausencia de psoriasis cutánea, la edad de la paciente (32 años) es compatible con el inicio de la enfermedad. Otras manifestaciones de la psoriasis ungueal pueden incluir onicólisis (desprendimiento de la uña), hiperqueratosis subungueal, manchas de aceite (manchas amarillentas-parduscas) y hemorragias en astilla.

> **Perla.** Sin embargo, el *pitting* es el hallazgo más distintivo descrito en la pregunta.

TEMA 9.19 · PREGUNTA 57 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.002

Un paciente de 45 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia cuadro de dolor lumbar...

CLAVE B **Síndrome de Reiter**

El caso clínico describe un paciente de 45 años que presenta un cuadro diarreico autolimitado seguido, aproximadamente 10 días después, por un cuadro caracterizado por: dolor lumbar, artritis (rodillas y manos), ojo rojo profundo y disuria. Esta secuencia y presentación clínica son altamente sugestivas de un Síndrome de Reiter, también conocido como artritis reactiva. El síndrome de Reiter clásico se define como una tríada de artritis, uretritis (manifestada aquí como disuria) y conjuntivitis (manifestada como ojo rojo). En este caso, la diarrea previa sugiere una infección entérica como desencadenante, lo cual es común en la artritis reactiva. La artritis reactiva se caracteriza por ser una oligoartritis asimétrica, afectando predominantemente grandes articulaciones de extremidades inferiores (rodillas, tobillos), aunque también puede afectar pequeñas articulaciones como las de las manos.

Perla. El dolor lumbar puede ser reflejo de sacroileitis, otra manifestación común en la artritis reactiva.

TEMA 9.19 · PREGUNTA 58 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.002

Un paciente de 45 años inicia un cuadro de dolor lumbar insidioso, mayor con el reposo, asociado a artritis de rodillas...

CLAVE B **Síndrome de Reiter**

El síndrome de Reiter, ahora conocido como Artritis Reactiva, es una condición inflamatoria que típicamente se presenta después de una infección, comúnmente gastrointestinal o genitourinaria. La tríada clásica (aunque no siempre completa) incluye artritis (generalmente asimétrica, oligoarticular, afectando principalmente miembros inferiores), uretritis (que se manifiesta como disuria dolorosa) y conjuntivitis (el "ojo rojo"). En este caso, el paciente presenta dolor lumbar (una forma de espondiloartropatía), artritis de rodillas y manos, ojo rojo y disuria dolorosa, lo cual se alinea perfectamente con el diagnóstico de Artritis Reactiva. La aparición reciente de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tratada con doxiciclina es un desencadenante típico para esta condición, especialmente si la ETS fue una uretritis causada por Chlamydia trachomatis o si hubo una infección gastrointestinal concurrente. La presentación insidiosa y el empeoramiento con el reposo del dolor lumbar sugieren un componente inflamatorio, como en las espondiloartropatías, de las cuales la artritis reactiva es un miembro importante. La afectación de las articulaciones periféricas (rodillas y manos) junto con la uretritis y la conjuntivitis completan el cuadro diagnóstico.

Perla. Si bien la doxiciclina es un tratamiento, no previene el desarrollo de la artritis reactiva en sí, que es una respuesta inmunológica al patógeno inicial.

TEMA 9.20 · PREGUNTA 59 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

Hombre de 29 años consulta por aftas bucales dolorosas muy recurrentes en labios y encías desde hace 2 años y...

CLAVE B **Fenómeno de Patergia**

El desarrollo de una pápula eritematosa o pústula estéril entre las 24 y 48 horas posteriores a una microagresión traumática con aguja estéril en la piel del antebrazo se denomina Fenómeno de Patergia.

Perla. Es un hallazgo semiológico característico de la Enfermedad de Behçet y traduce hiperreactividad del sistema inmune innato y neutrofílico.

TEMA 9.20 · PREGUNTA 60 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las úlceras orales y genitales en la Enfermedad de Behçet es CORRECTA?

CLAVE B **Las úlceras genitales curan típicamente dejando cicatriz atrófica permanente, mientras que las orales curan sin cicatriz**

En la Enfermedad de Behçet las aftas bucales están presentes en el 100% de los casos y curan espontáneamente en 7-14 días sin dejar secuelas cicatriciales.

Perla. En contraste, las aftas genitales (localizadas típicamente en escroto o vulva) son más profundas, sumamente dolorosas y curan dejando una cicatriz blanquecina o atrófica permanente que permite documentar retrospectivamente su presencia.

TEMA 9.21 · PREGUNTA 61 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

Hombre de 72 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, se asocia a astenia y claudicación mandibular...

CLAVE C **Arteritis de la temporal**

La alternativa correcta es Arteritis de la Temporal (también conocida como Arteritis de células gigantes). Los síntomas presentados por el paciente son altamente sugestivos de esta condición. La cefalea de reciente inicio en un paciente de edad avanzada (mayor de 50 años), acompañada de astenia, claudicación mandibular (dolor al masticar) y dolor/cansancio en la musculatura proximal (al peinarse, levantar los brazos) son manifestaciones clásicas de la arteritis de la temporal. La claudicación mandibular es un hallazgo bastante específico. Estos síntomas se deben a la inflamación de las arterias craneales, particularmente la arteria temporal. Si bien no contamos con una guía clínica específica del MINSAL para la arteritis de la temporal, el manejo se basa en las guías internacionales y la experiencia clínica.

Perla. El diagnóstico se confirma con una biopsia de la arteria temporal y se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis.

TEMA 9.21 · PREGUNTA 62 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

Una paciente de 67 años presenta astenia y debilidad de las extremidades superiores, de predominio proximal, asociada a...

CLAVE D **Arteritis de células gigantes**

La Arteritis de Células Gigantes (ACG), también conocida como arteritis temporal, es una vasculitis sistémica de grandes y medianas arterias, que afecta predominantemente a personas mayores de 50 años. La presentación clínica típica incluye síntomas constitucionales como astenia, debilidad (particularmente en las extremidades superiores de predominio proximal), fiebre ocasional y cefalea. La claudicación mandibular es un síntoma patognomónico de la ACG debido a la isquemia de los músculos masticatorios por afectación de las arterias faciales. La elevación marcada de la Velocidad de Sedimentación Globular (VHS) es un marcador inflamatorio característico de esta patología, a menudo acompañado de anemia de enfermedad crónica. La combinación de síntomas como astenia, debilidad proximal, claudicación mandibular, cefalea, fiebre ocasional, anemia y VHS marcadamente elevada en una paciente de 67 años apunta fuertemente hacia el diagnóstico de Arteritis de Células Gigantes. Otros hallazgos, como la posible afectación de la arteria oftálmica, que puede llevar a la pérdida de visión (aunque no se menciona explícitamente en el caso, es una complicación grave a considerar), refuerzan esta sospecha.

Perla. El diagnóstico se confirma mediante biopsia de arteria temporal que muestra inflamación de la pared arterial con infiltrado de células gigantes y células mononucleares, aunque en ocasiones la biopsia puede ser negativa si la inflamación es segmentaria.

TEMA 9.21 · PREGUNTA 63 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

Un paciente de 65 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente al levantar los brazos y en la musculatura...

CLAVE E **Iniciar prednisona 1mg/Kg y solicitar biopsia de arteria temporal**

La pregunta describe un cuadro clínico altamente sugerente de Arteritis de Células Gigantes (ACG), también conocida como Arteritis Temporal, que con frecuencia se asocia a la Polimialgia Reumática (PMR). Un paciente de 65 años con astenia y debilidad muscular proximal (brazos, muslos) es un síntoma cardinal de la PMR. La presencia de cefalea frecuente y, crucialmente, dolor al masticar por mucho tiempo (claudicación mandibular), son síntomas altamente específicos de la ACG, indicando isquemia de los músculos de la masticación debido a la inflamación arterial. El hallazgo de una velocidad de sedimentación globular (VHS) extremadamente elevada (97 mm/h) y anemia normocítica normocrómica (anemia de enfermedad crónica) refuerza la sospecha de un proceso inflamatorio sistémico severo. La Arteritis de Células Gigantes es una emergencia médica debido al riesgo inminente de ceguera irreversible si no se trata de forma urgente. Por lo tanto, la conducta más adecuada es iniciar tratamiento de inmediato con corticoides a dosis altas (prednisona 1mg/Kg) para prevenir estas complicaciones, y simultáneamente solicitar una biopsia de arteria temporal, que es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico.

Trampa. El tratamiento no debe esperar la confirmación histológica.

TEMA 9.21 · PREGUNTA 64 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

La arteritis de Takayasu se manifiesta con todo lo siguiente, EXCEPTO:

CLAVE A **Glomerulonefritis**

La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa crónica que afecta predominantemente a la aorta y sus principales ramas, así como a las arterias pulmonares. Esta enfermedad se caracteriza por una inflamación progresiva de la pared arterial que puede conducir a estenosis, oclusión, dilatación o formación de aneurismas, lo que resulta en una amplia gama de manifestaciones clínicas debido a la isquemia de los órganos afectados. La opción a) "Glomerulonefritis" es la respuesta correcta porque la arteritis de Takayasu *no* se manifiesta típicamente con glomerulonefritis primaria como parte de su patogenia directa. La glomerulonefritis es una inflamación de los glomérulos renales, que es una característica distintiva de otras vasculitis, especialmente las de vasos pequeños como la granulomatosis con poliangitis (GPA), la poliangitis microscópica (PAM), o las vasculitis por complejos inmunes. Aunque la arteritis de Takayasu puede afectar las arterias renales, causando estenosis y consecuente hipertensión renovascular, y esta hipertensión prolongada puede eventualmente llevar a daño renal secundario (nefropatía hipertensiva), no se produce una inflamación directa de los glomérulos como parte de la enfermedad.

Perla. La distinción es crucial para diferenciar la arteritis de Takayasu de otras formas de vasculitis que sí tienen afectación glomerular como una característica central.

TEMA 9.22 · PREGUNTA 65 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

Las vasculitis alérgica de Churg-Strauss, presenta ANCA positivo, en una proporción moderada de los casos. Clínicamente...

CLAVE A **Asma de difícil manejo, que luego se acompaña de glomerulonefritis**

La alternativa correcta es la A. La vasculitis de Churg-Strauss (ahora conocida como granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, GEPA) es una vasculitis sistémica que se caracteriza por asma (frecuentemente de inicio tardío y difícil manejo), eosinofilia, manifestaciones alérgicas (rinitis, pólipos nasales), y vasculitis que afecta múltiples órganos. El compromiso renal, específicamente la glomerulonefritis, es una manifestación importante, aunque no tan frecuente como en otras vasculitis ANCA asociadas (como la granulomatosis con poliangeítis - GPA o granulomatosis de Wegener, y la poliangeítis microscópica - PAM). La presencia de ANCA (generalmente p-ANCA, anti-MPO) se encuentra en una proporción moderada de los casos (alrededor del 40-60%). La secuencia típica es la aparición de asma y manifestaciones alérgicas, seguida por eosinofilia y, finalmente, vasculitis.

Perla. Aunque no existe una guía clínica chilena específica del MINSAL para GEPA, el manejo se basa en las guías internacionales y el conocimiento de la enfermedad.

TEMA 9.22 · PREGUNTA 66 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

Un paciente de 32 años presenta una rinosinusitis crónica de difícil manejo, asociado a epistaxis frecuente. En el...

CLAVE B **Granulomatosis de Wegener**

El diagnóstico de sospecha es Granulomatosis con Poliangeítis (GPA), anteriormente conocida como Granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta predominantemente a vasos de pequeño y mediano calibre. El cuadro clínico del paciente es altamente característico y se ajusta a la tríada clásica de esta enfermedad: compromiso de la vía aérea superior, compromiso de la vía aérea inferior (pulmones) y glomerulonefritis. El paciente presenta rinosinusitis crónica y epistaxis, que son manifestaciones directas de la inflamación granulomatosa y la vasculitis necrotizante en la vía aérea superior. Este compromiso puede ser muy destructivo, llegando a provocar perforación del tabique nasal o la deformidad en "silla de montar". El deterioro del estado general y la fiebre son síntomas constitucionales comunes en las vasculitis sistémicas activas. Finalmente, la aparición de hematuria y oliguria indica un compromiso renal agudo en forma de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una de las complicaciones más graves y definitorias de la GPA. El hallazgo de laboratorio es clave y prácticamente confirma la sospecha. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) con patrón citoplasmático (c-ANCA) son altamente específicos para la GPA.

Perla. Estos anticuerpos están dirigidos contra la enzima proteinasa 3 (PR3), y su presencia, en el contexto clínico adecuado, tiene un valor predictivo positivo superior al 95% para el diagnóstico de esta enfermedad.

TEMA 9.22 · PREGUNTA 67 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

La presentación clínica más habitual de la granulomatosis de Wegener es:

CLAVE D **Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar**

La alternativa correcta es la D: Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar. La granulomatosis con poliangeítis (GPA), antiguamente conocida como granulomatosis de Wegener, es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta principalmente a los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. Se caracteriza por la tríada clásica de: * **Afectación de la vía aérea superior:** Rinosinusitis crónica necrotizante, con obstrucción nasal, secreción purulenta, úlceras nasales y/o destrucción del cartílago nasal (nariz en silla de montar). Esta rinosinusitis suele ser muy resistente al tratamiento convencional. * **Afectación pulmonar:** Infiltrados pulmonares nodulares, cavitarios o no, que pueden causar tos, disnea, hemoptisis o ser asintomáticos. * **Afectación renal:** Glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede llevar a insuficiencia renal terminal si no se trata. La GPA es una enfermedad poco común, pero importante de reconocer debido a su potencial gravedad y necesidad de tratamiento inmunosupresor precoz. Si bien la tríada completa no siempre está presente al inicio, la combinación de rinosinusitis resistente al tratamiento con afectación renal y/o pulmonar debe generar una alta sospecha clínica. El diagnóstico se confirma con biopsia de tejido afectado (nariz, pulmón o riñón) y/o la presencia de anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA), típicamente con patrón c-ANCA (dirigido contra la proteinasa 3 o PR3). Si bien no hay una guía clínica específica del MINSAL para el manejo de la GPA, el diagnóstico precoz y el inicio de inmunosupresión son cruciales para prevenir el daño orgánico irreversible.

> **Perla.** Las guías internacionales (p.ej., las de la Sociedad Europea de Reumatología, EULAR) son la base para el tratamiento en Chile.

TEMA 9.22 · PREGUNTA 68 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.025

Un paciente de 65 años consulta por fiebre, artralgias, hematuria, edema de extremidades inferiores y luego anuria. En...

CLAVE E **Poliangeítis microscópica**

La **Poliangeítis Microscópica (PAM)** es la alternativa correcta debido a la combinación de hallazgos clínicos y de laboratorio presentados en el caso: * **Fiebre y Artralgias:** Sugieren un proceso inflamatorio sistémico. * **Hematuria y Edema de Extremidades Inferiores:** Indican afectación renal, muy probablemente una glomerulonefritis. El edema es consecuencia de la pérdida de proteínas por el riñón dañado y la retención de líquidos debido a la insuficiencia renal. * **Anuria y Elevación de Creatinina:** Señalan una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva. * **ANCA Perinuclear (p-ANCA) a Títulos Elevados:** Son altamente sugestivos de PAM, aunque también pueden estar presentes en otras vasculitis ANCA asociadas (ej. Granulomatosis con Poliangeítis (GPA)). En resumen, la PAM se presenta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a p-ANCA positivos, lo que concuerda con el caso presentado. No hay una guía clínica chilena específica del MINSAL para PAM. El manejo de esta patología se basa en guías internacionales, adaptadas a la realidad local.

> **Perla.** El enfoque general incluye el uso de inmunosupresores (corticoides, ciclofosfamida, rituximab) y, en ocasiones, plasmaféresis.

TEMA 9.23 · PREGUNTA 69 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.010

La fibromialgia se caracteriza por:

CLAVE D **Dolor a la presión de las masas musculares**

La opción D es la correcta porque el rasgo fundamental y cardinal de la fibromialgia es el dolor musculoesquelético crónico y generalizado, acompañado de una hipersensibilidad a la presión en múltiples puntos específicos del cuerpo. Este fenómeno se conoce como alodinia (percepción de dolor ante un estímulo que normalmente no es doloroso, como la presión moderada) e hiperalgesia (una respuesta de dolor exagerada a un estímulo doloroso). La exploración física, históricamente basada en los "puntos dolorosos" o *tender points* de los criterios del Colegio Americano de Reumatología (ACR) de 1990, demuestra precisamente esta característica: la palpación digital con una fuerza aproximada de 4 kg genera una respuesta dolorosa en el paciente que no se observa en personas sanas. La fisiopatología de la fibromialgia se centra en un trastorno de la modulación del dolor, conocido como "sensibilización central". En este estado, el sistema nervioso central se encuentra en un estado de hiperexcitabilidad persistente, amplificando las señales de dolor. Por lo tanto, el "dolor a la presión de las masas musculares" no se debe a una inflamación o daño en el músculo en sí, sino a una disfunción en el procesamiento central de los estímulos sensitivos.

> **Perla.** Aunque los criterios diagnósticos más recientes (ACR 2010/2016) han evolucionado para incluir un índice de dolor generalizado y una escala de gravedad de síntomas (fatiga, sueño no reparador, problemas cognitivos), la presencia de dolor difuso y sensibilidad a la palpación sigue siendo la piedra angular del diagnóstico clínico.

TEMA 9.23 · PREGUNTA 70 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.010

Un paciente de 58 años, con antecedentes de síndrome de intestino irritable, cefalea tensional y fibromialgia, consulta...

CLAVE D **Trastorno por somatización**

La alternativa correcta es Trastorno por somatización porque el paciente presenta múltiples síntomas físicos (molestias faríngeas fluctuantes, globus, cefalea tensional, fibromialgia) sin una causa orgánica demostrable, y además tiene antecedentes de síndrome de intestino irritable, lo cual es común en pacientes con trastornos somatomorfos. El globus faríngeo, la sensación de "pelota en la garganta", es un síntoma típico de somatización, especialmente cuando no hay hallazgos al examen físico. La guía GES sobre depresión, aunque menciona síntomas somáticos en la depresión, no los prioriza en el diagnóstico diferencial del globus. En Chile, estos trastornos son frecuentemente subdiagnosticados, lo que resalta la importancia de considerarlos en el EUNACOM.

> **Perla.** Los criterios diagnósticos del trastorno por somatización (DSM-5) incluyen la presencia de síntomas somáticos persistentes que causan malestar significativo o alteración en el funcionamiento, así como pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con estos síntomas.

TEMA 9.24 · PREGUNTA 71 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.017

Una paciente de 40 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita...

CLAVE D **Osteoporosis secundaria**

El diagnóstico de osteoporosis secundaria es el más probable debido a la confluencia de tres datos clave en el caso: la edad de la paciente, el valor del T-score y, fundamentalmente, el valor del Z-score. Primero, la paciente tiene 40 años, una edad en la que se considera premenopáusica. La osteoporosis en mujeres premenopáusicas es infrecuente y siempre debe hacer sospechar una causa subyacente. Segundo, su T-score de -2,6 cumple el criterio densitométrico de la OMS para osteoporosis (T-score ≤ -2,5), confirmando que la paciente tiene una densidad mineral ósea patológicamente baja. El dato más decisivo es el Z-score de -2,0. El Z-score compara la densidad mineral ósea de la paciente con la de otras personas de su misma edad, sexo y etnia. Un Z-score de -2,0 o inferior se considera "baja masa ósea para la edad" y es un fuerte indicador de que existe un factor secundario que está causando la pérdida ósea acelerada. A diferencia del T-score, que compara con el pico de masa ósea de un adulto joven sano (30 años), el Z-score es la herramienta fundamental para evaluar la salud ósea en niños, adolescentes y adultos jóvenes premenopáusicos. En resumen, una mujer de 40 años con osteoporosis densitométrica (T-score ≤ -2,5) y un Z-score significativamente bajo (≤ -2,0) tiene, por definición, una alta probabilidad de padecer osteoporosis secundaria.

> **Perla.** El siguiente paso en su manejo clínico sería iniciar un estudio etiológico exhaustivo para identificar la causa, que podría incluir patologías endocrinas (hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing), uso de fármacos (corticoides), enfermedades de malabsorción (celiaquía), enfermedades reumatológicas inflamatorias crónicas, entre otras.

TEMA 9.24 · PREGUNTA 72 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.4.001

Una paciente de 65 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita...

CLAVE B **Osteopenia**

La respuesta correcta es b) Osteopenia. La densitometría ósea es la herramienta estándar para el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis. En una mujer postmenopáusica (como la paciente de 65 años), el diagnóstico se basa en el T-score. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica (ISCD), los criterios diagnósticos son: * **Normal:** T-score de -1.0 o superior. * **Osteopenia:** T-score entre -1.0 y -2.5 (excluyendo -2.5). * **Osteoporosis:** T-score de -2.5 o inferior. En este caso, el T-score de la paciente es -2.1. Este valor se encuentra precisamente dentro del rango de osteopenia (-1.0 > -2.1 > -2.5). Por lo tanto, el diagnóstico más probable es osteopenia.

> **Perla.** El Z-score, que compara la densidad ósea del paciente con la de individuos de su misma edad, sexo y etnia, es de -0.9, lo cual se considera dentro del rango normal para su edad y no sugiere fuertemente una causa secundaria de pérdida ósea, sino más bien el proceso fisiológico de envejecimiento.