



A E

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM
PREPARACIÓN MÉDICA DE EXCELENCIA · CHILE

TOMO 18 · 1ª EDICIÓN 2026

MÓDULO 3

PEDIATRÍA GENERAL

90 Preguntas de Práctica

Neonatología

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Pediatría General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 18 · PARTE A: POR BLOQUES

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI					
2.01.1.020	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q12	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.032	Leucemias	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q1	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.035	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q13	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.1.037	Tumores sólidos	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q2	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.048	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q14	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.050	Cardiopatías congénitas frecuentes	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q3	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.072	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q8	Tomo 18 · C.7 (Pág. 18)
2.01.1.083	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q10	Tomo 18 · 18.2 (Pág. 7)
2.01.1.095	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q15	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.141	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q9	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.001	Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q11	Tomo 18 · 18.3 (Pág. 9)
2.01.2.005	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q16	Tomo 18 · C.6 (Pág. 16)
2.01.2.010	Hemorragia digestiva	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q4	Tomo 18 · C.1 (Pág. 6)
2.01.2.013	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q17	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.2.016	Meningococcemia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q5	Tomo 18 · C.21 (Pág. 46)
2.01.2.023	Shock	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q6	Tomo 18 · C.29 (Pág. 62)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.024	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q18	Tomo 18 · C.30 (Pág. 64)
2.01.2.144	SARS Cov 2 COVID 19	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q7	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
BLOQUE 2: RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS					
2.01.1.009	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q32	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.011	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q33	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.015	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q27	Tomo 18 · 18.7 (Pág. 24)
2.01.1.024	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q34	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.027	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q28	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.038	Constipación	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q19	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.062	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q35	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.076	Talla baja	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q20	Tomo 18 · C.11 (Pág. 26)
2.01.1.111	Malformaciones vasculares cutáneas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q21	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.002	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q26	Tomo 18 · 18.6 (Pág. 20)
2.01.2.003	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q29	Tomo 18 · 18.8 (Pág. 28)
2.01.2.004	Compromiso de conciencia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q22	Tomo 18 · C.5 (Pág. 14)
2.01.2.011	Hipertensión endocraneana	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q23	Tomo 18 · C.2 (Pág. 8)
2.01.2.017	Muerte súbita-ALTE, BRUE	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q24	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.2.018	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q30	Tomo 18 · C.14 (Pág. 32)
2.01.2.019	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q31	Tomo 18 · C.25 (Pág. 54)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.025	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q36	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.026	Traumatismo encéfalo- craneano	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q25	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
BLOQUE 3: INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO					
2.01.1.007	Enteroparasitosis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q37	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.008	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q47	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.023	Faringoamigdalitis	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q38	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.025	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q54	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.029	Sinusitis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q39	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.039	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q49	Tomo 18 · 18.11 (Pág. 41)
2.01.1.046	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q51	Tomo 18 · 18.12 (Pág. 45)
2.01.1.054	Soplos	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q40	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.058	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q48	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.067	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q50	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.1.073	Diabetes	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q41	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.074	Hiperplasia suprarrenal congénita	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q42	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.081	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q53	Tomo 18 · C.16 (Pág. 36)
2.01.1.108	Dermatitis del pañal y de contacto	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q43	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.006	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q52	Tomo 18 · 18.14 (Pág. 49)
2.01.2.007	Emergencia hipertensiva	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q44	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.012	Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q45	Tomo 18 · C.3 (Pág. 10)
2.01.2.020	Paro cardiorrespiratorio	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q46	Tomo 18 · C.18 (Pág. 40)
BLOQUE 4: NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS					
2.01.1.010	Hepatitis viral	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q55	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.013	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q71	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.018	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q67	Tomo 18 · 18.10 (Pág. 37)
2.01.1.026	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q68	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.030	Adenopatías	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q56	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.043	Hemorragia digestiva	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q57	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.055	Alergias	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q58	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.056	Inmunodeficiencias	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q59	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.057	Mesenquimopatías	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q60	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.093	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q72	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.116	Enterocolitis necrotizante (ECN)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q61	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.121	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q70	Tomo 18 · 18.17 (Pág. 60)
2.01.1.127	TORCH	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q62	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.128	Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q69	Tomo 18 · 18.16 (Pág. 58)
2.01.1.133	Malformaciones congénitas más frecuentes	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q63	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.008	Epistaxis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q64	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.014	Intoxicaciones	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q65	Tomo 18 · C.19 (Pág. 42)
2.01.2.021	Politraumatismos	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q66	Tomo 18 · C.27 (Pág. 58)
BLOQUE 5: NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS					
2.01.1.001	Desnutrición	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q73	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.006	Coqueluche	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q74	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.016	Mononucleosis infecciosa	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q75	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.031	Anemia ferropriva	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q76	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.036	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q87	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.042	Fibrosis quística	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q77	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.069	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q90	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.075	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q89	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)
2.01.1.088	Criptorquidia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q78	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.096	Estrabismo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q79	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.105	Alteraciones pigmentarias	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q80	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q81	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.109	Ectoparasitosis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q82	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.131	Sinequias vulvares	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q83	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.009	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q88	Tomo 18 · 18.20 (Pág. 72)
2.01.2.015	Meningitis bacteriana	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q84	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.2.022	Quemaduras	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q85	Tomo 18 · C.28 (Pág. 60)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.027	Estatus convulsivo en el niño	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q86	Tomo 18 · C.43 (Pág. 90)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.001	Desnutrición	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q73	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.006	Coqueluche	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q74	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.007	Enteroparasitosis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q37	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.008	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q47	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.009	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q32	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.010	Hepatitis viral	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q55	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.011	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q33	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.013	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q71	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.015	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q27	Tomo 18 · 18.7 (Pág. 24)
2.01.1.016	Mononucleosis infecciosa	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q75	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.018	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q67	Tomo 18 · 18.10 (Pág. 37)
2.01.1.020	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q12	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.023	Faringoamigdalitis	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q38	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.024	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q34	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.025	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q54	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.026	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q68	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.027	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q28	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.029	Sinusitis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q39	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.030	Adenopatías	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q56	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.031	Anemia ferropriva	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q76	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.032	Leucemias	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q1	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.035	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q13	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.1.036	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q87	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.037	Tumores sólidos	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q2	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.038	Constipación	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q19	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.039	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q49	Tomo 18 · 18.11 (Pág. 41)
2.01.1.042	Fibrosis quística	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q77	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.043	Hemorragia digestiva	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q57	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.046	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q51	Tomo 18 · 18.12 (Pág. 45)
2.01.1.048	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q14	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.050	Cardiopatías congénitas frecuentes	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q3	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.054	Soplos	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q40	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.055	Alergias	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q58	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.056	Inmunodeficiencias	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q59	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.057	Mesenquimopatías	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q60	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.058	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q48	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.062	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q35	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.067	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q50	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.1.069	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q90	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.072	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q8	Tomo 18 · C.7 (Pág. 18)
2.01.1.073	Diabetes	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q41	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.074	Hiperplasia suprarrenal congénita	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q42	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.075	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q89	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)
2.01.1.076	Talla baja	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q20	Tomo 18 · C.11 (Pág. 26)
2.01.1.081	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q53	Tomo 18 · C.16 (Pág. 36)
2.01.1.083	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q10	Tomo 18 · 18.2 (Pág. 7)
2.01.1.088	Criptorquidia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q78	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.093	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q72	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.095	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q15	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.096	Estrabismo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q79	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.105	Alteraciones pigmentarias	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q80	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q81	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.108	Dermatitis del pañal y de contacto	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q43	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.109	Ectoparasitosis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q82	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.111	Malformaciones vasculares cutáneas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q21	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.116	Enterocolitis necrotizante (ECN)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q61	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.121	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q70	Tomo 18 · 18.17 (Pág. 60)
2.01.1.127	TORCH	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q62	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.128	Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q69	Tomo 18 · 18.16 (Pág. 58)
2.01.1.131	Sinequias vulvares	Dx: Sospecha Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q83	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.133	Malformaciones congénitas más frecuentes	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q63	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.141	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q9	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.001	Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q11	Tomo 18 · 18.3 (Pág. 9)
2.01.2.002	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q26	Tomo 18 · 18.6 (Pág. 20)
2.01.2.003	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q29	Tomo 18 · 18.8 (Pág. 28)
2.01.2.004	Compromiso de conciencia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q22	Tomo 18 · C.5 (Pág. 14)
2.01.2.005	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	GES	Q16	Tomo 18 · C.6 (Pág. 16)
2.01.2.006	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q52	Tomo 18 · 18.14 (Pág. 49)
2.01.2.007	Emergencia hipertensiva	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q44	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.2.008	Epistaxis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q64	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)
2.01.2.009	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q88	Tomo 18 · 18.20 (Pág. 72)
2.01.2.010	Hemorragia digestiva	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q4	Tomo 18 · C.1 (Pág. 6)
2.01.2.011	Hipertensión endocraneana	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q23	Tomo 18 · C.2 (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.012	Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q45	Tomo 18 · C.3 (Pág. 10)
2.01.2.013	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q17	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.2.014	Intoxicaciones	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q65	Tomo 18 · C.19 (Pág. 42)
2.01.2.015	Meningitis bacteriana	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q84	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.2.016	Meningococemia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q5	Tomo 18 · C.21 (Pág. 46)
2.01.2.017	Muerte súbita-ALTE, BRUE	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q24	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.2.018	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopia	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q30	Tomo 18 · C.14 (Pág. 32)
2.01.2.019	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopia	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q31	Tomo 18 · C.25 (Pág. 54)
2.01.2.020	Paro cardiorrespiratorio	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q46	Tomo 18 · C.18 (Pág. 40)
2.01.2.021	Politraumatismos	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q66	Tomo 18 · C.27 (Pág. 58)
2.01.2.022	Quemaduras	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q85	Tomo 18 · C.28 (Pág. 60)
2.01.2.023	Shock	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q6	Tomo 18 · C.29 (Pág. 62)
2.01.2.024	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q18	Tomo 18 · C.30 (Pág. 64)
2.01.2.025	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q36	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.026	Traumatismo encéfalo- craneano	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q25	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.027	Estatus convulsivo en el niño	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q86	Tomo 18 · C.43 (Pág. 90)
2.01.2.144	SARS Cov 2 COVID 19	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q7	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS**BLOQUE 1 CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI****PREGUNTA 1****2.01.1.032**

1. Una niña de 9 meses de edad, estuvo alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en que inició la alimentación sólida. Sin embargo, la madre, vegana estricta, consideró que la niña no toleraba bien los alimentos, por lo que la mantuvo con leche materna exclusiva hasta ahora. Evoluciona con detención del crecimiento, dificultades para sentarse y hablar, además de estar más hipoactiva de lo normal. Al examen físico, se aprecia pálida y letárgica, con signos vitales normales y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar ni abdominal. Se solicitan exámenes, que muestran hemoglobina: 7,9 g/dl, hematocrito: 24%, blancos: 3.700 por mm³, plaquetas: 45.000 por mm³, VHS: 12 mm/h, TSH: 1,2 UI/L, creatininemia: 0,5 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Déficit de vitamina B12
- B) Anemia hemolítica
- C) Enfermedad celíaca
- D) Leucemia aguda
- E) Fibrosis quística

PREGUNTA 2**2.01.1.037**

2. Un niño de 7 años presenta orinas oscuras, desde hace 5 días, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa una masa abdominal en el flanco derecho de 10 cm de diámetro. Se solicitan exámenes entre los que destacan bilirrubina: 1,0 mg/dl, creatinina: 1,1 mg/dl, sedimento de orina con 30-40 glóbulos rojos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Riñón poliquístico
- B) Neuroblastoma
- C) Hapatoblastoma
- D) Tumor de Wilms
- E) Linfoma

PREGUNTA 3**2.01.1.050**

3. Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cardiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:

- A) Trasposición de grandes vasos
- B) Comunicación interauricular
- C) Coartación aórtica
- D) Canal auriculoventricular
- E) Comunicación interventricular

PREGUNTA 4**2.01.2.010**

4. Un lactante de 8 meses, presenta un cuadro de malestar general y vómitos alimentarios en varias oportunidades, durante las últimas horas. En el último episodio de vómitos, se agregó escasa hematemesis, por lo que acude al servicio de urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Esofagitis péptica
- B) Esofagitis erosiva
- C) Síndrome de Mallory Weiss
- D) Gastritis erosiva
- E) Gastritis por *Helicobacter pylori*

PREGUNTA 5**2.01.2.016**

5. [URGENCIA: Meningococcemia · 2.01.2.016] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Meningococcemia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 6**2.01.2.023**

6. Una lactante de 2 meses de edad presenta un cuadro de fiebre hasta 39°C, de 24 horas de evolución. Es llevada al servicio de urgencias debido a que ha evolucionado con deterioro del estado general y tendencia a la letargia. Al examen físico se observa soporosa, con un llenado capilar de 5 segundos, deshidratada y taquicárdica a 158 latidos por minuto. La temperatura es de 39,3°C. Además de administrar oxígeno, ¿cuál es la primera medida a tomar?

- A) Administrar solución fisiológica por vía endovenosa
- B) Administrar bicarbonato por vía endovenosa
- C) Administrar adrenalina por vía endovenosa
- D) Administrar hidrocortisona por vía endovenosa
- E) Administrar glucosa por vía endovenosa

PREGUNTA 7

2.01.2.144

7. Un adolescente de 14 años presenta un cuadro de fiebre de 39°C, desde hace 3 días, asociado a malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso, por lo que acude al servicio de urgencia. Al examen físico está con compromiso hemodinámico, con frecuencia cardíaca de 120x' y PA: 90/50 mmHg, por lo que es manejado con suero fisiológico endovenoso, con respuesta parcial. Tiene antecedente de PCR positiva para Covid-19 hace 30 días y se solicitan nuevos exámenes, que muestran hematocrito: 33%, blancos: 14.000 por mm³, plaquetas: 80.000 por mm³, VHS: 76 mmHg, PCR: 15,5 mg/L, dímero D: 670 ng/ml y troponinas elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Sepsis bacteriana
- B) Síndrome inflamatorio multisistémico
- C) Insuficiencia suprarrenal aguda
- D) Reinfeción por Covid-19
- E) Enfermedad de Kawasaki

PREGUNTA 8

2.01.1.072

8. Un niño de 8 años, es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos con volumen de 4cc. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. El diagnóstico más probable es:

- A) Pubertad precoz central
- B) Pubertad precoz periférica
- C) Pubertad temprana
- D) Hiperplasia suprarrenal
- E) Adrenarquia temprana

PREGUNTA 9

2.01.1.141

9. Un niño de 5 años, al que le molestan los ruidos fuertes, presenta vocabulario muy escaso. Caminó a los 24 meses y dijo su primera palabra a los 36 meses. No pareciera tener interés en relacionarse con los demás niños de su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Trastorno por déficit atencional
- B) Trastorno generalizado del desarrollo
- C) Parálisis cerebral
- D) Distrofia muscular
- E) Trastorno del lenguaje

PREGUNTA 10

2.01.1.083

10. Un niño de 18 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, a las 32 semanas de edad gestacional, camina en punta de pies. Logró la marcha independiente hace un mes. Al examen físico, tiene aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, con hiperreflexia y presencia de signo de Babinski. El diagnóstico más probable es:

- A) Estereotipia de la marcha
- B) Retraso del desarrollo psicomotor
- C) Diplejia espástica
- D) Polineuropatía
- E) Distrofia muscular

PREGUNTA 11

2.01.2.001

11. Un lactante de 12 meses acude al vacunatorio del CESFAM con su calendario al día hasta los 6 meses. ¿Cuáles son las vacunas que le corresponde recibir según el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile?

- A) Hexavalente, Hepatitis A y Varicela
- B) Tresvérica, Meningocócica ACWY y Neumocócica conjugada
- C) Tresvérica, Varicela y Hexavalente
- D) Neumocócica conjugada, Hepatitis A y Polio oral
- E) Meningocócica ACWY, Varicela y Hepatitis B monovalente

PREGUNTA 12

2.01.1.020

12. Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociada a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad respiratoria, taquipnea, retracción subcostal y subcostal. Al examen físico tiene FR: 70x', uso de musculatura accesoria, sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas e intensas, más cianosis perioral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A) Virus respiratorio sincicial
- B) Bordetella pertusis
- C) Virus influenza
- D) Virus parainfluenza
- E) Neumococo

PREGUNTA 13

2.01.1.035

13. Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al examen físico tiene petequias generalizadas y equimosis, principalmente en las extremidades inferiores. Su hemograma muestra hemoglobina 12 g/dl, hematocrito: 36%, plaquetas: 10.000 por mm³ y glóbulos blancos: 5.600 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Leucemia aguda
- B) Púrpura trombocitopénica inmune
- C) Púrpura trombocitopénica trombótica
- D) Hemofilia
- E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 14

2.01.1.048

14. Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- A) Anticuerpos IgA antiendomio
- B) Cuantificación de inmunoglobulinas
- C) Test del sudor
- D) Colonoscopia
- E) 17 – OH – progesterona

PREGUNTA 15

2.01.1.095

15. Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral, desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A) *Neisseria meningitidis*
- B) *Neisseria gonorrhoeae*
- C) *Streptococcus pneumoniae*
- D) *Streptococcus agalactiae*
- E) *Chlamydia trachomatis*

PREGUNTA 16

2.01.2.005

16. Niño de 7 años con asma en crisis, frecuencia respiratoria 40/min, SatO_2 91%, sibilancias bilaterales, sin uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A) Salbutamol inhalado + ipratropio + corticoides sistémicos + oxígeno
- B) Adrenalina subcutánea
- C) Intubación orotraqueal inmediata
- D) Antibióticos EV
- E) Solo oxígeno y observar

PREGUNTA 17

2.01.2.013

17. Niño de 3 años hospitalizado por neumonía. SatO_2 88% con oxígeno por naricera a 3 L/min. FR 50/min, uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo ventilatorio?

- A) Ventilación no invasiva (VNI/CPAP) o cambio a mascarilla de alto flujo
- B) Intubación orotraqueal inmediata
- C) Aumentar flujo de oxígeno por naricera a 6 L/min
- D) Adrenalina nebulizada
- E) Alta con oxígeno domiciliario

PREGUNTA 18

2.01.2.024

18. Un lactante de 15 meses de edad presenta una convulsión tónico-clónica de 1 minuto de duración, autolimitada, mientras cursaba con fiebre de 39 grados Celsius. Al examen está bien perfundido, algo pálido, consciente, con pulso y presión arterial normales, sin signos focales, ni signos meníngeos. El resto de su exploración, no presenta hallazgos de importancia. Además de bajar la temperatura del niño ¿cuál es la conducta más adecuada?

- A) Realizar punción lumbar
- B) Iniciar diazepam
- C) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- D) Iniciar ácido valproico
- E) Mantener en observación por 4 horas

BLOQUE 2 RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

PREGUNTA 19

2.01.1.038

19. Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días sin defecar y cuando lo hace, sus deposiciones son duras y caprinas. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Niño sano
- B) Atresia duodenal
- C) Constipación funcional
- D) Megacolon aganglionótico
- E) Malrotación intestinal

PREGUNTA 20

2.01.1.076

20. Un paciente de 11 años, es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha estado creciendo en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico se aprecia desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. Se solicita radiografía de carpo que muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. El diagnóstico más probable es:

- A) Talla baja familiar
- B) Hipogonadismo
- C) Acondroplasia
- D) Enanismo
- E) Retardo constitucional del crecimiento

PREGUNTA 21

2.01.1.111

21. Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente la visión. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

- A) Administrar propanolol
- B) Administrar betametasona
- C) Realizar embolización
- D) Derivar a cirujano plástico
- E) Observar evolución

PREGUNTA 22

2.01.2.004

22. [URGENCIA: Compromiso de conciencia · 2.01.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Compromiso de conciencia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 23

2.01.2.011

23. Un niño de 4 años presenta cefalea de 1 mes de evolución, que es mayor en las mañanas y se asocia a diplopía. Además, ha presentado náuseas y vómitos alimentarios en el último tiempo, que han aumentado su frecuencia. ¿Cuál es la causa más probable de su cefalea?

- A) Migraña de presentación atípica
- B) Cefalea tensional
- C) Jaqueca clásica
- D) Vicio de refracción
- E) Hipertensión endocraneana

PREGUNTA 24

2.01.2.017

24. Un niño de 24 meses es traído por episodios repetidos de llanto, apnea, seguidos de hipotonía y compromiso de conciencia, que luego se recuperan espontáneamente. En algunos de estos episodios, además, presentó movimientos clónicos, de corta duración. Los episodios se han presentado en relación a situaciones en las que ha llorado o se ha enojado mucho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Solicitar TAC de cerebro y electroencefalograma
- B) Iniciar ácido valproico
- C) Solicitar electroencefalograma
- D) Iniciar carbamazepina
- E) Indicar manejo conductual

PREGUNTA 25

2.01.2.026

25. [URGENCIA: Traumatismo encéfalo- craneano · 2.01.2.026] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo encéfalo- craneano. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 26

2.01.2.002

26. Un niño de 18 meses consulta en el Servicio de Urgencia por disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio en reposo de 4 horas de evolución. Se cataloga como laringitis aguda grado II. Se administra dexametasona oral y una nebulización con adrenalina racémica, logrando una rápida mejoría sintomática con desaparición del estridor a los 20 minutos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al destino del paciente?

- A) Alta inmediata a domicilio con amoxicilina oral
- B) Mantener en observación en el Servicio de Urgencia por un mínimo de 2 horas para descartar efecto rebote
- C) Hospitalización inmediata en UCI pediátrica
- D) Indicar nueva nebulización con adrenalina cada 30 minutos de forma reglada
- E) Alta con indicación de frío ambiental e inhalador de salbutamol

PREGUNTA 27

2.01.1.015

27. Un niño de 8 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega una conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 glóbulos rojos por mm³, 20 glóbulos blancos por mm³, con 90% de mononucleares, proteínas: 80 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- A) Oseltamivir
- B) Vancomicina
- C) Ceftriaxona
- D) Aciclovir
- E) Ampicilina

PREGUNTA 28

2.01.1.027

28. Un niño de 3 años presenta un cuadro de congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura 37,3 grados celsius, faringe congestiva, rosada y nariz con rinorrea abundante. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A) Solución salina intranasal
- B) Amoxicilina oral
- C) Corticoides nasales
- D) Diclofenaco oral
- E) Azitromicina oral

PREGUNTA 29

2.01.2.003

29. Una niña de dos años presenta un episodio brusco de tos intensa, asociado a cianosis y disnea, que remite luego de pocos minutos. Persiste luego con tos en salvas y expectoración. Al examen pulmonar se auscultan roncus y sibilancias, mayores en el lado derecho. La conducta más adecuada es:

- A) Solicitar PCR para Bordetella pertussis
- B) Solicitar TAC de tórax
- C) Solicitar broncoscopia
- D) Realizar laringoscopia rígida
- E) Iniciar antibióticos

PREGUNTA 30

2.01.2.018

30. [URGENCIA: Obstrucción de vía aérea superior · 2.01.2.018] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Obstrucción de vía aérea superior. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 31

2.01.2.019

31. Usted evalúa a un recién nacido de término, con antecedente de síndrome de Down, quien, desde el segundo día de vida, presenta vómitos abundantes y explosivos, que impiden su adecuada alimentación. Al examen físico se observa irritable, con distensión abdominal, por lo que se solicita radiografía abdominal que muestra imagen de doble burbuja, siendo de mayor tamaño la burbuja del lado izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Atresia yeyunal
- B) Atresia duodenal
- C) Enterocolitis necrotizante
- D) Estenosis hipertrófica del píloro
- E) Malrotación intestinal

PREGUNTA 32

2.01.1.009

32. Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema eritematoso generalizado, que se muestra en la siguiente imagen: Foto 6 (<http://www.childnuture.com/article/XXXXXXX>) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Eritema infeccioso
- B) Exantema súbito
- C) Reacción alérgica a medicamentos
- D) Enfermedad de Kawasaki
- E) Síndrome de piel escaldada

PREGUNTA 33

2.01.1.011

33. Un lactante de 3 meses presenta aparición de lesiones en el abdomen y muslo, que se muestran a continuación: Foto 16 (<https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=447&ionid=40442582>). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A) Virus herpes simplex
- B) Streptococcus pyogenes
- C) Virus varicela zóster
- D) Virus pox
- E) Staphylococcus aureus

PREGUNTA 34

2.01.1.024

34. Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC:100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior

- A) Mycoplasma pneumoniae
- B) Chlamydia pneumoniae
- C) Streptococcus pneumoniae
- D) Haemophilus influenzae
- E) Staphylococcus aureus

PREGUNTA 35

2.01.1.062

35. Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor, por lo que se realiza un examen de orina por sondeo, que da salida a un líquido con abundante bacterias, 50 piocitos por campo y escasa hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A) Ciprofloxacino
- B) Cefadroxilo
- C) Nitrofurantoína
- D) Gentamicina
- E) Cefoperazona

PREGUNTA 36

2.01.2.025

36. [URGENCIA: Testículo agudo · 2.01.2.025] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Testículo agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 37

2.01.1.007

37. Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal, desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- A) Parasitológico de deposiciones
- B) Test de Graham
- C) Hemograma
- D) Prueba de reacción cutánea a la escoriación (Prick test)
- E) Recuento de inmunoglobulina E específica

PREGUNTA 38

2.01.1.023

38. Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y secreción conjuntival bilateral. Al examen físico, además, se observa faringe eritematosa exudado amigdalino bilateral y se palpan adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:

- A) Staphylococcus aureus
- B) Streptococcus pyogenes
- C) Metaneumovirus
- D) Adenovirus
- E) Virus de Epstein Baar

PREGUNTA 39

2.01.1.029

39. Un niño de 6 años, con antecedente de obstrucción nasal y rinorreas frecuentes, mayor en primavera, presenta un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por rinorrea mucosa abundante, tos y picos subfebriles hasta 37,8 °C. Inicialmente tendió a mejorar, sin embargo, desde hace 4 días se produjo un aumento en la secreción nasal, la que en ocasiones tenía mal olor, y se agregó cefalea frontal. Al examen físico está en buenas condiciones, con temperatura: 36,5 °C, FC: 90x' y FR: 15x', se observa faringe eritematosa con descarga posterior y se constata dolor a la percusión de la zona frontal. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente y escasos roncus bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Solicitar radiografía de senos paranasales
- B) Iniciar amoxicilina vía oral
- C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- D) Iniciar prednisona oral
- E) Solicitar nasofibroscopia

PREGUNTA 40

2.01.1.054

40. Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- A) Soplo inocente
- B) Ductus arterioso persistente
- C) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- D) Estenosis aórtica
- E) Coartación aórtica

PREGUNTA 41

2.01.1.073

41. Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. ¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?

- A) Suero glucosado
- B) Suero glucosalino
- C) Solución salina al 0,45%
- D) Solución salina al 0,9%
- E) Solución ringer lactato

PREGUNTA 42

2.01.1.074

42. Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na+ 132, K+ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

- A) Vancomicina
- B) Noradrenalina
- C) Hidrocortisona
- D) Vasopresina
- E) Dopamina

PREGUNTA 43

2.01.1.108

43. Lactante con eritema del pañal que no responde a óxido de zinc y muestra lesiones satélite. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A) Clotrimazol tópico
- B) Mupirocina tópica
- C) Hidrocortisona tópica 1%
- D) Óxido de zinc en mayor concentración
- E) Fluconazol oral

44. [URGENCIA: Emergencia hipertensiva · 2.01.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Emergencia hipertensiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

45. [URGENCIA: Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar · 2.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

46. [URGENCIA: Paro cardiorrespiratorio · 2.01.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorrespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

47. Pregunta 96 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un niño de 6 años, presenta odinofagia intensa, con fiebre y decaimiento. Además, aparece luego un exantema eritematoso, generalizado, que es más marcado en los pliegues inguinales y axilares. Al examen físico, está febril, con temperatura de 38.7°C, faringe eritematosa. Tiene adenopatías cervicales bilaterales, sensibles y la piel se palpa áspera al tacto. ¿Qué tipo de complicación puede desarrollar este paciente?

- A) Aneurismas coronarios
- B) Meningitis
- C) Fasceítis necrotizante
- D) Glomerulonefritis
- E) Miocarditis

48. Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y lengua en fresa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Enfermedad de Kawasaki
- B) Mononucleosis infecciosa
- C) Escarlatina
- D) Artritis idiopática juvenil
- E) Sarampión

PREGUNTA 49

2.01.1.039

49. Un niño de 18 meses, desde hace 24 horas, presenta fiebre hasta 38,7°C, asociado a episodios de vómitos alimentarios y seguido de diarrea acuosa abundante, con múltiples deposiciones. Al examen físico, se ve de buen aspecto, hidratado, tiene T°:37,2°C y frecuencia cardíaca normal. Su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible e indoloro, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se realiza examen de deposiciones con tiras reactivas, que resultan positivos para rotavirus y Clostridium difficile (Clostridioides difficile). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Probar tolerancia y rehidratación por vía oral
- B) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
- C) Iniciar metronidazol oral
- D) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- E) Iniciar vancomicina endovenosa

PREGUNTA 50

2.01.1.067

50. Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar general. Hace 4 días está con diarrea. Al examen físico se aprecia pálido, se constata el edema blando y se observan múltiples equimosis en las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 35 mg/dl, hemograma con hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000, blancos: 11.000 por mm³, frotis con esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es:

- A) Síndrome nefrótico
- B) Púrpura de Schönlein Henoch
- C) Insuficiencia renal prerrenal
- D) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- E) Síndrome hemolítico urémico

PREGUNTA 51

2.01.1.046

51. Un niño de 28 días presenta vómitos después de comer, que iniciaron hace una semana y que han aumentado en frecuencia e intensidad. La madre refiere que llora después de comer y vomitar y se objetiva que no ha incrementado bien de peso en el último tiempo, observándose algo enflaquecido. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

- A) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
- B) Ecografía abdominal
- C) Endoscopia digestiva alta con biopsia duodenal
- D) Colonoscopia con biopsia de la pared intestinal
- E) Radiografía simple toracoabdominal

PREGUNTA 52

2.01.2.006

52. Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:

- A) Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua
- B) Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición
- C) Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar
- D) Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo
- E) Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

PREGUNTA 53

2.01.1.081

53. Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Síncopes vasovagales
- B) Epilepsia mioclónica
- C) Crisis de ausencia
- D) Epilepsia focal
- E) Déficit atencional

PREGUNTA 54

2.01.1.025

54. Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad respiratoria. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, que aumenta con el llanto, asociado a retracción intercostal moderada. Su saturación de oxígeno es 94% y, al examen pulmonar se ausculta murmullo pulmonar conservado bilateral con transmisión de ruidos desde la vía aérea superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Laringitis aguda obstructiva
- B) Neumonía atípica
- C) Neumonía bilateral
- D) Asma del lactante
- E) Neumonitis viral

BLOQUE 4 NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

PREGUNTA 55

2.01.1.010

55. Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525 UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose prurito y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Hepatitis crónica
- B) Remisión completa

- C) Portación asintomática del virus
- D) Remisión parcial con recurrencias
- E) Falla hepática

PREGUNTA 56

2.01.1.030

56. Niño con adenopatías cervicales y granulomas hepatoesplénicos en la ecografía abdominal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A) Bartonella henselae
- B) Toxoplasma gondii
- C) Epstein-Barr virus
- D) Mycobacterium tuberculosis
- E) Leishmania sp.

PREGUNTA 57

2.01.1.043

57. Un lactante de 9 meses de edad presenta cuadro de irritabilidad y llanto, asociado a un episodio de deposiciones con sangre roja abundante hace 3 horas. Al examen físico, está irritable y llora desconsoladamente a la palpación abdominal. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

- A) TAC de abdomen y pelvis
- B) Colonoscopia
- C) Endoscopia digestiva alta
- D) Cintografía con tecnecio 99m
- E) Radiografía de abdomen simple

PREGUNTA 58

2.01.1.055

58. Lactante de 2 meses con diarrea, vómitos y dermatitis perioral y perianal tras introducción de fórmula láctea. Test de parche positivo para proteína de leche de vaca. ¿Cuál es el manejo?

- A) Cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o elemental
- B) Continuar fórmula habitual y agregar antihistamínico
- C) Hospitalizar para estudio endoscópico
- D) Iniciar corticoides orales
- E) Cambiar a leche de soja

PREGUNTA 59

2.01.1.056

59. Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable?

- A) Inmunodeficiencia celular (DiGeorge)
- B) Déficit de complemento
- C) Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)
- D) Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
- E) Enfermedad granulomatosa crónica

PREGUNTA 60

2.01.1.057

60. Un niño de 12 años consulta por cansancio, artralgias, dolores musculares generalizados y fiebre. Refiere que las mialgias son intensas, al punto que limitan su actividad física. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, en especial en la espalda alta y los hombros. Además, tiene eritema violáceo en los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:

- A) Artritis reumatoide juvenil
- B) Distrofia muscular
- C) Dermatomiositis
- D) Triquinosis
- E) Lupus infantil

PREGUNTA 61

2.01.1.116

61. Un recién nacido de 10 días de vida, con antecedente de haber nacido prematuro a las 27 semanas, siendo alimentado con fórmula láctea para prematuros por sonda nasogástrica, presenta un cuadro de dos días de evolución de distensión abdominal y aumento de la retención láctea observada por la sonda. Se solicita radiografía simple de abdomen, que muestra dilatación de asas intestinales, con zonas de engrosamiento de la pared intestinal y visualización de burbujas en algunos segmentos. Además de suspender la fórmula láctea y asegurar una adecuada hidratación por vía endovenosa, ¿cuál es la conducta más adecuada?

- A) Realizar resolución quirúrgica inmediata
- B) Iniciar alimentación con fórmula hidrolizada de proteínas por sonda nasointestinal
- C) Administrar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
- D) Realizar endoscopia digestiva alta
- E) Alimentar con suero glucosado por vía oral

PREGUNTA 62

2.01.1.127

62. RN con microcefalia, calcificaciones periventriculares y coriorretinitis. Madre con serología IgG positiva para CMV y IgM positiva. ¿Cuál es el agente causante de la infección congénita?

- A) Citomegalovirus (CMV)
- B) Toxoplasma gondii
- C) Virus herpes simplex tipo 2
- D) Treponema pallidum
- E) Virus de rubéola

PREGUNTA 63

2.01.1.133

63. Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardíacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Realizar cirugía de urgencia
- B) Solicitar endoscopia digestiva alta
- C) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
- D) Administrar prostaglandina
- E) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

64. [URGENCIA: Epistaxis · 2.01.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Epistaxis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

65. Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por minutos, frecuencia respiratoria de 38 por minuto y pupilas areactivas a la iluminación. ¿Qué fármacos son los más probablemente ingeridos?

- A) AINES
- B) Benzodiacepinas
- C) Salicilatos
- D) Opiáceos
- E) Antidepresivos tricíclicos

66. [URGENCIA: Politraumatismos · 2.01.2.021] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Politraumatismos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

67. Un niño de 5 años presenta fiebre desde hace 7 días, que ha respondido parcialmente al uso de ampicilinos. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 1,5 cm y en el examen abdominal se palpa esplenomegalia. Se solicita ecografía abdominal que muestra múltiples lesiones hipoeogénicas de pequeño tamaño en hígado y bazo, compatibles con microabscesos, sin pared visible. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A) Citomegalovirus
- B) Virus de Epstein-Barr
- C) Bartonella henselae
- D) Echinococcus granulosus
- E) Mycobacterium tuberculosis

68. Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopia se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. El fármaco de elección en este caso es:

- A) Ibuprofeno oral
- B) Amoxicilina oral
- C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
- D) Gentamicina tópica
- E) Claritromicina oral

69. Recién nacido pequeño para la edad gestacional (2.500 g). ¿Qué conducta tomar en relación a la alimentación?

- A) Iniciar fórmula láctea hipercalórica
- B) Instalar sonda nasogástrica para alimentación
- C) Ayuno 6 horas y luego fórmula de prematuro
- D) Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas
- E) Suero glucosado al 10% endovenoso

70. Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre era O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- B) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
- C) Ictericia fisiológica
- D) Hepatitis neonatal
- E) Ictericia por lactancia materna

PREGUNTA 71

2.01.1.013

71. Niño con fiebre de 10 días, cefalea, mialgias, diarrea y luego heces duras, hígado y bazo palpables. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar estudio?

- A) Coproparasitológico seriado
- B) Coprocultivo
- C) Serología para Epstein-Barr
- D) Hemocultivo
- E) Prueba de Widal

PREGUNTA 72

2.01.1.093

72. Un niño de 6 años consulta por dolor en el codo derecho, de dos días de evolución, asociado a impotencia funcional y fiebre de hasta 39°C. Al examen físico, se observa codo eritematoso y aumentado de volumen, con dolor intenso a la movilización activa y pasiva. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A) Staphylococcus aureus
- B) Haemophilus influenzae
- C) Streptococcus agalactiae
- D) Neisseria meningitidis
- E) Streptococcus pyogenes

BLOQUE 5 NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

PREGUNTA 73

2.01.1.001

73. Un niño de 5 años presenta bajo incremento ponderal, con talla y peso menores a -1 desviación estándar para su edad. Se observa una radiografía de mano, que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Raquitismo
- B) Displasia ósea
- C) Osteogénesis imperfecta
- D) Osteomalacia
- E) Osteoporosis

PREGUNTA 74

2.01.1.006

74. Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

- A) Amoxicicilina
- B) Azitromicina
- C) Ceftriaxona
- D) Oseltamivir
- E) Aciclovir

PREGUNTA 75

2.01.1.016

75. Un niño de 3 años, con un cuadro de fiebre alta, asociada a malestar general y odinofagia intensa. Se inició tratamiento con amoxicilina, pero a las 48 horas presenta un exantema, que se muestra más abajo. Al examen físico, se aprecia decaído, con adenopatías cervicales anteriores dolorosas y amígdalas edematosas y eritematosas, con exudado blanco en su superficie. El exantema se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

- A) Escarlatina
- B) Mononucleosis infecciosa
- C) Alergia a la penicilina
- D) Enfermedad de Kawasaki
- E) Sarampión

PREGUNTA 76

2.01.1.031

76. Un niño de 9 meses tiene palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 36%, VCM: 68 fl, glóbulos blancos: 6.500 por mm³, plaquetas: 450.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Anemia ferropriva
- B) Anemia por enfermedades crónicas
- C) Trombocitosis esencial
- D) Hemoglobinopatía
- E) Microesferocitosis familiar

PREGUNTA 77

2.01.1.042

77. Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- A) Enfermedad celiaca
- B) Enteropatía perdedora de proteínas
- C) Enfermedad de cilio inmóvil
- D) Fibrosis quística
- E) Alergia a la proteína de la leche de vaca

PREGUNTA 78

2.01.1.088

78. Recién nacido de término sin testículos palpables, pene de 2 cm. Además de solicitar ecografía, ¿cuál es la conducta más adecuada?

- A) Derivar a urología de inmediato
- B) Control en un mes
- C) Iniciar testosterona tópica
- D) Derivar a genética para cariotipo urgente
- E) Cirugía correctiva a los 3 meses

PREGUNTA 79

2.01.1.096

79. Un lactante de 1 mes de vida, acude a control. Al examen físico, presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal. Su crecimiento pondoestatural es normal, al igual que su desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Derivar a oftalmólogo
- B) Mantener los controles habituales del lactante
- C) Solicitar RMN de cerebro
- D) Realizar fondo de ojo
- E) Indicar parche ocular alternante

PREGUNTA 80

2.01.1.105

80. Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tiene otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?

- A) Hipercolesterolemia
- B) Hipertrigliceridemia
- C) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
- D) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- E) Un componente de la dieta

PREGUNTA 81

2.01.1.107

81. Una niña de 4 años presenta lesiones cutáneas recurrentes de 2 años de evolución, caracterizadas por pápulas pruriginosas que aparecen en los antebrazos y fosas cubitales, así como en las piernas, fosas poplíteas, cara y cuello. Su madre comenta que pasa por periodos de exacerbación de las lesiones y otros en que son mucho menos intensas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Dermatitis alérgica
- B) Urticaria
- C) Dermatitis atópica
- D) Escabiosis
- E) Dermatitis seborreica

PREGUNTA 82

2.01.1.109

82. Una preescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Ivermectina oral
- B) Permetrina tópica al 1%
- C) Permetrina tópica al 5%
- D) Lindano tópico
- E) No tratar, mientras no se visualicen piojos

PREGUNTA 83

2.01.1.131

83. Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- A) Realizar lavados con ácido acético
- B) Aplicar corticoides tópicos
- C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
- D) Indicar antibióticos
- E) Realizar aseo y masajes en la zona

PREGUNTA 84

2.01.2.015

84. Lactante de 3 meses con fiebre 39°C, rigidez de nuca, fontanela abombada y letargia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Hospitalizar, punción lumbar y ATB empírico EV inmediato (ampicilina + cefotaxima)
- B) ATB oral y control en 24h
- C) Solo antipiréticos y observar
- D) Solicitar TAC antes de la punción lumbar
- E) Alta con instrucciones

PREGUNTA 85

2.01.2.022

85. Usted atiende a un niño de 3 años en el servicio de urgencia, que es traído por su madre, por haber sufrido quemaduras en los dedos y en la espalda, después de haberse apoyado accidentalmente en una estufa. Al examen físico, está agitado y llorando y se observa eritema y flictenas en las zonas afectadas. ¿Cuál es la conducta inicial?

- A) Curaciones
- B) Paracetamol vía oral
- C) Ungüento antibiótico tópico
- D) Analgesia endovenosa
- E) Antibióticos endovenosos

PREGUNTA 86

2.01.2.027

86. [URGENCIA: Estatus convulsivo en el niño - 2.01.2.027] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Estatus convulsivo en el niño. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 87

2.01.1.036

87. Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se observan extremidades inferiores con equimosis en distinto grado de resolución, algunas de gran tamaño. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA alargado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Púrpura trombocitopénica inmune
- B) Hemofilia
- C) Enfermedad de von Willebrand
- D) Enfermedad de Glanzmann
- E) Púrpura trombocitopénica trombótica

PREGUNTA 88

2.01.2.009

88. Un recién nacido de 38 semanas, con peso de 4.250 g, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta temblores finos en extremidades superiores y succión débil a las 2 horas de vida. Se realiza control de glicemia venosa que informa 32 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

- A) Ofrecer mamadera de 20 mL de agua con azúcar por vía oral y reevaluar en 2 horas
- B) Administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua de glucosa a 6-8 mg/kg/min
- C) Administrar un bolo endovenoso rápido de Suero Glucosado al 50% a 5 mL/kg
- D) Administrar Hidrocortisona endovenosa a 10 mg/kg como primera línea
- E) Mantener en observación sin tratamiento, dado que a las 2 horas la glicemia de 32 mg/dL es normal

PREGUNTA 89

2.01.1.075

89. Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09 UI/L (VN: 0,7 a 5,7) y T4 libre: 2,18 ng/dl (VN: 0,9 a 2,1). La conducta más adecuada es:

- A) Suspender la levotiroxina
- B) Subir la dosis de levotiroxina
- C) Repetir la TSH en 6 semanas
- D) Disminuir la dosis de levotiroxina
- E) Solicitar cintigrafía tiroidea

PREGUNTA 90

2.01.1.069

90. Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bpalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- A) Síndrome nefrótico
- B) Glomerulonefritis aguda
- C) Insuficiencia renal crónica
- D) Síndrome hemolítico urémico
- E) Nefritis intersticial

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

**CLAVES 1 A
90****BLOQUE 1 CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI · SOLUCIONARIO OFICIAL****PREGUNTA 1 Respuesta: D Leucemias****2.01.1.032** Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 85). Evalúa el manejo clínico de Leucemias según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 2 Respuesta: D Tumores sólidos**2.01.1.037** Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La asociación de hematuria y masa obliga a descartar un tumor de Wilms o nefroblastoma, el cáncer renal más frecuente en niños (en adultos lo más frecuente es el cáncer de células renales).

PREGUNTA 3 Respuesta: A Cardiopatías congénitas frecuentes**2.01.1.050** Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.

PREGUNTA 4 Respuesta: C Hemorragia digestiva**2.01.2.010** Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un Sd. De Mallory Weiss clásico

PREGUNTA 5 Respuesta: A Meningococcemia**2.01.2.016** Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Meningococcemia" como urgencia clínica (2.01.2.016), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 6 Respuesta: A Shock**2.01.2.023** Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Manejo de Sepsis en Lactantes: En casos de sepsis en lactantes, la prioridad es la reanimación y la administración de antibióticos. Si el lactante presenta shock o signos de deshidratación, la primera medida es la hidratación intravenosa con solución salina.

PREGUNTA 7 Respuesta: B SARS Cov 2 COVID 19**2.01.2.144** Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 36). Evalúa el manejo clínico de SARS Cov 2 COVID 19 según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 8 Respuesta: A**2.01.1.072** Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar **GES****Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)**

Tiene una pubertad precoz (menos de 9 años en varones), con testículos de 4 cc, por lo que están estimulados por las gonadotropinas. Como hay elevación de gonadotropinas, es porque está activado el eje hipotálamo hipófisis, es decir, es central.

PREGUNTA 9**Respuesta: B**

2.01.1.141

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

Tiene un trastorno del espectro autista clásico, de la variante autista (Asperger, en cambio, tiene lenguaje normal). Además, afecta otras áreas del desarrollo, por lo que antes se les llamaba trastornos generalizados del desarrollo.

PREGUNTA 10**Respuesta: C**

2.01.1.083

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPPI)

La caminata en punta de pies puede tener múltiples causas, siendo normal en menores de 3 años, pero también asociándose a trastornos del espectro autista (se ` pensaría si tuviese otras estereotipias, alteraciones del lenguaje o de la interacción social) y se asocia asimismo a parálisis cerebral con espasticidad. La diplegia espástica es una variante de ello, en que se afectan las extremidades inferiores. Tiene buen pronóstico con un adecuado tratamiento multidisciplinario. La distrofia muscular suele tener un desarrollo normal, pero luego va perdiendo fuerza, especialmente en los grupos musculares grandes, que, por ejemplo, le dificulta ponerse de pie, por lo que suele hacerlo con el apoyo de las manos.

PREGUNTA 11**Respuesta: B**

2.01.2.001

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg:
Completo

GES

Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

A) Incorrecta. Hexavalente, Hepatitis A y Varicela corresponden al hito de los 18 meses. B) Correcta. En Chile, a los 12 meses de vida se administran: 1) Tresvrica (SRP: sarampión, rubéola, parotiditis), 2) Meningocócica conjugada contra serogrupos A, C, W-135 e Y, y 3) Refuerzo de Neumocócica conjugada. C) Incorrecta. La varicela y el refuerzo de hexavalente se indican a los 18 meses. D) Incorrecta. La polio oral (bOPV) ya no forma parte del calendario chileno (se usa VIP en la hexavalente). E) Incorrecta. La varicela corresponde a los 18 meses.

PREGUNTA 12**Respuesta: A**

2.01.1.020

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Completo

GES

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

Es una bronquiolitis clásica, por VRS.

PREGUNTA 13**Respuesta: B**

2.01.1.035

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Derivar

GES

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

Tiene un PTI clásico: alteración de hemostasia primaria, con trombocitopenia aislada.

PREGUNTA 14**Respuesta: A**

2.01.1.048

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg:
Derivar

GES

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

Se sospecha una enfermedad celíaca, que se estudia con anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomio, más una endoscopia digestiva alta, con biopsia duodenal.

PREGUNTA 15**Respuesta: E**

2.01.1.095

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Derivar

GES

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

Tanto gonococo como clamidia producen conjuntivitis neonatal, pero la gonorrea suele ser muy purulenta y aparecer en la primera semana de vida. La clamidia, en cambio, puede demorar más (algunas semanas), ser menos purulenta y asociarse a neumonía, similar a las neumonías atípicas.

PREGUNTA 16**Respuesta: A****Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado****2.01.2.005**Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg:
Derivar**GES**

Crisis asmática moderada: broncodilatadores β_2 (salbutamol) + anticolinérgico (ipratropio) + corticoides sistémicos (prednisona oral o hidrocortisona EV) + oxígeno para $\text{SatO}_2 > 94\%$.

PREGUNTA 17**Respuesta: A****Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado****2.01.2.013**Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Derivar**GES**

Niño con neumonía grave que no responde a oxigenoterapia convencional + signos de trabajo respiratorio aumentado: siguiente escalón = VNI (CPAP o BPAP) antes de intubación, según protocolo actual.

PREGUNTA 18**Respuesta: E****Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado****2.01.2.024**Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Derivar**GES**

Parece una convulsión febril benigna. No tiene signos que hagan sospechar meningitis y por ser la primera convulsión, tampoco es necesario iniciar naticonvulsivantes.

BLOQUE 2**RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS · SOLUCIONARIO OFICIAL****PREGUNTA 19****Respuesta: C****Constipación****2.01.1.038**

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene una constipación funcional clásica, probablemente complicada con un fecaloma (por la incontinencia fecal). Es la causa más frecuente de constipación en niños y se mejora con laxantes y formación de hábitos de defecación.

PREGUNTA 20**Respuesta: E****Talla baja****2.01.1.076**

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un retraso constitucional del crecimiento. Edad ósea 2 años menor a la cronológica. Llama la atención los testículos pequeños (aún no inicia la pubertad, pero eso es acorde a su edad biológica = ósea), sin embargo el Klinefelter, no tiene talla baja. El Turner, de las niñas, sí tiene talla baja.

PREGUNTA 21**Respuesta: A****Malformaciones vasculares cutáneas****2.01.1.111**Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg:
Derivar

El propranolol es el tratamiento de primera línea de los hemangiomas infantiles. La cirugía solo se hace en casos que no responden y sabiendo que dejará cicatriz con certeza.

PREGUNTA 22**Respuesta: A****Compromiso de conciencia****2.01.2.004**

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Compromiso de conciencia" como urgencia clínica (2.01.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 23**Respuesta: E****Hipertensión endocraneana****2.01.2.011**

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

No queda claro la causa precisa de sus síntomas (tumor cerebral, meningitis tuberculosa, pseudotumor cerebral), pero sí tiene un síndrome de HTEC clásico, con 1. la cefalea de predominio matinal, 2. las náuseas y vómitos y 3. solo le falta el edema de papila. La migraña y la cefalea tensional suelen aumentar en las tardes y no en las mañanas.

PREGUNTA 24 **Respuesta: E** Muerte súbita-ALTE, BRUE 2.01.2.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene apneas emotivas, que son ALTE de bajo riesgo. Orienta a eso la edad y la clara correlación con las emociones. Se observan y se educa. Los ALTE de alto riesgo, en cambio, son los que tienen menos de 6 meses, antecedentes de muerte súbita en la familia, alteraciones en el examen neurológico o cardíaco o la necesidad de reanimación.

PREGUNTA 25 **Respuesta: A** Traumatismo encéfalo- craneano 2.01.2.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo encéfalo- craneano" como urgencia clínica (2.01.2.026), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

2.01.2.002

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg:
Completo

GES

A) Incorrecta. El alta inmediata tras adrenalina es peligrosa por el riesgo de reaparición del edema al cesar la vasoconstricción alfa-1. B) Correcta. La adrenalina nebulizada produce vasoconstricción mucosa rápida pero transitoria (duración de 90 a 120 minutos). Existe el riesgo demostrado de 'efecto rebote', en el cual el estridor y la disnea reaparecen con igual o mayor intensidad. Por norma de seguridad pediátrica, todo niño que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación en Urgencia por un mínimo de 2 horas antes de definir el alta ambulatoria. C) Incorrecta. Si responde favorablemente y no tiene otros factores de riesgo, no requiere UCI. D) Incorrecta. La adrenalina se usa según necesidad clínica, no de forma profiláctica reglada cada 30 minutos. E) Incorrecta. El salbutamol no actúa en la vía aérea superior subglótica.

PREGUNTA 27 **Respuesta: D**

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

2.01.1.015

Dx: Específico ·
Tx: Inicial ·
Seg: Derivar

GES

Tiene una meningitis herpética, que se trata con aciclovir EV. Tanto la clínica, como el LCR viral (predominio MN y glucosa normal) hemorrágico la sugieren.

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

2.01.1.027

Dx: Específico ·
Tx: Completo ·
Seg: Completo

GES

Es un resfriado común. No aparecía paracetamol SOS, así que la respuesta más adecuada es el SF intranasal.

PREGUNTA 29 **Respuesta: C**

Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

2.01.2.003

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Tiene un cuerpo extraño bronquial clásico, probablemente en el bronquio derecho. Si bien el primer examen suele ser la radiografía, el manejo y extracción se realiza con broncoscopia flexible o rígida, según disponibilidad. La TAC no suele aportar mucho más que la radiografía y, sea como sea, la clínica tan categórica obliga a la broncoscopia.

PREGUNTA 30 **Respuesta: A**

Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

2.01.2.018

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Obstrucción de vía aérea superior" como urgencia clínica (2.01.2.018), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

2.01.2.019

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

Atresia Duodenal: La imagen de "doble burbuja" y el cuadro clínico apuntan a una atresia duodenal. La enterocolitis necrotizante sí puede tener vómitos, pero se manifestaría con antecedentes de prematurez o asfixia, heces con sangre y neumatosis intestinal en la radiografía. La estenosis hipertrófica del píloro, aunque presenta síntomas similares, suele aparecer más tarde, entre las 2 y 6 semanas de vida.

PREGUNTA 32 **Respuesta: B**

2.01.1.009

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Completo

GES

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

Es un exantema súbito clásico, por virus herpes 6.

PREGUNTA 33 **Respuesta: E**

2.01.1.011

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg:
Completo

GES

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

Es un impétigo buloso, causado por S. aureus.

PREGUNTA 34 **Respuesta: C**

2.01.1.024

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg:
Completo

GES

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

Es una NAC neumocócica clásica.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

2.01.1.062

Dx: Específico ·
Tx: Inicial · Seg:
Derivar

GES

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera o segunda generación. Tampoco se usan las quinolonas, por lo mismo.

PREGUNTA 36 **Respuesta: A**

2.01.2.025

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Testículo agudo" como urgencia clínica (2.01.2.025), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

BLOQUE 3 INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO · SOLUCIONARIO OFICIAL**PREGUNTA 37** **Respuesta: B** Enteroparasitosis

2.01.1.007

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Parece una oxiuriasis, que se diagnostica con el test de Graham.

PREGUNTA 38 **Respuesta: D** Faringoamigdalitis

2.01.1.023

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La clásica amigdalitis exudativa en el menor de 3 años es por ADV. Suele tener fiebre alta y, en este caso, además, viene con la clásica fiebre faringoconjuntival por ADV. Si no hubiese tenido afectación ocular igual sería por ADV, así que a aprender este caso clínico.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B** Sinusitis **2.01.1.029** Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tiene una sinusitis aguda, con alta sospecha de infección bacteriana (por empeoramiento y Gempo de evolución). El diagnóstico es clínico y se trata con amoxicilina oral, como antibiótico de primera línea.

PREGUNTA 40 **Respuesta: A** Soplos **2.01.1.054** Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cuadro clásico

PREGUNTA 41 **Respuesta: D** Diabetes **2.01.1.073** Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La cetoacidosis se hidrata con suero fisiológico. Sin embargo la opción del Ringer Lactato es una respuesta totalmente correcta. Pero suero NaCl al 0,9% será la respuesta correcta.

PREGUNTA 42 **Respuesta: C** Hiperplasia suprarrenal congénita **2.01.1.074** Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una hiperplasia suprarrenal congénita, con una crisis adrenal (se ve por la hiponatremia, hiperkalemia y shock que no responde). Además está descompensado, probablemente por una infección.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A** **2.01.1.108** Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Dermatitis del pañal y de contacto

Clotrimazol tópico

PREGUNTA 44 **Respuesta: A** Emergencia hipertensiva **2.01.2.007** Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Emergencia hipertensiva" como urgencia clínica (2.01.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 45 **Respuesta: A** **2.01.2.012** Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar" como urgencia clínica (2.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 46 **Respuesta: A** Paro cardiorrespiratorio **2.01.2.020** Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorrespiratorio" como urgencia clínica (2.01.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 47 **Respuesta: D** **2.01.1.008** Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo **GES**

Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

La escarlatina se complica con GNAPE.

PREGUNTA 48**Respuesta: A****Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)**

2.01.1.058

Dx: Específico ·
Tx: Inicial ·
Seg: Derivar

GES

Kawasaki: fiebre ≥ 5 días + ≥ 4 criterios (exantema polimorfo, adenopatía cervical, conjuntivitis no exudativa, labios/lengua enrojecidos, edema palmoplantar). Requiere ecocardio y tratamiento con IGIV + aspirina para prevenir aneurismas coronarios.

PREGUNTA 49**Respuesta: A****Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico**

2.01.1.039

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Completo

GES

Manejo de Diarrea Aguda con Portación Asintomática de Clostridium difficile: Un niño con diarrea aguda por rotavirus y portación asintomática de Clostridium difficile no requiere tratamiento para C. difficile. La portación asintomática en niños es frecuente y no suele complicarse. El metronidazol no ha demostrado mayor utilidad en estos casos. El manejo de este caso se centra en la diarrea por rotavirus con tolerancia oral y rehidratación oral.

PREGUNTA 50**Respuesta: E****Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico**

2.01.1.067

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Derivar

GES

Es un SHU clásico: falla renal, anemia hemolítica y plaquetopenia. Suele estar precedido por diarrea en el 70% de los casos. La IRA prerrenal no tiene edema.

PREGUNTA 51**Respuesta: B****Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrofica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal**

2.01.1.046

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg:
Completo

GES

Tiene una estenosis hipertrofica del píloro, que se estudia con ecografía abdominal.

PREGUNTA 52**Respuesta: D****Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico**

2.01.2.006

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg: Completo

GES

Tiene estado hemodinámico límite, pero el sopor obliga a hidratar por vía endovenosa, con plan C

PREGUNTA 53**Respuesta: C****Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.1.081

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Completo

GES

Cuadro clásico

PREGUNTA 54**Respuesta: A****Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona**

2.01.1.025

Dx: Específico · Tx:
Completo · Seg:
Completo

GES

Laringitis Aguda Obstructiva: El caso describe una laringitis aguda obstructiva clásica, con un cuadro gripal seguido de síntomas obstructivos, incluyendo estridor laringeo.

PREGUNTA 55 Respuesta: D Hepatitis viral

2.01.1.010

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una hepatitis A recurrente (una de las formas de presentación de la hepatitis A).

PREGUNTA 56 Respuesta: A Adenopatías

2.01.1.030

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Bartonella henselae

PREGUNTA 57 Respuesta: D Hemorragia digestiva

2.01.1.043

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

El cuadro clínico sugiere una intususcepción intestinal, cuyo examen de elección es la ecografía abdominal. Sin embargo, no está entre las opciones, por lo que lo más probable es que quien redactó la pregunta quería preguntar un divertículo de Meckel complicado. El divertículo de Meckel se estudia con cintigrafía con tecnecio 99m, también llamada "cintigrafía de Meckel".

PREGUNTA 58 Respuesta: A Alergias

2.01.1.055

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Alergia a proteína de leche de vaca (APLV): tratamiento = fórmula extensamente hidrolizada (FEH). Si se usa leche materna, la madre elimina lácteos. Soja no recomendada bajo 6 meses (cross-reactividad).

PREGUNTA 59 Respuesta: C Inmunodeficiencias

2.01.1.056

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)

PREGUNTA 60 Respuesta: C Mesenquimopatías

2.01.1.057

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una dermatomiositis infantil clásica, con el rash heliotropo y el rash en manto. Se debe descartar un cáncer (suele ser paraneoplásica).

PREGUNTA 61 Respuesta: C Enterocolitis necrotizante (ECN)

2.01.1.116

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una enterocolitis necrotizante, confirmada por la radiografía, que muestra neumatosis intestinal. Su tratamiento consiste en régimen cero, descompresión gástrica mediante sonda, hidratación y alimentación parenteral, antibióticos de amplio espectro y analgesia, más manejo de las complicaciones. La cirugía se reserva a los casos complicados (perforación, estenosis) y a los muy graves que no responden al tratamiento médico. El suero oral y la alimentación por sonda enteral están contraindicados.

PREGUNTA 62 Respuesta: A TORCH

2.01.1.127

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

CMV congénito es la infección congénita viral más frecuente. Calcificaciones periventriculares (vs parenquimatosas en toxoplasma) + microcefalia + coriorretinitis = TORCH por CMV.

PREGUNTA 63 Respuesta: E

2.01.1.133

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Malformaciones congénitas más frecuentes

Es una hernia diafragmática. Produce hipoplasia pulmonar. Se debe intubar, conectar al ventilador de alta frecuencia y probablemente a la membrana de oxigenación extracorpórea y la cirugía se postpone, para cuando esté estable, con los pulmones más desarrollados. Eso es pregunta para especialistas, no para médico general.

PREGUNTA 64 Respuesta: A Epistaxis

2.01.2.008

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Epistaxis" como urgencia clínica (2.01.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 65 **Respuesta: A** Intoxicaciones 2.01.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una intoxicación por tricíclicos por el compromiso de conciencia, taquicardia y pupilas arreactivas (en midriasis). No puede ser benzodiazepinas ni opiáceos, porque no tenía disminución de la frecuencia respiratoria. AINEs y salicilatos no afectan las pupilas.

PREGUNTA 66 **Respuesta: A** Politraumatismos 2.01.2.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Politraumatismos" como urgencia clínica (2.01.2.021), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 67 **Respuesta: C** Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) 2.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar **GES**

Tiene una enfermedad por arañazo de gato clásica, con la fiebre, adenopatia y compromiso hepatoesplénico. Eso sí, la presentación más frecuente es con fiebre más una o más adenopatías en relación a una lesión cutánea. La IgM anti-Bartonella puede ser útil para confirmar el diagnóstico. El tratamiento de elección son los macrólidos (azitromicina).

PREGUNTA 68 **Respuesta: B** Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR 2.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo **GES**

Tiene una OMA: amoxi sola. En la OMAR también es amoxi sola. Solo si no responde en 72 horas, se agrega ácido clavulánico.

PREGUNTA 69 **Respuesta: D** Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal 2.01.1.128 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar **GES**

Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas

PREGUNTA 70 **Respuesta: A** Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia 2.01.1.121 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar **GES**

Es una ictericia precoz (menor a 24 horas), indirecta, por lo que lo más probable es que sea hemolítica. Además, por los grupos sanguíneos, solo puede ser por incompatibilidad de grupo clásico (madre O e hijo A o B).

PREGUNTA 71 **Respuesta: D** Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo 2.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo **GES**

Hemocultivo

PREGUNTA 72 **Respuesta: A** Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo 2.01.1.093 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar **GES**

Tiene una artritis séptica de codo (monoartritis aguda en niño). La etiología más frecuente es el estafilococo áureo en todas las edades, ya que el gonococo ha disminuido mucho (eso sí, aún debe tenerse como opción en pacientes con conductas sexuales de riesgo o con clínica de gonorrea).

PREGUNTA 73 Respuesta: A Desnutrición

2.01.1.001

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Raquitismo: La radiografía muestra un retraso severo en la calcificación de los huesos del carpo y otros huesos de la mano, lo que es compatible con raquitismo causado por deficiencia de vitamina D.

PREGUNTA 74 Respuesta: B Coqueluche

2.01.1.006

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.

PREGUNTA 75 Respuesta: B Mononucleosis infecciosa

2.01.1.016

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es una mononucleosis clásica, dado que tiene el síndrome mononucleósico (odinofagia, fiebre y adenopatías), más el clásico rash morbiliforme (similar al sarampión), que aparece luego de iniciar aminopenicilinas (ampicilina o amoxicilina). También es clásico el exudado amigdalino blanco y adherente sobre la superficie amigdalina. La escarlatina tendría clínica de amigdalitis bacteriana (ya explicada en otra pregunta) y un exantema en piel de gallina, con especial afectación de pliegues cubitales y que respeta el triángulo de Filatov. La enfermedad de Kawasaki no suele tener odinofagia ni exudado amigdalino, sino fiebre, adenopatías, ojo rojo, boca roja, rash de cualquier tipo (salvo vesicular o pustular) y compromiso de pies y manos.

PREGUNTA 76 Respuesta: A Anemia ferropriva

2.01.1.031

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una anemia ferropénica clásica, tanto por la edad, como por la microcitosis.

PREGUNTA 77 Respuesta: D Fibrosis quística

2.01.1.042

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una fibrosis quística. Las demás opciones producen solo síntomas digestivos (A, B y E) o solo neumonías (C).

PREGUNTA 78 Respuesta: B Criptorquidia

2.01.1.088

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Control en un mes

PREGUNTA 79 Respuesta: B Estrabismo

2.01.1.096

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 115). Evalúa el manejo clínico de Estrabismo según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 80 Respuesta: E Alteraciones pigmentarias

2.01.1.105

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por ingesta de betacaroteno

PREGUNTA 81 Respuesta: C Dermatitis atópica

2.01.1.107

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una dermatitis atópica clásica: lesiones crónicas recidivantes, en zonas flexoras, más mejillas.

PREGUNTA 82 Respuesta: B Ectoparasitosis

2.01.1.109

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tanto los piojos, como las liendres, son diagnósticas de pediculosis (a menos que las liendres estén muy alejadas del cuero cabelludo, ya que serían antiguas). La pediculosis se trata con permetrina al 1%.

PREGUNTA 83 Respuesta: E Sinequias vulvares**2.01.1.131**

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una pregunta difícil, ya que en distintas partes se manejan de manera diferente. Sin embargo, la mayor evidencia dice que el aseo es lo más importante para que se resuelva. Los masajes pueden ayudar a que se desprenda antes.

PREGUNTA 84 Respuesta: A Meningitis bacteriana**2.01.2.015**

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Meningitis bacteriana en lactante <3 meses: hospitalización urgente + punción lumbar + ATB empírico inmediato (ampicilina para cubrir *Listeria* + cefotaxima para *S. agalactiae*, *E. coli*, *S. pneumoniae*).

PREGUNTA 85 Respuesta: D Quemaduras**2.01.2.022**

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 21). Evalúa el manejo clínico de Quemaduras según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 86 Respuesta: A Estatus convulsivo en el niño**2.01.2.027**

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Estatus convulsivo en el niño" como urgencia clínica (2.01.2.027), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 87 Respuesta: B**2.01.1.036**

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

GES**Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato**

El alargamiento del TTPA sugiere fuertemente hemofilia. Que tenga una clínica tan florida, en un niño (sexo masculino) pequeño, la sugiere también. Suele evolucionar a hemartrosis y hematomas musculares y de otras partes del cuerpo. PTI y PTT tienen plaquetopenia. EvW y Glanzmann tienen alteración de la hemostasia primaria, con petequias y clínicas generalmente más leves que la hemofilia, aunque sí pueden tener una clínica similar, en las formas más graves. Eso sí, el TTPA suele estar normal, salvo en algunas variantes de la EvW en que sí se puede alargar.

PREGUNTA 88 Respuesta: B**2.01.2.009**

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES**Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato**

A) Incorrecta. En un paciente sintomático, la vía oral no asegura corrección rápida ni previene el daño cerebral. B) Correcta. La hipoglicemia neonatal sintomática (temblores, glicemia < 45 mg/dL) es una urgencia neurológica. El tratamiento protocolizado consiste en administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% (SG10%) a dosis de 2 mL/kg (200 mg/kg de glucosa) infundido lentamente en 5 minutos, seguido inmediatamente de una infusión continua de glucosa para mantener una carga (VIG) de 6 a 8 mg/kg/minuto, reevaluando la glicemia plasmática en 30 minutos. C) Incorrecta. El SG al 50% o al 20% en bolo está formalmente contraindicado por riesgo de lesión endotelial, hiperosmolaridad cerebral y secreción masiva de insulina que produce hipoglicemia de rebote grave. D) Incorrecta. Los corticoides se reservan para hiperinsulinismo refractario extremo. E) Incorrecta. 32 mg/dL con temblores es francamente patológico.

PREGUNTA 89 Respuesta: D**2.01.1.075**

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES**Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo**

Tiene la TSH menor a lo normal, por lo que está "sobretreatado" y se debe disminuir la dosis de levoT4. La habitual es 1,6 ug/Kg, así que probablemente estaba muy alta la dosis de 25 mg para un lactante de 3 meses (6 Kg aprox).

PREGUNTA 90

Respuesta: A

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.1.069

Dx: Especifico · Tx:
Inicial · Seg:
Derivar

GES

Es un síndrome nefrótico clásico (orina espumosa, edema y proteinuria), aunque le faltan los exámenes confirmatorios (proteinuria cuantitativa o índice proteinuria / creatininuria, albumnemia y perfil lipídico). No hay hematuria dismórfica, así que no puede ser una glomerulonefritis. No tiene insuficiencia renal, así que no puede ser ninguna de las otras opciones.