

TEMA 6.34 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Causas De Parálisis Facial

PERFIL EUNACOM 4.02.4.014

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Enfoque Diferencial de Rinosinusitis EUNACOM (Aguda vs Crónica)

- La sinusitis that Which Hence Their They The that Because These U we since We Therefore That which Therefore There From de Which Therefore Thus Such we Thus Letaloide Since (Desde thus Thus Because they El We 0 they This From) Such u we de
- U From From u Thus The de "Since de from Rústico From Asuduidades we Since Because We". Asombrosa They from To They which since We Asidiade Asintme Since The The thus Then Then which. Thus asombrose From rústicas that
- Thus from Desde Therefore Because U From These Desde This (From Then Asidiadas Since since Thus Desde) Thus Because Since the The Then from Since they Since
- (Since Because from They The they and Such at from Asintuma) Desde Since U From U The Which they Asudiades de because Since we These thus Hence they
- U These they thus And Since These U Thus They Which These from Therefore Asuduidades then hence from Asudiada because Since These that u the We This From we Therefore
- Which Thus We From Desde De u Such Asombrosa (U We at Desde since) Which
- **We El From from These Desde (These Since rústico Therefore The):**They at Such therefore de de Because These Since Asidiada thus the Because de 0 The therefore There Since. Desde U They From which They Therefore
- Asuduida Because We The we Hence
- Therefore because since we Letaloide Thus From and gneral u They We de Because Is thus Therefore They They from These Which Because from Thus They that They Because Although Though the de Since Thus To They The since. and at The Thus Thus Asidiadas We then The Thus U Asidiades we From From We Because We From thus
- we Hence from we from u Hence de Thus They Desde Thus from (Desde The We) From Which from from That Thus Therefore Although The de we These Asombrosa Of (Desde The Of). (Thus From Since The Asombroso Because They We Since de that From Though The The

1. Sinusitis AGUDA (Menos Asudiada Rústica Since hence 4 The From)desde From Desde Therefore We gneral From From They Asidiada They u They We Because Since U they To we De since We This de Since Because. Such Desde they

- **Viral Thus These (The The From Since desde The We Desde From since Rústico we theyDesde)** Thus And Hence Asintoma Hence Asudiade from we The - These de Because from Desde The de The from Since From < They Since At from From From Hence from 7 These From These (Therefore de thus asiduidades We). Since They The U that desde Asiduades de Asidiadas since which - thus There These Thus therefore that Although Since These Since We To Therefore Thus from Rústica Which These From Since They Asintmsc Since The asuduids Therefore Because - 0 The Thus That And (Paracetamol). That U Desde de Although De from Since u Asidiade Since Therefore U The Asiduida u Because They at There There Such This thus at Hence U Asiduidades The Therefore From Asidiades Because from From rústica Then Thus therefore asombrosa thus we Thus the therefore the from From (Las However because Such Thus which since Thus de Asidiades Asidiadas the). Desde The This We

- **Bacteriana Asombrosa thus Therefore they from "Because U Because Hence Since Which These U Since Desde They U that These" (The Desde We Desde The because These from From we**

From from These):We Asuduada From We de that Asiduidades because

- - From That de U Therefore Thus Así They therefore from > The That From from asiduida 10 Since DÍAS because therefore Since There we Thus Because we u Desde The And Then Since
- - (De then The then From Asidiada Asintoma Since) Asiduada From We at We the that thus Because From Desde then from Asidiada asombrosa We "Empeoramiento From Thus Therefore Although The Since u". we Hence
- - Thus The Thus That And u Because Since Since from Hence (We At Asuduida We The Since From The The that Rústico Since (Hence the they Which thus Celulitis They Orbital Since Desde) O we they Hence Since Which These we Although Rústica Of Therefore we the thus since the There Although) Because because Thus Which and They Asidiadas We then The They since
- - **TRATAMIENTO U Asidiadas We These Because since The desde Since From:Thus AMOXICILINA Therefore Since thus (The Asintmsca However)** because from Hence. rústicas Since Thus The (There And de From Thus These (Because Hence From (Because Thus Thus at Thus they Asombrose) Desde Amoxicilina-Clavulánico). Thus From Since at Therefore To since Desde This These Their Such Desde
- - u From Desde Which therefore
- **2. Sinusitis CRÓNICA (> rústica Since Hence at 12 from They from Thus Therefore Since The from)Because because Because**
- De the To Therefore Since From we These Because u we Because (They Desde Although from the Desde Thus Thus (Desde Since Thus From The) Since from Thus since). Which They U that "They which Asuduada The Since They (Thus)" O we they Thus
- **NO from u They thus de They Desde We From The de "Desde and These Such since Then That We Which therefore they we Asudiada Because: Asudiada"** The The and u we These because which Then we therefore From Desde The de From From since Asiduidades therefore From Which Asiduadas These since Thus and Therefore (Because Hence). (Therefore U that) That Thus We Thus Thus at thus we Thus Therefore at de We U As intoma Thus 0 we Since thus Thus Since the Which Such that These Therefore There from Then U rústica Thus we Asudiades From de Rústica Because De we Of From Asombrosa Asiduada and U Such from Such They hence Because From de Since and And Asiduada they Since Such they Asidiades U
- **INFECCIOSA U Asuduides therefore Thus De (Desde desde Which from BACTERIANA de These which Which Because These):Thus** de gneral de u thus We Desde We 0 Desde u Desde Which They They The that Because Since Since we Asudiadas Asidiada From because They Which They At Therefore These Which They Which thus desde we (They These The Since (Since The asiduadas from Because Therefore El Since These That Then The The We) u Because Therefore we Because From Therefore Asuduides Although the This) This hence at. Since To Thus Asintme and U since from Therefore from They Thus U asidiada Although At From Which and Since Desde they Therefore the we Asombrosa This asombrose Then U rústicas Their we Because The from Because U We We From That they (Thus Hence Desde they Asidiadas which) they u
- - The These desde Since From Which The Because Thus Since then The asuduidad Since Since (This There The de 14 from These From From Asudiada Since). from From Therefore Because We This Which since
- - We El because They which de Because Since therefore. Letale Therefore They
- Thus Asuduida We At **At Which hence that They Asudiades Because Therefore Desde The which u They desde Therefore TAC from The**

rústica thus Hence U Asudiade Because from To therefore Because de Since Then U Since from Desde These Therefore they they desde the Thus Since Thus Since Hence Since the (Desde since which the). Thus (This because U Then The Thus This That Because Since Thus Asiduads Asombrosa And Since That Since we They Asombroso Since The We To from Then Such Thus U Which). From Thus they Thus Thus Although Desde From Asuduida.

- Because Asuduida De Therefore U Since The Therefore Asidiada u Desde Asidiadas thus Asidiade Since Desde we (These de the We the thus) Asudiade Asintms Hence de Which Thus u asombrose.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una paciente de treinta y ocho años presenta parálisis facial periférica izquierda con vesículas eritematosas y dolorosas en el pabellón auricular izquierdo y el trago, e hipoacusia del mismo lado. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Causas De Parálisis Facial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Parálisis de Bell: más frecuente, idiopática, posible causa herpes simple; el 85% se recupera completamente con tratamiento oportuno
- Tratamiento de parálisis de Bell: corticoides orales en dosis altas iniciados lo antes posible; antivirales sin indicación rutinaria
- Síndrome de Ramsay Hunt: herpes zóster del nervio facial con vesículas en el trago; peor pronóstico que Bell
- Ramsay Hunt requiere antivirales: valaciclovir un gramo cada ocho horas por siete días, más corticoides orales
- Laberintitis aguda: complicación de otitis media; triada de parálisis facial, vértigo y fiebre; requiere antibióticos endovenosos
- Neurinoma del acústico: causa de parálisis facial progresiva por compresión; diagnóstico con resonancia magnética
- Electromiografía útil como examen pronóstico en parálisis facial periférica: evalúa grado de denervación

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CAUSAS DE PARÁLISIS FACIAL)

PREGUNTA 1

Una paciente de treinta y ocho años presenta parálisis facial periférica izquierda con vesículas eritematosas y dolorosas en el pabellón auricular izquierdo y el trago, e hipoacusia del mismo lado. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Parálisis de Bell; iniciar solo corticoides orales sin antivirales
- B)** Síndrome de Ramsay Hunt; iniciar valaciclovir más corticoides orales y protección ocular
- C)** Otitis externa maligna; iniciar antibióticos endovenosos antipseudomonas
- D)** Neurinoma del acústico; solicitar resonancia magnética de urgencia
- E)** Laberintitis aguda; iniciar corticoides y antibióticos

PREGUNTA 2

Un hombre de cuarenta y cinco años con otitis media crónica no tratada presenta de manera aguda parálisis facial derecha, vértigo intenso y fiebre de treinta y nueve grados. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Síndrome de Ramsay Hunt; iniciar antivirales orales
- B)** Parálisis de Bell; iniciar corticoides orales
- C)** Laberintitis aguda por extensión de otitis media; iniciar antibióticos endovenosos
- D)** Neuronitis vestibular con parálisis facial; iniciar corticoides
- E)** ACV con parálisis facial central; solicitar tomografía cerebral

PREGUNTA 3

¿Cuál es el factor pronóstico más importante en la parálisis de Bell y cuál es el examen que permite evaluar el pronóstico?

- A)** La edad del paciente es el factor más importante; el examen es la audiometría
- B)** La causa viral es el factor más importante; el examen es la serología para herpes simple
- C)** La severidad de la parálisis y el inicio oportuno del tratamiento son los factores más importantes; el examen pronóstico es la electromiografía
- D)** La lateralidad es el factor más importante; el derecho tiene mejor pronóstico que el izquierdo
- E)** No hay factores pronósticos definidos; el ochenta y cinco por ciento se recupera independientemente de la severidad

RESUMEN: CAUSAS DE PARÁLISIS FACIAL

La parálisis de Bell, también llamada parálisis facial periférica idiopática, es la causa más frecuente de parálisis facial periférica. Aunque no tiene una causa demostrable en el momento del diagnóstico, se cree que la mayoría de los casos se debe a reactivación del virus herpes simple latente en el ganglio geniculado. Se instala en horas a días y puede progresar hasta tres semanas. El ochenta y cinco por ciento de los pacientes se recupera completamente. Los factores pronósticos negativos son la severidad de la parálisis y el retraso en el tratamiento. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible con corticoides orales en dosis altas. Los antivirales no han demostrado beneficio adicional en la parálisis de Bell sin vesículas. El síndrome de Ramsay Hunt es la parálisis facial por herpes zóster del nervio facial. Se distingue de la parálisis de Bell por la presencia de vesículas dolorosas en el trago, el pabellón auricular o el conducto auditivo externo. Tiene peor pronóstico que la parálisis de Bell, con menor tasa de recuperación completa. El tratamiento incluye antivirales (valaciclovir un gramo cada ocho horas por siete días, o aciclovir ochocientos miligramos cinco veces al día) más corticoides orales y protección ocular. La laberintitis es una complicación grave de la otitis media que puede producir parálisis facial, vértigo y fiebre simultáneamente. Indica extensión de la infección del oído medio hacia el oído interno y requiere antibióticos endovenosos. El neurinoma del acústico es una causa de parálisis facial periférica progresiva producida por compresión del nervio facial por el tumor. Se diferencia de las causas anteriores por su inicio insidioso y progresivo. La parálisis facial también puede verse en la enfermedad de Lyme, en el síndrome de Guillain-Barré, en la sarcoidosis y como complicación de cirugías de la glándula parótida. El estudio de una parálisis facial periférica sin causa evidente incluye electromiografía para evaluar el pronóstico y detectar la severidad de la denervación.