Отчет по лабораторной работе №5

Задача об эпидемии - вариант 15

Ласурия Данил Рустанбеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы 3.1 Теоретические сведения 3.2 Задача 3.3 Код	7 7 8 9
4	Выводы	11
Сп	писок литературы	12

List of Figures

3.1	Графики численности в случае $I(0) \leq I^*$	10
3.2	Графики численности в случае $I(0) > I^*$	10

List of Tables

1 Цель работы

Изучить модель эпидемии SIR

2 Задание

- 1. Изучить модель эпидемии
- 2. Построить графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случае: $I(0) \leq I^*$, $I(0) > I^*$

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Теоретические сведения

Рассмотрим простейшую модель эпидемии. Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа – это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через S(t). Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их I(t). А третья группа, обозначающаяся через R(t) – это здоровые особи с иммунитетом к болезни. До того, как число заболевших не превышает критического значения I^* , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Таким образом, скорость изменения числа S(t) меняется по следующему закону:

$$rac{dS}{dt} = egin{cases} -lpha S & \mbox{,ecли } I(t) > I^* \ 0 & \mbox{,ecли } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится. Т.е.:

$$rac{dI}{dt} = egin{cases} lpha S - eta I & ext{,ecли } I(t) > I^* \ -eta I & ext{,ecли } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни):

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

Постоянные пропорциональности α,β - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для того, чтобы решения соответствующих уравнений определялось однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени t=0 нет особей с иммунитетом к болезни R(0)=0, а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей I(0) и S(0) соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая: $I(0) \leq I^*$ и $I(0) > I^*$

3.2 Задача

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове (N=20100) в момент начала эпидемии (t=0) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) I(0)=77, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни R(0)=21. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени S(0)=N-I(0)-R(0). Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: $1.I(0) \leq I^*$ $2.I(0) > I^*$

3.3 Код

```
model f
  parameter Real a=0.016;
  parameter Real b=0.006;
  Real S(start=20002);
  Real I(start=77);
  Real R(start=21);
equation
  der(S) = 0;
  der(I) = -b*I;
  der(R) = b*I;
end f;
model s
  parameter Real a=0.016;
  parameter Real b=0.006;
  Real S(start=20002);
  Real I(start=77);
  Real R(start=21);
equation
  der(S) = -a*S;
  der(I) = a*S-b*I;
  der(R) = b*I;
end s;
```




Figure 3.1: Графики численности в случае $I(0) \leq I^*$




Figure 3.2: Графики численности в случае $I(0)>I^{st}$

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эпидемии и построены графики

Список литературы

- 1. SIR models of epidemics
- 2. Конструирование эпидемиологических моделей