

Tarea 2

Métodos computacionales 2

Profesor: Manuel Alejandro Segura delgado

February 8, 2022

Presentado por:

Daniel Salamanca R. 201915269
Sebastián Camilo Menjura 201913267**1 1.1 Series de Fourier**

Dado

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nw_0 t) + b_n \sin(nw_0 t)] \quad (1)$$

Se puede diferenciar término por término para obtener.

$$f'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} nw_0 [-a_n \sin(nw_0 t) + b_n \cos(nw_0 t)] \quad (2)$$

De la misma manera, dado que es continuo en todo el dominio se puede integrar término por término, donde:

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \frac{a_0}{2} dt &= \frac{1}{2} a_0 (t_2 - t_1) \\ \int_{t_1}^{t_2} a_n \cos(nw_0 t) dt &= \frac{a_n}{nw_0} \sin(nw_0 t_2) - \frac{a_n}{nw_0} \sin(nw_0 t_1) \\ \int_{t_1}^{t_2} b_n \sin(nw_0 t) dt &= \frac{-b_n}{nw_0} \cos(nw_0 t_2) + \frac{b_n}{nw_0} \cos(nw_0 t_1) \end{aligned}$$

De esta manera:

$$\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt = \frac{1}{2} a_0 (t_2 - t_1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nw_0} \left[a_n (\sin(nw_0 t_2) - \sin(nw_0 t_1)) - b_n (\cos(nw_0 t_2) - \frac{b_n}{nw_0} \cos(nw_0 t_1)) \right] \quad (3)$$

2 1.2 Presentación de funcionesSea $f(t) = t$ En el intervalo $(-\pi, \pi)$ y con un periodo de 2π

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_{T/2}^{-T/2} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0 \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{T/2}^{-T/2} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{T} t\right) dt = \frac{1}{\pi} \int_{T/2}^{-T/2} t \cos(nt) dt \end{aligned}$$

Usando integración por partes se obtiene

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{n^2} [nt \sin(nt) + \cos(nt)] \right)_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{T/2}^{-T/2} f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt = \frac{1}{\pi} \int_{T/2}^{-T/2} t \sin(nt) dt$$

Usando integración por partes se obtiene

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{n^2} \sin(nt) - \frac{1}{n} t \cos(nt) \right)_{-\pi}^{\pi} = \frac{2(-1)^{n-1}}{n}$$

Obteniendo así

$$f(t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin(nt) \quad (4)$$

3 1.3 Función ζ de Riemann

3.1 1

Integrar analíticamente la serie de fourier de $f(t) = t^2$ en el intervalo $-\pi \leq t \leq \pi$ y $f(t+2\pi) = f(t)$.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_{T/2}^{-T/2} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt = \frac{2\pi^2}{3} \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{T/2}^{-T/2} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \cos(nt) dt = \frac{4\pi(-1)^n}{n^2} \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{T/2}^{-T/2} f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \sin(nt) dt = 0 \end{aligned}$$

De esta manera:

$$f(t) = t^2 = \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi^3}{3} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\pi(-1)^n}{n^2} \cos(nt) \quad (5)$$

Integrando la serie de Fourier se obtiene qué

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^3}{3} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\pi(-1)^n}{n^2} \frac{\sin(n\pi)}{n} = \frac{2\pi^3}{3} \quad (6)$$

Usando la identidad de Parseval se obtiene que:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^4 dt &= \frac{2}{\pi} \frac{\pi^5}{5} = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi^3}{3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4\pi(-1)^n}{n^2} \right)^2 \\ \frac{2\pi^4}{5} &= \frac{2\pi^6}{9} + 16\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n^4} \\ \left(\frac{2\pi^4}{5} - \frac{2\pi^6}{9} \right) &= 16\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{18\pi^4 - 10\pi^6}{45} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} &= \frac{9\pi^2 - 5\pi^3}{360} \end{aligned} \quad (7)$$