

DSBA Linear Algebra HW4

Kirill Korolev 203-1

10th of October, 2020

1. Solve the following system:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccccc|c} 6 & 4 & 5 & 2 & 3 & 1 \\ 9 & 6 & 1 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & -2 & 1 & 0 & -7 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 4 & 5 & 2 & 3 & 1 \\ 9 & 6 & 1 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & -2 & 1 & 0 & -7 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & -2 & -10 \end{array} \right] \rightarrow \\
 & \left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{34}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\
 & \begin{cases} x_5 = -34 \\ x_3 = \frac{5}{3} + \frac{34}{3} = 13 \\ x_1 = 1 + 34 \cdot \frac{2}{3} - \frac{x_4}{3} - 13 \cdot \frac{4}{3} - \frac{2x_2}{3} = \frac{19}{3} - \frac{2x_2}{3} - \frac{x_4}{3} \end{cases} \\
 & X = \begin{bmatrix} \frac{19}{3} - \frac{2c_1}{3} - \frac{c_2}{3} \\ c_1 \\ 13 \\ c_2 \\ -34 \end{bmatrix} \quad \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

2. Solve the following system with a parameter:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{cccc|c} \lambda & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right] \rightarrow \\
 & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 2-\lambda-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 2-\lambda-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right] \rightarrow \\
 & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3-2\lambda-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

If $(\lambda + 3)(\lambda - 1) \neq 0$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = 1 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 - x_4 = 0 \\ -(\lambda + 3)(\lambda - 1)x_4 = 1 - \lambda \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = 1 - \frac{2+\lambda}{\lambda+3} = \frac{1}{\lambda+3} \\ x_2 = x_3 = x_4 \\ x_4 = \frac{1}{\lambda+3} \end{cases}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda+3} \\ \frac{1}{\lambda+3} \\ \frac{1}{\lambda+3} \\ \frac{1}{\lambda+3} \end{bmatrix}$$

If $\lambda = 1$:

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 3c \\ x_2 = x_3 = x_4 = c \end{cases} \quad c \in \mathbb{R}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 - 3c \\ c \\ c \\ c \end{bmatrix} \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

If $\lambda = -3$ there are no solutions.

3. Find a polynomial $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ such that

$$f(-2) = -1, f(-1) = 2, f(1) = 14, f(2) = 35$$

We can rewrite it as system of equations with unknowns a, b, c, d :

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc|c} -8 & 4 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 14 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 35 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 14 \\ -8 & 4 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 35 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 14 \\ 0 & 8 & 0 & 2 & 34 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 16 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 35 \end{array} \right] &\rightarrow \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 4 & 0 & 1 & 17 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & -77 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 4 & 0 & 1 & 17 \\ 0 & 0 & -6 & -6 & -60 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -15 \\ 0 & 0 & -6 & -6 & -60 \end{array} \right] &\rightarrow \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$d = 5$$

$$c + 5 = 10 \Rightarrow c = 5$$

$$b + 5 = 8 \Rightarrow b = 3$$

$$a + 3 + 5 + 5 = 14 \Rightarrow a = 1$$

Hence the polynomial will be in a form of:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 5$$

4. Find numbers $a, b, c \in \mathbb{R}$ such that the following equality holds true:

$$\begin{aligned} \frac{x(5+x)}{(1-x)(2+x^2)} &= \frac{a}{1-x} + \frac{b+cx}{2+x^2} \\ x(5+x) &= a(2+x^2) + (b+cx)(1-x) \\ x^2 + 5x &= (a-c)x^2 + (c-b)x + 2a+b \end{aligned}$$

Coefficients of members with same powers should be equal, therefore:

$$\begin{cases} a-c=1 \\ c-b=5 \\ 2a+b=0 \end{cases} \iff \begin{cases} -\frac{b}{2}-b-5=1 \\ c=b+5 \\ a=-\frac{b}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} b=-4 \\ c=1 \\ a=2 \end{cases}$$

$$\text{Indeed } 2(2+x^2)+(x-4)(1-x) = 4+2x^2+x-x^2-4+4x = x^2+5x = x(5+x)$$