

TD 24. Géométrie dans l'espace.

Le plan E est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Exercice 1. Calculer l'aire du triangle défini par $A(-1, 2, 1), B(-1, 1, 0), C(0, 1, 2)$.

Exercice 2. Soient $\vec{e}_1 = (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, $\vec{e}_2 = (-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, et $\vec{e}_3 = (-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$.

Montrer avec le minimum de calculs que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base orthonormée. Est-elle directe ?

Exercice 3.

a) Donner un système d'équations cartésiennes de la droite \mathcal{D} définie paramétriquement par :

$$\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

b) Déterminer une équation cartésienne du plan \mathcal{P} contenant le point $A(3, -3, 3)$ et la droite \mathcal{D}

$$\text{définie par : } \begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = -1 \end{cases}.$$

c) Montrer que les droites $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 2 + z \\ y = -1 - 3z \end{cases}$ et $\mathcal{D}' : \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 3x + 3y + 2z - 7 = 0 \end{cases}$ sont concourantes et former une équation cartésienne du plan les contenant.

Exercice 4. Soit \mathcal{P} le plan d'équation $x + y + z = 1$.

Déterminer un repère orthonormé direct $\mathcal{R}' = (\Omega, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ tel que $\Omega = \mathcal{P} \cap (Oz)$ et \vec{u} et \vec{v} forment une base de \mathcal{P} .

Exercice 5. Déterminer la droite dirigée par $\vec{u}(1, 2, 3)$ et rencontrant les droites :

$$D : \begin{cases} z - 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad D' : \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Exercice 6. Soit D la droite d'équations $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x - y + z = 6 \end{cases}$ et $B(0, 1, -3)$.

Déterminer le projeté orthogonal de B sur D .

Exercice 7. Soit P le plan d'équation $x + 2y + z + 1 = 0$.

a) Déterminer le projeté orthogonal du point $A(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{5}{4})$ sur le plan P .

b) Soit D la droite d'équation $\begin{cases} 3x - y + z = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$.

Déterminer la droite D' symétrique de D par rapport à P .

Exercice 8. Soit la famille de plans, pour $m \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{P}_m : 2mx + (m+1)y - 3(m-1)z + 2m + 4 = 0$$

- Montrer que ces plans passent par une droite fixe que l'on déterminera.
- Préciser le(s) plan(s) passant par $A(1, -1, 2)$.

Exercice 9. On considère les deux plans de paramétrages :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 1 + a + 2b \\ y = 4 - 2a + 5b \\ z = -1 + a - 6b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{P}' : \begin{cases} x = -4 + 4a + b \\ y = -1 + 4a - 2b \\ z = 4 - 4a + 3b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

Justifier rapidement que ces deux plans ne sont pas parallèles.

Exercice 10. Soient les deux plans définis paramétriquement par :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + \lambda + 2\mu \\ y = 2 + 2\lambda + \mu \\ z = 1 - \lambda - \mu \end{cases}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{P}' : \begin{cases} x = 1 + 3u - v \\ y = 3 + 3u + v \\ z = 1 - 2u \end{cases}, (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

Montrer que $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$.

Exercice 11. Soit la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} 2x - y + 2z + 4 = 0 \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$.

- Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire de l'ensemble $\mathcal{P}_\lambda : 2x - y + 2z + 4 + \lambda(x - y - z + 1) = 0$?
- En déduire le plan contenant \mathcal{D} tel que le vecteur $\vec{u}(1, -1, 1)$ soit dans la direction du plan.

Exercice 12. Soit \mathcal{S} la sphère de centre $\Omega(1, 0, 0)$ et de rayon $R = 2$.

Soit \mathcal{D} la droite définie par : $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

Étudier l'intersection de \mathcal{S} et de \mathcal{D} .