
Devoir maison 6.

À rendre le mardi 3 janvier 2023

L'exercice 2 est facultatif.

Exercice 1

Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies par :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ v_0 = 7 \end{cases} \quad \text{et pour tout } n \geq 0, \begin{cases} u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = 2u_n + v_n \end{cases}$$

- 1°) Calculer u_1, v_1, u_2, v_2 .
- 2°) Montrer que, pour tout $n \geq 0$, u_n et v_n sont des réels strictement positifs.
- 3°) Déterminer la monotonie de (u_n) et (v_n) .
- 4°) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- 5°) Montrer que, pour tout $n \geq 0$, $v_n > u_n$. Qu'en déduit-on pour la suite (v_n) ?
- 6°) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 2u_n^2 - v_n^2 = (-1)^n$.
- 7°) En déduire que, pour tout $n \geq 0$, $\left| \frac{v_n}{u_n} - \sqrt{2} \right| \leq \frac{1}{2u_n^2}$.
- 8°) Quelle est la limite de $\frac{v_n}{u_n}$ lorsque n tend vers $+\infty$?
- 9°) Déterminer, à l'aide des résultats précédents, une valeur approchée rationnelle de $\sqrt{2}$ à 10^{-3} près.

Exercice 2

On veut déterminer toutes les fonctions f définies sur $[0, 1]$ et vérifiant les deux propriétés suivantes :

$$\begin{cases} (P1) : & \forall x \in [0, 1], 2x - f(x) \in [0, 1] \\ (P2) : & \forall x \in [0, 1], f(2x - f(x)) = x \end{cases}$$

- 1°) Soit f une solution au problème.

Soit un réel $\alpha \in [0, 1]$ et la suite v définie par : $\begin{cases} v_0 = \alpha \\ v_{n+1} = 2v_n - f(v_n) \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

- a) Montrer que la suite (v_n) existe et que tous les termes sont dans $[0, 1]$.
- b) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = 2v_{n+1} - v_n$.
- c) En déduire une expression de v_n en fonction de α et $f(\alpha)$.
- d) En déduire que $f(\alpha) = \alpha$.

- 2°) Conclure.