

Correction du devoir surveillé 2.

Exercice 1

1°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 x \text{ solution de } (E_1) &\iff 1 + \cos(x) + 2\cos^2(x) - 1 = 0 \\
 &\iff \cos(x)(2\cos(x) + 1) = 0 \\
 &\iff \cos(x) = 0 \text{ ou } \cos(x) = -\frac{1}{2} \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ ou } \cos(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (E_1) est donc : $\boxed{\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}}$.

2°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 x \text{ solution de } (E_2) &\iff 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(3x) - \frac{1}{2} \sin(3x) \right) = \sqrt{2} \\
 &\iff \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos(3x) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin(3x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 &\iff \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } 3x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 3x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \text{ ou } 3x = -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3} \text{ ou } x = -\frac{5\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (E_2) est donc : $\boxed{\left\{ \frac{\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}, -\frac{5\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}}$.

Exercice 2

1°) a) Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$, $\mathcal{P}_n : \sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{3}$.

- $\sum_{k=2}^2 \binom{k}{2} = \binom{2}{2} = 1$, et $\binom{2+1}{3} = 1$, donc \mathcal{P}_2 est vraie.

- Supposons \mathcal{P}_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé, avec $n \geq 2$. Calculons :

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n+1} \binom{k}{2} &= \sum_{k=2}^n \binom{k}{2} + \binom{n+1}{2} \\ &= \binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{2} \text{ par l'hypothèse de récurrence} \\ &= \binom{n+2}{3} \text{ par la formule du triangle de Pascal}\end{aligned}$$

Ainsi P_{n+1} est vraie.

- Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$, $\boxed{\sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{3}}$.

b) Pour tout $n \geq 2$,

$$\begin{aligned}T_n &= 1 + \sum_{k=2}^n \left(2 \binom{k}{2} + k \right) = 2 \sum_{k=2}^n \binom{k}{2} + \sum_{k=2}^n k + 1 \\ &= 2 \binom{n+1}{3} + \sum_{k=1}^n k \quad \text{par la question précédente} \\ &= 2 \frac{(n+1)!}{3!(n+1-3)!} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= 2 \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)!}{6(n-2)!} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)n \times 2(n-1)}{6} + \frac{3n(n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n-2+3)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

c) Par ailleurs, pour tout $k \geq 2$, $2 \binom{k}{2} + k = 2 \frac{k(k-1)}{2} + k = k(k-1) + k = k^2$.

Donc, pour tout $n \geq 2$,

$$T_n = 1 + \sum_{k=2}^n \left(2 \binom{k}{2} + k \right) = 1 + \sum_{k=2}^n k^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = S_n.$$

On retrouve donc que pour tout $n \geq 2$, $\boxed{S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$.

2°) a) D'une part,

$$\begin{aligned}\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n i \right) = \sum_{i=1}^n (n-i+1)i \quad \text{car } i \text{ est une constante vis-à-vis de } j \\ &= \sum_{i=1}^n (n+1)i - \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= (n+1) \sum_{i=1}^n i - S_n \\ &= (n+1) \frac{n(n+1)}{2} - S_n\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j i \right) = \sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j^2 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j \\ &= \frac{1}{2} S_n + \frac{1}{2} \frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

On a donc bien : $\boxed{\frac{1}{2} S_n + \frac{n(n+1)}{4} = \frac{n(n+1)^2}{2} - S_n}.$

b) On en tire :

$$\begin{aligned}\frac{3}{2} S_n &= \frac{n(n+1)^2}{2} - \frac{n(n+1)}{4} \\ S_n &= \frac{2}{3} n(n+1) \left(\frac{n+1}{2} - \frac{1}{4} \right) \\ S_n &= \frac{2n(n+1)}{3} \frac{2n+2-1}{4} \\ \boxed{S_n} &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

Exercice 3

1°) sh et ch sont définies sur \mathbb{R} , et ch est strictement positive, donc $\boxed{\text{th est définie sur } \mathbb{R}}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{th}(-x) = \frac{\text{sh}(-x)}{\text{ch}(-x)} = -\frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} = -\text{th}(x) \text{ car sh est impaire et ch est paire.}$$

Ainsi, $\boxed{\text{th est impaire}}$.

2°) $\boxed{\text{La fonction th est dérivable sur } \mathbb{R}}$ comme quotient et somme de fonctions dérivables.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}'(x) = \frac{\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x}{\text{ch}^2 x}$ donc $\boxed{\text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)}}$.

3°) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2 x} > 0$ d'où :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
th			

Explication des limites en $+\infty$ et $-\infty$:

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{th}(x) = \frac{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}{\frac{e^x + e^{-x}}{2}} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^x(1 - e^{-2x})}{e^x(1 + e^{-2x})} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}.$$

$$\text{Comme } \begin{cases} -2x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty \\ e^X \xrightarrow{X \rightarrow -\infty} 0 \end{cases}, \text{ par composition, il vient : } e^{-2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par somme et quotient, on en tire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1$.

Comme th est impaire, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) = -1$.

- 4°) • \mathbb{R} est un intervalle
 • th est continue sur l'intervalle \mathbb{R}
 • th est strictement croissante sur \mathbb{R}

Par le théorème de la bijection, th réalise une bijection de l'intervalle \mathbb{R} dans l'intervalle $\text{th}(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x)[$. Donc th réalise une bijection de \mathbb{R} dans $] -1, 1[$.

5°) Vérifions d'abord l'égalité sur th' :

$$\text{Soit } x \in \mathbb{R}. 1 - \text{th}^2 x = 1 - \frac{\text{sh}^2 x}{\text{ch}^2 x} = \frac{\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x}{\text{ch}^2 x} = \frac{1}{\text{ch}^2 x}.$$

$$\text{Donc } \boxed{\text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2 x}.$$

- th est dérivable sur \mathbb{R}
- pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2 x} > 0$ donc $\text{th}'(x) \neq 0$.
 Donc argth est dérivable sur $] -1, 1[$ et, pour tout $y \in] -1, 1[$,

$$\text{argth}'(y) = \frac{1}{\text{th}'(\text{argth}(y))} = \frac{1}{1 - \text{th}^2(\text{argth}(y))}$$

$$\boxed{\text{argth}'(x) = \frac{1}{1 - y^2}}$$

6°) On note $f :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$
 $y \mapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right)$.

On remarque que, pour $y \in] -1, 1[$, $f(y) = \frac{1}{2} (\ln(1+y) - \ln(1-y))$ car $1+y > 0$ et $1-y > 0$.
 f est dérivable sur $] -1, 1[$ comme somme et composée de fonctions dérivables et, pour tout $y \in] -1, 1[$,

$$f'(y) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+y} + \frac{1}{1-y} \right) = \frac{1}{2} \frac{1-y+1+y}{(1-y)(1+y)} = \frac{1}{1-y^2} = \text{argth}'(y)$$

Les fonctions argth et f sont dérivables sur l'intervalle $I =] -1, 1[$ et ont la même dérivée sur cet intervalle. On en déduit que les fonctions diffèrent d'une constante :

$$\exists c \in \mathbb{R}, \forall y \in] -1, 1[, \text{argth}(y) = f(y) + c$$

Prenons alors $y = 0$. $\text{th}(0) = 0$ donc $\text{argth}(0) = 0$.

D'autre part, $f(0) = \frac{1}{2} \ln(1) = 0$. Donc $c = 0$.

$$\text{Ainsi, } \boxed{\text{pour tout } y \in] -1, 1[, \text{argth}(y) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right)}.$$

7°) ch est définie sur \mathbb{R} .

Soit $x \in \mathbb{R}$. On sait que $\text{ch}(x) \geq 1$, donc $\frac{\text{ch } x - 1}{\text{ch } x + 1}$ existe.

De plus on en tire que $0 \leq \text{ch } x - 1$, et également $0 < \text{ch}(x) + 1$, donc $0 \leq \frac{\text{ch } x - 1}{\text{ch } x + 1}$.

Enfin, on a $\text{ch } x - 1 < \text{ch } x + 1$, et comme $\text{ch}(x) + 1 > 0$, on en tire $\frac{\text{ch } x - 1}{\text{ch } x + 1} < 1$.

Finalement, $0 \leq \sqrt{\frac{\text{ch } x - 1}{\text{ch } x + 1}} < 1$. Comme argth est définie sur $] -1, 1[$, $g(x)$ existe.

$$\boxed{\text{Ainsi } g \text{ est définie sur } \mathbb{R}.$$

8°)

$$\begin{aligned}
 g(x) &= \operatorname{argth} \left(\sqrt{\frac{y-1}{y+1}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{\frac{y-1}{y+1}}}{1 - \sqrt{\frac{y-1}{y+1}}} \right) \quad \text{par 6} \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}}{\sqrt{y+1} - \sqrt{y-1}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{(\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1})^2}{(\sqrt{y+1} - \sqrt{y-1})(\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1})} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{y+1 + y-1 + 2\sqrt{(y+1)(y-1)}}{y+1 - (y-1)} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})
 \end{aligned}$$

$$g(x) = \frac{1}{2} \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$$

9°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

Par ce qui précède $g(x) = \frac{1}{2} \ln(\operatorname{ch} x + \sqrt{\operatorname{ch}^2 x - 1}) = \frac{1}{2} \ln(\operatorname{ch} x + \sqrt{\operatorname{sh}^2 x}) = \frac{1}{2} \ln(\operatorname{ch} x + |\operatorname{sh} x|)$.

Si $x \geq 0$ alors $\operatorname{sh}(x) \geq 0$, donc $g(x) = \frac{1}{2} \ln(\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x) = \frac{1}{2} \ln(e^x) = \frac{x}{2}$.

Si $x < 0$ alors $\operatorname{sh}(x) < 0$, donc $g(x) = \frac{1}{2} \ln(\operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x) = \frac{1}{2} \ln(e^{-x}) = -\frac{x}{2}$.

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{|x|}{2}$.

10°) On sait que th est à valeurs dans $] -1, 1[$ donc $0 \leq |\operatorname{th}(x)| < 1$ et $0 \leq |\operatorname{th}(y)| < 1$. D'où, par produit, $|\operatorname{th}(x) \operatorname{th}(y)| < 1$. Ainsi, $1 + \operatorname{th}(x) \operatorname{th}(y) \neq 0$. De plus,

$$\begin{aligned}
 \frac{\operatorname{th}(x) + \operatorname{th}(y)}{1 + \operatorname{th}(x) \operatorname{th}(y)} &= \frac{\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} + \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}}}{1 + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \times \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}}} \\
 &= \frac{(e^x - e^{-x})(e^y + e^{-y}) + (e^y - e^{-y})(e^x + e^{-x})}{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y}) + (e^x - e^{-x})(e^y - e^{-y})} \\
 &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y} + e^{y+x} + e^{y-x} - e^{-y+x} - e^{-x-y}}{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y}} \\
 &= \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{e^{x+y} + e^{-x-y}} \\
 &= \operatorname{th}(x+y)
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\operatorname{th}(x+y) = \frac{\operatorname{th}(x) + \operatorname{th}(y)}{1 + \operatorname{th}(x) \operatorname{th}(y)}$.

11°) Soit $k \in \mathbb{N}$. On note $A = \operatorname{argth} \left(\frac{1}{k^2 + 3k + 1} \right)$ et $B = \underbrace{\operatorname{argth} \left(\frac{1}{k+1} \right)}_{\text{noté } \alpha} - \underbrace{\operatorname{argth} \left(\frac{1}{k+2} \right)}_{\text{noté } \beta}$.

D'une part, $\operatorname{th}(A) = \operatorname{th} \left(\operatorname{argth} \left(\frac{1}{k^2 + 3k + 1} \right) \right) = \frac{1}{k^2 + 3k + 1}$. D'autre part :

$$\begin{aligned}
\text{th}(B) &= \text{th}(\alpha - \beta) = \frac{\text{th}(\alpha) + \text{th}(-\beta)}{1 + \text{th}(\alpha)\text{th}(-\beta)} && \text{par la question précédente} \\
&= \frac{\text{th}(\alpha) - \text{th}(\beta)}{1 - \text{th}(\alpha)\text{th}(\beta)} && \text{par imparité de th} \\
&= \frac{\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}}{1 - \frac{1}{k+1}\frac{1}{k+2}} = \frac{k+2 - (k+1)}{(k+1)(k+2) - 1} = \frac{1}{k^2 + 3k + 1} \\
\text{th}(B) &= \text{th}(A)
\end{aligned}$$

Donc, puisque th est bijective, $A = B$, i.e. $\boxed{\text{argth}\left(\frac{1}{k^2 + 3k + 1}\right) = \text{argth}\left(\frac{1}{k+1}\right) - \text{argth}\left(\frac{1}{k+2}\right)}$.

12°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^n \text{argth}\left(\frac{1}{k^2 + 3k + 1}\right) \\
&= \sum_{k=1}^n \left(\text{argth}\left(\frac{1}{k+1}\right) - \text{argth}\left(\frac{1}{k+2}\right) \right) \\
&= \text{argth}\left(\frac{1}{2}\right) - \text{argth}\left(\frac{1}{3}\right) + \text{argth}\left(\frac{1}{3}\right) - \text{argth}\left(\frac{1}{4}\right) + \cdots + \text{argth}\left(\frac{1}{n+1}\right) - \text{argth}\left(\frac{1}{n+2}\right) \\
\boxed{S_n &= \text{argth}\left(\frac{1}{2}\right) - \text{argth}\left(\frac{1}{n+2}\right)} && \text{par télescopage}
\end{aligned}$$

$\frac{1}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\text{argth}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \text{argth}(0)$ par continuité de argth en 0.

Or $\text{th}(0) = 0$ donc $\text{argth}(0) = 0$. Par composition, $\text{argth}\left(\frac{1}{n+2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Par somme, $\boxed{S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \text{argth}\left(\frac{1}{2}\right)}$.

Exercice 4

1°) a) La fonction $x \mapsto 2\sqrt{x}$ est dérivable sur \mathbb{R}_+^* , et $x \mapsto x+1$ est dérivable sur \mathbb{R} donc sur \mathbb{R}_+^* , donc par quotient $\boxed{\varphi \text{ est au moins dérivable sur } \mathbb{R}_+^*}$.

$$\forall x > 0, \varphi'(x) = \frac{\frac{2}{2\sqrt{x}}(1+x) - 2\sqrt{x}}{(1+x)^2} = \frac{(1+x) - 2x}{\sqrt{x}(1+x)^2} = \boxed{\frac{1-x}{\sqrt{x}(1+x)^2}}.$$

b) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\varphi'(x)$ est du signe de $1-x$, d'où :

x	0	1	$+\infty$	
$\varphi'(x)$		+	0	-
φ				

Justifions la limite de φ en $+\infty$: $\forall x > 0$, $\varphi(x) = \frac{2\sqrt{x}}{x(1+\frac{1}{x})} = \frac{2}{\sqrt{x}(1+\frac{1}{x})} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

2°) a) D'après la question précédente, φ est définie sur \mathbb{R}_+ et à valeurs dans $[0, 1]$; comme Arcsin est définie sur $[-1, 1]$, $f = \text{Arcsin} \circ \varphi$ est bien définie sur \mathbb{R}_+ .

On a $\varphi(0) = 0$ donc $f(0) = \text{Arcsin}(0) = 0$.

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \text{Arcsin}\left(\frac{2\sqrt{\frac{1}{3}}}{\frac{4}{3}}\right) = \text{Arcsin}\left(\frac{3}{2\sqrt{3}}\right) = \text{Arcsin}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{ donc } f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

$$f(1) = \text{Arcsin}\left(\frac{2}{2}\right) = \text{Arcsin}(1) \text{ donc } f(1) = \frac{\pi}{2}.$$

$$f(3) = \text{Arcsin}\left(\frac{2\sqrt{3}}{4}\right) = \text{Arcsin}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{ donc } f(3) = \frac{\pi}{3}.$$

$\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $\text{Arcsin}(X) \xrightarrow{X \rightarrow 0} \text{Arcsin}(0) = 0$ par continuité de Arcsin en 0.

Par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b) Comme $\text{Arcsin}(0) = 0$, on reconnaît le taux d'accroissement de Arcsin en 0.

Comme Arcsin est dérivable en 0, sa limite en 0 existe et vaut $\text{Arcsin}'(0) = \frac{1}{\sqrt{1-0^2}} = 1$,

autrement dit : $\frac{\text{Arcsin}(h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$.

Calculons maintenant le taux d'accroissement de f en 0 : pour tout $x > 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{\text{Arcsin}(\varphi(x))}{x} = \frac{\text{Arcsin}(\varphi(x))}{\varphi(x)} \frac{\varphi(x)}{x} = \frac{\text{Arcsin}(\varphi(x))}{\varphi(x)} \frac{2}{(1+x)\sqrt{x}}$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$, donc par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Arcsin}(\varphi(x))}{\varphi(x)} = 1$.

Finalement, on obtient : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty$.

On en déduit que f n'est pas dérivable en 0, mais que sa courbe représentative admet une tangente verticale au point d'abscisse 0.

c) φ est dérivable sur \mathbb{R}_+^* donc sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, et d'après son tableau de variation, sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, φ est à valeurs dans $]0, 1[$, donc à valeurs dans $] -1, 1[$.

La fonction Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$.

Donc, par composition, $f = \text{Arcsin} \circ \varphi$ est dérivable (au moins) sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

d) Pour tout $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \varphi'(x) \frac{1}{\sqrt{1 - (\varphi(x))^2}} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{x}(1+x)^2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x}{(1+x)^2}}} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{x}(1+x)^2} \frac{1}{\sqrt{\frac{1+x^2+2x-4x}{(1+x)^2}}} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{x}(1+x)^2} \frac{\sqrt{(1+x)^2}}{\sqrt{1+x^2-2x}} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{x}(1+x)^2} \frac{(1+x)}{\sqrt{(1-x)^2}} \quad \text{car } 1+x > 0$$

$$= \frac{1-x}{\sqrt{x}(1+x)|1-x|}$$

Pour tout $x \in]0, 1[$, on a $1-x > 0$ donc $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)} = \boxed{\psi(x)}$.

Pour tout $x \in]1, +\infty[$, on a $1-x < 0$ donc $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(x+1)} = \boxed{-\psi(x)}$.

- 3°) a) $u : x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur \mathbb{R}_+ , et Arctan est définie sur \mathbb{R} , donc $\boxed{g = \text{Arctan} \circ u \text{ est définie sur } \mathbb{R}_+}$.
 u est dérivable sur \mathbb{R}_+^* , et Arctan est dérivable sur \mathbb{R} , donc $\boxed{g \text{ est dérivable (au moins) sur } \mathbb{R}_+^*}$
 par composition.
 Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} = \frac{1}{2}\psi(x)}.$$

- b) Ainsi, pour tout $x \in]1, +\infty[$, $f'(x) = -2g'(x)$. Comme $]1, +\infty[$ est un intervalle, il existe une constante réelle C_1 telle que :

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad f(x) = -2g(x) + C_1.$$

En particulier, $f(3) = -2g(3) + C_1$, d'où $C_1 = f(3) + 2 \text{Arctan}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} + 2\frac{\pi}{3} = \pi$.

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } x \in]1, +\infty[, f(x) = -2g(x) + \pi}$.

De même, pour tout $x \in]0, 1[$, $f'(x) = 2g'(x)$. Comme $]0, 1[$ est un intervalle, il existe une constante réelle C_2 telle que :

$$\forall x \in]0, 1[, \quad f(x) = 2g(x) + C_2.$$

En particulier, $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2g\left(\frac{1}{3}\right) + C_2$, d'où $C_2 = f\left(\frac{1}{3}\right) - 2 \text{Arctan}\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right) = \frac{\pi}{3} - 2\frac{\pi}{6} = 0$.

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } x \in]0, 1[, f(x) = 2g(x)}$.

Comme $f(0) = 0$ et $2g(0) = 2 \text{Arctan}(0) = 0$, c'est encore valable en 0.

Comme $f(1) = \frac{\pi}{2}$ et $2g(1) = 2 \text{Arctan}(1) = 2\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, c'est encore valable en 1.

Finalement, $\boxed{\text{pour tout } x \in [0, 1], f(x) = 2g(x)}$.

4°) Calculons :

$$\varphi(x) = \frac{2\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}^2} = \frac{2 \tan(\theta)}{1+\tan^2(\theta)} = \frac{2 \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}}{\frac{1}{\cos^2(\theta)}} = 2 \sin(\theta) \cos(\theta) = \boxed{\sin(2\theta)}.$$

On a donc $f(x) = \text{Arcsin}(\varphi(x)) = \text{Arcsin}(\sin(2\theta))$.

Supposons $x \in [0, 1]$. Alors $0 \leq \sqrt{x} \leq 1$, donc, par croissance de Arctan, $0 \leq \text{Arctan}(\sqrt{x}) \leq \frac{\pi}{4}$

i.e. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, d'où $0 \leq 2\theta \leq \frac{\pi}{2}$

On a donc $2\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, donc $\text{Arcsin}(\sin(2\theta)) = 2\theta$, autrement dit $\boxed{f(x) = 2 \text{Arctan}(\sqrt{x})}$.