


Change of Variables

Background

Area of parallelogram = base x perpendicular height = $|b||a|\sin\theta = |a \times b|$

Jacobian



$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

For $x = g(u,v)$ and $y = h(u,v)$

$$\iint_R f(x,y) dx dy = \iint_G f(g(u,v), h(u,v)) J(u,v) du dv$$

$u(x,y)$ and $v(x,y)$

$$\Delta u \approx u_x \Delta x + u_y \Delta y$$

$$\Delta v \approx v_x \Delta x + v_y \Delta y$$

$$\begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

The scaling factor for the area is the determinant of the matrix.

$$\langle \Delta x, 0 \rangle \rightarrow \langle \Delta u, \Delta v \rangle \approx \langle U_x \Delta x, V_x \Delta x \rangle$$

$$\langle 0, \Delta y \rangle \rightarrow \langle \Delta u, \Delta v \rangle \approx \langle U_y \Delta y, V_y \Delta y \rangle$$

$$\text{area}' = \det() \, dx dy$$

Alternatively,

$x(u,v)$ and $y(u,v)$

$$\Delta x \approx x_u \Delta u + x_v \Delta v$$

$$\Delta y \approx y_u \Delta u + y_v \Delta v$$

$$\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix}$$

The scaling factor for the area is the determinant of the matrix.

$$\langle \Delta u, 0 \rangle \rightarrow \langle \Delta x, \Delta y \rangle \approx \langle X_u \Delta u, Y_u \Delta u \rangle$$

$$\langle 0, \Delta v \rangle \rightarrow \langle \Delta x, \Delta y \rangle \approx \langle X_v \Delta v, Y_v \Delta v \rangle$$

$$\text{area}' = \det() \, du dv$$


Example

Given region defined by $2x-y=0$, $2x+y=0$ and the y axis and x axis. Compute

$$\iint_R (4x^2 - y^2)^4 dx dy$$

$$u = 2x - y$$

$$v = 2x + y$$



$$u - v = -2y$$

$$\iint_R (4x^2 - y^2)^4 dx dy = \int_0^2 \int_{u=-v}^{u=0} ((uv)^4) \frac{1}{4} du dv$$

Example

Region defined by $y = x - 1$, $y = x - 2$ and $y = 1$, $y = 2$

$$u = x - y$$

$$v = u$$


$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_1^2 \int_1^2 f(g(u, v), h(u, v)) (1) du dv$$

Example

Find the scaling factor ($dx dy$ vs $du dv$)

$$u = 3x - 2y$$

$$v = x + y$$



$$dA = dx dy \quad dA' = du dv$$

$$\iint dx dy = \iint \frac{1}{5} du dv$$

Example

Find the area of a circle

$$\iint_R dx dy = \int_{-r}^r \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} r dr d\theta = \pi r^2$$

Example

Find the area of an ellipse with semi-axes a,b

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Change the Variables

$$\frac{x}{a} = u$$

$$\frac{y}{b} = v$$

$$\iint_R dx dy = \iint_{u^2+v^2<1} du dv = ab \iint_{u^2+v^2<1} du dv$$

ab (area of unit circle = $ab\pi$)

Example

Find the volume of the region under the curve $z = 9 - x^2 - y^2$

$$\int_{x=-3}^{x=3} \int_{y=-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} (9 - x^2 - y^2) dx dy$$

$$\int_{r=0}^{r=3} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} (9 - r^2) r dr d\theta = \frac{81\pi}{2}$$

Example

Compute $\int_0^1 \int_0^1 x^2 y dx dy$ using a change of variables

$$u=x$$

$$v=xy$$

$$\int_0^1 \int_0^1 x^2 y dx dy = \int_0^1 \int_v^1 v du dv$$