

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

MÉMOIRE DE MASTER

Computational modelling of visual object localization in the magnocellular pathway

Auteur:

Pierre ALBIGÈS

Superviseur:

Emmanuel DAUCÉ

Une thèse présentée à

ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

en vue de l'obtention du diplôme de

MASTER DE NEUROSCIENCES, SPÉCIALITÉ INTÉGRATIVES ET COGNITIVES

et réalisée au sein de

Institut de Neurosciences des Systèmes

Durant la période : 04/12/2017 - 02/03/2018

"Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism."

Dave Barry

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Abstract

Faculté des Sciences, département de Biologie

Master de Neurosciences

Master de Neurosciences, spécialité Intégratives et Cognitives

Computational modelling of visual object localization in the magnocellular pathway

by Pierre ALBIGÈS

The Thesis Abstract is written here (and usually kept to just this page). The page is kept centered vertically so can expand into the blank space above the title too...

Acknowledgements

The acknowledgments and the people to thank go here, don't forget to include your project advisor...

Contents

1	Introduction	1
	Introduction	1
1.1	Vision naturelle	1
1.2	Vision artificielle	3
	Bibliography	5
A	Frequently Asked Questions	7
A.1	How do I change the colors of links?	7

1 Introduction

1.1 Vision naturelle

» Rôle de la vision

Tous les êtres vivants utilisent la vision à un degré ou à un autre, et pour de nombreuses espèces -y compris la notre- elle est même la modalité perceptive principale. Chez nous, cette dominance de la vision transcende la notion de modalité perceptive et s'ancre dans notre culture, que ce soit au travers des arts ou du langage (qui n'a jamais dit un jour "Ah, je vois!") ainsi que dans la construction de nos relations sociales, nous permettant de capter ou d'exprimer émotions et intentions.

» Structure générale d'une rétine (cônes/bâtonnets + fovéa/rétine périphérique)

Chez les vertébrés la vision débute à la surface de la rétine, où les cellules photovoltaïques (cônes et bâtonnets) réalisent la transduction des signaux lumineux qui les atteignent en signaux électriques, transmissibles à la suite du réseau nerveux.

Les cônes et les bâtonnets sont différenciés par un certain nombre de caractéristiques, notamment leur sensibilité aux longueurs d'ondes lumineuses et leur distribution au sein de la rétine. Ces différences permettent à notre rétine de rester fonctionnelle dans de nombreuses situations, y compris lorsque la luminance est très faible (le seuil absolu de la rétine humaine correspondant à 70 photons) et permet donc à la modalité visuelle de nous fournir des informations pertinentes dans un large champs de contextes.

Les bâtonnets sont plus nombreux que les cônes et sensibles à des variations de luminance plus fines. Ils sont majoritairement responsables de notre vision scotopique (dans des conditions de faible luminance, tel que la nuit) et sont des acteurs majeurs de la vision périphérique.

Le champs visuel peut être divisé en vision centrale et vision périphérique. La vision centrale (environ 2°) est soutenue par la région rétinienne appelée fovea, comprenant uniquement des cônes. On y observe l'acuité visuelle la plus importante (la région présente les champs récepteurs les plus petits

de la rétine). Cette acuité visuelle diminue avec l'excentricité par rapport à la fovéa (autrement dit, les champs récepteurs visuels grandissent avec cette excentricité ; Werner and Chalupa, 2014).

» Notion de saccades oculaires/Vision d'une cible en périphérie

Lors de l'exploration de son environnement visuel, un agent va en conséquence réaliser des saccades oculaires : mouvements brefs (20-60ms) des globes oculaires (réalisés grâce aux muscles oculomoteurs les encadrant) afin de placer l'image d'une cible (ou sa position prédite dans l'espace) au niveau de la fovéa, permettant ainsi de traiter les informations en provenant avec la plus grande précision possible.

» Cellules parvo/magno -> rôle de la voie magno

L'activité rétinienne est transmise le long des voies nerveuses visuelles jusqu'au cortex visuel, où sera réalisé la majorité du traitement des informations qu'elle supporte.

Entre la rétine et le cortex existe un certain nombre d'étapes, mais tout au long de ces voies, la distribution rétinienne de l'information (la rétinotopie) est conservée.




FIGURE 1.1: Schéma des voies visuelles humaines, de la rétine jusqu'au cortex visuel primaire (adapté de Hofer S. et al., 2010 via Wikimedia Commons [CC BY 3.0])

Dans leurs travaux de 1962 et 1977, Hubel et Wiesel émettent l'hypothèse des courants visuels, qui définit trois voies visuelles naissant dans le **corps genouillé latéral** (LGN, où sont présents les corps des types cellulaires donnant leur nom aux voies) et le **cortex visuel primaire** (V1) : **magnocellulaire** (M), **parvocellulaire** (P) et **koniocellulaire** (K). Chacune supporte le transport d'informations visuelles présentant des caractéristiques distinctes.

L'activité des cellules M ne distingue les couleurs et est sensible à des différences fines de luminance, de contraste et de fréquence spatiale. Ces caractéristiques semblent lier la voie M au traitement de la luminance et des mouvements (Werner and Chalupa, 2014).

» Voie dorsale (voie du "où/where"), rôle dans la localisation de cible

La différenciation des voies visuelles est conservée au delà de V1, et l'on décrit alors deux voies visuelles (communiquant avec des régions cérébrales différentes) : **dorsale** (codant majoritairement pour des informations provenant de la voie M) et **ventrale** (codant majoritairement pour des informations provenant de la voie P). (Werner and Chalupa, 2014)

1.2 Vision artificielle

» Motivations

$$E = mc^2 \tag{1.1}$$

If you don't want a particular equation numbered, use the unnumbered form:

$\backslash[a^{\{2\}}=4 \backslash]$

Bibliography

Werner, John S. and Leo M. Chalupa, eds. (2014). *The new visual neurosciences*. MIT Press, p. 1675. ISBN: 9780262019163.

A Frequently Asked Questions

A.1 How do I change the colors of links?

The color of links can be changed to your liking using:

```
\hypersetup{urlcolor=red}, or
```

```
\hypersetup{citecolor=green}, or
```

```
\hypersetup{allcolor=blue}.
```

If you want to completely hide the links, you can use:

```
\hypersetup{allcolors=.}, or even better:
```

```
\hypersetup{hidelinks}.
```

If you want to have obvious links in the PDF but not the printed text, use:

```
\hypersetup{colorlinks=false}.
```