



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

11. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU VE 16. KDTU GÜNLERİ

 **İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ**
TIP FAKÜLTESİ



11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu ve 16. KDTU Günleri

CERRAHİ VE YAPAY ZEKA
SEMPOZYUMU

CERRAHİNİN DURUMU, GELECEĞİ VE DAHASI...

14-15 MAYIS 2026
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL
KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

KDTU ÖZET KİTAPÇIĞI

Kurullar

Onursal Başkan: Prof. Dr. Nusret AKPOLAT

Başkan: Prof. Dr. Mehmet ASLAN

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KOÇ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd.

Doç. Dr. Azibe YILDIZ
Dönem-I Koordinatörü
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ahmet Kadir ARSLAN
Dönem-II Koordinatörü
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aslıhan METE YILDIRIM
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

KDTU PROGRAMI

PERŞEMBE, 14 Mayıs 2026

Saat	Etkinlik	Salon	Oturum / Jüri
09.30-10.15	Açılış Konuşması	-	-
11.30-12.30	Sözlü Sunumlar SS (1-6)	Mavi Salon	Dr. Elif Seren Tanrıverdi Doç. Dr. Kevser Tanbek
11.30-12.30	Sözlü Sunumlar SS (7-12)	Pembe Salon	Dr. Erkal Gümüşboğa Prof. Dr. Harika Gözde Gözükara Bağ
11.30-12.30	Sözlü Sunumlar SS (13-19)	Turuncu Salon	Dr. Mustafa Safa Pepele Prof. Dr. Engin Burak Selçuk
13.30-14.30	Sözlü Sunumlar SS (20-26)	Mavi Salon	Dr. Tuğrul Çiçek Doç. Dr. Azibe Yıldız
13.30-14.30	Sözlü Sunumlar SS (27-32)	Pembe Salon	Prof. Dr. Halil Düzova Doç. Dr. Ahmet Kadir Arslan
13.30-14.30	Sözlü Sunumlar SS (33-39)	Turuncu Salon	Dr. Necmettin Akpınar Doç. Dr. Yıldız Tütüncü
15.00-17.00	Poster Sunumları PS (1-24)	Fuaye Alanı	Dr. Gökhan Zorlu Dr. Mesut Yılmaz
15.00-17.00	Poster Sunumları PS (25-51)	Fuaye Alanı	Doç. Dr. Okan Aslantürk Dr. Seyhan Ayık

CUMA, 15 Mayıs 2026

Saat	Etkinlik
15.00-15.15	KDTU Birincisi Sunumu
15.30-16.30	Kapanış ve Ödül Töreni

Not: SS = Sözlü Sunum, PS = Poster Sunum

Sunumlar 7 dk sunum + 3 dk soru/cevap şeklinde gerçekleştirilecektir.

BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ (DANIŞMANLAR)

Dr. Abdurrahim BAKIRHAN
Dr. Ahmet Kadir ARSLAN
Dr. Alaadin POLAT
Dr. Aslı TAŞLIDERE
Dr. Aslıhan METE YILDIRIM
Dr. Aymelek ÇETİN
Dr. Ayşe BARAN
Dr. Azibe YILDIZ
Dr. Arzu ÇALIŞKAN DEMİR
Dr. Bedriye DOĞAN
Dr. Bilge ÖZGÖR
Dr. Bora TETİK
Dr. Bulut DURAL
Dr. Burcu KAYHAN TETİK
Dr. Cem ÇANKAYA
Dr. Cemal EKİCİ
Dr. Cihan YETİŞ
Dr. Cuma MERTOĞLU
Dr. Çağatay TAŞKAPAN
Dr. Durmuş Emre KARATOPRAK
Dr. Dursun TÜRKMEN
Dr. Egemen ÇİÇEK
Dr. Emrah ÖZTÜRK
Dr. Elif Damar GÜNGÖR
Dr. Elif YEŞİLADA
Dr. Elif Seren TANRIVERDİ
Dr. Emek GÜLDOĞAN
Dr. Emrah GÜNDÜZ
Dr. Engin Burak SELÇUK
Dr. Ertuğrul KARABULUT
Dr. Erkal GÜMÜŞBOĞA
Dr. Fatma Ebru ALGÜL
Dr. Gökhan ZORLU
Dr. Gülseda BOZ
Dr. Hakan ERTEM
Dr. Hakan PARLAKPINAR
Dr. Halil DÜZOVA
Dr. Harika GÖZÜKARA BAĞ
Dr. Hilal ER ULUBABA
Dr. Hüseyin KOCAASLAN

Dr. Hüseyin Utku ÖZDEŞ
Dr. İbrahim TOPÇU
Dr. İlknur TUNCER FIRAT
Dr. İnanç DOĞAN ÇİÇEK
Dr. Kevser TANBEK
Dr. Leyla BEYTUR
Dr. Lokman Hekim TANRIVERDİ
Dr. Mahmut ŞAHİN
Dr. Mehmet GÜL
Dr. Mehmet Sait KOÇ
Dr. Mehmet ÖNCÜL
Dr. Mehmet ÖZCAN
Dr. Mesut YILMAZ
Dr. Metin Fikret GENÇ
Dr. Mustafa Safa PEPELE
Dr. Necmettin AKPINAR
Dr. Neslihan ALTUNKAYA YAĞCI
Dr. Okan ASLANTÜRK
Dr. Onural ÖZHAN
Dr. Ramazan PAŞAHAN
Dr. Resul ÇİÇEK
Dr. Seda TAŞDEMİR
Dr. Saltuk Buğra KAYA
Dr. Sedat YILDIZ
Dr. Serdar DERYA
Dr. Seyhan AYIK
Dr. Şengül YÜKSEL
Dr. Tayfun GÜLDÜR
Dr. Tuğrul ÇİÇEK
Dr. Tülay YILDIRIM
Dr. Ülkü DEMİR
Dr. Vedat SUBAŞI
Dr. Yasin DALDA
Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ
Dr. Yusuf TÜRKÖZ
Dr. Zeynep ÇELİK
Dr. Zeynep Burçin YILMAZ
Dr. Zeynep KÖYLÜ MIZRAK
Dr. Zekiye KANAT

İçindekiler

KOD	BAŞLIK/SUNUCU	SAYFA
POSTER SUNUMLARI		
PS-01	Kök Hücrenin Tıpta Kullanımı/ <u>Sedanur Behiye Avcı¹</u>	10
PS-02	Hücresel Atık Yönetim Sistemi: Otofaji/ <u>Abdulkadir Gül</u>	11
PS-03	Histolojik Teknik Ile Pankreas Preparatları Hazırlanması Ve Işık Mikroskopik İnceleme / <u>¹Hüseyin Kaan Efeoğlu</u>	12
PS-04	Kolorektal Kansere Nedeniyle Ameliyat Yapılan Hastalarda Kan Grubu Sağkalımı Etkiliyor Mu?/ <u>Emirhan Vatan Tatlı</u>	13
PS-05	Mrna Aşılarının Kansere Tedavisinde Kullanımı /Zelal Kaplan	14
PS-06	Ergenlerde Zorbalık Ve Siber Zorbalığın Demografik Değişkenlerle İlişkisi /Arda Hüseyin Çiçek	15
PS-07	Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yapay Zekâ Destekli Cilt Lezyonu Tanı Sistemlerine Güven Düzeyi /Asrın İlhan Çitil	16
PS-08	Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Beslenme Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi /Mustafa Can Dumlupınar	17
PS-09	İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencilerinde Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi /Muhammed Mustafa Çolak	18
PS-10	Ylang Ylang Uçucu Yağının Meme Kanseri Hücre Hattı (MCF-7) Üzerindeki Antikanser Etkisinin Cisplatin Ile Karşılaştırılması /Aykut Buğra Demir	19
PS-11	Sessiz Büyüyen Tehlike: Antibiyotik Direnci /Adem Atay Katipoğlu	20
PS-12	Serbest Radikallerin Fizyolojik İşlevlerden Patolojik Hasara Çift Yönlü Rolü/ <u>Ozan Okşar</u>	21
PS-13	Gastroözofageal Reflü Hastalığında On-Demand “Lüzum Halinde” Tedavi Stratejisinin Plasebo Ile Karşılaştırılması / <u>Muhammed Mert Can</u>	22
PS-14	Magnezyum Takviyeleri: Doğru Mu Kullanıyoruz? / <u>Ayşe İrmak Millioğulları</u>	23
PS-15	Malatya İlinde Tıp Iı Diyabet Sıklığı Ve Bu Sıklığı Etkileyen Sosyodemografik Ve Yaşam Tarzı Faktörlerinin Değerlendirilmesi / <u>Arda DURAN</u>	24
PS-16	Monosodyum Glutamat İnsan Sağlığına Yararlı Mı, Zararlı Mıdır? / <u>Ukkase Enes Çoban</u>	25
PS-17	İnsektisit Olarak Kullanılan Alüminyum Fosfit Ve Ürünü Fosfin Gazı İnsanı Nasıl Zehirler?/ <u>Elif Sude İPEK</u>	26
PS-18	Mantar Zehirlenmesinin Mekanizması Ve Antidot Geliştirme Çalışmaları/ <u>Ahmet Tuna CEYLAN</u>	27
PS-19	Yoga Ve Meditasyon Demansı Önler Mi?/ <u>Fatma YILDIZ</u>	28
PS-20	Lipidomik Klinikte Derman Olabilir Mi ? Tek Testte Bütünü Görmek / Aysun AYDIN	29
PS-21	Türkiye’deki Özel Tıp Fakültelerinin Kontenjan, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Gibi Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması / M.Recep Dağdeviren	30
PS-22	Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesi Ve Başarı Durumunun İlişkisi / <u>Serkan Şakalar</u>	31
PS-23	Tıp Eğitiminde Yapay Zeka: Öğrenci Perspektifinden Bir Anlatısal Derleme/ <u>Hivda Dağkiran Reyryan Padak</u>	32
PS-24	Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Radyasyon Üzerine Farkındalığı/ <u>Elif Sude Akbulut</u>	33
PS-25	Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Üfürüm Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi / <u>Dilay Şen</u>	34
PS-26	Metalik Yabancı Cisimlerin Çıkarılmasında Mıknatısların Etkinliği/ <u>Nisanur Işık</u>	35
PS-27	Annelerin Aşılarla Yönelik Tutumları Ve Aşı Tereddüdüne Etki Eden Faktörler/Mina Altay	36
PS-28	Kanıta Dayalı Tıp Uygulaması Ve İzlenecek Yol Haritası	37
PS-29	Hastanemizde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarındaki Kuru Göz Sıklığı / <u>İlayda Atlıhan</u>	38
PS-30	Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ekran Sürelerinin İncelenmesi Ve Sonuçları/ <u>Rumet BEKİL</u>	39

PS-31	Sosyal Medya Kullanımının Ebeveynlerin Aşı Tutumları Üzerindeki Etkisi: İnfodemi Ve Dijital Dezenformasyonun Kesitsel Analizi/ <u>Faruk Ensar Yurter</u>	40
PS-32	Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kafein Kullanım Alışkanlıkları Ve Bilimsel Sağlık Bilgisi Farkındalığı / <u>Nehir Fahrioğulları</u>	41
PS-33	Deprem, Konaklama Ve Tıp Eğitimi/ <u>Elanur Demirhan</u>	42
PS-34	Burun Estetiğinin (Rinoplasti) Bireylerin Öz güven Ve Sosyal Algı Üzerine Etkisi / <u>Merve Naz Göksin</u>	43
PS-35	Elektronik Sigara: Bağımlılığın Yeni Yüzü / <u>Mert BURULDAY</u>	44
PS-36	Yapay Zekâyı Tanı Aracı Olarak Kullanan Hastaların Memnuniyet Düzeyi Ve Hekime Başvuru Davranışına Etkisi / <u>Fatih Fidan</u>	45
PS-37	MELAS Sendromunda Güncel Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları: Klinik Bulgular Ve Moleküler Temelin Kanıta Dayalı Analizi / <u>Betül Kayaduman</u>	46
PS-38	İnsan Bedeninde Umudun Ve Korkunun Savaşı: Zihnin Bedeni Yönlendirme Gücü/ <u>Osman Ünal</u>	47
PS-39	Ankilozan Spondilit Düşünülen Olgularda <i>HLA-B27</i> Alelinin Sıklığı/ <u>Ahmet Ferit Elmastaş</u>	48
PS-40	Kalp Hızı Değişkenliğinin Stres Araştırmalarında Kullanımı/ <u>Yusuf Ziya Yanardağ</u>	49
PS-41	Tıp Eğitiminde Hipnoz Uygulamalarının Etkisi: Derleme / <u>Arda Varlı</u>	50
PS-42	Akut Apandisit Şüphesinde Ultrasonografi Öncelikli Strateji: Gereksiz Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı, Radyasyon Yüğü Ve Sağlık Hizmeti Maliyetlerinin Değerlendirilmesi / <u>İpek Ergün</u>	51
PS-43	Klasik Otopside Kullanılan Temel İnceleme Teknikleri / <u>Zehra Zehir</u>	52
PS-44	Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Otopsi Hakkında Bilgi Ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi / <u>İlgın KULAK</u>	53
PS-45	İNönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğrencilerinde Kahve Tüketiminin Uyku Ve Çalışma Düzenine Etkileri/ <u>Elif Merve Atasoy</u>	54
PS-46	İnsan Vücudunda Çizgili Kas Varyasyonları Ve Klinik Önemi/ <u>Sedef Köksal</u>	55
PS-47	Tıp Fakültesi Dönem I Ve Dönem II Öğrencilerinde Bel/Basen Oranı Ve Sporla İlişkisi / <u>Yusuf Özdemir</u>	56
PS-48	Uzun Süreli Travmanın Epigenetik Üzerindeki Etkileri/ <u>Amuac Soaan</u>	57
PS-49	Kaygı Ve Depresyonda Bağırsak Mikrobiyotası/ <u>Mehmet Berat Doğan</u>	58
PS 50	Sirkadiyen ritim ve ilaç metabolizması: Kronofarmakolojik yaklaşım / <u>Cemal Tarık Demirtaş</u>	59
PS-51	Kanser araştırmalarında plasebo kontrollü klinik çalışmaların rolü ve etkinliği/ <u>İkra Su Özcan</u>	60

SÖZLÜ SUNUMLAR

SS-1	V B12 Tanı, Eksiklik Ve Tedavi Güncel Kanıtlar Işığında Klinik Yaklaşım/ <u>Muhammed Faruk Alavi</u>	62
SS-2	Preoperatif Açlık Süresi Ve Aspirasyon Riski/ <u>Hüseyin Murat İspir</u>	63
SS-3	Ulusal Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Annelerin Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi/ <u>Münevver Savrun</u>	64
SS-4	Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sosyal Medya Platformlarının Dermokozmetik Ürün Seçimleri Üzerine Etkisi / <u>Buse Ecem Kokuş</u>	65
SS-5	Skolyoz tedavisinde fizyoterapinin rolü/ <u>Emre Bozan</u>	66
SS-6	Yapay Zekanın Sağlık Tercihlerine Etkisi/ <u>Hüseyin YARDIMCI</u>	67
SS-7	Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yapay Zekaya Bakışı: Kesitsel Bir Çalışma/ <u>İrem Toptaş</u>	68
SS-8	Onkolojik Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Gastrointestinal Semptomların Değerlendirilmesi: Cerrahi Tıp Ve Mesleki Faktörlerin Etkisi / <u>Hacı Bayram AKDOĞAN</u>	69
SS-9	Üniversite Öğrencilerinde Miyopi İlerlemesine Neden Olan Faktörlerin Sıklığı/ <u>Özgür Deniz Sevim</u>	70

SS-10	Glokomda Topikal Tedavi Yüğü Ve Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi / Birhat Taşkın	71
SS-11	İntravitreal Enjeksiyon Uygulanan Diyabetik Retinopati Ve Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastalarının Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi /Mücahit Demirdelen	72
SS-12	Kuru Göz/ <u>Elif Gaye KAYA</u>	73
SS-13	Persistan hipotansiyon ile seyreden atipik feokromositoma ve yeni bir NF1 frameshift mutasyonu: olgu sunumu / <u>Zeynep Özer/ Begüm Dağlı</u>	74
SS-14	Pankreas Kanseri: Epidemiyoloji, Moleküler Patogenez, Güncel Tanı Ve Tedavi Yaklaşımlarının Derlemesi / Mert Ali Mandollu	75
SS-15	Akut Periferik Arteriyel Emboli Nedeniyle Embolektomi Uygulanan Hastaların Klinik Özellikleri Ve Erken Dönem Sonuçları: Tek Merkez Retrospektif Olgu Serisi / <u>Helin Kılıç</u>	76
SS-16	Tıp Fakültesi Dönem 1 Ve Dönem 2 Öğrencilerinin Epilepsi Farkındalığı /Perihan İnce	77
SS-17	Yeni Tanı Prostat Kanseri Hastalarında Ga-68 PSMA PET/BT Tutulumu İle Gleason Skoru Ve Serum Total PSA Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / <u>Fatma Ünal/ Damla Karademir</u>	78
SS-18	Büyük Dil Modellerinin Tıp Eğitimi Sınavlarındaki Performansı, Tek Merkez Kesitsel Çalışma/ <u>Muhammed Enes Avlamaz</u>	79
SS-19	Merkezimizde son bir yılda radyoterapi uygulanan geriatrik kanser hastalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi/ <u>Eylül Boz</u>	80
SS-20	Tıp Öğrencilerinde Pnömotoraks Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi/Murat Sarp Uraz	81
SS-21	Sosyodemografik Faktörler Ve Kabul-Eylem Modeli Üzerine Bir Kesitsel Çalışma: Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Psikolojik Esnekliğin Sınav Kaygısı Üzerine Etkileri/ Efe Erdemir	82
SS-22	Tüm Ekzon Analizi Yapılan Bir Hastanın Varyantlarının Değerlendirilmesi/Yusuf Cankurt	83
SS-23	Klinik Öncesi Tıp Öğrencilerinde Grup A Streptokok Prevelansının Araştırılması/ <u>Kevser Taşdemir</u>	84
SS-24	Tıp Öğrencilerinin Yapay Zeka Dil Modellerinin Kullanımı Ve Etkileri/ <u>Ali Buğra Kılınc</u>	85
SS-25	Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Böbrek Taşı Risk Faktörleri Ve Yaşam Tarzı Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi/ Selim Yiğit Karakuş	86
SS-26	Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İdrar Yolu Enfeksiyonu Sıklığı, Semptomları Ve İlişkili Davranışsal Faktörlerin Değerlendirilmesi/ Hatice İrem Toprak	87
SS-27	Cinsel Sağlık Bilgi Ve Tutumlarının Tıp Öğrencilerinde Değerlendirilmesi: Akademik İlerleme Ve Klinik Maruziyetin Etkisi/ <u>Ahmet Arif Güler</u>	88
SS-28	Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Bilgi Düzeyi Ve Stigma Algılarının Değerlendirilmesi/Abdurrahman Yunus Biri	89
SS-29	Sağlık Çalışanlarında Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) Hastalığı Ve RSV Aşısına Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranışların Değerlendirilmesi / <u>Anıl Çağlar Dursun</u>	90
SS-30	Üçüncü Basamak Merkezlerde Bel Ağrısı: Cerrahi Ve Konservatif Tedavi Oranları/ Arda KARADAŞ	91
SS-31	Subdural Hematomlu Hastaların Demografik Özellikleri Ve Klinik Seyirlerinin Değerlendirilmesi/ Zeynep Tekedereli	92
SS-32	2021–2026 Yılları Arasında Anevrizmal Subaraknoid Kanamalı Hastaların Epidemiyolojik Bulguları / <u>Nehir KARTAL</u>	93
SS-33	Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Serum Demir, Demir Bağlama Kapasitesi Ferritin Ve RDW Düzeyleri / <u>Büşra Yıldırım</u>	94
SS-34	Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığında Aterosklerotik Riskin Belirlenmesinde Aterojenik Plazma İndeksinin Yeri/ Cemil Mungan	95

SS-35	Organ Nakli Sonrası Yaşamda En Belirgin Değişim Alanlarının Değerlendirilmesi/ <u>Berfin Çeliköz</u>	96
SS-36	Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Otizm Spektrumunun Araştırılması/ <u>Alper Semi İnce</u>	97
SS-37	Polikistik Over Sendromu (PKOS) Hastası Kadınlarda Yeme Bozukluğu Ölçümü/ <u>Elif Coşkun</u>	98
SS-38	Kronik Çözünebilir Kahve Tüketiminin Sıçanlarda Bilişsel Fonksiyonlar, Anksiyete Benzeri Davranışlar Ve Nörotrofik Faktörler Üzerindeki Doz-Cevap İlişkisinin İncelenmesi / <u>Sare Yön</u>	99
SS-39	Steril Eldiven Takma Eğitim Videolarının Niteliksel Analizi Ve Teknik Yeterliliği	100

POSTER SUNUMLARI

PS 1 – PS 51

PS-01

Kök hücrenin tıpta kullanımı

Emre Polat¹, Mahmut Karşıt¹, İlhan Darıcı¹, Omar Adra¹, Sedanur Behiye Avcı¹, Cemre Erden¹,
Muhammed Elmuhtdi Elnesir¹, Aslı Taşlıdere²

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1, Malatya

²İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Embriyoloji ve Histoloji AD, Malatya

Özet

Hazırlamış olduğumuz "**Kök Hücrenin Tıpta Kullanımı**" başlıklı poster çalışmamız kök hücrenin rejeneratif tıpta ve hücrel tedavilerde kullanımına ilişkin güncel gelişmeleri ele almaktadır.

Çalışmamızda, kök hücrelerin temel biyolojik özellikleri olan "kendini yenileme" ve "farklılaşma" yeteneklerinden yola çıkılarak; güncel tıpta devrim yaratan şu başlıklar detaylandırılmıştır:

- **CAR-T ve CAR-iNK Hücre Teknolojileri:** Kanser immünoterapisinde kişiselleştirilmiş "akıllı hücre" uygulamaları ve dünyadaki en güncel klinik başarılar (Prof. Wang Jinyong, 2026 çalışmaları dahil).
- **Rejeneratif Uygulamalar:** Osaka Üniversitesi'nin 3D biyo-iskele yöntemleri ve Spina Bifida gibi konjenital anomalilerde kök hücrenin iyileştirici rolü.
- **Kişiselleştirilmiş Tıp ve Organoidler:** Pekin Üniversitesi'nin Tip 1 Diyabet üzerindeki CIPSC başarıları ve ilaç geliştirme süreçlerinde organoid teknolojisinin yeri.
- **Türkiye'deki Mevcut Durum:** TÜRKÖK aracılığıyla yürütülen kök hücre bağış süreçleri, yerel başarılar ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik akademik çıkarımlar.

Bu çalışma, modern tıbbın geleceği olan hücrel tedavilerin kapsamını akademik bir perspektifle sunmayı ve tıp literatüründeki en son (2024-2026) verileri sentezleyerek farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Kök hücre, Kanser, Organoid, Konjenital anomali, CAR-T, CAR-iNK.

PS 2

Hücrel atık yönetim sistemi: Otofaji

Abdulkadir Gül, Başar Eren Atabay, Hasan Kerim Eraslan, Miraç Atmış, Ömer Faruk Özbey, Sultan Ayvalı, Sümeyye Görgün, Yahya Kocakaya

İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

abdulkadir.44gul@gmail.com

Hücrelerin kendi iç bileşenlerini parçalayarak geri dönüştürdüğü katabolik bir süreç olan otofaji hücrel atık yönetiminde kritik bir rol oynar. Bu mekanizma sayesinde hasar görmüş organeller, yanlış katlanmış proteinler ve işlevini yitirmiş diğer makromoleküller lizozomlar aracılığıyla parçalanır. Böylece hücre içinde biriken atıkların temizlenmesi sağlanır ve hücrel denge korunur. Bunun yanı sıra otofaji, hücrenin stres koşullarına uyum sağlamasına da yardımcı olur. Açlık, oksidatif stres, DNA hasarı, endoplazmik retikulum stresi, hipoksi gibi durumlarda hücre, otofaji yoluyla kendi kaynaklarını yeniden kullanarak enerji üretir ve hayatta kalma şansını artırır.

Otofaji, başlıca makrotofaji, mikrotofoji ve şaperon aracılı otofaji olmak üzere üç ana alt tipe ayrılmaktadır. Makrotofaji, çift membranlı otofagozomların oluşumu ve lizozomlarla füzyonu yoluyla gerçekleştiği için en iyi tanımlanmış formdur.

Makrotofaji süreci, otofajiyile ilişkili proteinlerin koordineli aktivasyonu ile başlatılır. Sitoplazmik materyal, izolasyon membranı tarafından çevrelenerek otofagozom oluşturulur; ardından bu yapı lizozomla birleşerek otofagolizozomu meydana getirir ve içerik hidrolitik enzimler aracılığıyla parçalanır. Bu yıkım sonucunda ortaya çıkan amino asitler, yağ asitleri ve nükleotitler tekrar hücrel metabolizmaya kazandırılır.

Otofajinin düzenlenmesi, hücrelerin enerji durumu, besin varlığı ve stres koşullarına duyarlı olan mTORC1 ve AMPK gibi sinyal yolları tarafından kontrol edilir. Besin varlığında mTORC1 otofajiyi baskımlarken, açlık veya enerji stresinde AMPK aktivasyonu otofajiyi indükler. Bu dinamik regülasyon, hücrenin hem enerji homeostazını korumasını hem de potansiyel olarak toksik hücrel atıkların birikimini engellemesini sağlar.

Otofajik aktivitenin bozulması, hücrel atıkların birikimine ve proteostatik dengenin kaybına yol açarak hastalıkların gelişimine zemin hazırlayabilir. Özellikle nörodejeneratif hastalıklar, kanser ve metabolik bozukluklar, otofajinin yetersiz çalışmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, otofajinin modülasyonu, çeşitli hastalıklar için potansiyel bir terapötik hedeftir.

Sonuç olarak otofaji, hücrel atık yönetiminin merkezinde yer alan bir mekanizmadır. Hücre içi homeostazın sürdürülmesini sağlayarak zararlı bileşenlerin birikimini etkin biçimde engeller ve hücrenin değişen çevresel koşullara uyum kapasitesini artırır. Bu çok yönlü işleviyle otofaji, yalnızca bir “temizlik” mekanizması değil, aynı zamanda hücrenin adaptasyon ve savunma sisteminin de önemli bir parçasıdır.

Anahtar kelimeler: Homeostaz, hücre yenilenmesi, otofaji

PS 3

Histolojik teknik ile pankreas preparatları hazırlanması ve ışık mikroskopik inceleme

¹Yavuz SelimAytaç, ¹Ece Naz Şarklı, ¹Ahmet Ejder, ¹Hüseyin Kaan Efeoglu, ¹Berat Alçiçek, ¹Methan Zafer, ¹Muhammed Nur Acar, ¹Kerem Kalkan, ¹Abdullah Aziz Yıldızlı, ²Mehmet Gül

¹ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I, Malatya, ² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ab.D., Malatya

huseyinkaaneoglu@gmail.com

Biyopsi veya otopsi yöntemi ile alınan doku ve organ örneklerinin yapısal özelliklerinin mikroskop ile inceleyebilmek için histolojik doku takip, kesit ve boyama yöntemlerinin uygulanması gerekir. Uygulanan bu işlemlerin tamamına histolojik teknik adı verilir. İncelenen pankreas dokusu örnekleri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yürütülmekte olan deney sonunda dekapite edilmiş ve herhangi bir ilaç uygulanmamış kontrol grubu sıçanlardan alınmıştır. Alınan doku örnekleri %10 formaldehit içinde 48 saat +4 °C’de fiksasyon işlemine tabii tutuldu. Sonrasında doku örnekleri etil alkol (%50-%99,9), ksilen ve erimiş parafin (62 °C) serilerinden geçirilerek parafin bloklar içerisine gömüldü. Parafin bloklardan mikrotom ile 6 µm kalınlığında kesitler alınarak lamalar üzerine yerleştirildi. Kesitler Hematoksilen-Eosin ile boyandıktan sonra lamel ile kapatıldı. Hazırlanan kesitler Nikon Eclipse Ni-U mikroskop; DS-Fi3 kamera ve NIS-Elements Documentation 5.02 görüntü analiz sistemi (Nikon Corp., Tokyo, Japan) ile incelenerek x10, x20, x40 ve x100 objektif büyütmelede fotoğraflar alındı. Işık mikroskopik olarak incelenen pankreas kesitlerinde ekzokrin pankreas ve endokrin pankreas alanları normal histolojik yapıda izlendi. Ekzokrin pankreas alanlarında seröz asinuslar ve kanal yapıları olağan görünümde değerlendirildi. Endokrin pankreas Langerhans adacıklarında endokrin hücre kordonları ve kapiller yapılar normal histolojik yapıda izlendi.

Anahtar Kelimeler: Histoloji, Ekzokrin pankreas, Endokrin pankreas

PS 4

KOLOREKTAL KANSER NEDENİYLE AMELİYAT YAPILAN HASTALARDA KAN GRUBU SAĞKALIMI ETKİLİYOR MU?

Emirhan Vatan Tatlı, Rukiye Köse, Büşra Renk, Ebubekir Kızılgül, Sümeyra Selin Kolcu, Fatih Kaan Ercan, Özgür Kızır, Furkan Erdem, Ozan Küçük

Danışman Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kocaaslan

huseyinkocaaslan@gmail.com

ÖZET

GİRİŞ

Kolorektal kanser dünya genelinde morbidite ve mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Tümörün yerleşimine göre yapılan ameliyat tedavide ana basamağı oluşturmaktadır. Kan grupları mide kanseri gibi bazı hastalıklarda etyolojide sorumlu tutulabilmektedir. Çalışmamızın amacı kolorektal kanser nedeniyle ameliyat yapılan hastalarda kan grubunun sağ kalım üzerindeki etkisini araştırmaktır.

MATERYAL VE METOT

Kliniğimizde 2014-2022 yılları arasında kolorektal kanser nedeniyle ameliyat yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların verilerine hastane bilgisayar sisteminden ulaşıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, ameliyat şekli, mortalite durumları, yatış süreleri kayıt altına alındı. İstatistiksel hesaplamalar SPSS programı ile yapıldı ve $p<0,05$ anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

SONUÇ

Kolorektal kanserli hastalarda cerrahi tedavi hastanın sağkalımını artırmaktadır. Kan grubunun sağ kalım üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Daha geniş hasta gruplarıyla yapılacak çalışmalarla bu etki daha net olarak ortaya konulabilir.

Anahtar kelimeler: kolorektal kanser, cerrahi, kan grubu

PS 5

mRNA Aşılarının Kansere Tedavisinde Kullanımı

Zelal Kaplan*, Mehmet Fatih Sağlam, Veysi Savar, Sultan Muratakan, Muhammed Muhammed, Abdijabar Abdullahi Mahad, Berat Sefa Uçar, Muhammed Aslan Avcı

İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1, Malatya

*zelalkpln02@gmail.com

Danışman: Prof. Dr. Şengül Yüksel

Özet:

Kanser tedavisinde kullanılan mRNA aşıları, hastaya özgü tümör neoantijenlerini hedef alacak şekilde tasarlanan yenilikçi immünoterapi yaklaşımlarıdır. Bugüne kadar pek çok kanser türünde klinik iyileştirici potansiyelleri gösterilmiştir. Bu umut verici gelişmelere rağmen, özellikle etkili uygulama ve bağışıklık tepkisinin hassas düzenlenme mekanizmaları konusunda önemli zorluklar devam etmektedir. Bu çalışmada, mRNA kanser aşılarının sentezi ve etki mekanizmalarının yanı sıra ve kanser immünoterapisindeki potansiyel uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca mRNA aşı teknolojisinin mevcut durumunun yanı sıra ana akım bir tedavi seçeneği olarak geliştirilmesi ve uygulanması konusunda olası stratejiler de tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mRNA aşıları, kanser, İmmünoterapi

PS 6

Ergenlerde Zorbalık ve Siber Zorbalığın Demografik Değişkenlerle İlişkisi

Arda Hüseyin Çiçek¹, Enes Tolan¹, Nihal Turaç¹, Meriç Ece Çalışkan¹, Abdurrahman Efe Nalçacı¹, Canan Yıldırım¹, Arda Öztürkoğlu¹, Alper Altar Durmuş¹, Hafsa İpek Özhan¹, Arzu Çalışkan Demir²

arzu.demir@inonu.edu.tr

¹ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

² İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Malatya

Zorbalık ve siber zorbalık, günümüzde ergenler arasında yaygın olarak gözlemlenen önemli psikososyal sorunlar arasında yer almaktadır. Özellikle dijital teknolojilerin ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, zorbalık davranışları geleneksel ortamlardan çevrimiçi platformlara taşınmış ve daha geniş bir etki alanı kazanmıştır. Yapılan araştırmalar, hem yüz yüze zorbalık hem de siber zorbalığın farklı yaş gruplarında belirli oranlarda görüldüğünü ve bu davranışların giderek artan bir sıklıkta rapor edildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, zorbalık ve siber zorbalığın bireylerin psikolojik iyi oluşu, akademik başarısı ve sosyal ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilen yaygın bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Bu çalışma, ergenlerde zorbalık ve siber zorbalık davranışlarının çeşitli demografik değişkenlerle ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 14-18 yaş aralığında toplam 140 katılımcı ile gerçekleştirilmiş, katılımcıların zorbalık ve siber zorbalık düzeyleri; yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyoekonomik durum gibi demografik özellikler açısından değerlendirilmiştir. Veriler, geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanılarak toplanmış ve istatistiksel analiz yöntemleri ile incelenmiştir.

Bulgular, ergenler arasında hem geleneksel zorbalık hem de siber zorbalık davranışlarının belirli demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterebildiğini ortaya koymuştur. Özellikle yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik durumun zorbalık davranışlarının sıklığı ve biçimi üzerinde etkili olabileceği saptanmıştır.

Çalışma sonuçları, ergenlerde zorbalık ve siber zorbalığın çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ve bireysel farklılıkların bu davranışların ortaya çıkışında önemli rol oynadığını göstermektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, okullarda önleyici ve müdahale edici programların geliştirilmesinde demografik faktörlerin dikkate alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, eğitimciler, aileler ve politika yapıcılar için yol gösterici öneriler sunulabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler: ergen, zorbalık, siber zorbalık, yaş, cinsiyet

PS7

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yapay Zekâ Destekli Cilt Lezyonu Tanı Sistemlerine Güven Düzeyi

Asrın İlhan Çitil¹, Enes Bilici¹, Kerem Ören¹, Kerem Yıldırım¹, Mehmet Akif Durgun¹, Münir Doğan Eğinli¹, Yasin Karagöz¹, Zehra Aslan¹, Dursun Türkmen²

¹ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Malatya, Türkiye

² İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç : Yapay zekâ (YZ) destekli deri lezyonu tanı sistemleri dermatoloji pratiğinde giderek daha fazla yer almaktadır. Ancak bu sistemlerin klinik uygulamaya etkili biçimde entegre edilebilmesi, yalnızca tanısal performanslarına değil, aynı zamanda sistemlere duyulan güvene de bağlıdır. Tıp öğrencileri, gelecekte klinik pratikte bu teknolojileri kullanacak olmaları nedeniyle, YZ destekli sistemlere duyulan güvenin değerlendirilmesi açısından önemli bir grubu oluşturmaktadır. Bu çalışma, tıp fakültesi öğrencilerinin YZ destekli cilt lezyonu tanı sistemlerine yönelik güven düzeylerini ve bu güveni etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Bu kesitsel, web tabanlı anket çalışmasına İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 182 tıp öğrencisi dahil edildi. Anket kapsamında katılımcıların demografik özellikleri, önceki YZ deneyimleri, YZ destekli deri lezyonu değerlendirmesine ilişkin tutumları ve melanoma ile seboreik keratoz görselleri üzerinden yaptıkları görsel temelli güven değerlendirmeleri incelendi. Birincil sonlanım ölçütü olarak altı maddeden oluşan bileşik bir güven skoru hesaplandı. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirildi. Grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri, korelasyon analizlerinde Spearman rho testi, aynı katılımcıların iki görsele verdikleri yanıtların karşılaştırılmasında Wilcoxon işaretli sıralar testi ve bağımsız belirleyicilerin değerlendirilmesinde çok değişkenli doğrusal regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.94±2.44 yıl olup %53.8'i kadındı. Güven ölçeği iyi düzeyde iç tutarlılık gösterdi (Cronbach alfa=0.794). Ortalama güven skoru 3.24±0.65 olarak bulundu ve bu sonuç, YZ destekli sistemlere yönelik güvenin orta düzeyde olduğunu gösterdi. Güven düzeyi; yaş, cinsiyet, sınıf, dermatoloji stajı yapmış olma ve katılımcıların kendi bildirdikleri YZ bilgi düzeyi ile anlamlı ilişki göstermedi. Buna karşılık, sağlık alanında YZ uygulamalarını daha önce kullanmış olmak (p=0.006) ve YZ tabanlı deri lezyonu değerlendirme uygulamalarından önceden haberdar olmak (p=0.020), daha yüksek güven düzeyi ile bağımsız olarak ilişkili bulundu. Güven düzeyi iki farklı lezyon görseli arasında anlamlı farklılık gösterdi ve seboreik keratoz görseline yönelik güven daha düşüktü (p<0.001). Buna karşın, tıbbi değerlendirme gereksinimine ilişkin algı iki görsel arasında farklı değildi (p=0.609).

Sonuç: Tıp öğrencilerinin YZ destekli deri lezyonu tanı sistemlerine duyduğu güvenin orta düzeyde, deneyimden etkilenen ve bağlama göre değişen bir özellik taşıdığı görüldü. Resmî tıp eğitiminin düzeyinden çok, önceki YZ deneyiminin daha yüksek güven ile ilişkili olduğu saptandı. Bu bulgular, tıp eğitiminde yapay zekâ okuryazarlığının artırılmasının ve öğrencilerin YZ tabanlı klinik karar destek sistemleriyle erken dönemde tanıştırılmasının önemini ortaya koymaktadır.

PS 8

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Beslenme Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mustafa Can Dumlupınar^{*1}, Engin Fırat Yaylagül¹, Abdullah Yıldırım¹, Gülağa Mert Kılıç¹, Hayrunnisa Karakuş¹, Efe Şanlı¹, Kerem Tahtalı¹, Yasin Yolcu¹, Ahmet Kağan Kavak¹, Harika Gözükara Bağ¹

^{*1}İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya
01250102015@ogr.inonu.edu.tr

Özet

Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar, tükettiğimiz besinlerin beyin kimyamızı doğrudan etkileyerek serotonin, dopamin gibi mutluluk hormonlarının seviyesini belirleyerek duygu durumumuzu etkileyebileceğini göstermektedir. Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I-II ve III öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Kesitsel tasarımda yürütülen çalışmamızda, Türkçe geçerliği ve güvenilirliği Demir ve Cicioğlu (2019) tarafından yapılmış 5'li likert tipinde 21 maddeden oluşan sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin; Beslenme Hakkında Bilgi (BHB), Beslenmeye Yönelik Duygu (BYD), Olumlu Beslenme (OB) ve Kötü Beslenme (KB) olmak üzere 4 alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin tamamı için en düşük puan 21, en yüksek puan 105'dir. 21 puan çok düşük, 22-42 puan düşük, 43-63 puan orta, 64-84 puan yüksek ve 85 ve üzeri ideal düzeyde sağlıklı beslenmeye ilişkin tutuma sahip olduğunu gösterir. Öğrencilerin mutluluk düzeyinin belirlenmesi için Türkçe geçerliği ve güvenilirliği, Doğan ve Akıncı Çötök (2011) tarafından yapılmış 7 maddeli 5'li likert tipindeki Oxford mutluluk ölçeği kısa formu kullanılmıştır. Ölçek tek boyutlu olup puanı 7-35 arasında değişmektedir. Yüksek puan yüksek mutluluk düzeyini göstermektedir.

Bulgular: Çalışmaya katılan 146 öğrencinin 78'i (%53,4) erkek, 68'i (%46,6) kadın olup yaş aralığı 17-24'tür. Sağlıklı beslenmeye ilişkin toplam ölçek puanı [medyan=72 (38-94)] ile toplam mutluluk puanı [medyan=22 (11-35)] arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve zayıf düzeyde bir ilişki saptanmıştır ($r_s = 0.19$, $p=0.022$). Sağlıklı beslenme ölçek puanı sınıflandırılarak dikkate alındığında ise düşük+orta düzeyde tutum gösterenlerin mutluluk puanının [$n=19$, medyan=18 (11-35)], yüksek [$n=116$, medyan=22 (11-30)] ve ideal düzeyde tutum gösterenlere [$n=11$, medyan=23 (16-27)] göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmüştür ($p<0,05$). Mutluluk ölçek puanı öğrencilerin cinsiyetine, ailesinin gelir durumuna, nerede yaşadığına ve düzenli spor yapma durumuna göre karşılaştırıldığında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, sağlıklı beslenme tutumu ile mutluluk düzeyini kestirmek değil, aralarındaki ilişki düzeyini belirlemek amaçlanmış ve pozitif yönde zayıf bir korelasyon elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Tıp fakültesi, öğrenci, sağlıklı beslenme tutumu, mutluluk

PS 9

**İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2025–2026 eğitim-öğretim yılı öğrencilerinde
depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi**

Ayşe Begüm TÜDÜN¹, Bahar KAPLAN¹, Elif Sude TÜRKER¹, Mehmet Şahin YİĞİT¹,
Mehmet TİMÜR¹, Mert ASLAN¹, Muhammet Mustafa ÇOLAK^{*1}, Şeyda Gül ÇETİN¹,
Yağmur GÜLEÇ¹, Emek GÜLDOĞAN²

¹İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Malatya

²İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya

*01250102019@ogr.inonu.edu.tr

Özet

Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde depresyon düzeylerini ve bunu etkileyen demografik ve akademik faktörleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik bir soru formu ile Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılmıştır. Araştırmaya toplamda 181 öğrenci dahil edilmiş; bunların 99'u (%54,7) kadın, 82'si (%45,3) erkektir. Yaş ortalaması $20,5 \pm 1,5$ yıl (18–24 yıl arasında) olarak belirlenmiştir. Dönem dağılımı incelendiğinde, dönem 1'den 53 (%29,3), dönem 2'den 69 (%38,1) ve dönem 3'den 59 (%32,6) öğrencinin katıldığı görülmektedir. Öğrencilerin BDE toplam puanı ortalaması $15,14 \pm 9,31$ (ortanca: 13,0; aralık: 0–51) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %27,6'sı minimal, %35,9'u hafif, %30,4'ü orta ve %6,1'i şiddetli depresyon belirtisi göstermiştir; klinik eşik değerin (BDE ≥ 10) üzerinde kalma oranı %72,4 olarak bulunmuştur. Bölüme isteyerek gelme, okul başarısı, okul yaşamından memnuniyet, vücut ağırlığından memnuniyet, arkadaş sayısı ve kronik hastalık varlığı ile BDE puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur ($p < 0,05$). Cinsiyet, aile tipi, gelir düzeyi, ebeveyn eğitim durumu, yaşamın geçtiği yer, sigara içme, arkadaş grubu varlığı, şu an yaşadığı yer ve boy uzunluğundan memnuniyet ile depresyon puanları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon yaygınlığı dikkat çekici düzeydedir. Akademik motivasyon, okul yaşamı memnuniyeti ve sosyal destek ağının genişliği, ruh sağlığının temel belirleyicileri olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Beck Depresyon Envanteri, tıp fakültesi öğrencileri, ruh sağlığı, üniversite öğrencileri

PS 10

Ylang Ylang Uçucu Yağının Meme Kanseri Hücre Hattı (MCF-7) Üzerindeki Antikanser Etkisinin Cisplatin ile Karşılaştırılması

Aykut Buğra DEMİR^{*1}, Ayşe Gökçen TÜDÜN¹, Ayşegül ÖZBAY¹, Beyza FIRAT¹, Ceren TÜRKMEN¹, Kadir Efe DEMİR¹, Neslihan GÜNBEYİ¹, Tuna Berk AKSAKAL¹, Zeynep Sezin KAYGUSUZ¹

*

¹Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: 01250102029@ogr.inonu.edu.tr

Danışman: Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR

Özet

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerindendir. Meme kanseri tedavisinde sıkça kullanılan cisplatin'in ciddi yan tesirlerinden ötürü daha farklı tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bitkisel kökenli doğal bileşiklerin antikanser etkileri bu noktada önemli araştırmalara konu olmaktadır. Bu doğal bileşiklerden birisi de araştırmamızın ana unsuru olan Ylang Ylang uçucu yağıdır. Ylang Ylang'ın antimikrobiyal, antiinflamatuvar gibi çeşitli biyoaktif etkiler gösterdiği bilinmektedir. Ancak literatürde meme kanseri hücre hattı MCF-7 üzerindeki doğrudan etkisine ve cisplatin ile karşılaştırılmalı olarak araştırılmasına yönelik bir çalışma yer almamaktadır. Bu çalışmada Ylang Ylang uçucu yağının MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerindeki sitotoksik etkisi *in vitro* olarak araştırılarak cisplatin ile karşılaştırılmalı etkilerinin ortaya konulması amaçlandı.

MCF-7 hücreleri (%10 FBS, %1 penisilin/streptomisin içeren DMEM; 37°C, %5 CO₂) kültüre edildi ve 96 kuyucuklu plaklara 1×10⁴ hücre/kuyucuk olacak şekilde ekildi. Ylang Ylang uçucu yağı ve Cisplatin DMSO'da çözülerek seri seyreltmeler hazırlandı ve IC₅₀ değerleri MTT testi ile belirlendi. Hücreler 24 saat inkübasyon sonrası uçucu yağ ile muamele edildi. Kontrol (DMEM), DMSO, cisplatin ve Ylang Ylang grupları oluşturuldu. MTT absorbansı 540 nm'de ölçüldü. Veriler SPSS 27.0 ile analiz edildi; p<0.05 anlamlı kabul edildi

MTT analizi sonucunda Ylang Ylang'ın IC₅₀ değeri MCF-7 için 4,6 µg/mL, sağlıklı hücre hattı L929 için 4,7 µg/mL olarak hesaplandı. Cisplatin'in MCF-7 hücre hattı için IC₅₀ değeri 28,78 µg/mL, L929 hücre hattı için 62,89 µg/mL olarak hesaplandı.

Bulgularımız, Ylang Ylang'ın MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerinde Cisplatin'e kıyasla anlamlı derecede daha yüksek bir sitotoksik potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Ancak Cisplatin'in sağlıklı (L929) ve kanserli hücre hattı (MCF-7) arasındaki IC₅₀ farkı daha belirgin iken, Ylang Ylang'ın her iki hücre hattında da benzer dozlarda etki göstermesi, bileşiğin yüksek antikanser aktivitesine rağmen hücre seçiciliğinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçlarımızın doğrulanması için ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, MCF-7, Ylang Ylang, cisplatin, sitotoksikite, MTT

PS 11

Sessiz Büyüyen Tehlike: Antibiyotik Direnci

Adem Atay Katipoğlu^{*1}, Ali Eren Doğan¹, Elif Naz Yünkül¹, Emre Eraslan¹, Güliden Aslan¹, Melih Lütfi Kısak¹, Miraç Yiğit¹, Semih Gazi¹, Yusuf Aytan¹ ve Seda Taşdemir²

¹ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1, Malatya

² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: sedamd23@gmail.com

Giriş ve Amaç: Antibiyotik direnci (AMR), yalnızca enfeksiyon hastalıklarını değil; cerrahi girişimler, yoğun bakım uygulamaları, onkolojik tedaviler ve transplantasyon süreçlerini de tehdit eden küresel bir sağlık krizidir. Küresel hastalık yükü analizlerine göre, 2019 yılında bakteriyel AMR doğrudan 1.27 milyon ölüme neden olmuş, 4.95 milyon ölümle ilişkili bulunmuştur. Güncel projeksiyonlar, 2050 yılında yıllık 1.91 milyon doğrudan AMR kaynaklı ölüm ve 8.22 milyon ilişkili ölüm olabileceğini göstermektedir. **Yöntem:** Çalışma grubunda yer alan öğrenciler tarafından PubMed®, Web of Science™, Scopus ve Google Akademik gibi veri tabanlarında yer alan makaleler derlenerek elde edilen bilgiler sözlü sunumlar yapılmak suretiyle grup içerisinde tartışılmıştır. **Bulgular:** Direnç gelişimi; β-laktamaz üretimi, hedef değişiklikleri, efflux pompaları ve biyofilm oluşumu gibi mekanizmalarla gerçekleşirken, bu süreç yatay gen transferi ile hızla yayılmaktadır. WHO'nun 2024 yılında güncellediği Öncelikli Patojenler Listesi, özellikle karbapenem dirençli Gram-negatif bakterilerin ve çok ilaca dirençli patojenlerin acil tehdit oluşturduğunu vurgulamaktadır.

Mevcut antibiyotik geliştirme süreci, artan direnç hızının gerisinde kalmaktadır. WHO verilerine göre geliştirme aşamasındaki 32 antibiyotik adayının yalnızca 12'si yenilikçi olup, bunların sadece sınırlı bir kısmı kritik patojenlere etkilidir. Bu durum, antibiyotik Ar-Ge hattındaki zayıflığı açıkça ortaya koymaktadır.

Güncel mücadele stratejileri yalnızca yeni antibiyotik geliştirilmesine değil; akılcı antibiyotik kullanımı, enfeksiyon kontrol önlemleri, aşılama ve One Health yaklaşımına dayanmaktadır. Buna ek olarak, bakteriyofaj tedavisi, CRISPR temelli antimikrobiyaller, anti-virülans yaklaşımlar ve mikrobiyota modülasyonu gibi yenilikçi tedavi stratejileri, alternatif veya tamamlayıcı müdahaleler olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Sonuç: AMR geleceğe ait bir tehdit değil, günümüzde aktif olarak etkisini gösteren küresel bir krizdir. Bu sorunun kontrol altına alınabilmesi; akılcı antibiyotik kullanımı, etkin enfeksiyon kontrol stratejileri, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve One Health perspektifinde multidisipliner iş birliğinin güçlendirilmesine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, Akılcı antibiyotik kullanımı, Antibakteriyel Ar-Ge

PS 12

Serbest radikallerin fizyolojik işlevlerden patolojik hasara çift yönlü rolü

Ozan Okşar^{*1}, Eser Mert Kölük¹, Ümit Fidancan¹, Selim Taş¹, Elif Nur Gür¹, Hasan Öznaneci¹,
Ayşe Kara¹, Fatma Zehra Özbey¹, Hayrunnisa Kara¹

¹Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1 Türkçe Programı, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: ozn_oksr@hotmail.com

Danışman: Doç. Dr. Onural Özhan

Özet

Giriş ve Amaç: Serbest radikaller, özellikle **reaktif oksijen türleri (ROS)** ve **reaktif nitrojen türleri (RNS)**, kısa ömürlü ancak yüksek reaktiviteye sahip moleküllerdir. Fizyolojik düzeylerde hücre proliferasyonu ve apoptoz gibi süreçleri düzenlerken, oksidatif dengenin bozulması kanser, diyabet ve nörodejenerasyon gibi hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, serbest radikallerin kaynaklarını, hücrel etkilerini ve antioksidan savunma mekanizmalarını bütüncül bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: PubMed ve Google Scholar veri tabanlarında yer alan güncel literatür taranmış; antioksidan enzimler, vitaminler ve polifenoller üzerine yapılmış deneysel ve klinik çalışmalar derleme yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Bulgular: ROS ve RNS, düşük düzeylerde **nükleer faktör kappa B (NF-κB)** ve **aktivatör protein-1 (AP-1)** gibi faktörleri modüle ederek immün yanıtı ve vasküler tonusu düzenlemektedir. Başlıca endojen kaynak mitokondriyal elektron transport zinciri iken; sigara dumanı, radyasyon, ağır metaller ve yüksek şekerli diyetler önemli eksojen kaynaklardır. Nöronlar yüksek oksijen tüketimleri nedeniyle oksidatif hasara en duyarlı hücrelerdir. Kardiyovasküler hastalıklarda ROS, **düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL)** oksidasyonu yoluyla ateroskleroza hızlandırırken; diyabette β-hücre hasarına, kanserde ise **deoksiribonükleik asit (DNA)** mutasyonlarına ve tümör proliferasyonuna katkıda bulunmaktadır. Vücut, **süperoksit dismutaz (SOD)**, katalaz, **glutasyon peroksidaz (GPx)**, C ve E vitaminleri ile polifenoller aracılığıyla çok katmanlı bir antioksidan savunma sistemi oluşturmaktadır. **N-asetilsistein (NAC)** ve alfa-lipoik asit gibi antioksidan takviyeler umut verici görünse de klinik sonuçlar tartışmalıdır.

Sonuç: Serbest radikaller fizyolojik sinyalizasyon ile patolojik hasar arasında hassas bir dengede yer almaktadır. Bu nedenle antioksidan temelli tedaviler, hastalığın hücrel bağlamına göre dikkatle optimize edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan Paradoksu, Antioksidan Savunma Sistemleri, Hücrel Sinyal İletimi, Nörodejenerasyon, Serbest Radikaller

PS 13

Gastroözofageal reflü hastalığında on-demand “lüzum halinde” tedavi stratejisinin plasebo ile karşılaştırılması

Muhammed Mert Can^{*1}, Yunus Emre Alan¹, Ebrar İzem Şahin¹, Mustafa Arda Yücel¹, Gülsüm Nisa Bozdemir¹, Yaren Albay¹, Faruk Ege Çınar¹, Nevin Meral¹, Elif Açar¹, Lokman H. Tanrıverdi²

¹Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

² Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail:

Özet

Gastroözofageal reflü hastalığında (GÖRH) on-demand (“lüzum halinde”) proton pompa inhibitörü tedavisinin plasebo ile karşılaştırıldığında etkililik ve tedavi devamlılığı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. PubMed veri tabanında GÖRH, non-eroziv reflü hastalığı, proton pompa inhibitörleri, on-demand tedavi ve randomize kontrollü çalışma terimlerini içeren kapsamlı bir arama stratejisi kullanıldı. Çalışmamızdaki her bir parametre için risk oranı (RR) ve %95 güven aralığı hesaplandı. Analizlerde ters varyans random effects modeli kullanıldı ve tüm istatistiksel analizler R version 4.4.1 programı ile gerçekleştirildi. Dâhil edilen 5 çalışmada toplam 1.116 hasta yer alırken takip süresi 4 ile 26 hafta arasındaydı. On-demand tedavi, hasta memnuniyetini artırma eğiliminde bulundu, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (RR: 1,85; %95 GA: 0,75-4,54). Buna karşın, herhangi bir nedenle tedaviyi bırakma oranı on-demand tedavi grubunda anlamlı derecede daha düşüktü (RR: 0,43; %95 GA: 0,31-0,60). Benzer şekilde, yetersiz semptom (RR: 0,27; %95 GA: 0,20-0,34), mide ekşimesi kontrolüne (RR: 0,32; %95 GA: 0,17-0,58) veya rahatlama sağlanamamaya (RR: 0,24; %95 GA: 0,15-0,39) bağlı tedavi bırakma oranı da on-demand tedavi lehine anlamlı derecede azaldı. On-demand proton pompa inhibitörü tedavisi, GÖRH hastalarında plaseboya kıyasla tedavi devamlılığını artırmakta ve yetersiz semptom kontrolüne bağlı tedavi bırakma oranlarını azaltmaktadır. Hasta memnuniyeti açısından da olumlu bir eğilim gözlenmiştir. Bu bulgular, özellikle non-eroziv veya hafif GÖRH hastalarında on-demand tedavinin etkili ve uygulanabilir bir yaklaşım olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gastroözofageal Reflü Hastalığı, Non-eroziv Reflü Hastalığı, Proton Pompa İnhibitörleri, on-demand tedavi, plasebo, randomize kontrollü çalışma

PS 14

Magnezyum takviyeleri: doğru mu kullanıyoruz?

Ayşe Irmak Millioğulları¹ , Emine Ceren Aksu^{1*} , Nisa Nur Ok¹ , Sevde Gül Topuz¹ , Fatma Nur Elmas¹ , Tuba Şakar¹ , Ahmet Nejat Baydede¹ , Ali Kabakcı¹

¹ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail:

cerenaksu8558@gmail.com

Magnezyum (Mg), vücudumuzda 300'den fazla enzimatik reaksiyonda kofaktör olarak görev alan, yaşamın devamlılığı için kritik öneme sahip temel bir mineraldir. Hücresel düzeyde DNA ve RNA stabilitesinin korunmasından enerji transferine, kemik metabolizmasından nöromusküler fonksiyonların düzenlenmesine kadar pek çok hayati süreçte rol oynar. Modern tarım yöntemleri nedeniyle toprağın mineralce fakirleşmesi, aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi ve vücuttaki parazitler oluşumların magnezyumu tüketmesi gibi nedenlerle besinlerden yeterli miktarda Mg almak zorlaşabilmektedir. Günlük minimum ihtiyaç kadınlarda 310 mg, erkeklerde 400 mg olarak belirlenmiştir. Magnezyum eksikliği; diyabet, insülin direnci, akut miyokard enfarktüsü ve bağışıklık sistemi sorunları gibi çeşitli patolojilerle ilişkilendirilmektedir. Fakat günümüzde sosyal medya ve reklamların etkisiyle magnezyum takviyeleri kontrolsüzce kullanılmaktadır. Arkadaş tavsiyesi veya popüler içeriklerle uzman görüşü almadan başlanan takviyeler, doz aşımı ve yanlış form seçimi riskleri beraberinde getirir. Normal böbrek fonksiyonu olan kişilerde fazlalık idrarla atılsa da, yüksek dozlar diyareye neden olabilmektedir. Böbrek fonksiyon bozukluğuna sahip olan bireylerde ise magnezyumun atılamaması, risk taşıyan hipermagnezemiye yol açabilir. Piyasada glisinat, malat, sitrat ve treonat gibi biyoyararlanımı farklı birçok Mg formu bulunmaktadır. Hangi formun hangi sağlık sorunu için (uyku, kas ağrısı, zihinsel sağlık vb.) uygun olduğu ve doğru dozaj, ancak bir uzman tarafından belirlenmelidir. Özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda takviye süreci doktor kontrolünde yürütülmelidir.

Anahtar kelimeler: Magnezyum eksikliği, magnezyum takviyesi, doğru kullanım, hipermagnezemi

PS 15

Malatya İlinde Tip 1 Diyabet Sıklığı Ve Bu Sıklığı Etkileyen Sosyodemografik Ve Yaşam Tarzı Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Arda DURAN*, Arda SEVİNÇ*, Yusuf TÜRKÖZ**

*İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, Malatya

** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D., Malatya

ÖZET

Giriş ve Amaç:

Diyabet Hastalığı; insülin sekresyonu, insülin etkisi veya her ikisindeki bozukluk sonucu gelişen kronik bir metabolik hastalıktır. Günümüzde özellikle yaşam tarzı değişiklikleri, sedanter yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları diyabet prevalansını artırmaktadır. Bu anket çalışmasının amacı, Malatya ilinde diyabet oranını etkileyen faktörleri; yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlık açısından değerlendirmektir.

Yöntem: Bu çalışmada, tanımlayıcı tipte bir anket uygulanmıştır. Toplam 156 katılımcıya online ve yüz yüze anket yöntemi ile ulaşılmıştır. Anket kapsamında katılımcıların demografik özellikleri, diyabet tanı durumları, aile öyküsü, fiziksel aktivite düzeyi, beslenme alışkanlıkları ve diyabet semptomları sorgulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiki olarak yüzdelerle dağılımlar şeklinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların büyük çoğunluğunu 18–29 yaş aralığındaki bireyler oluşturmaktadır (% 74). Katılımcıların % 55'i diyabet durumunu bilmediğini ifade ederken, %37'sinde diyabet bulunmadığı, % 6'sında Tip 2 diyabet ve % 1'inde Tip 1 diyabet olduğu belirlenmiştir. Aile öyküsü incelendiğinde katılımcıların % 17'sinde Tip 2 diyabet öyküsü bulunduğu, % 26'sının ise bu konuda bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Fiziksel aktivite düzeyi değerlendirildiğinde yalnızca % 32'sinin düzenli egzersiz yaptığı, % 17'sinin ise hiç egzersiz yapmadığı saptanmıştır. Beslenme alışkanlıkları incelendiğinde, yüksek karbonhidrat ve şeker içeren gıdaların yaygın olarak tüketildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca katılımcıların önemli bir kısmında diyabet ile ilişkili semptomların (aşırı susama, sık idrara çıkma, iştah artışı) görüldüğü belirlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma, Malatya'da diyabet riskini artıran başlıca faktörlerin düşük sağlık farkındalığı, yetersiz fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları olduğunu göstermektedir. Katılımcıların yarısından fazlasının diyabet durumunu bilmemesi, toplumda erken tanı ve tarama eksikliğine işaret etmektedir. Diyabetin önlenmesinde düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve toplum tabanlı farkındalık çalışmalarının artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, erken tanı programlarının yaygınlaştırılması ve bireylerin yaşam tarzı değişikliklerine yönlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Malatya, halk sağlığı, tip II diyabet, beslenme, fiziksel aktivite

PS 16

Monosodyum Glutamat İnsan Sağlığına Yararlı Mı, Zararlı Mıdır?

Ukkaşe Enes Çoban*, Yusuf TÜRKÖZ**

*İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, Malatya

** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D., Malatya

ÖZET

Amaç: Monosodyum glutamat (MSG), gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve temel beşinci tat olan "umami" aromasını sağlayan bir gıda katkı maddesidir. İlk kez 1908 yılında Japonyada izole edilen bu bileşik, glutamik asit aminoasidinin sodyum tuzu formudur. Literatürde bu konunun güvenilirliği hakkında çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu derleme çalışmanın amacı, MSG'nin toksisite potansiyelini ve fizyolojik etkilerini güncel veriler ışığında değerlendiren bu konuda bilimsel ve toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır.

Materyal ve Metot: Araştırma kapsamında, "monosodium glutamate", "safety", "toxicity" ve "human health" anahtar kelimeleri kullanılarak Google Scholar veri tabanı üzerinden kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Belirlenen kriterlere uygun makalelerin tam metinlerine erişim sağlanmış; ilgili makaleler Türkçeye çevrilmiş ve analiz edilmek üzere bir veri havuzu oluşturulmuştur.

Bulgular: Literatürdeki hayvan modelleri üzerinde yürütülen çalışmalar; yüksek dozda MSG maruziyetinin obezite, insülin direnci ve nörotoksisite ile korelasyon gösterdiğini ortaya koymuş; tehlikeli dozun 15-18 g/kg aralığında olduğunu rapor etmiştir. Buna karşın, insan denekler üzerinde gerçekleştirilen çift-kör plasebo kontrollü (DBPC) klinik araştırmalarda, MSG'nin tek başına su ile stimülasyonunda dahi söz konusu metabolik etkilerin gözlemlenmediği ve plasebo grubu ile anlamlı bir istatistiksel fark oluşmadığı saptanmıştır. Gebe kadın-fetus bağlamında ise, plasental bariyerin selektif geçirgenliği sayesinde fetal dolaşıma geçemediği belirlenmiştir. Bu veriler ışığında; Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) insanlar için günlük 30 mg/kg vücut ağırlığı miktarını güvenli üst sınır (ADI) olarak belirlerken; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve JECFA (FAO/WHO) gibi otoriteler, maddeyi "genellikle güvenli" (GRAS) kategorisinde değerlendirerek spesifik bir kısıtlama getirmemiştir.

Sonuç: Şu ana kadar ki yapılan araştırmalar, MSG'nin kontrollü tüketiminin insan sağlığı üzerinde sistemik bir risk teşkil etmediğini göstermektedir. Uluslararası gıda otoritelerinin güncel değerlendirmeleri ışığında MSG, mevcut toksikolojik veriler çerçevesinde güvenli bir gıda katkı maddesi olarak nitelendirilmektedir. Ancak MSG'nin insan sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerinin derinliğine incelenerek daha güçlü kanıtların ortaya konulabilmesi için uzun süreli, randomize, çift kör ve plasebo kontrollü protokollerle yürütülen geniş katılımlı klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Monosodyum glutamat, gıda katkı maddesi, insan sağlığı

PS 17

İnsektisit Olarak Kullanılan Alüminyum Fosfit Ve Ürünü Fosfin Gazı İnsanı Nasıl Zehirler?

Elif Sude İPEK*, Atakan SARI*, Yusuf TÜRKÖZ**

*İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, Malatya

**İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D., Malatya

ÖZET

Giriş ve Amaç: Genelde tablet, toz ve granüler formda bulunan ve ortamda bulunan nem, su veya hidroklorik asitle birleşince reaksiyona giren alüminyum fosfit, bu reaksiyon sonucunda ölümcül olabilecek düzeyde toksik fosfin gazının salınmasına neden olmaktadır. Bu derleme çalışmasının amacı, solunduğunda yüksek mortalite oranlarına sahip olan bu gazın hücresel düzeyde nasıl bir yıkıma yol açtığını ve ölümcül etkilerini incelemektir.

Yöntem: PubMed, Web of Science ve Google Scholar veri tabanlarında "Phosphine poisoning mechanism / Fosfin zehirlenmesi patofizyolojisi" anahtar kelimeleriyle tarama yapılmıştır. Akut toksisite, mitokondriyal disfonksiyon ve oksidatif stres odaklı klinik vakalar ve moleküler çalışmalar analiz edilerek bir veri havuzu oluşturulmuştur.

Bulgular: Nem, su veya hidroklorik asitle birleşince reaksiyona giren alüminyum fosfit, ölümcül olabilen toksik fosfin gazının salınmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar, fosfin gazının temel olarak mitokondriyal toksin gibi davrandığını göstermektedir. Mitokondriyal toksinler genel olarak mitokondri DNA yapısına, işlevine hasar vererek enerji üretimini baskılar. Bu durum hücre fonksiyon bozukluğuna, hücre ölümüne, organ yetmezliğine ve daha da ileri seviyelerde ölüme kadar yol açabilmektedir. Fosfin gazı toksisitesi konusunda yapılan araştırmalarda fosfin gazının hücresel düzeydeki etkileri ve oluşturduğu klinik tablo şöyle özetlenebilir: (1) Fosfin gazı, mitokondriyal elektron taşıma zincirindeki kompleks IV'ü (sitokrom c oksidaz) inhibe ederek hücresel solunumu durdurur. Bu durum, ATP üretiminin aniden kesilmesine yol açar. (2) Serbest Radikal Hasarı: Hücre içi reaktif oksijen türlerinin (ROS) kontrolsüz artışı, oksidatif stres, lipid peroksidasyonu ve hücresel membran bütünlüğünün bozulmasına neden olur. (3) Klinik tabloda en sık görülen ölüm sebebi, miyokardiyal hücrelerdeki enerji kaybına bağlı gelişen dirençli kardiyovasküler şok ve çoklu organ yetmezliğidir. Fosfin gazı zehirlenmesinde spesifik bir antidotun bulunmaması, vakalardaki mortaliteyi artırmaktadır.

Tartışma ve Sonuç: Fosfin gazı zehirlenmesi, "metabolik bir boğulma" tablosu oluşturarak sistemik yıkıma yol açan ve geri dönüşümsüz moleküler hasar potansiyeli nedeniyle acil ve agresif müdahale gerektiren bir durumdur. Fosfin gazı zehirlenmesinde kullanılabilecek her hangi bir antidot bulunmamaktadır. Bu nedenle, fosfin gazı zehirlenmesinde kullanılabilecek antidot geliştirilmesine yönelik geniş kapsamlı araştırmaların yapılmasına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aliminyum fosfit, fosfin gazı, sitokrom c oksidaz, mitokondriyal disfonksiyon, ATP depleasyonu

PS18

Mantar Zehirlenmesinin Mekanizması Ve Antidot Geliştirme Çalışmaları

Ahmet Tuna CEYLAN*, Yusuf TÜRKÖZ**

*İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, Malatya

**İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya

ÖZET

Giriş ve Amaç: Amanita Phalloides, hem dünyada hem de ülkemizde ölümcül zehirlenmelerin yaklaşık %90'ından sorumlu olan oldukça zehirli bir mantar türüdür. Amanita Phalloides zehirlenmesindeki ana toksin α -amanitin dir. Henüz hücresel etki mekanizmaları tam anlamıyla çözülmemiş olması nedeniyle α -amanitin spesifik bir antidotu da geliştirilememiştir. Ancak son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar umut vaat edici gelişmeler ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı bu mantarın zehirlenme mekanizması ve antidot için yapılan çalışmalar hakkında bir literatür taraması yaparak bu konuya dikkat çekmektir.

Yöntem: Bu çalışmada Pubmed ve Google scholar'da "Amanita Phalloides", "Amanita Phalloides toxicity/Amanita Phalloides zehirlenmesi" anahtar kelimeleri ile taramalar yapıldı ve ilgili makalelere SpringerLink, Nature Communications veri tabanlarından erişildi. Bu makaleler Türkçeye çevrilerek bir makale havuzu oluşturuldu.

Bulgular: Karaciğer α -amanitin'in ilk hedefi olmakla beraber böbrekler ikincil hedef organdır. α -amanitin'in RNA polimeraz II inhibisyonu yaptığı bilinmektedir. α -Amanitin RNA polimeraz II'nin bridge helix denen bölgesine bağlanarak transkripsiyonun ilerlemesini engeller. RNA polimeraz II DNA'ya bağlanır ancak DNA üzerindeki ilerlemeyi sağlayan bridge helix kısmı işlevini sağlayamadığı için mRNA sentezi tamamlanamaz dolayısıyla hücrenin hayatta kalması için en kritik mekanizmalardan olan protein sentezi durur, bu da hücrede apoptoz veya nekroz gerçekleşmesine sebep olur. Yapılan son çalışmalar α -amanitin toksisitesi için STT3B'nin gerekli olduğunu ve STT3B inhibitörü olan indosiyanin yeşilinin (ICG) α -amanitin zehirlenmesinde spesifik bir panzehir olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Tartışma ve Sonuç: Amanita Phalloides mantar zehirlenmeleri için henüz kesin olarak spesifik bir antidot geliştirilememiş olsa da yapılan çalışmalar, indosiyanin yeşilinin α -amanitin zehirlenmesinde kullanılabilecek bir panzehir olabileceğini ortaya koymuştur. Ancak α -amanitin zehirlenmesinin moleküler mekanizmalarının tam olarak ortaya konulabilmesine ve antidot geliştirilmesine yönelik kapsamlı araştırmaların yapılmasına hala ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amanita Phalloides, α -amanitin zehirlenmesi, spesifik antidot, indosiyanin yeşili

PS 19

Yoga Ve Meditasyon Demansı Önler Mi?

Fatma YILDIZ*, Hacer Pelşin KORKUTATA*, Yusuf TÜRKÖZ**

*İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, Malatya

**İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D., Malatya

ÖZET

Giriş ve Amaç: Yaşlanan popülasyonla birlikte demans (bunama), giderek artan önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Mevcut farmakolojik tedavilerin hastalığı geri döndürmedeki sınırlılığı, koruyucu hekimlik kapsamında alternatif yaklaşımlara yönelimi artırmaktadır. Bu derleme çalışmasında, yoga ve meditasyon gibi zihin-beden uygulamalarının demans sürecine etkisi incelenmiştir.

Yöntem: Bu çalışma, PubMed ve Google Scholar veri tabanları kullanılarak hazırlanmıştır. “Yoga and neuroplasticity”, “meditation on dementia prevention” ve “cortisol and hippocampal atrophy” anahtar kelimeleriyle yapılan taramada, özellikle son 10 yılda yayımlanan klinik çalışmalar ve sistematik derlemeler değerlendirilmiştir.

Bulgular: Elde edilen veriler, düzenli yoga ve meditasyon uygulamalarının beyin yapısı ve fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini göstermektedir. Yapılan araştırmalar, yoga ve meditasyonun hipokampus hacminin korunması ve prefrontal kortekste gri madde yoğunluğunun artırılması yönünde etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yoganın demans üzerindeki faydalı etki mekanizmasının, yoganın Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal (HPA) aksını düzenleyerek kortizol düzeylerini düşürdüğü ve böylece hipokampal hasarı azalttığı şeklinde yorumlanmaktadır. Meditasyonun ise Default Mode Network üzerinde düzenleyici etkiler göstererek dikkat ve duygu durum üzerinde iyileştirici rol oynadığı belirtilmektedir. Ayrıca Kirtan Kriya gibi tekniklerin serebral perfüzyonu artırarak bilişsel işlevleri desteklediği tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Yoga ve meditasyon, demans tedavisinde destekleyici bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu yöntemler düşük maliyetli ve yan etkisiz olmaları nedeniyle klinik uygulamalarda yer bulma potansiyeline sahiptir. Ancak konunun daha derinliğine incelenerek daha güçlü kanıtların ortaya konulabilmesi için uzun süreli, randomize, çift kör ve plesebo kontrollü protokollerle yürütülen geniş katılımlı klinik araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yoga, Meditasyon, Demans, Nöroplastisite, Bilişsel Rezerv

PS 20

Lipidomik Klinikte Derman Olabilir Mi ?

Tek Testte Bütünü Görmek

Aysun AYDIN, Berk Enes BİLA, Rabia COŞKUN, Enes Muhammet DAL, Yasemin EREN, İbrahim ŞENER, Ahmet Safa TEMELLİ, Pelin YILMAZ

Omik bilimler, bir biyolojik sistemdeki tüm bileşenlerin toplu ve bütüncül şekilde incelenmesini ifade eder. Genomik, trnaskriptomik, proteomik, metabolomik ve lipidomik gibi alt dalları bulunmaktadır. Lipidomik bir hücrede, dokuda veya organizmada bulunan tüm lipid moleküllerinin kapsamlı ve sistematik incelenmesini kapsar. Bu derlemede kısaca lipidomiğin ne olduğu , yöntemi, tıp alanındaki katkıları, lipidomik verilere ulaşabilecek ve değerlendirebilecek veri tabanları ele alınmaktadır. Amacımız tıp fakültesi öğrencilerini omik-lipidomik bilimler ile tanıştırmak, lipidomiğin hekimin teşhis ve tedavi pratiğinde ne tür katkılar sunabileceğine dair farkındalık yaratmaktır. Biyolojik numunelerde (serum, idrar vb.) lipidomik analizler için ileri analitik teknikler kullanılmaktadır (Sıvı Kromatografisi – Kütle Spektrometrisi veya Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi). Lipidomik analizler çok geniş bir lipid yelpazesini içermektedir. Geleneksel rutin biyokimyasal testler ile en fazla 4-5 lipid parametresinin tespiti mümkün iken bu yöntem ile tek bir numunede yüzlerce, binlerce farklı lipidin kendi moleküler kimliği tanımlanıp miktarları belirlenebilmektedir. Örneğin rutin biyokimya testlerinde yalnızca toplam triaçilgliserol miktarı belirlenebilirken , lipidomik analizler ile numunedeki triaçilgliserollerdeki yağ asitlerinin karbon zinciri uzunlukları , doymamış bağ sayıları ve bunların izomerleri ayrı ayrı tanımlanabilmekte ve miktarları tespit edilebilmektedir. Bu şekilde lipidomik analizler ile modern dünyanın değişik metabolik hastalıklarının (ör. diabet, yağlı karaciğer hastalığı, obezite vb.) erken teşhisinde kullanılabilecek biyobelirteçlerin ortaya çıkmasını sağlarken , diğer yandan hastalık alt tiplerinin belirlenmesinde, kişiye özel tedavi protokollerinin ve yeni ilaçların geliştirilmesinde kullanılması mümkün olmaktadır. Bu potansiyelin hayata geçmesi , hekimlerin bu yeni verileri klinikte kullanma ve uygulama yetkinliği kazanmasına bağlıdır. Yarının tıp dünyasında lipidomik diğer omik alt dalları ile birlikte bir seçenek değil , her hastanın hastalığına ait tüm resmi görebilmek ve en doğru müdahaleyi yapabilmek için hekimlerin elindeki en temel araçlardan biri olabilecektir.

Anahtar Kelimeler : Lipidomik, Biyobelirteçler, Metabolik Hastalıklar, Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi, Lipidler .

PS 21

Türkiye’deki özel tıp fakültelerinin kontenjan, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi bazı özelliklerinin karşılaştırılması

Öğrenciler: M.Recep Dağdeviren, Elif Berra Küçük, Betül Karatekin, Ferhat Koyuncu, Seher Najjar, M.Emin Tuna, Merve Nur Bilen, Şeyda Nur Cici, Tuana Arı

Danışman: Prof.Dr.Metin GENÇ metin.genc@inonu.edu.tr

Fakültemiz Dönem 1 KDT grubu öğrencileri tarafından 2025 Ekim-2026 Nisan tarihleri arasında internetten ülkemizdeki vakıf üniversiteleri tıp fakültelerin web sitelerine ve YÖK Atlas sitesine girilip bilgiler toplanmıştır. Buna göre İstanbul’da 20, Ankara’da 7, Kıbrıs’ta 3, İzmir’de 2, Konya ve Gaziantep’de 1 özel tıp fakültesi vardır. Tıp fakültelerine girişteki 50 bin barajına yakın en düşük puanlı öğrenci sıralaması Okan, Nişantaşı ve İstinye Tıp’dır .Bunlar 49-50 bininci arasındaki sınırdaki öğrencileri almışlardır. Burslu kontenjanları hesaba katıldığında ilk 1000 e giren toplam 22 burslu öğrenci Medipol, Koç ve Acıbadem Tıp Fakültelerini tercih etmiştir. Öğretim üyesi sayısı 59 ila 394 (Başkent Tıp) arasındadır. Bir hocaya düşen öğrenci sayısı 0.86 ila 8.73 arasındadır. YÖK kaynaklarında öğretim üyesi başına düşen bu rakam dışında biz bundan farklı olarak hasta başı vizit yapılan branşlardaki bir klinisyen hocaya ne kadar stajyer (4, 5 ve 6.sınıfların toplamı) düştüğünü hesaplamak istedik. Radyoloji, patoloji, nükleer tıp gibi branşlar hariç tutuldu. Buna göre bir klinisyen öğretim üyesi başına düşen stajyer öğrenci sayısını 0.48 (Kıbrıs D.Akdeniz Tıp), 0.77(Koç Tıp) ve 0.93 ile Üsküdar Tıp olarak bulduk. Klinisyen başına en fazla stajyer Girne Tıp Fakültesi, ve Bahçeşehir Tıp Fakültesi’nde 6,9 öğrenci düşerken, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise 7.3 idi. Cerrahpaşa Türkçe ve İngilizce bölümleri 4+5+6 ncı sınıflarda bir klinisyen hocaya 2.6 stajyer, Hacettepe’de ise Türkçe ve İngilizce bölümleri 4+5+6 ncı sınıflarında bir klinisyene 2.1 stajyer düşüyordu. Yeni açılan devlet tıp fakültelerinde 1 klinisyen öğretim üyesine Kırşehir’de 3.7, Kastamonu’da 2.5, Adıyaman’da 4.5, T.Özal Üniversitesi’nde 4, Aksaray’da 5.7 ve Ağrı’da 18.6 stajyer düşmektedir. Bu fakülteler esasen az öğrenci alan fakültelerdir.

Anahtar kelimeler: Tıp eğitimi, özel tıp fakülteleri

PS 22

Tıp fakültesi öğrencilerinde uyku kalitesi ve başarı durumunun ilişkisi

Esmanur Çetin¹, Zehra Gül Şireci¹, Aynur Bağrıaçık¹, Deren Duru Kökçe¹, Arif Arda Akburak¹, Kutay Çakmak¹, Serkan Şakalar¹, Ahmet Mert Yenipınar¹ Aleyna Aslan¹, Ayşe Baran^{1*}

¹Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

***ayse.baran@inonu.edu.tr**

Giriş ve amaç: Uyku, bireyin genel sağlık durumu ve yaşam kalitesi üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Uyku düzeninin ve kalitesinin bozulması; bilişsel fonksiyonlarda azalma, duygudurum değişiklikleri ve fiziksel sağlık sorunları ile ilişkilidir. Üniversite öğrencileri uyku saatlerini bağımsız olarak belirleyebilme, artan akademik yük, sınav stresi ve sosyal aktiviteler nedeniyle düzensiz uyku alışkanlıkları geliştirmeye yatkın bir gruptur. Bu da öğrencilerde bu durumun ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Çalışmamız tıp öğrencilerinde uyku kalitesinin başarı durumu ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Metod: Çalışmamız İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 310 öğrenci ile yapılan kesitsel tipte bir çalışmadır. 105 birinci sınıf, 101 ikinci sınıf ve 104 üçüncü sınıf öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler sosyodemografik bilgileri içeren bir anket ve Epworth Uykululuk Ölçeği (ESS) aracılığıyla toplanmıştır. Kategorik veriler n (%), ölçümsel veriler medyan (Min-Max) şeklinde gösterilmiştir. Normallik dağılımı Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Normal dağılıma göre gruplar arasında karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların %60,3'si kadın %39,7 'i erkektir ve yaşlarının medyan değeri 20 (Min-Max: 17-24)'dir. Herhangi bir işte çalışan öğrencilerin ESS puanları çalışmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksektir ($p<0,001$). Yurtta yaşadığını belirten katılımcıların ESS puanları aile ile evde ve arkadaş ile evde yaşayan öğrencilerden anlamlı derecede yüksektir ($p<0,001$). Ders sırasında sık sık uykulu olduğunu belirten öğrenciler ara sıra ve nadiren şeklinde belirten öğrencilere göre daha yüksek ESS puanına sahiptir ($p<0,001$).

Sonuç: Bu çalışmada tıp öğrencilerinde gündüz aşırı uykululuk halinin yaygın olduğu ve çeşitli yaşam koşulları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Özellikle çalışma durumu, barınma şekli ve ders sırasında uykululuk sıklığı gibi faktörlerin ESS puanlarını anlamlı düzeyde etkilediği saptanmıştır. Bu bulgular, tıp öğrencilerinde uyku sağlığının iyileştirilmesine yönelik müdahalelerin planlanmasının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tıp fakültesi, uyku kalitesi, başarı.

PS 23

Tıp Eğitiminde Yapay Zeka: Öğrenci Perspektifinden Bir Anlatısal Derleme

Aslıhan Mete Yıldırım ¹, Hivda Dağkiran ², Reyyan Padak ², Aybar Akbaş ², Mehmet Sefa Özbek ², Rabia Gökçek ²,
Rahime Azra Yalçın ², Samet Mustafa Yılmaz ², Seyit Yusuf Saraç ², Yusuf Karaman ²

¹ İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya

² İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1

Bu anlatısal derleme, tıp eğitiminde yapay zekanın (YZ) rolünü, tıp öğrencilerinin bu konudaki tutumlarını ve mevcut müfredatların yeterliliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 2024–2025 yılları arasında yayımlanmış, hakemli dergilerde yer alan ve tıp eğitimi ile yapay zeka ilişkisini doğrudan ele alan beş bilimsel makale incelenmiştir. Seçilen çalışmalar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve bulgular öğrenme yaklaşımları, yapay zekanın eğitimdeki rolü, öğrenci tutumları, etik ve güvenlik boyutları, müfredat yeterliliği ve küresel eğilimler başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Bulgular, günümüz tıp öğrencilerinin esnek, bireyselleştirilmiş ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımlarını benimsediğini göstermektedir. Yapay zeka, adaptif öğrenme sistemleri ve simülasyon teknolojileri aracılığıyla öğrenme sürecini desteklemekte ve klinik karar verme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin YZ'ye yönelik tutumları genel olarak olumlu olmakla birlikte, veri güvenliği, hasta mahremiyeti ve etik sorumluluklar gibi konularda önemli kaygılar bulunmaktadır.

Mevcut müfredatların ise bu hızlı dönüşüme yeterince uyum sağlayamadığı ve YZ eğitiminin çoğunlukla teorik düzeyde kaldığı görülmektedir. Sonuç olarak, tıp eğitiminde yapay zekanın etkin entegrasyonu için uygulama temelli eğitimlerin artırılması ve etik boyutun müfredata dahil edilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, geleceğin hekimlerinin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmede kritik rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Tıp eğitimi, derleme,

PS 24

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Radyasyon Üzerine Farkındalığı

Elif Sude Akbulut*, Nefel Özbay, Zeynep Yıldırım, Feride Berra Bozkurt, Rotında Kaya, İlayda Deniz Budak, Muhammet Emin Başkaya, Nur Havin Yüzal, Meryem Ceren Polat, Mahmut Şahin İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Malatya İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Radioloji, Malatya Sorumlu yazar e-mail: elifs2006@hotmail.com

Özet

Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin radyoloji ve radyasyon güvenliğine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerini değerlendirmek amacıyla kesitsel tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 1–6. sınıflar arasında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuş, gönüllülük esasına dayalı olarak ankete katılan toplam 214 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların %70,6'sının 1. sınıf öğrencilerinden oluşması, prelinik dönemdeki öğrencilere erişimin daha kolay olmasıyla açıklanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından literatüre uygun şekilde hazırlanan iki bölümlü yapılandırılmış anket aracılığıyla toplanmıştır. İlk bölümde sosyodemografik özellikler, ikinci bölümde ise iyonizan radyasyon kaynakları, radyasyon dozu, görüntüleme yöntemlerinin prensipleri, biyolojik etkiler ve korunma yöntemlerine ilişkin 13 bilgi sorusu yer almıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiş, gruplar arası karşılaştırmalarda Ki-kare ve gerekli durumlarda Fisher kesin testi kullanılmıştır. Bulgular, klinik öncesi dönemdeki öğrencilerin büyük çoğunluğunun yapılandırılmış radyasyon güvenliği eğitimi almadığını ve bilgi düzeylerinin daha çok teorik çerçevede kaldığını göstermiştir. Bu grupta özellikle iyonizan radyasyon kaynaklarının kapsamlı şekilde tanımlanması ve ALARA prensibi gibi korunma yaklaşımlarının klinik bağlamda uygulanması konusunda belirgin eksiklikler saptanmıştır. Buna karşın klinik stajlara katılan öğrencilerde bilgi düzeyinin anlamlı derecede arttığı ve klinik senaryolarda daha doğru kararlar verildiği görülmüştür. İstatistiksel analizlerde eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Eğitim alan öğrencilerin %71,4'ü gebelikte en hassas dönemi doğru yanıtlamışken bu oran eğitim almayanlarda %44,2'de kalmıştır ($p=0,022$). Güvenli görüntüleme yöntemi sorusunda doğru yanıt oranı eğitim alanlarda %45,2, almayanlarda %17,4 bulunmuştur ($p=0,002$). ALARA prensibini doğru bilme oranı ise sırasıyla %69,0 ve %39,5 olarak saptanmıştır ($p=0,005$). Sonuç olarak, radyoloji eğitiminin özellikle erken dönemde verilmesinin öğrencilerin bilgi düzeyini artırmada kritik öneme sahip olduğu ve klinik deneyimin teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmede belirleyici rol oynadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon Güvenliği, Tıp Eğitimi, İyonizan Radyasyon, Klinik Öncesi Dönem, Klinik Staj Dönemi, ALARA Prensibi, Radyolojik Farkındalık, Teratojenik Risk, Organogenez, Hasta Güvenliği, Tanısal Görüntüleme, Mesleki Yeterlilik.

PS 25

Çocuk kardiyoloji polikliniğine üfürüm nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi

Mehmet Öncül¹, Özlem Elkıran¹ Azra Büyüksarı², Ali Üzüm², Berra Demirhan², Ceren Cura², Dilay Şen², Mitat Can Gezmen², Muhammed Semih Korkusuz², Yunus Emre Nazlier²

¹İNönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü

²İNönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi

Sorumlu Yazar: Mehmet Öncül, mehmet.uncul@inonu.edu.tr

Giriş ve Amaç: Çocukluk çağında kalp üfürümleri, pediatri pratiğinde en sık karşılaşılan fizik muayene bulgularından biridir. Bu üfürümlerin büyük çoğunluğu yapısal olarak normal bir kalpten kaynaklanan "masum üfürümler" olsa da üfürüm bazen ciddi kalp hastalığının tek klinik belirtisi olabilir. Bu çalışma, çocuk kardiyoloji polikliniğine üfürüm ön tanısıyla sevk edilen hastaların klinik özelliklerini, sevk eden hekimlerin değerlendirmeleriyle uzman muayenesi arasındaki korelasyonu ve ekokardiyografinin (EKO) tanısal etkinliğini incelemeyi amaçlamaktadır.

Materyal ve Metot: Ocak 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında üfürüm şikayetiyle başvuran 1292 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Tüm hastalara fizik muayene, elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sevk edilen 1292 hastanın %71'inde (918 hasta) uzman muayenesinde üfürüm doğrulanmıştır. Bu üfürümlerin 451'i klinik olarak masum, 467'si ise patolojik olarak sınıflandırılmıştır. Bu hastalara yapılan Ekokardiyografik değerlendirmede toplam hastaların %47,1'inde (608 hasta) en az bir kardiyak anomali saptanmıştır. En sık rastlanan patolojiler; Mitral Kapak Yetersizliği (145 vaka), PFO (137 vaka), Sekundum ASD (117 vaka) ve VSD (64 vaka) olarak kaydedilmiştir. En dikkat çekici bulgu, klinik olarak "masum" kabul edilen 451 hastanın %31'inde (142 hasta) EKO ile yapısal anomali (PFO, hafif MY, ASD, PDA vb.) saptanmasıdır. Ayrıca, muayenede üfürüm duyulmayan hastaların da %31,1'inde (başlıca PFO ve hafif MY) anomali tespit edilmiştir. Patolojik üfürüm tespit edilen 467 hastanın 349 (%75) anormal EKO bulgularına rastlandı.

Hastaların 105'inde EKG/Holter ile ritim bozukluğu (en sık SVE, VES ve WPW) saptanmıştır.

Tartışma ve Sonuç: Çocukluk çağında üfürümlerin ayırıcı tanısında fizik muayene kritik olsa da klinik deneyim ve hasta uyumu gibi faktörler tanı doğruluğunu etkilemektedir. Çalışma verileri, masum olduğu düşünülen üfürümlerin altında bile ileride enfektif endokardit veya kalp yetmezliği riski oluşturabilecek patolojilerin yatabileceğini göstermektedir. EKO, invaziv olmayan doğası ve yüksek tanısal gücüyle, üfürümle başvuran hastaların değerlendirilmesinde altın standart yöntem olma özelliğini korumaktadır. Sonuç olarak, üfürüm nedeniyle sevk edilen her hastanın, klinik sınıflamadan bağımsız olarak, kesin tanı için ekokardiyografik değerlendirmeye tabi tutulması önerilmektedir.

Anahtar kelime: üfürüm, çocuk, ekokardiyografi, elektrokardiyografi

PS 26

Metalik Yabancı Cisimlerin Çıkarılmasında Mıknatısların Etkinliği

Nisanur Işık¹, Miraç Elçi¹, Zeynep Ak¹, Bilge Kaan Çaylak¹, Ahmet Yasin Olgun¹, Vahide Eda Parlak¹, Barış Yıldız¹, Ömer Kerim Yüce¹, Hilal Özdemir¹, Okan Aslantürk*²

¹Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

*²Inönü Üniversitesi, Tıp Fakülte, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya

*okan.aslanturk@inonu.edu.tr.

Giriş: Ekstremitelerde bulunan metalik yabancı cisimler (MFB), komplikasyonları önlemek ve manyetik rezonans görüntüleme için kontrendikasyonları ortadan kaldırmak amacıyla çıkarılması gereken yaygın bir klinik sorundur. Mıknatıs yardımlı çıkarma, geleneksel cerrahi tekniklere alternatif bir yöntem olmakla birlikte, etkinliği ve klinik yararı konusunda sistematik veriler hâlâ sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, ekstremitelerde bulunan metalik yabancı cisimlerin mıknatısla çıkarılmasının klinik etkinliğini, radyasyona maruz kalma üzerindeki etkisini ve farklı anatomik bölgeler ile yabancı cisim türlerine göre başarı oranlarını değerlendirmektir.

Metot: Üçüncü basamak bir travma merkezinde 2017 ile 2025 yılları arasında yabancı cisim çıkarma ameliyatı geçiren hastaların verilerini geriye dönük olarak inceledik. İncelenen 364 hastadan, metal olmayan yabancı cisimler, mıknatıs kullanılmayan vakalar ve eksik kayıtlar hariç tutulduktan sonra 51'i dahil edilme kriterlerini karşıladı. Demografik veriler, anatomik konum, yabancı cisim özellikleri, floroskopi kullanımı ve mıknatısın etkinliği kaydedildi.

Sonuç: 51 hastada 52 metal yabancı cisim için mıknatıs kullanıldı. Metal yabancı cisimlerin mıknatısla çıkarılması, vakaların %87'sinde (45/52) başarılı oldu. Başarı oranı metal çapaklar için %100 iken, iğne tipi yabancı cisimlerde %63'e düştü ($p<0,001$). Mıknatısla çıkarma, tüm üst ekstremitte vakalarında (28/28, %100) ve alt ekstremitte vakalarının %68,2'sinde (15/22) başarılı oldu; bilateral tutulum görülen bir hastada her iki bölgede de başarıyla tedavi edildi ($p=0,003$). Tüm vakaların %70'inde ve mıknatıs ile başarılı sonuç alınan vakaların %80'inde görüntü yoğunlaştırıcı kullanılmamıştır. Anatomik bölgeye göre yapılan analiz, özellikle alt ekstremitte vakalarında floroskopi kullanımının daha belirgin olduğunu ortaya koymuştur ($p=0,020$).

Çıkarımlar: Mıknatıs, metalik yabancı cisimlerin çıkarılmasında yüksek başarı oranlarına sahip, kolay ve uygulanabilir bir yöntemdir. Mıknatıs kullanımı, metal yabancı cisimlerin çıkarılması sırasında radyasyona maruziyeti azaltabilir. Bu yöntemin etkinliği, alt ekstremitte bölgelerinde, özellikle ayak tabanında ve iğne tipi yabancı cisimlerde daha düşüktür. Bu bulgular, metalik yabancı cisimlerin mıknatısla çıkarılmasının anatomik konuma ve yabancı cisim tipine göre planlanması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Metalik yabancı cisim, mıknatıs, floroskopi, ekstremitte

PS 27

Annelerin Aşı Tutumları

Hüseyin Utku Özdeş*¹

Giriş: Günümüzde aşı karşıtlığı, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralardan kaynaklanan bilgi kirliliği nedeniyle toplum sağlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bu nedenle, annelerin tutumlarını ve bilgi edinme yollarını anlamak, hedefe yönelik halk sağlığı stratejileri geliştirmek açısından önemlidir. Bu çalışma, annelerin çocukluk çağı aşılarına yönelik tutumlarını, aşı karşıtlığına yol açan nedenleri ve bilgi kaynaklarının bu tutum üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Bu araştırma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Gönüllülük esasına dayalı 81 anne çalışmaya katılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, aşı uygulamalarına ilişkin davranışları, tereddüt ettikleri aşı türleri ve bilgi kaynakları yapılandırılmış bir anket formu aracılığıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Anketimizdeki sorular annelerin tutumlarına göre 1–5 arasında puanlanmış; ortalamalar ve yüzdelere hesaplanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%80,2) üniversite mezunudur ve %83,2'si aktif olarak çalışmaktadır.

Bulgular

Çocukların rutin aşılarının tam olma oranı %96,5 olarak belirlenmiştir. Annelerin %16'sı en az bir kez aşı yaptırmaktan kaçındığını ifade etmiştir. En fazla tereddüt edilen aşı türü %65,4 ile Covid-19 aşısıdır. Katılımcıların %66,7'si sosyal medyada aşı karşıtı içeriklere maruz kalmaktadır. Buna karşın, bilgi edinmede en çok sağlık personeline başvurulduğu gözlenmiştir ve bu oran %61,7'dir. “Aşılar çocukları ciddi hastalıklardan korur” ifadesi en yüksek cevap olarak verilmiştir.

Sonuç

Araştırma, anneler arasında genel aşı kabulünün yüksek düzeyde olduğunu, ancak Covid-19 aşısına yönelik belirgin bir tereddüt bulunduğunu göstermektedir. Sosyal medya, aşı karşıtlığını besleyen önemli bir faktör olarak öne çıkmakta; buna rağmen sağlık personeli hâlen en güvenilir bilgi kaynağıdır. Bulgular, anne-çocuk sağlığı programlarında etkili iletişim, şeffaf bilgilendirme ve sosyal medyada doğru içeriklerin görünürlüğünü artırmanın önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anne, çocuk sağlığı, aşılama

PS 28

**Emir Muaz Karanfil¹, Hatice Bahar Şahin¹, Hüseyin Yüksek¹, Mehmet Efe Avcı¹, Meryem Düzen¹, Nisa Nur Yılmaz¹,
Rabia Gül Ünal¹, Sümeyye Taş¹**

¹İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri

Danışman Hoca: Hakan Ertem

İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Kanıta Dayalı Tıp Uygulaması ve izlenecek Yol Haritası

Kanıta Dayalı Tıp Tanımı

Hastanın değerlerine dayanarak bilimsel kanıtların uygulanmasını sağlar. En yüksek kaliteli kanıtlarla tıbbi sonuçları iyileştirmeyi amaçlar. Klinik karar verme sürecini geliştirmeyi hedefler. Klinik yargı ile tedavi hastaya özgü uyarlanır. Araştırma gücünü analiz ederek etkili kullanım sağlar.

Kanıta dayalı Tıp Uygulaması ve İzlenecek Yol

Klinik karar verme sürecinde en iyi kanıtların, hekim deneyimi ve hasta değerleriyle birleştirilmesidir. Süreç 5 adımdan oluşur.

Adımlar

1. Klinik soru oluşturma (PICO)
2. Literatür tarama
3. Kanıtların değerlendirilmesi
4. Uygulama
5. Performans değerlendirme

Kanıtların Değerlendirilmesi

Kanıtlar uygulanmadan önce bilimsel yöntemlerle analiz edilmelidir. Geçerlilik, önem ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilir.

Kanıt Düzeyleri

- A: Sistematiik derlemeler ve randomize çalışmalar
- B: Kohort çalışmalar
- C: Vaka-kontrol ve düşük düzey çalışmalar
- D: Uzman görüşleri

PS 29

Hastanemizde görev yapan sağlık çalışanlarındaki kuru göz sıklığı

İlayda Atlıhan¹, Ömer Faruk Sincer¹, Nuriye Kübra Taşkingül¹, Yahya Demir¹, Hatice Nur Demir¹, Arda Salman¹,
Furkan Eren Badas¹, Emir Efe Güney¹, Cem Çankaya²

¹İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

²İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Malatya

Sorumlu yazar mail: cem_cankaya@yahoo.com

ÖZET

Amaç: Kuru göz hastalığı, özellikle yoğun ekran kullanımı ve çevresel faktörlere maruziyet nedeniyle sağlık çalışanları arasında yaygın görülen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde görev yapan sağlık personelinde kuru göz sıklığını kontrol grubu ile karşılaştırarak Ocular Surface Disease Index (OSDI) anketi kullanarak değerlendirmektir.

Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışmaya 80 hastane personeli ve yaş-cinsiyet açısından benzer 80 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Tüm katılımcıların demografik verileri kaydedilmiş ve OSDI anketi uygulanmıştır. OSDI skorları 0–12 normal, 13–22 hafif, 23–32 orta ve ≥ 33 şiddetli kuru göz olarak sınıflandırılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalar uygun istatistiksel testler ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 80 sağlık personeli (38 erkek, 42 kadın) ve 80 kontrol grubu (42 erkek, 38 kadın) olmak üzere toplam 160 kişi dahil edilmiştir. Hastane personelinde kuru göz semptomları kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur ($p < 0.05$). OSDI skor ortalaması sağlık çalışanlarında kontrol grubuna kıyasla daha yüksek saptanmıştır ($[18.55 \pm 8.66]$ vs $[11.33 \pm 7.64]$). Sağlık çalışanlarında hafif, orta ve şiddetli kuru göz oranları sırasıyla [%40], [%11] ve [%8] iken, kontrol grubunda bu oranlar daha düşük bulunmuştur

Sonuç: Hastane personelinde kuru göz sıklığı kontrol grubuna göre daha yüksektir. Mesleki faktörler, kapalı ortam ve özellikle uzun süreli ekran kullanımı bu artışta rol oynayabilir. Sağlık çalışanlarında kuru göz açısından farkındalığın artırılması ve koruyucu önlemlerin alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: kuru göz, OSDI, sağlık çalışanları, kontrol grubu, prevalans

Danışman Hoca: Prof. Dr. Cem Çankaya

PS 30

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ekran Sürelerinin İncelenmesi ve Sonuçları

Rumet BEKİL^{*1}, Zeynep ARSLAN¹, Ayşe Betül ÖZKILIÇ¹, Kübra SÖNMEZ¹, Atakan ÖZÜŞ¹, Hüseyin Efe BATUR¹, Enes Ekrem KILIÇ¹, Emirhan AÇIKGÖZ¹, Muhammed Ramazan DUDAKLI¹,

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

*rumet.bekil@hotmail.com

Amaç:

Bu çalışmada, Tıp Fakültesi öğrencilerinde ekran süresi ile akademik başarı arasındaki ilişki incelenmiş; bu ilişkinin ders çalışma ve uyku süresi ile birlikte nasıl şekillendiği araştırılmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırma, 143 öğrenci ile gerçekleştirilen kesitsel anket çalışmasına dayanmaktadır. Katılımcılardan demografik bilgiler, ekran süresi, sınav haftası ekran kullanımı, ders çalışma süresi, uyku süresi ve sınav notları toplanmıştır. Veriler, değişkenlerin ölçüm özelliklerine uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir; ilişkiler Spearman korelasyon katsayısı, grup karşılaştırmaları ise ki-kare testi ile incelenmiştir. Tüm analizler Python tabanlı yöntemlerle Google Colab ortamında yeniden üretilebilir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin büyük bir kısmının günlük ekran süresinin yüksek olduğu, en yaygın kullanım aralığının 4–6 saat (%32.87) olduğu ve katılımcıların %82.52’sinin en çok telefon kullandığı belirlenmiştir. Sınav haftasında öğrencilerin %51.05’inin ekran süresini azalttığı ve ekran kullanımının büyük ölçüde ders çalışma amacıyla yönlendirildiği gözlenmiştir.

Ekran süresi (günlük ve sınav haftası) ile akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Spearman $\rho \approx -0.08$, $p > 0.05$). Buna karşılık, sınav haftasındaki ders çalışma süresi ile akademik başarı arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (Spearman $\rho = 0.245$, $p < 0.01$). Uyku süresi ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Tartışma ve Sonuç: Ekran süresi akademik başarıyı tek başına açıklamamaktadır. Buna karşılık ders çalışma süresi daha güçlü bir belirleyici olarak öne çıkmaktadır. Bulgular, akademik başarının zamanın miktarından çok kullanım biçimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca sonuçlar, ekran kullanımının etkisinin yalnızca süre ile değil, kullanım amacı ve bağlamı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekran süresi, akademik başarı, ders çalışma, zaman yönetimi

PS 31

Sosyal medya kullanımının ebeveynlerin aşı tutumları üzerindeki etkisi: İnfodemi ve dijital dezenformasyonun kesitsel analizi

Faruk Ensar Yurter^{1*}, Ali Dörtbudak¹, Muhammed Polat¹, Elçinur Keleş¹, Yusuf Arda Gökyokuş¹, Güner İrem Kaçar¹, Mustafa Tamer¹, Alperen Besle¹, Necmettin Akpınar^{2*}

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

²İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: necmettin.akpinar@inonu.edu.tr

Dijital çağda bilgiye erişimin hızlanması, beraberinde "İnfodemi" riskini getirmiştir. Sosyal medya platformları, kanıta dayalı olmayan spekülasyon içeriklerin yayılmasına ve ebeveynlerin aşı kararları üzerinde tereddüt oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çalışma, Malatya ilindeki ebeveynlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının aşılama yönelik tutum ve davranışları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte tasarlanmıştır. 2026 tarihinde, Malatya’da ikamet eden n=178 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan 17 maddelik dijital anket formuyla hazırlanmıştır. Katılımcıların %61,8’i kadın, %38,2’si erkektir. Eğitim durumu incelendiğinde %56,2’sinin üniversite ve üzeri mezuniyete sahip olduğu görülmüştür. Ebeveynlerin %43,8’i günlük 1-3 saat, %46,1’i ise 3 saatten fazla sosyal medya kullanmaktadır. En sık kullanılan platformlar Instagram (%74,7) ve YouTube (%49,4) olarak saptanmıştır. Araştırma, ebeveynlerin sağlık bilgisini alma noktası ile güven duydukları kaynak arasında büyük bir uçurum olduğunu göstermektedir. Katılımcıların %73,6 gibi çok yüksek bir oranı sağlık içerikleri için sosyal medyayı takip ederken, hekimleri temel bilgi kaynağı olarak görenlerin oranı %59,6’da kalmıştır. Sosyal medya içeriklerinin katılımcıların %19,1’inin aşı uygulama kararını doğrudan değiştirdiği veya ertelediği tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi yüksek grupta bilgi kirliliği farkındalığı (%71,0) yüksek çıksa da, bu grubun %21,0’inin spekülasyon paylaşımlar nedeniyle aşı tereddüdü yaşadığı gözlenmiştir. Araştırma, Malatya’da her beş ebeveyninden birinin aşı kararının dijital dezenformasyona açık olduğunu kanıtlamaktadır. Eğitim düzeyi koruyucu bir faktör olsa da, dijital mecralardaki duygusal manipülasyon tüm grupları etkilemektedir. Sağlık profesyonellerinin dijital mecralarda kanıta dayalı içeriklerle daha aktif rol almaları ve bu platformlarda kanıta dayalı tıbbi temsil eden dijital otoriteler olarak konumlandırılması toplumsal bağışıklama için kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: İnfodemi, Aşı Tereddüdü, Sosyal Medya, Malatya, Dijital Dezenformasyon

PS 32

Tıp fakültesi öğrencilerinde kafein kullanım alışkanlıkları ve bilimsel sağlık bilgisi farkındalığı

Mustafa Safa Pepele¹, Nehir Fahriogulları², Kübra Duran², Zeynep Özge Oğuz², Yağmur Taştan², Elifnaz Kaynar², Ali Osman Dal², Aleyna Gökteş², Görken Çolakça², İbrahim Tuna Özgül²

¹İNönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Malatya

²İNönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: safa.pepele@inonu.edu.tr

Özet

Kafein, üniversite öğrencileri tarafından uyanıklık, konsantrasyon ve akademik performansı desteklemek amacıyla sık kullanılan bir psikoaktif maddedir. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinde kafein kullanım alışkanlıkları, kafeine bağlı yan etkiler ve bilimsel sağlık bilgisi farkındalığı düzeyinin değerlendirilmesi amaçlandı. Tanımlayıcı-analitik kesitsel tasarımıdaki çalışmada veriler, çevrim içi yapılandırılmış anket formu ile toplandı. Analize 18 yaş ve üzeri toplam 311 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 20,3±2,4 yıl olup %52,4'ü kadındı. Öğrencilerin %64,3'ü düzenli kafein tükettiğini, %40,2'si her gün kafein aldığını bildirdi. Günlük kafein tüketimi tüm örneklemde %36,3 oranında 200 mg'dan az, %27,0 oranında 200–400 mg ve %4,2 oranında 400 mg'dan fazla olarak bildirildi. En sık tüketilen kafein kaynakları kahve (%65,0) ve çaydı (%59,2). Başlıca tüketim nedenleri tadını sevmeye/keyfi kullanım (%72,0), sosyal alışkanlık (%42,4) ve uyanık kalmaydı (%41,5). Katılımcıların %56,6'sı en az bir yan etki bildirdi; en sık yan etkiler çarpıntı (%29,9), uykusuzluk (%27,7) ve mide rahatsızlığıydı (%18,3). Öğrencilerin %59,5'i sınav döneminde kafein kullanımının arttığını belirtti ve bu durum düzenli kafein tüketimi ile anlamlı ilişkiliydi (p=0,003). Bilimsel sağlık bilgisi farkındalığı skoru 15 puan üzerinden 10,9±2,1 idi. Kanıt düzeyi en yüksek çalışma türünü doğru bilenlerin oranı %46,6, p<0,05 ifadesini doğru yorumlayanların oranı %35,4'tü. Bulgular, tıp fakültesi öğrencilerinde kafein kullanımının yaygın olduğunu ve bilimsel sağlık bilgisi farkındalığının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kafein, tıp öğrencileri, sağlık bilgisi, bilimsel farkındalık, kesitsel çalışma

PS 33

Deprem, Konaklama Ve Tıp Eğitimi

Dr. Saltuk Buğra KAYA, Elanur Demirhan, İlber Irak, Omar Farhat, Mobina Sabsalı, Beyen Aloulou, Sarah Jafari, Fakhriyya Alizade, Mohamad, Aswad

Bu çalışma, tıp fakültesi öğrencilerinde akademik erteleme davranışının sıklığını ve bu davranışın konaklama koşulları, akademik başarı (GANO) ve çalışma alışkanlıkları ile ilişkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında Malatya ilinde ortaya çıkan konut yetersizliği nedeniyle devlet yurtlarında oda kapasitesinin 4 kişiden 6 kişiye çıkarılmasıyla oluşan kalabalık yaşam koşullarının, öğrencilerin bireysel çalışma alanlarını kısıtlayarak akademik performansta azalma ve akademik erteleme davranışında artışa yol açabileceği öngörülmektedir. Akademik erteleme düzeyi Tuckman Academic Procrastination Scale kullanılarak değerlendirildi. Çalışmaya toplam 876 tıp fakültesi öğrencisi dahil edilmiş olup katılımcıların yaş ortalaması 21.58 ± 2.23 yıl ve günlük ortalama ders çalışma süresi 3.07 ± 1.76 saat olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %35.2'si devlet yurdunda, %33.9'u aile yanında, %17.4'ü özel yurttan ve %12.4'ü kiralık evde kalmaktadır; ayrıca %54.8'inin kendine ait bir odası bulunmamaktadır. Ayrıca, sınıf düzeyi ile erteleme davranışı arasında anlamlı fark saptanmış ($p < 0.001$) ve alt sınıflarda erteleme eğiliminin daha yüksek olduğu dikkat çekmiştir. Konaklama koşulları açısından değerlendirildiğinde, özellikle devlet yurtlarında kalan öğrencilerde “son dakikaya bırakma” davranışının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ($p < 0.001$) ve kendine ait odası olmayan öğrencilerde akademik erteleme eğiliminin belirgin şekilde arttığı ($p < 0.001$) saptanmıştır; bu durum, kalabalık yaşam koşullarının akademik erteleme üzerindeki olumsuz etkisini desteklemektedir. Oda arkadaşlarının bölümüne göre yapılan analizde, tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte kalanlar ile diğer bölümlerden öğrencilerle kalanlar arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Özellikle “işleri son dakikaya bırakma” davranışının diğer bölümlerden öğrencilerle kalanlarda daha yüksek olduğu ($p = 0.006$) ve “bir şeyi yapmamak için bahane bulma” davranışının bu grupta daha belirgin olduğu ($p = 0.016$) görülmüştür. Buna karşılık, “bugünün işini yarına bırakmama” eğiliminin tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte kalanlarda daha yüksek olduğu ($p = 0.044$) belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Malatya ilinde konteyner kentler ve vagon evlerin kademeli olarak boşaltılması sürecinde, bu barınma alanlarının yoğun akademik yükü olan tıp fakültesi gibi bölümlerde öğrenim gören öğrenciler için tahsis edilmesinin, kalabalık yaşam koşullarını azaltarak akademik erteleme davranışını düşürebileceği ve akademik başarıyı destekleyebileceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİME: Akademik erteleme, deprem, konaklama, tıp eğitimi

PS 34

Burun estetiğinin (rinoplasti) bireylerin özgüven ve sosyal algı üzerine etkisi

Merve Naz Gökşin¹, Efe Acar¹, Ahmed Elmuhammed¹, Eyşan Kadak¹, Hasan Alali¹, Muhammed Mustafa Polat¹, İrem Öztürk¹, Mirancan Güler¹, Ozan Erdem Karakeçe¹, Emrah Gündüz²

¹İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

²İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD, Malatya

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emrah Gündüz

Sorumlu yazar mail: emrah.gunduz@inonu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmanın amacı, rinoplasti uygulanmış bireylerde ameliyat sonrası dönemde özgüven ve sosyal algı düzeylerinde meydana gelen değişimi değerlendirmek ve elde edilen bulguları literatürdeki kanıtlarla karşılaştırmaktır.

Yöntem: Çalışma, rinoplasti geçirmiş 18 yaş üstü 113 gönüllü katılımcı üzerinde yürütülen anket temelli, gözlemsel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ameliyat öncesi ve sonrası özgüven, sosyal algı ve estetik memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Likert tipi sorular kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, medyan) kullanılmış; ameliyat öncesi ve sonrası puanların karşılaştırılmasında ise parametrik olmayan Wilcoxon İşaretli Sıra Testi (Wilcoxon Signed-Rank Test) tercih edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması $25,1 \pm 6,1$ (18-50 yaş aralığı) olarak saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda şu bulgular elde edilmiştir:

- **Estetik Memnuniyet ve Özgüven:** Hastaların burun görüntülerini sevmeye oranları 1,48'den 4,67'ye (5 üzerinden) yükselmiş; "burnunun olabildiğince iyi görüldüğü" algısı ise 1,39'dan 4,65'e çıkmıştır ($p<0,001$).
- **Sosyal Algı:** Arkadaş ve çevre tarafından beğenilme algısı 2,00'dan 4,68'e yükselmiştir ($p<0,001$).
- **Sosyal ve Profesyonel Konfor:** Burun görüntüsünün sosyal veya profesyonel aktiviteleri engelleme düzeyi 3,45'ten 1,34'e gerileyerek anlamlı bir düşüş göstermiştir ($p<0,001$).
- **Fonksiyonel İyileşme:** Nefes alma kalitesinde 2,04'ten 4,61'e anlamlı bir artış gözlemlenmiştir ($p<0,001$).
- **Tekrar Ameliyat İsteği:** Ameliyat öncesi cerrahiye olan ihtiyaç/istek puanı 4,87 iken, ameliyat sonrası bu oran 1,82'ye düşerek yüksek hasta memnuniyetini doğrulamıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda, rinoplasti operasyonu geçiren bireylerde ameliyat sonrası özgüven ve sosyal algı düzeylerinde istatistiksel olarak çok anlamlı bir artış görülmektedir. Fiziksel görünümdeki iyileşme, bireylerin sosyal ve profesyonel hayatlarındaki engelleri azaltmakta ve yaşam kalitesini hem estetik hem de fonksiyonel açıdan pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Rinoplasti, özgüven, sosyal algı, yaşam kalitesi, estetik memnuniyet

PS 35

Elektronik Sigara: Bağımlılığın Yeni Yüzü

Mert BURULDAY1, Muhammed Arda ÇETİN1, Safahan EKİCİ1, Zehranur BATUR1, Müfide ŞEREFHANLI1,
Firaz ELHAMMUD1, Engin Burak SELÇUK2
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
buruldaymert012@gmail.com

Elektronik sigara maruziyeti, temel organ sistemleri üzerinde geniş bir yelpazede advers reaksiyonlara sebebiyet vermektedir. Solunum sisteminde orofaringeal irritasyon, enflamatuar süreçler ve ciddi havayolu obstrüksiyonlarına yol açan bu ürünler; oral ve gastrointestinal düzeyde periodontal hastalıklar, diş eti enflamasyonu ve sistemik semptomlarla ilişkilendirilmektedir. Kardiyovasküler sistemde hemodinamik parametreleri bozarak nabız ve kan basıncı artışını tetiklemekte, nörolojik boyutta ise anksiyete, tremor ve kognitif fonksiyon kayıpları gibi negatif etkiler doğurmaktadır. Ayrıca, e-sigara likitlerinin dermal irritan özellikleri ve kazara yutulması halinde oluşabilecek akut toksisite riskinin yanı sıra, yüksek konsantrasyonlarda DNA hasarı ve karsinojenik potansiyel üzerinden genotoksik bir tehdit oluşturduğu saptanmıştır.

Elektronik sigara (e-sigara) maruziyeti; ağız, burun, trakea ve bronş sisteminde inflamatuvar reaksiyonları tetiklemektedir. Ana bileşen olan propilen glikol ve salınan ağır metaller (nikel, krom, kadmiyum vb.); hava yolu tıkanıklığı, dispne ve mukozal irritasyonun yanı sıra nazofarenks kanserleri için risk oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda artış gösteren EVALI Sendromu (e-sigara kaynaklı akciğer hasarı), ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Akut dönemde nabız ve kan basıncı artışına neden olan e-sigara kullanımı, içeriğindeki nikotin nedeniyle aritmi; karbonil ve akrolein gibi bileşenler nedeniyle yüksek kardiyovasküler toksisite riski taşımaktadır. Literatürde, kullanım sonrası gelişen akut miyokard enfarktüsü vakaları mevcuttur.

Adölesan dönemdeki kronik maruziyet, bellek ve dikkat fonksiyonlarında kalıcı bozulmalara yol açmaktadır. Klinik raporlar, e-sigara kullanımı ile kronik baş ağrısı ve nöbetler arasında ilişki kurmaktadır. Likit içeriğinin oral yolla eser miktarda dahi alınması; konfüzyon, ajitasyon ve letarji gibi akut nörotoksik tabloları tetikleyebilmektedir.

E-sigara aerosoller; formaldehit, akrolein ve tütüne özgü nitrozaminler gibi DNA hasarına yol açan karsinojenik maddeler içermektedir. Nane aromalı likitlerde saptanan pulegon maddesi bu riski artırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Elektronik Sigara, Nikotin, Evali Sendromu

PS 36

Yapay zekâyı tanı aracı olarak kullanan hastaların memnuniyet düzeyi ve hekime başvuru davranışına etkisi

Fatih Fidan¹, Ali Osman Çapar¹, Duygu Ada Erçin¹, Uğur Kaya¹, Esra Akköse¹, Ali Baran Boyraz¹, Abdulkadir Karakavak¹, Arif Eren Kurt¹, Erdiñ Çay¹, Burak Dönmez¹, Burcu Kayhan Tetik²

1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1

2. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Malatya

Sorumlu yazar: burcu.tetik@inonu.edu.tr

Giriş: Günümüzde pek çok hasta, semptomlarını sorgulamak ve olası tanılar hakkında fikir edinmek amacıyla YZ tabanlı araçlara başvurmaktadır. Bu eğilim; hekim-hasta iletişimini, sağlık hizmetlerine başvuru davranışını ve tedavi süreçlerini doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir.

Bu çalışmada; polikliniğe başvuran yetişkin bireylerin YZ'yi tanı aracı olarak kullanma alışkanlıklarını, bu kullanımdan duydukları memnuniyeti ve söz konusu kullanımın hekime başvuru davranışlarına yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Materyal/Metod: Bu çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı-analitik bir araştırma modeliyle yürütülmüştür. TOTM hastanesi polikliniklerine Ocak–Mart 2026 tarihleri arasında başvuran ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 102 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Katılımcılar; demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi), YZ kullanım alışkanlıkları, hekime başvuru davranışları, güvenilirlik algıları ve YZ'ye ilişkin genel tutumlarını değerlendiren 19 sorudan oluşan yapılandırılmış bir anket formunu doldurmuştur.

Bulgular: Araştırmaya katılan 102 bireyin sosyodemografik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri

Değişken	n	%
Yaş Grubu		
18–25	46	45,1
Cinsiyet		
Kadın	42	41,2
Erkek	59	57,8
Eğitim Durumu		
Değişken	n	%
Lisans	44	43,1
Toplam	102	100,0

Sonuç: Bu araştırma, hastaların YZ'yi sağlık bilgisi kaynağı olarak benimsediğini, ancak profesyonel tıbbi değerlendirmeye olan güvenin büyük ölçüde sürdüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, tanı aracı, hasta memnuniyeti, hekime başvuru davranışı,

PS 37

MELAS Sendromunda Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Klinik Bulgular ve Moleküler Temelin Kanıta Dayalı Analizi

Betül KAYADUMAN, Semanur ANIK, Elif Nur AKINTI, Seyit YILDIRIM
Baran SABANCI, Yusuf Arda ÖLMEZ, Berk SAĞIR, Arif Yılmaz TURAN, Murat BİNGÖL, Zeynep ÇAVDARCI,
Elif Nur AKINTI

Danışman: Prof. Dr. Ahmet KOÇ

MELAS sendromu (Mitokondriyal Ensefalomiyopati, Laktik Asidoz ve İnme-benzeri ataklar), mitokondriyal DNA'daki mutasyonlara bağlı gelişen, başta beyin ve kas dokusu olmak üzere çok sayıda sistemi etkileyen nadir fakat klinik açıdan önemli bir hastalıktır. En sık ilişkili mutasyon, MT-TL1 geninde yer alan m.3243A>G değişikliğidir ve bu mutasyon mitokondriyal protein sentezini bozarak hücrel enerji üretiminde ciddi aksamalara yol açar. Enerji üretimindeki bu yetersizlik, özellikle yüksek enerji gereksinimi olan dokularda belirgin klinik bulguların ortaya çıkmasına neden olur.

Hastalık genellikle çocukluk veya erken erişkinlik döneminde başlar ve 40 yaşından önce tanı alır. Klinik olarak en karakteristik bulgu, klasik vasküler dağılıma uymayan inme benzeri ataklardır. Bunun yanında epileptik nöbetler, kas güçsüzlüğü, laktik asidoz, işitme kaybı ve endokrin bozukluklar sık görülür. Tanıda klinik şüphe büyük önem taşır; özellikle genç hastalarda atipik inme bulguları varlığında MELAS akılda tutulmalıdır. Tanı süreci, biyokimyasal testler (laktat/piruvat oranı), görüntüleme yöntemleri ve genetik analizlerle desteklenir.

Günümüzde MELAS için kesin bir tedavi bulunmamakla birlikte, semptomları azaltmaya yönelik çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. L-arginin tedavisi vasküler etkileri sayesinde inme benzeri atakların sıklığını ve şiddetini azaltabilirken, koenzim Q10 desteği mitokondriyal enerji üretimini desteklemeyi amaçlar. Ayrıca gen terapisi çalışmaları umut verici olmakla birlikte henüz deneysel aşamadadır. Hastaların yönetiminde nöroloji, genetik, kardiyoloji ve diğer disiplinlerin yer aldığı multidisipliner yaklaşım büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: MELAS sendromu, mtDNA, Mitokondriyal Ensefalomiyopati

PS 38

İnsan bedeninde umudun ve korkunun savaşı: zihnin bedeni yönlendirme gücü

Osman Ünal¹, Mehmet Akkoç¹, Yağmur Altun¹, Nurevşan Polat¹, Zeki Öztunç¹, Firdevs Bensu Karabaş¹, Muhammed Ali Kılıç¹, Mehmet Onat Doğan¹, Abdulkerim Yemez¹, Nisa Nur Atay¹

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I, Malatya

*Sorumlu yazar: 01240101060@inonu.edu.tr

Plasebo ve nocebo etkileri, zihnin bedensel süreçler üzerindeki doğrudan etkisini gösteren önemli psikobiyojik olgulardır. Plasebo etkisi, bireyin iyileşeceğine dair olumlu beklentisi ve koşullanması sonucunda bir tedaviyle ilişkili olarak algılanan veya ölçülebilir fayda ortaya çıkmasını ifade ederken; nocebo etkisi, olumsuz beklentiler ve kaygılar nedeniyle zararsız bir durumun ya da tedavinin gerçek fiziksel yan etkilere yol açmasıdır. Plasebo etkisi, temelde “beklenti teorisi” ve ilacın etkisiyle plasebonun eşleşmesine dayanan “klasik koşullanma” mekanizmaları ile açıklanmaktadır. Bu süreçler birlikte daha güçlü bir etki oluşturmakta ve nörobiyolojik düzeyde endojen opioid sistemleri, dopaminerjik yollar ve kolesistokinin gibi nöromodülatör sistemlerin aktivasyonu ile ilişkilendirilmektedir. Nocebo etkisi ise hekimlerin olumsuz veya korkutucu dil kullanımı, ilaç prospektüslerindeki uyarılar ve medyada yer alan abartılı bilgiler gibi dış etkenlerin yanı sıra bireyin içsel duygusal durumu ile de tetiklenebilmektedir. Nitekim bazı çalışmalarda, geçmişteki olumsuz deneyimleri hatırlayan ergen bireylerin, zararsız uyarılarına daha ağırlı algıladığı gösterilmiştir; bu durum ergen beyninin tehditlere karşı artmış duyarlılığı ile açıklanmaktadır. Geçmişte şüpheyle karşılanan bu mekanizmalar, günümüzde nörobilimsel kanıtlarla desteklenmekte ve klinik pratikte dikkate alınması gereken önemli faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu etkiler, aktif tedavinin yerine geçmek amacıyla değil, tedavi etkinliğini artırmak üzere etik bir çerçevede değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, hekimlerin risk vurgusundan ziyade dengeli ve güven verici bir iletişim dili kullanması, nocebo etkisini azaltarak iyileşme sürecini ve zihin-beden bütünlüğünü destekleyebilir.

Anahtar kelimeler: Plasebo etkisi, Nocebo etkisi, Beklenti, Klasik koşullanma, Nörobiyoloji, Ağrı algısı

PS 39

Ankilozan spondilit düşünülen olgularda *HLA-B27* alelinin sıklığı

Ahmet Ferit Elmastaş*, Hayrunnisa Akan, Alkım Naykı, Yusuf Taha Kanmaz, Ayşe Sıla Durmaz, Yasemin Gül, Abdulrahman Bitar, Zohra Saddique Noor Mohamed, Ahmet Sohaib İbrahim Balla, Muhammet Özakan

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Dönem 1, Malatya

* elmastasahmet13@gmail.com

Danışman: Prof. Dr. Elif YEŞİLADA

Ankilozan spondilit (AS) omurga, eklemler ve eklem çevresi dokuları etkileyen, kronik, ilerleyici inflamatuvar bir hastalıktır. Ankilozan spondilitin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, özellikle *HLA-B27* alelinin pozitifliği, hastalıkla ilişkilendirilmektedir. AS hastalarının yaklaşık %90'ında *HLA-B27* alelinin pozitifliği rapor edilmektedir. Ancak, *HLA-B27* pozitif olan herkesin AS geliştirmemesi, tek başına bu aleli taşımanın yeterli olmadığını, başka genetik faktörlerin ve çevresel tetikleyicilerin de devreye girdiğini göstermektedir. Bu çalışmada, son bir yıl içerisinde İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin çeşitli birimlerinden **Genetik Hastalıklar Tanı Merkezine** *HLA-B27* alelinin varlığını belirlemek üzere **yönlendirilen 811 olgu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan, 534 kadın ve 277 erkek bireyden oluşan grupta *HLA-B27* alelinin sıklığı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre**, refere edilen olgulardan 107 tanesinin (%13,19) *HLA-B27* pozitif olduğu bulunmuştur. Pozitiflik oranı kadınlarda %8,99 iken erkeklerde %21,30 olarak hesaplanmıştır. Çalışmamızda *HLA-B27* pozitiflik oranı literatürden farklı olarak düşük bulunmuştur. Bu farklılık, AS düşünülen ve sadece ön tanısı bulunan hastaların çalışmaya dahil edilmesi ile açıklanabilir. AS tanısı olan ve daha büyük bir örneklem ile çalışmanın yapılması toplumumuzda AS ve *HLA-B27* pozitifliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymak bakımından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, HLA B-27, spondiloartrit

PS 40

Kalp Hızı Değişkenliğinin Stres Araştırmalarında Kullanımı

Yusuf Ziya Yanardağ^{*1}, Mehmet Emin Yıldız¹, Ferhat Akıcı¹, Muhammet Enes Bulut¹, Zeynep Gülcan¹,
Elif Sıla Karabulut¹, Arda Kurtoglu¹, Merve Arı¹, Adar Mirza Kolak¹,
Beyza Çekmegelioğlu², Sedat Yıldız²

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Battalgazi, Malatya

²İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Battalgazi, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: 01250101005@ogr.inonu.edu.tr

Vücudumuzda stresi yöneten iki ana sistem vardır. Bunlar otonom sinir sisteminin sempatik dalı (vur-ya da kaç mekanizması) ve hipotalamo-pituiter-adrenal (HPA) eksenidir. Otonom sinir sisteminin aktivitesinin ortaya konması için, sempatik sinir sisteminin dallarına tungsten elektrotlar yerleştirilerek, sempatik aktivitenin ölçülmesi bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Fakat bu yöntemin en önemli dezavantajları arasında uygulamanın invazif olması, sinir lifine iğne batırılmasını gerektirmesi ve bu nedenle “beyaz önlük stresi”ni tetiklemesi, nispeten pahalı aygıt gerektirmesi, laboratuvar ortamında ve profesyonel uygulayıcılar tarafından uygulanması gerekliliği bulunmaktadır. Bu bağlamda üzerinde en fazla durulan ve uygulanan yöntem kalp hızı değişkenliği (KHD)’dir. Vücuttaki birçok sistem gibi, kalbin çalışması otonom kontrol altındadır. Sempatik sistem kalbi hızlandırırken, parasempatik sistem kalbi yavaşlatmaktadır. KHD, sempatovagal sistemin kalbi yönetmek için oluşturdukları “çekişmeyi” sunmaktadır. Aritmik olmayan bireylerde, dakikada kalp atım sayısının 70 civarında olduğu bir senaryoda, her bir kalp siklusunun 0.86 saniye olacağı hesaplanabilir. Kalp atım sayısı bu şekilde olan sağlıklı bir insanda, ardışık kalp atımlarındaki süre “monoton” değildir ve atımlar arası süre 0.70 saniye ile 1.00 saniye arasında değişiklik gösterir. Buna kalp hızı değişkenliği adı verilir ve en az 5 dakikalık süre için devamlı bir kayıt alınarak hesaplanır. Bir kişide KHD ne kadar yüksek ise (ne kadar monoton değilse), kişinin o kadar “az stresli” olduğu düşünülmektedir. Klinik ve temel veriler de bunu desteklemektedir. Kalp hızı değişkenliğini belirlemek için genellikle elektrokardiyografik (EKG) verilerden faydalanılır. Bu amaçla, ölçümü yapılacak kişiden 5 dakika süreyle aralıksız EKG kaydı yapılarak, yazılımlarla her bir kalp siklusunun R-R aralıkları ortaya konur. Matematiksel hesaplamalarla zaman-bağımlı parametreler ile frekans-bağımlı parametreler belirlenir. Kalp hızı değişkenliği (KHD), kişinin yaşadığı stresi objektif olarak verebilen bir parametre olarak incelenmektedir. Bu sistem aktivitesinin non-invazif olarak ölçülebilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır.

PS 41

Tıp eğitiminde hipnoz uygulamalarının etkisi: Derleme

Ahmet Oğuz Özkan^{*1}, İlke Yıldırım¹, Arda Varlı¹, İremnur Özcan¹, Ebru Bayraktar¹, Tülay Eda Kılınç¹, Mustafa Eren Kısa¹

^{*1}: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, Malatya
ardavarli63mail.com

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, tıp öğrencilerinde yaygın olarak görülen sınav kaygısının azaltılmasında klinik hipnoz ve kendi kendine hipnoz (self-hypnosis) tekniklerinin etkililiğini literatür ışığında değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma, sınav kaygısı, hipnoz ve gevşeme teknikleri üzerine yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaların sistematik olmayan literatür taraması şeklinde yürütülmüştür. Özellikle tıp öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş; klinik hipnoz, kendi kendine hipnoz ve diğer gevşeme tekniklerinin psikolojik etkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Literatür bulguları, sınav kaygısının bilişsel, duygusal ve fizyolojik bileşenleri olan çok boyutlu bir yapı olduğunu ve özellikle tıp öğrencilerinde yüksek akademik baskı nedeniyle daha sık görüldüğünü ortaya koymaktadır. Klinik hipnozun kısa süreli uygulamalarla dahi kaygı düzeylerini azaltabildiği gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, bireylerin bağımsız şekilde uygulayabildiği kendi kendine hipnoz tekniklerinin de sınav kaygısını azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir. Otojenik eğitim ve progresif kas gevşetme gibi diğer gevşeme yöntemlerinin de psikolojik iyi oluş üzerinde olumlu etkiler sağladığı saptanmıştır. Ancak çalışmaların çoğunda küçük örneklem büyüklükleri ve öz-bildirim temelli ölçüm araçları gibi metodolojik sınırlılıklar bulunmaktadır.

Sonuç:

Klinik hipnoz ve kendi kendine hipnoz teknikleri, tıp öğrencilerinde sınav kaygısının azaltılmasında etkili ve uygulanabilir yöntemler olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, daha geniş örneklemli ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sınav kaygısı, tıp öğrencileri, klinik hipnoz, self-hipnoz, gevşeme teknikleri

PS 42

Low-Value CT imaging in histopathologically confirmed appendicitis: Radiation exposure, costs, and ED length of stay

İpek Ergün^{*1}, Ahmet Ege Büyükfırat¹, Ahsen Öztürk¹, Ali Efe Aktürk¹, Ahmet Deniz Topal¹, Ahmet arda altuner¹, Yağmur Irmak¹, Zehra Keser¹, Aram Miran Yamuk¹

^{*1}İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: serdar.derya@inonu.edu.tr

Abstract

Objective: To determine how often computed tomography (CT) is performed despite already positive ultrasonography (US) findings—defined as potentially avoidable CT (PA-CT)—in patients with histopathologically confirmed acute appendicitis, and to evaluate the associated radiation exposure, imaging costs, and emergency department (ED) length of stay (LOS).

Methods: We conducted a single-center retrospective cohort study including 887 consecutive patients who underwent appendectomy between January 2023 and December 2025. The association between PA-CT use and ED LOS was assessed using a gamma generalized linear model, and independent predictors were examined with multivariable logistic regression. A propensity score–matched sensitivity analysis (1:1, 90 pairs) was performed.

Results: CT was performed in 87.6% of patients (777/887), and 10.4% (81/777) met PA-CT criteria. Notably, 43.8% of patients with positive US findings underwent additional CT. These examinations accounted for 648 mSv of radiation exposure and 26,667 TL (~\$811 USD) in additional imaging costs; nearly half of affected patients were pediatric (49.4%). In adjusted analyses, PA-CT use was associated with a modest but significant increase in ED LOS (IRR=1.051, 95% CI 1.009–1.095; p=0.016), corresponding to approximately 18 minutes. Presentation during working hours showed a stronger association with prolonged LOS (IRR=1.162; p<0.001), suggesting a greater role for system-level workflow factors. US findings were the only independent predictor of PA-CT use (OR=2.194, 95% CI 1.616–2.979; p<0.001), whereas no clinical or laboratory variables were associated.

Conclusion: CT use remained frequent even when ultrasonography had already established the diagnosis. This pattern was not explained by patient-level factors, but instead suggests system-level and behavioral influences in imaging decisions. Limiting CT use after positive US may reduce unnecessary radiation and improve ED efficiency without compromising diagnostic confidence.

Keywords: acute appendicitis; computed tomography; low-value imaging; emergency department length of stay; imaging stewardship; radiation exposure; clinical decision-making

PS 43

Klasik Otopside Kullanılan Temel İnceleme Teknikleri

Fatma Halat¹, Yusufcan Aspar¹, Eylül Hediye Ekin¹, Kağan Karaağaç¹, Bedirhan Özgan¹, Ayşegül Dursun¹,
Nurgül Ateş¹, Zehra Zehir¹, Muhammed Enes Yıldırım¹, Yağız Mert Şerefoglu¹, Mesut Yılmaz²

1-İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi

2-İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli vakalarda ölüm nedeninin belirlenmesi için kullanılan temel otopsi diseksiyon yöntemlerinin incelemesi amaçlanmaktadır. Adli otopsilerde, Virchow tekniği, Rokitansky (In Situ) tekniği, Ghon (En Blok) tekniği ve Letulle (En Masse) tekniği olmak üzere dört temel diseksiyon tekniği kullanılmaktadır. Virchow tekniğinin temel prensibi, organların tek tek çıkarılmasıdır. Bu teknik, bazı modifikasyonlarla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Her organdaki patolojik değişiklikler iyi bir şekilde gösterilebilir. Organ ile sistemler arasındaki ilişkinin değerlendirme güçlüğü tekniğin dezavantajlı yönüdür. Rokitansky tekniğinde, her organ in situ muayene edilir ve açılır, anormal anatomik ilişki saptanırsa veya gerek duyulursa organlar kısmen blok şeklinde dışarı çıkarılır. Tüm organ ve sistemler bir arada değerlendirilebilir. Ancak derin dokulardaki patolojilerin tespitinin zor olması, vücudun arka bölgelerinde kalan sistem ilişkilerinin incelenmesinin zor olması tekniğin olumsuz yanıdır. Ghon tekniğinde, göğüs ve boyun organları, karın organları ve ürogenital sistem organları bloklar şeklinde çıkarılır. Organ ilişkilerinin incelenmesi sağlar. Günümüzde Ghon tekniğinin modifikasyonları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Letulle tekniğinde, göğüs, boyun, karın ve pelvis organları bir bütün halinde çıkarılır. Tüm organ ve sistemler bir arada değerlendirilebilir. Adli tıp pratiğinde, hatalı pozitif veya negatif bulgu riskini en aza indirmek, yargı sürecinde kanıta dayalı, denetlenebilir ve bilimsel standartlara uygun veri sunabilmek adına; vakaya göre yöntemin seçilmesi gerekir. Bu nedenle yöntem seçimi, vakanın özellikleri dikkate alınarak yapılmalı ve en uygun yöntem tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler: otopsi, diseksiyon, otopsi teknikleri

PS 44

Tıp fakültesi öğrencilerinin otopsi hakkında bilgi ve tutum düzeylerinin belirlenmesi

Rüveyda SÖĞÜT¹, Yiğit Ali ER¹, Mehmet Ali ÖKSÜZOĞLU¹, Batıkan OLUÇ¹, İlgın KULAK¹, Poyraz SEZGİN¹, Çağan KAMIŞLI¹, Ayşe Serra NAMDAR¹, Erkal GÜMÜŞBOĞA²

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I, Malatya

²İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya

Giriş-Amaç: Tıp eğitiminde adli otopsi konusundaki bilgi ve tutumları hekimlerin mesleki hayatlarındaki adli-klinik vakalara yaklaşım becerisini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; fakültemiz tıp öğrencilerinin adli otopsi kavramı ve uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerini ölçmek, tutumlarını değerlendirmek ve tıp eğitimindeki olası ihtiyaçlara ışık tutmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir anket çalışmasıdır. Araştırmanın evrenini, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmaya katılmayı kabul eden kişilerin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür taraması doğrultusunda geliştirilen yapılandırılmış online bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılara sosyodemografik verilerinin, adli otopsi konusunda bilgiyi ve tutumlarının sorgulandığı toplamda 3 bölümden oluşan 24 soruluk anket yöneltilmiştir. Veriler, sayısal olarak sınıflandırılmış ve istatistiksel analiz programı (SPSS v.24) kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde, ortalama $\pm$ standart sapma ve ortanca (minimum–maksimum) olarak verilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-kare testi ile, değişkenler arasındaki korelasyon ise Spearman analizi ile değerlendirilmiştir. Kategorize bağımlı değişkenler için ordinal lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. $p < 0,05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza 252 öğrenci katıldı. Katılımcıların bilgi puanı ortalaması: 7,06 (0-12 puan aralığı), tutum puanı ortalaması 34,4 puan (9-45 puan aralığı) olarak hesaplandı. Bilgi düzeyi ile tutum düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (Pearson ki-kare = 17,109; sd = 4; $p = 0,002$). Bilgi düzeyi arttıkça yüksek tutum düzeyine sahip bireylerin oranının arttığı görüldü. Ayrıca bilgi toplam puanı ile tutum toplam puanı arasında pozitif yönde, bir korelasyon saptandı (Spearman's rho = 0,294; $p < 0,001$). Adli otopsiye şahit olma durumu ile bilgi düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (Pearson ki-kare = 1,046; sd = 2; $p = 0,593$). Benzer şekilde, katılımcıların yakınlarına otopsi yapılıp yapılmaması ile bilgi düzeyi arasında da anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada adli otopsi konusunda bilgi ve tutum düzeylerini anlamlı derece artıran en önemli unsurun adli otopsi konusunda alınan eğitimler olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Adli otopsi, Eğitim, Tıp fakültesi öğrencileri, kesitsel

PS 45

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğrencilerinde Kahve Tüketiminin Uyku ve Çalışma Düzenine Etkileri

Elif Merve Atasoy, Zeynep Nisa Neris Turgut, Ayşe Sema Şahin, Hacer Beyazıt İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

Danışman öğretim üyesi: Leyla Beytur Sorumlu yazar e-mail: m.atasoy2006@gmail.com

Giriş: Kahve, yaygın olarak tüketilen ve merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi bulunan bir maddedir; tıp fakültesi öğrencileri, dikkatlerini artırmak ve uyanıklıklarını sürdürmek amacıyla sıklıkla kahve tüketimine yönelmektedir. Kısa vadede olumlu etkiler gösterebilen kahve, dozuna ve tüketim zamanına bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilmekte; özellikle yüksek miktarda veya günün geç saatlerinde tüketildiğinde uyku düzenini bozarak uyku kalitesini düşürebilmekte ve dolaylı olarak öğrenme ve dikkat süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı; tıp fakültesi öğrencilerinin kahve tüketim alışkanlıklarını analiz ederek, bu alışkanlığın ders çalışma verimliliği, odaklanma süresi ve uyku düzeni üzerindeki etkilerini somut verilerle ortaya koymaktır.

Gereç ve yöntem: Bu araştırma 3 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 2025-2026 yılı dönem 1 öğrencilerinden 32, dönemde 2 öğrencilerinden 9, dönem 3 öğrencilerinden 9, dönem 4 öğrencilerinden 3, dönem 5 öğrencilerinden 2 olmak üzere toplam 55 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, öğrencilerden gönüllülük esasına dayalı olarak anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket kahve tüketiminin odaklanma süresi ve uyku düzeni üzerine etkisini değerlendiren sorular içermektedir. Elde edilen veriler sayısal olarak sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya farklı dönemlerden toplam 55 tıp fakültesi öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin dönem ortalaması $1,82 \pm 1,17$ olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin %60'ı ($n=33$) gün içerisinde kahve içmeye ihtiyaç duyduğunu belirtirken, %40'ı ($n=22$) ihtiyaç duymadığını ifade etmiştir. Günlük kahve tüketim miktarı ortalaması $1,55 \pm 0,96$ fincan olarak bulunmuştur. Katılımcıların günlük uyku süresi ortalaması $6,48 \pm 1,32$ saat olarak saptanmıştır. Uyku süresi ile kahve tüketimi birlikte değerlendirildiğinde, daha kısa süre uyuyan öğrencilerin kahve tüketimine daha fazla ihtiyaç duyduğu gözlenmiştir. Kahve tüketiminin odaklanma üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde (1=azalma, 2=değişiklik yok, 3=hafif artış, 4=belirgin artış), odaklanma puanı ortalaması $2,56 \pm 0,68$ olarak saptanmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu odaklanmada hafif artış veya değişiklik olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte, bazı öğrenciler çarpıntı gibi yan etkiler nedeniyle odaklanmada azalma yaşadığını ifade etmiştir. Genel değerlendirmede, öğrenciler arasında kahve tüketiminin yaygın olduğu, uyku süresinin görece düşük olduğu ve kahve tüketiminin odaklanma üzerinde ortalama düzeyde olumlu etkiler oluşturduğu, ancak bireysel farklılıklara bağlı olarak olumsuz etkilerin de görülebildiği belirlenmiştir.

Sonuç ve öneriler: Bu çalışmanın bulguları, tıp fakültesi öğrencileri arasında kahve tüketiminin yaygın olduğunu ve genellikle uyanıklık ile odaklanmayı artırma amacıyla tercih edildiğini göstermektedir. Düşük uyku süresinin kahve tüketimini artırdığı ve daha az uyuyan öğrencilerin daha fazla kahve tüketme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Kahve tüketiminin çoğu öğrencide uyanıklık ve odaklanma üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu, ancak bazı bireylerde yan etkilere bağlı olumsuz sonuçlar görülebileceği saptanmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin uyku düzenlerinin iyileştirilmesi ve kahve tüketiminin bilinçli şekilde sınırlandırılmasına yönelik eğitimlerin artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kahve tüketimi, tıp fakültesi öğrencileri, odaklanma süresi, uyku düzeni.

PS 46

İnsan Vücudunda Çizgili Kas Varyasyonları Ve Klinik Önemi

Sedef Köksal, Dilek Koz, Ahmet Baha Aksakal, Ahmet Talha Kaya, Mehmet Nur
İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp fakültesi, İngilizce Tıp Dönem 1, Malatya
Danışman öğretim üyesi: Leyla Beytur
Sorumlu yazar e-mail: sdf07kksl@gmail.com

Giriş: Kas varyasyonları, insan anatomisinin doğal bir parçası olup, embriyolojik gelişim sürecinde meydana gelen küçük farklılıkların bir sonucudur. Bu varyasyonlar genellikle normal anatomik sınırlar içerisinde değerlendirilir ve çoğu bireyde herhangi bir klinik belirtiyeye yol açmaz.

Metot ve Yöntem: Bu alanda yazılmış olan makaleler incelendi.

Bulgular ve Çıkarımlar: İnsan vücudundaki kaslar; hacim, şekil, yapı, konum (başlangıç ve bitiş noktası) ve sayı bakımından belirli derece de farklılık gösterir ve bu morfolojik dalgalanmalara kas varyasyonu denir. Bu kas varyasyonlarından en yaygın görüleni (nüfusun %80-85'inde) ön kolda bulunan ve el bileğine fleksiyon yaptıran m. palmaris longus kasının varyasyonlarıdır. Kas varyasyonlarının avantajları olduğu kadar dezavantajları da olduğundan bu varyasyonların klinik ve cerrahi açıdan bilinmesi önem taşımaktadır. Örneğin m. palmaris longus kası ameliyatlarda yedek tendon olarak kullanılabilir ya da m. pyramidalis kası (karın ön duvarında bulunan, ancak insanların %10' unda olmayan bir kas) sezaryen ameliyatlarında cerraha batına nereden girileceği konusunda kılavuzluk yapabilir. Bu avantajlara karşın bazı kas varyasyonlarının sinir sıkışmasına veya tanı hatalarına sebebiyet vermesi ise dezavantajlarıdır. Bu tanı hatalarının önüne geçmek için Ultrasonografi (USG), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi tıbbi yöntemleri haricinde basit testler de kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerle fark edilebilen kas varyasyonları güçlü bir belirti vermediği ve hastanın sağlığı üzerinde görünür bir etki yaratmadığı için günlük hayatta fark edilmez.

Sonuç: İnsan kas anatomisinin belirli bir standardı olsa da belirli farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkların kişilerin hayatına genelde bir etkisi olmasa da bazı durumlarda avantaj veya dezavantajlarına rastlamak mümkündür.

Anahtar kelimeler: Çizgili kas, varyasyon , anatomi, tanı, ameliyat.

PS 47

Tıp fakültesi dönem I ve dönem II öğrencilerinde bel/basen oranı ve sporla ilişkisi

Emirhan Akçiçek, Kaan Kavas, Berat Mert Uyan, Alp Attila Yılmaz, Enes Alver, Sami Yusuf Özdemir, Mehmet Faik Canan, Eren Ağzıküçük, Mustafa Kerem Kaplan,

Ahmet Buğra Şerefhanlı

**İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem I
Malatya**

Danışman:Dr.Öğ.Üyesi Aymelek Çetin

Amaç: Literatürde bel çevresi genişlediğinde tip 2 diyabet riskinin arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencilerinde erken dönemde bel/basen oranı ile tip 2 diyabet arasındaki ilişki hakkında farkındalık yaratmak için bu çalışma düzenlendi. Çalışmaya 51 kız öğrenci (50.5%), 50 erkek öğrenci (49.5%) olmak üzere toplam 101 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.

Erkek öğrencilerde Boy: 177.7 cm (Standart Sapma: ± 5.5), Kilo: 76.8 kg (Standart Sapma: ± 19.2), Bel: 85.5 cm (Standart Sapma: ± 10.0), Basen: 100.8 cm (Standart Sapma: ± 8.8)

Bel/Basen Oranı: 0.85, Vücut Kitle İndeksi (BMI): 24.3

Kız öğrencilerde Boy: 165.7 cm (Standart Sapma: ± 4.9), Kilo: 60.6 kg (Standart Sapma: ± 11.7)

Bel: 70.5 cm (Standart Sapma: ± 7.2), Basen: 97.8 cm (Standart Sapma: ± 7.9)

Bel/Basen Oranı: 0.72, Vücut Kitle İndeksi (BMI): 22.1

Bel ölçüsünde kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı fark gözlemlendi ($t=8.67$, $p=0.0000$).

Bel/Basen oranında ($t=10.29$, $p=0.0000$) ile BMI 'de ($t=2.32$, $p=0.0226$) anlamlı fark tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'ne göre risk dağılımı erkek öğrenciler için 19 kişi artmış risk taşıırken; kız öğrencilerde 7 kişinin artmış risk taşıdığı gözlemlendi.

Spor yapma alışkanlıkları erkeklerde 24 kişi (%48.0), kız öğrencilerde 6 kişi (%11.8) idi.

Anahtar kelimeler: Bel-basen oranı, tip 2 diyabet, vücut kitle indeksi spor ilişkisi

PS 48

Uzun süreli travmanın epigenetik üzerindeki etkileri

Amuac Soaan, Jana Abou Samra

İNönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1 İngilizce, Malatya

Sorumlu yazar e-mail: gokhan.zorlu@inonu.edu.tr

Epigenetik, DNA dizisinde bir değişiklik meydana gelmeksizin genlerin işleyişini düzenleyen mekanizmalardır. Bu mekanizmalar arasında DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve RNA temelli düzenlemeler öne çıkmaktadır. Uzun süreli travmalar, özellikle çocukluk döneminde yaşandığında, stres yanıt sistemlerini (HPA eksenini) etkileyerek NR3C1 glukokortikoid reseptör geni üzerinde metilasyon artışına neden olabilmektedir. Bu durum, bireyin strese karşı aşırı hassas hale gelmesine yol açar. Ayrıca travma; hipokampus ve amigdala gibi beyin bölgelerindeki gen ifadesini değiştirerek anksiyete, depresyon ve PTSD riskini artırırken, bağışıklık sistemi üzerinde kronik inflamasyona ve otoimmün hastalıklara zemin hazırlayabilir. Dikkat çekici bir bulgu olarak, Holokost sonrası yapılan çalışmalar travmaya bağlı epigenetik değişikliklerin nesiller arası aktarılabilirliğini göstermiştir. Ancak epigenetik değişimler dinamiktir; psikoterapi, sağlıklı sosyal çevre, egzersiz ve meditasyon gibi faktörlerle gen ifadesi olumlu yönde geri döndürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Epigenetik, Travma, DNA Metilasyonu, HPA Eksenini, Nesiller Arası Aktarım, Nöroplastisite

PS 49

Kaygı ve depresyonda bağırsak mikrobiyotası

Mehmet Berat Doğan, Hamza Arda Sayan

İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1 İngilizce, Malatya

Sorumlu yazar e-mail: gokhan.zorlu@inonu.edu.tr

Bağırsak mikrobiyotası ile merkezi sinir sistemi arasındaki çift yönlü iletişim ağı olan "Mikrobiyota-Bağırsak-Beyin Ekseni", nöropsikiyatrik bozuklukların patogeneğinde kilit bir rol oynamaktadır. Bağırsak florasındaki yapısal bozulmalar (disbiyozis); nörotransmitter sentezi, bağışıklık sistemi regülasyonu ve HPA ekseni aktivitesi üzerinden ruh sağlığını doğrudan etkilemektedir. Yapılan literatür taramaları, anksiyete ve depresyon tanılı bireylerde mikrobiyal çeşitliliğin azaldığını ve stres hormonu olan kortizol seviyelerinin bozulduğunu göstermektedir. CAS Content Collection verilerine göre, 2000 yılından itibaren bu alandaki bilimsel ilgi katlanarak artmış ve güncel yayın sayısı 7.000'i aşmıştır. Çalışmalar, özellikle *Lactobacillus* ve *Bifidobacterium* suşlarını içeren probiyotik (psikobiyotik) takviyelerinin semptomları hafifletmede etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Sonuç olarak bağırsak mikrobiyotası, geleneksel farmakolojik tedavileri destekleyen ve doğrudan müdahale edilebilir yenilikçi bir terapötik hedef olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota-Bağırsak-Beyin Ekseni, Disbiyozis, Psikobiyotikler, Anksiyete, Depresyon, HPA Ekseni

PS 50

Sirkadiyen ritim ve ilaç metabolizması: Kronofarmakolojik yaklaşım

Cemal Tarık Demirtaş, Mohammad Faisal Yassin, Mina Nur Tağ

İNönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1 İngilizce, Malatya

Sorumlu yazar e-mail: gokhan.zorlu@inonu.edu.tr

Sirkadiyen ritim, organizmanın fizyolojik ve biyokimyasal süreçlerinde yaklaşık 24 saatlik döngüsel değişimleri ifade eder ve hipotalamustaki suprakiazmatik çekirdek tarafından yönetilir. Kronofarmakoloji, ilaçların etkinliğinin ve toksisitesinin bu biyolojik saate göre değiştiğini savunan bir disiplindir. İlaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılım (ADME) süreçleri gün boyunca sabit değildir. Özellikle karaciğerdeki CYP3A4 ve CYP2D6 gibi kritik enzimlerin aktivitesi sirkadiyen ritim gösterir; bu da aynı doz ilacın uygulama zamanına bağlı olarak farklı plazma düzeylerine ulaşmasına neden olur. Literatür taraması kapsamında incelenen çalışmalar, antihipertansifler ve statinler gibi ilaç gruplarında kronoterapinin önemini vurgulamaktadır. İlaçların biyolojik ritme uygun zamanlanması, yan etkileri (kronotoksosite) azaltırken düşük dozla maksimum etki sağlanmasına olanak tanır. Geleceğin tıbbı, hastanın biyolojik saatine göre kişiselleştirilmiş "doğru zamanda tedavi" prensibini standart hale getirmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen Ritim, Kronofarmakoloji, İlaç Metabolizması, CYP450, Kronoterapi, Biyolojik Saat

PS 51

Kanser araştırmalarında plasebo kontrollü klinik çalışmaların rolü ve etkinliği

İkra Su Özcan, Elif Yılmaz

İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1 İngilizce, Malatya

Sorumlu yazar e-mail: gokhan.zorlu@inonu.edu.tr

Kanser tedavisinde ilaçların gerçek etkinliğini, farmakolojik etkileri psikolojik faktörlerden ayırıştırarak değerlendirmek amacıyla plasebo kontrollü randomize klinik çalışmalar kritik bir rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında; Megestrol Asetat, Piridoksin/Tiyotepa ve Temazepam/Melatonin odaklı farklı onkolojik araştırmalar incelenmiştir. Bulgulara göre, Megestrol Asetat kullanımı ileri evre kanser hastalarında iştahı ve kiloyu anlamlı düzeyde artırırken, intravezikal Tiyotepa tedavisi yüzeysel mesane kanserinde nüks oranlarını %60,4'ten %47,4'e düşürmüştür. Uyku bozuklukları üzerine yapılan çalışmalarda ise aktif ajanların uykusuzluk şiddetini azalttığı ve iyi tolere edildiği saptanmıştır. Plasebo kontrollü çalışmalar, tedavinin sadece tümör kontrolü değil, semptom yönetimi üzerindeki objektif başarısını ölçmede en güvenilir yöntemdir. Sonuç olarak, farmakolojik müdahalelerin potansiyel faydaları görülse de, elde edilen verilerin kesinleşmesi ve klinik pratiğe tam entegrasyonu için daha geniş örneklemli randomize çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Plasebo, Kanser, Klinik Çalışmalar, Semptom Yönetimi, Megestrol Asetat, Tiyote

SÖZLÜ SUNUMLAR

SS 1 – SS 38

SS 1

Muhammet Faruk Alavi,¹ Talha Karadoğan¹, Rayan Altaha¹, Mohamed Yahya Ghazal¹

Neslihan Altunkaya Yağcı²

Vitamin B12 Tanı, Eksiklik ve Tedavi Güncel Kanıtlar Işığında Klinik Yaklaşım

Amaç

Vitamin B12 eksikliğinin klinik önemini, risk gruplarını, tanıdaki zorlukları ve güncel tedavi yaklaşımlarını ortaya koyarak klinik yönetimi iyileştirmek.

Metod

Güncel literatür ve klinik rehberler doğrultusunda B12 eksikliği; risk faktörleri, tanı yöntemleri (Serum B12, MMA, homosistein, Holo-TC) ve tedavi seçenekleri (intramüsküler ve oral) açısından derlenmiş ve sistematik bir klinik yaklaşım algoritması oluşturulmuştur.

Bulgular

B12 eksikliği; anemi, nörolojik bozukluklar ve psikiyatrik semptomlarla ilişkilidir. Risk gruplarında daha sık görülür. Serum B12 tek başına tanı için yeterli değildir ve fonksiyonel testlerle desteklenmelidir. Yüksek doz oral tedavi birçok hastada intramüsküler tedavi kadar etkilidir. Tanı ve tedavi süreçlerinde standart eksiklikler bulunmaktadır.

Sonuç

Vitamin B12 eksikliği erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen düzeltilebilir. Klinik değerlendirme ön planda tutulmalı, risk grupları taranmalı ve uygun tedavi gecikmeden başlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: B12 vit , beslenme, eksiklik, vitamin.

SS 2

Preoperatif açlık süresi ve aspirasyon riski

Hüseyin Murat İspir¹, Diyap Kaya¹, Hacı Güneş¹, Büşra Eylül Topaloğlu¹, Erkan Subaşı¹, Muhsin Eren Hedekoğlu¹, Mehmet

Tolga Biri¹, Ebru Kalçık¹, Cebail Sezer¹, Zeynep Köylü Mızrak²

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Malatya

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Malatya

diyapkaya0172@gmail.com

Bu araştırma, preoperatif açlık süresi ile pulmoner aspirasyon riski arasındaki ilişkiyi ve uzamış açlığın hemodinami ile metabolizma gibi anestezi yönetimine etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, preoperatif açlık süresinin tarihsel süreçteki değişimi, hangi koşullarda uygulandığı ve güvenli bir şekilde asgari ne kadar indirilebileceği araştırılmıştır.

Literatür taraması temel olarak "PubMed" veri tabanı üzerinden gerçekleştirilmiş olup, güncel kanıtlara ulaşmak amacıyla özellikle 2010-2025 yıllarını kapsayan son 15 yıllık literatür hedeflenmiştir. Ek olarak, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aspirasyonu önlemeye yönelik yapılan mevcut düzenlemeler de incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, günümüz anestezi pratiğinde geleneksel katı açlık kısıtlamalarının yerini kanıta dayalı, liberal "proaktif rehidrasyon" stratejilerinin aldığı saptanmış ve araştırmanın metodolojik çerçevesi bu güncel yaklaşımlar üzerine inşa edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Preoperatif açlık, pulmoner aspirasyon, anestezi yönetimi, proaktif rehidrasyon, literatür taraması

SS 3

Ulusal yenidoğan tarama programı hakkında annelerin farkındalık düzeyinin değerlendirilmesi

Münevver Savrun, Muhammed Batuhan Yeli, Azra Rana Bozbağ, Emre Şıktar, Hüseyin Karasu, Ferhat Demir, Ahmet Bozan, Enes Burak Demir, Yusuf Canpolat, Bilge Özgör²

1 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya
2 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Malatya

*drbilge.ozgor@gmail.com

Ulusal yenidoğan tarama programları, kalıtsal, metabolik ve gelişimsel hastalıkların erken tanınması açısından önemli halk sağlığı uygulamalarıdır. Bu çalışma, Malatya ilinde annelerin yenidoğan tarama testlerine ilişkin bilgi, tutum ve farkındalık düzeylerini değerlendirmek ve tarama programlarına katılım durumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel tipte tasarlanan araştırmanın evrenini Nisan-Mayıs 2026 tarihleri arasında Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne başvuran anneler oluşturacaktır. Örneklem, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilecek olup örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyi ve %5 hata payı ile 384 olarak hesaplanmıştır. Veriler, yüz yüze uygulanacak yapılandırılmış anket formu ile toplanacaktır. Anket; sosyodemografik özellikler, yenidoğan tarama testleri hakkında bilgi edinme durumu ve bilgi kaynakları ile tarama testlerine ilişkin görüşleri değerlendiren bölümlerden oluşacaktır. Katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyi puanlanarak nicel olarak değerlendirilecek, veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizi kullanılarak incelenecektir. Çalışmadan elde edilecek bulguların, annelerin yenidoğan taramalarına ilişkin bilgi boşluklarının ve güvenilir bilgi kaynaklarının belirlenmesine katkı sağlaması, yerel düzeyde eğitim stratejilerinin geliştirilmesine ve yenidoğan tarama programlarının etkinliğinin artırılmasına zemin oluşturması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan tarama programı, anne farkındalığı, anket, topuk kanı, Malatya

SS 4

**Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sosyal Medya Platformlarının
Dermokozmetik Ürün Seçimleri Üzerine Etkisi**

Buse Ecem Kokuş¹, Rumeysa Gezen¹, Yağmur Koca¹, Ekin Kayapınar¹, Elfin Güllü¹, Hakan Öztürk¹,
M.H. Ada Güler¹, Sultan Işık¹, Enes Erdem¹, Zekiye Kanat²

¹İnönü üniversitesi, Tıp fakültesi, Dönem II, Malatya

²İnönü üniversitesi, Tıp fakültesi, Deri ve Zührevi hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

Giriş ve Amaç: Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dermokozmetik ürün tüketim alışkanlıkları önemli ölçüde değişmektedir. Tıp öğrencileri, hem sağlık okuryazarlığı gelişmekte olan bireyler hem de yoğun sosyal medya kullanıcıları olarak bu dönüşümden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinde sosyal medya platformlarının dermokozmetik ürün seçimleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 231 öğrenci üzerinde kesitsel tanımlayıcı online anket (Google Forms) yöntemiyle yürütülmüştür. Katılımcıların %62,3'ü kadın, %37,2'si erkektir; yaş aralığı büyük ölçüde 21–23 yaş grubundadır (%56,3). Sosyal medya kullanım alışkanlıkları, dermokozmetik ürün tercihleri ve sosyal medyanın bu tercihler üzerindeki etkisini ölçen ifadelerden oluşan 5'li Likert tipi sorular içeren anket formu uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %47,6'sı günde 1–3 saat sosyal medya kullandığını belirtmiş; en çok kullanılan platformlar Instagram (%86,1) ve YouTube (%76,6) olmuştur. En sık kullanılan dermokozmetik ürün grubu nemlendiriciler (%46,3) iken ürün seçiminde marka bilinirliği (%52,4) ve içerik/aktif maddeler (%50,6) öne çıkmıştır. Katılımcıların %59,3'ü sosyal medyanın yeni dermokozmetik ürünleri tanımalarına katkı sağladığını ifade etmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin %56,7'si influencer önerilerinin ürüne bakışlarını etkilemediğini, %54,5'i ise sosyal medyada gördükleri ürünleri araştırmadan satın almadığını belirtmiştir. Tıp öğrencisi kimliğinin sosyal medya içeriklerine eleştirel yaklaşımı artırdığı yönünde güçlü bir eğilim saptanmıştır (%75,3, 4–5 puan). Öğrencilerin %51,5'i sosyal medyanın dermokozmetik ürün seçimleri üzerindeki etkisini değerlendirmekte kararsız kalmıştır.

Sonuç: Tıp öğrencileri sosyal medyayı aktif olarak kullansa da dermokozmetik ürün seçimlerinde sosyal medya içeriklerine ve influencer önerilerine temkinli yaklaştıkları görülmektedir. Tıp eğitiminin eleştirel bakış açısı geliştirdiği, ancak sosyal medyanın ürün farkındalığı üzerindeki etkisinin yadsınamaz olduğu sonucuna varılmıştır. Kanıta dayalı tüketim alışkanlıklarının pekiştirilmesi amacıyla tıp müfredatına dermokozmetoloji alanındaki güncel veriler dahil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, dermokozmetik, tıp öğrencisi, ürün seçimi, kanıta dayalı tıp

SS 5

Skolyoz tedavisinde fizyoterapinin rolü

Emre Bozan*1, Ahmet Can Çalışkan, Mustafa Katuk, Sıla Tali, Usman Ghani, Muhammet Beyhes Haj Khalaf, Ayat Flitani, Beçet Zamud, Nur İlevi

*İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

Projenin bilimsel danışmanı: Doç. Dr. Tülay Yıldırım

*Sorumlu yazar e-mail: drtulayoner@hotmail.com

Skolyoz, omurganın üç boyutlu deformitesi olarak tanımlanan bir hastalıktır ve genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Omurgada lateral eğrilik ve vertebra rotasyonu ile karakterizedir. Erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımları hastalığın ilerlemesini önlemede kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada skolyoz tedavisinde fizyoterapinin rolü incelenmiştir. Fizyoterapi; postürün düzeltilmesi, kas kuvvetinin artırılması, omurga stabilitesinin sağlanması ve eğriliğin ilerlemesinin yavaşlatılması gibi temel hedefleri içerir. Schroth yöntemi skolyoz tedavisinde kullanılan üç boyutlu egzersiz yaklaşımıdır ve rotasyonel solunum teknikleri ile konkav bölgelerin genişletilmesini sağlar. Bu sayede omurga hizalanması desteklenir ve kas dengesizlikleri düzeltilir. Düzenli fizyoterapi uygulamaları Cobb açısındaki artışı yavaşlatabilir ve cerrahi gereksinimi azaltabilir. Ayrıca akciğer kapasitesini artırarak hastaların yaşam kalitesini yükseltir.

Anahtar Kelimeler: Skolyoz, Fizyoterapi, Schroth yöntemi, Omurga, Egzersiz

SS 6

Yapay Zekanın Sağlık Tercihlerine Etkisi

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARABULUT (Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Yürütücü Araştırmacılar: Hüseyin YARDIMCI, Abdulghani ALSAIED OMAR, Saliha Aleyna KARAKAŞ, Büşra ÖZMAN, Siham HAJİ, Muhammed HANCİKKADED, Ahmet NAYİFOĞLU, Zeynep Rana TÜNCAR

Amaç

Bireylerin semptom yönetimi ve tıbbi teşhis süreçlerinde yapay zeka araçlarına olan eğilimlerini, hekim-hasta-teknoloji üçgenindeki güven parametrelerini ve dijital sağlık okuryazarlığının klinik tercihler üzerindeki etkisini nicel verilerle saptamak için bir anket çalışması yapmaya karar verdik.

Metod (Yöntem): Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir çalışma olup toplam 156 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların demografik dağılımı (Cinsiyet: %56,4 Kadın, %43,6 Erkek; Yaş: %55,8 ile 17-25 yaş yoğunluklu) kaydedildikten sonra, 11 adet genel tutum sorusu ve 7 adet likert tipi ölçek sorusundan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Veriler; ilk başvuru noktası, teşhis hızı algısı, tıbbi hata beklentisi, cerrahi otonomi kabulü ve hekim-yapay zeka çelişkisi gibi değişkenler üzerinden analiz edilmiştir. Katılımcıların yapay zeka araçlarını sağlık amaçlı kullanım sıklığı ve bu araçların doktor randevusu oluşturma kararı üzerindeki etkisi 1-5 arası puanlama ölçeği ile ölçülmüştür.

Bulgular:

- **Primer Başvuru ve İletişim:** Katılımcıların %39,7'si semptom başlangıcında ilk durak olarak Yapay Zeka/ İnternet platformlarını tercih etmektedir. Ayrıca kullanıcıların %62,8'i, utandığı veya "saçma" bulduğu semptomları bir hekimden ziyade yapay zekaya anlatmada daha yüksek konfor düzeyine sahiptir.
- **Teşhis ve Klinik Güven:** Yapay zekanın tıbbi hataları azaltacağına dair %45,5 oranında bir inanç bulunsa da, hız konusunda %49,4'lük bir kesim hekimleri hala daha üstün görmektedir. Olası bir teşhis ihtilafında katılımcıların %90,4'ü doğrudan hekim görüşünü esas almaktadır.
- **Otonomi ve Girişimsel İşlemler:** Cerrahi müdahalelerde insan kontrolü olmaksızın çalışan tam otonom yapay zeka sistemlerine karşı %77,6 oranında belirgin bir isteksizlik/red gözlemlenmiştir. Ancak, radyolojik görüntü analizinde yapay zeka desteğine duyulan ihtiyaç %76,3 ile oldukça yüksektir.
- **Ölçek Sonuçları:** Likert analizine göre yapay zeka tarafından önerilen tedavi yöntemlerini deneme sıklığı oldukça düşük seviyede kalmıştır.

Sonuç: Toplumda yapay zekaya karşı genel bir "umutlu" bekleyiş hakim olsa da, teknolojiye duyulan güvenin "destekleyici sistem" çerçevesinde sınırlı kaldığı görülmektedir. Kullanıcılar, yapay zekayı veri analizi ve ön eleme süreçlerinde değerli bulmakla birlikte, girişimsel işlemler ve nihai klinik sorumluluk noktalarında insan hekim kararını vazgeçilmez bir referans noktası olarak konumlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tıpta Yapay Zeka, Dijital Sağlık Okuryazarlığı, Teşhis Doğruluğu, Klinik Karar Destek Sistemleri, Sağlıkta Yapay Zekaya Güven

SS 7

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yapay Zekaya Bakışı: Kesitsel Bir Çalışma

Gülseda Boz, İrem Toptaş, Emine Şekerci, Musa Özel, Gözde Yazıcı, Ahsen Pelinsu Bulut, İbrahim Murat Turgut, Sude Nur Tetik, Mehmet Efe Görgeç, Emine Yetkin, Dilay Yuka Tanış

Amaç: Yapay zekâ (YZ) sağlık hizmetlerinde giderek daha fazla kullanılmasına rağmen, tıp öğrencilerinin YZ'ye yönelik tutumları ve eğitim gereksinimleri tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışma, tıp öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutumlarını, kullanım düzeylerini ve eğitim gereksinimlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Ocak–Mart 2026 tarihleri arasında 305 tıp öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, yapılandırılmış anket formu ve Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde bağımsız örneklem t testi, ANOVA ve MANOVA yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %13,4'ü daha önce YZ eğitimi aldığını belirtirken, %80,7'si tıp müfredatında YZ eğitiminin yer alması gerektiğini ifade etmiştir. YZ eğitimi alan ve kullanım düzeyi yüksek olan öğrencilerin pozitif tutum puanları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur ($p<0.001$). Negatif tutum puanları çoğu değişken açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. MANOVA analizinde, YZ kullanım düzeyinin tutum puanlarının birleşik yapısı üzerinde anlamlı etkisi olduğu ve bu etkinin özellikle pozitif tutumdan kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca, YZ'nin mesleği elinden alacağına yönelik korkunun negatif tutumlar üzerinde anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır ($p<0.001$).

Sonuç: Sonuç olarak, tıp öğrencileri arasında YZ eğitime yönelik güçlü bir ihtiyaç bulunmaktadır. YZ'ye maruziyetin ve kullanım düzeyinin artması, öğrencilerin daha olumlu tutum geliştirmesi ile ilişkilidir. Bu doğrultuda, tıp müfredatına etik, veri güvenliği ve klinik uygulamaları kapsayan yapılandırılmış YZ eğitim programlarının entegre edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: yapay zekâ, tıp öğrencileri, tutum, tıp eğitimi, yapay zekâ eğitimi

SS 8

Onkolojik gastrointestinal cerrahi sonrası gastrointestinal semptomların değerlendirilmesi: cerrahi tip ve mesleki faktörlerin etkisi

Dr. Öğr. Ü. Egemen ÇİÇEK*¹, Hacı Bayram AKDOĞAN², Anıl Can Canyurt³, Derya SERTTAŞ⁴, Nazlıcan AKTÜRK⁵, Şevval Nazlı DURMAZ⁶, Ahsen Ebrar YAHŞİ⁷, Elif ŞİMİR⁸, Ece GÜLBAŞ⁹,

¹Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya*Sorumlu yazar e-mail:dregemencicek@gmail.com

Gastrointestinal cerrahi sonrası dönemde teknik başarı sağlanmasına rağmen, hastalarda çeşitli fonksiyonel gastrointestinal semptomlar devam edebilmektedir. Karın ağrısı, gaz, şişkinlik ve dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler bu semptomlar arasında yer almakta olup, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Özellikle kolorektal cerrahiler sonrası gelişen fonksiyonel bozukluklar acil defekasyon ihtiyacı, sık dışkılama ve tam boşaltamama hissi ile karakterizedir. Bununla birlikte, benzer semptomlar diğer gastrointestinal cerrahiler sonrası da görülebilmektedir.

Cerrahiye bağlı faktörlerin yanı sıra yaş, cinsiyet ve mesleki aktivite gibi hasta özelliklerinin de semptomlar üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle fiziksel aktivitenin bağırsak motilitesini etkileyerek semptomları artırabileceği öne sürülmektedir.

Gastrointestinal cerrahi sonrası semptom yükünün değerlendirilmesi ve cerrahi tip, ameliyat sonrası süre, stoma durumu ve mesleki aktivite ile ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Onkolojik gastrointestinal kanser cerrahisi geçirmiş hastalardan poliklinik başvurusu yapan hastalara “İş Stresi Değerlendirme Ölçeği” ve “Gastrointestinal Semptom Değerlendirme Ölçeği” uygulandı.

Çalışmaya 32 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 50,2 yıl idi. Toplam gastrointestinal semptom skoru ortalaması $35,1 \pm 12,8$ olarak hesaplanırken, medyan değer 34,0 bulundu. En sık görülen semptomlar; tam boşaltamama hissi, acil defekasyon ihtiyacı, gazla ilişkili şikayetler ve guruldama idi.

Cerrahi tip (kolorektal vs kolorektal dışı), ameliyat sonrası süre, stoma durumu ve cinsiyet değişkenlerine göre toplam gastrointestinal semptom skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Cerrahi sonrası dönemde semptomların yaygın olduğu ve uzun dönemde de devam edebildiği gösterilmiştir. Her ne kadar semptom şiddeti genel olarak düşük–orta düzeyde olsa da hastaların büyük çoğunluğunda klinik olarak anlamlı semptomların bulunması fonksiyonel sonuçların önemini ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular, özellikle gazla ilişkili şikayetler, acil defekasyon ihtiyacı ve tam boşaltamama hissi gibi semptomların ön planda olduğunu göstermektedir. Bu durum, bağırsak motilitesinde ve rezervuar fonksiyonunda meydana gelen değişikliklerle açıklanabilir.

Onkolojik gastrointestinal cerrahi sonrası semptomlar sık görülmekte ve uzun dönemde de devam edebilmektedir. Bu çalışmada bağımsız belirleyici saptanmamış olmakla birlikte, mesleki fiziksel aktivitenin semptomlar üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Onkolojik cerrahi, Ameliyat sonrası stres, Gastrointestinal sistem, İş stresi, Kanser

SS 9

Üniversite öğrencilerinde miyopi ilerlemesine neden olan faktörlerin sıklığı

Özgür Deniz Sevim, Muhammed İsa Sarıoğlu

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

Sorumlu Yazar-Sunum: Özgür Deniz Sevim 01240102260@ogr.inonu.edu.tr

Danışman: Dr.Öğr. Üyesi Elif DAMAR GÜNGÖR

Amaç: Dünya genelinde miyopi prevalansı küresel olarak artmaktadır ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olması ve hemen hemen %10'unda ise yüksek derecede miyop gelişmesi beklenmektedir. Tıp fakültesi öğrencilerinde miyopi, akademik performanslarını ve günlük aktivitelerini etkileyen oldukça sık görülen bir kırma kusurudur. Çalışmalarda tıp öğrencilerinde %52,78-%92,8 gibi farklı değerlerde miyopi olduğu tespit edilmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinde miyopi prevalansı ve progresyonu; genetik yatkınlık, yoğun akademik yük (uzun süreli yakın çalışma) ve dijital ekran maruziyeti ile doğrudan ilişkilidir. Miyopinin akademik performans üzerindeki etkisi de kaydedilmiştir; miyop öğrenciler okuma, sınavlarda mikroskop kullanma ve grafik ve resim içeren görevleri yerine getirme gibi etkinliklerde zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar, genel akademik başarılarını ve tıp uzmanlık alanlarını seçmelerini etkileyebilir. Literatürdeki verilere dayanarak tıp fakültesi öğrencilerinde miyopi progresyonuna neden olan faktörlerin sıklığını araştırmayı elde ettiğimiz verileri farklı fakülte öğrencileri ile kıyaslamayı amaçladık. **Materyal-Metod:** İnönü Üniversitesi'nde, literatürden elde edilen kanıtları kullanarak miyopiyle ilişkili risk faktörlerini belirlemek için tasarlanan anket tıp fakültesi ve diğer fakülte öğrencilerine mobil telefonda mesaj şeklinde iletilmiştir. Veri toplama sırasında, demografik özellikler, yaşam tarzı hakkında bilgi toplamak için Google Forms kullanılmıştır. **Bulgular:** Çalışmaya 232 Tıp Fakültesi, 232 diğer fakülte öğrencileri katıldı. Bölümlere göre olguların demografik verileri analiz edildiğinde; ekran parlaklığı, karanlık ortamda telefon, tablet kullanımı, kitap ve/veya ekrana bakma mesafesi, ailede miyop varlığı açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu ($p>0.05$). Ekran süresi, yakın çalışma süresi, uyku süresi, yıllık göz muayenesi oranı, miyop varlığı ve derecesi, miyop ile ilişkili komorbid hastalık bilgisi Tıp fakültesi öğrencilerinde anlamlı olarak daha yüksek oranda görüldü ($p<0.05$). Miyop gelişimi açısından logistik regresyon ile risk analizi yapıldığında ailede miyop varlığı ve ekrana bakma süresi ≥ 4 saat üzerinde ise miyop gelişme riskinin 2 kat arttığı ($p<0.001$), Tıp fakültesi öğrencisi olmanın ise miyop gelişme riskini 2,4 kat arttırdığını tespit ettik ($p<0.001$). **Sonuç:** Miyopi ekran süresi uzunluğu, ailede miyopi varlığı ile anlamlı olarak ilişkilidir. Tıp fakültesi öğrencisi olmak gelişimi riskini 2,4 kat artırmaktadır.

SS 10

Glokomda Topikal Tedavi Yüğü ve Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Birhat Taşkın¹, Abdullah Gül¹, Rabia Karaca¹, Senay Seyar¹, Mehmet Seyfi Çakabay¹, Beyza Yalçın¹, Ahmet Ensar Topal¹, Hatun Akca¹, Yusuf Arda Aydoğan¹

¹Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye

Sorumlu yazar e-mail: birhataski@gmail.com

Amaç:

Bu çalışmada, glokom tanılı hastalarda günlük topikal damla sayısı ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Ayrıca yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, hastalık süresi ve glokom düzeyinin anksiyete ile ilişkisi incelendi.

Yöntem:

Kesitsel nitelikteki bu çalışmaya glokom tanısıyla izlenen 146 hasta dahil edildi. Hastalara ait yaş, cinsiyet, ek hastalık, hastalık süresi, günlük damla sayısı, glokom düzeyi ve HADS-A temelli anksiyete kategorileri kaydedildi. Anksiyete düzeyi ordinal değişken olarak ele alındı. Günlük damla sayısı ile ilişkisi Spearman korelasyonu, ki-kare testi, Kruskal-Wallis testi ve çok değişkenli sıralı lojistik regresyon ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edildi.

Bulgular:

Toplam 146 hastanın verileri analiz edildi. Hastaların yaş ortalaması $61,9 \pm 15,3$ yıl olup, glokom süresi medyan 60 ay (çeyrekler arası aralık (CAA): 12–120) idi. Günlük damla sayısı medyan 4 (CAA: 2–5) olarak bulundu. Olguların %54,8'i erkek, %45,2'si kadındı. Hastaların %32,2'si hafif, %33,6'sı orta ve %34,2'si ağır glokom grubunda yer aldı. Anksiyete düzeyi dağılımında en sık kategori hafif anksiyete (%30,1) iken, bunu yüksek (%24,7), normal (%24,0) ve orta (%21,2) düzey izledi. Hastaların %65,8'inde en az bir ek hastalık mevcuttu. En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon (%28,1–28,8) ve diyabet (%24,7) olarak saptandı. Günlük damla sayısı ile anksiyete düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (Spearman $\rho = 0,102$; $p = 0,220$). Benzer şekilde kategorik karşılaştırmalarda da anlamlılık izlenmedi (ki-kare $p = 0,872$; Kruskal-Wallis $p = 0,448$). Çok değişkenli sıralı lojistik regresyonda, anksiyete düzeyi ile ilişkili kalan değişken ek hastalık varlığı oldu.

Sonuç:

Glokom hastalarında günlük topikal damla yükü ile anksiyete düzeyi arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi. Buna karşılık ek hastalık varlığı anksiyete düzeyi ile ilişkili görüldü. Bu bulgular, glokom hastalarında psikolojik yükün yalnızca tedavi yoğunluğuyla değil, eşlik eden sistemik hastalıklarla da ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: glokom, HADS-A, anksiyete, ilaç yükü, topikal tedavi

SS 11

İntravitreal Enjeksiyon Uygulanan Diyabetik Retinopati ve Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastalarının Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Mücahit Demirdelen^{*1}, Işın Kübra Figen¹, Zeynep Hafsa Özdemir¹, Ayşe Berfin Karataş¹, Sıla Hamamcı¹, Meryem Karakaya¹, Yusuf Duraz¹, Hafsa Sevde Aydın¹, Yunus Emre Kaya¹

¹İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye

*Sorumlu yazar e-mail: kostumer95@gmail.com

Özet

Amaç: Diyabetik retinopati (DR) ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) nedeniyle intravitreal enjeksiyon uygulanan hastalarda anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi ve bu düzeylerin görme keskinliği, hastalık tipi ve demografik faktörlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Retina Birimi'nde DR veya YBMD tanısıyla takip edilen ve intravitreal enjeksiyon uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri, hastalık süreleri, uygulanan intravitreal enjeksiyon sayıları ve görme keskinlikleri kaydedildi. Anksiyete ve depresyon düzeyleri, intravitreal enjeksiyon öncesinde yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanan Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ve Durumluk Kaygı Envanteri (STAI) ile değerlendirildi. Hastalar hastalık tipi, görme bozukluğunun şiddeti ve enjeksiyon sayısına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 138 hasta (69 DR, 69 YBMD) çalışmaya dahil edildi. Gruplar arasında cinsiyet dağılımı, hastalık süresi, toplam enjeksiyon sayısı ve enjeksiyon öncesi bekleme süresi açısından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla $p=0.233$, $p=0.256$, $p=0.115$, $p=0.813$). YBMD grubunun ortalama yaşı (71.36 ± 11.10 yıl), DR grubuna (61.57 ± 9.72 yıl) göre anlamlı derecede daha yüksekti ($p<0.001$). Sağ göz görme keskinliği açısından gruplar benzer bulunurken, sol göz görme keskinliği YBMD grubunda anlamlı derecede daha düşüktü ($p=0.048$). STAI ve HAD-Anksiyete skorları açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla $p=0.637$ ve $p=0.251$). Buna karşılık HAD-Depresyon skoru YBMD grubunda (8.14 ± 3.95), DR grubuna (6.51 ± 4.03) kıyasla anlamlı derecede daha yüksek bulundu ($p=0.010$).

Sonuç: İntravitreal enjeksiyon uygulanan DR ve YBMD hastalarında anksiyete düzeyleri benzer bulunurken, depresyon düzeylerinin YBMD grubunda daha yüksek olduğu saptandı. Bu durum, YBMD hastalarının daha ileri yaşta olmaları ve daha düşük görme keskinliğine sahip olmasından kaynaklanmış olabilir. Bu bulgular, YBMD hastalarının psikolojik açıdan daha savunmasız olabileceğini göstermekte; kronik makula hastalıklarında psikososyal değerlendirmelerin düzenli olarak yapılmasının ve gerektiğinde psikolojik destek sağlanmasının önemini vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: anksiyete, depresyon, diyabetik retinopati, intravitreal enjeksiyon, yaşa bağlı makula dejenerasyonu

SS 12

Kuru göz

Elif Gaye KAYA¹, Bekir Tarık BALÇIK¹, Gamze ÖZDEMİR¹, Hilal YALIM¹, İklil Kayra VAROL¹,
Melek GÜR¹, Muhammed Enes KEBABCI¹, Sıla BÜLBÜL¹, Yusuf Semih ONUK¹, Zehra ÇAM¹,
Ülkü DEMİR²

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

²İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

kayaelifgaye@gmail.com

Özet

Kuru göz, başlıca gözde yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti, gözde yabancı cisim hissi, görme bozukluğu belirtileri ile kendisini gösteren; gözyaşı üretiminde yetersizlik veya göz yüzeyinde artmış buharlaşma ile karakterize, gözyaşı ve göz yüzeyinin multifaktöriyel bir hastalığıdır. Bu hastalığa gözyaşı filminin ozmolaritesinde artış ve göz yüzeyinde iltihaplanma eşlik eder. Tüm dünyada erişkin popülasyonun %6-34' nün kuru gözden etkilendiği tahmin edilmektedir. Kuru göz ile ilişkili risk faktörleri bireysel, çevresel, klinik hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve oküler faktörleri içermektedir. Sjögren Sendromu, romatoid artrit, skleroderma, polimiyozit, rozasea, lenfoma, amiloidoz, sarkoidoz, diyabet ve sistemik lupus eritematosus gibi birçok sistemik hastalık ile ilişkilidir. Kuru göz tanı testleri; semptom anketleri, oküler yüzey hasarını tespit etmek için boyama, gözyaşı kırılma süresi, Schirmer testi ve gözyaşı hiperosmolaritesi için osmometridir. Kuru göz hastaların hayat kalitesini azaltmakla birlikte, korneada ülser oluşumu ve erime gibi komplikasyonlar ile görmeyi tehdit eder. Hastalığın tedavisinde kuru göze neden olan faktörlerin ortaya çıkarılması ve semptomları arttıran durumların engellenmesi önemlidir. Kuru göz hastalığı için en yaygın kullanılan tedavi, topikal yapay gözyaşı ile gözyaşı replasmanıdır. Antiinflamatuvarlar ve immunomodülatörler diğer tedaviler arasındadır. Gözyaşının drenajını önlemek için punktal oklüzyon, en yaygın farmakolojik olmayan tedavidir. Erken tanı ve tedavi, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve gözde oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Kuru göz, kornea, Schirmer testi, suni gözyaşı

SS 13

Persistan hipotansiyon ile seyreden atipik feokromositoma ve yeni bir NF1 frameshift mutasyonu: olgu sunumu

Ali Utku Duman¹, Hişar Halit Dağkiran¹, Halil Çil¹, Mansur Özkan¹, Zeynep Özer¹, Sedanur Figen¹, Begüm Dağlı¹, Eyüp Urgan¹, Ahmet Hakan Kalaylı¹, Danışman Dr. Mehmet Sait Koç²

¹ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

² İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya

Sorumlu yazar e-mail; mehmetsait.koc@inonu.edu.tr

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, daha önce nörofibromatozis tip 1 (NF1) tanısı olmayan bir hastada, klinik ve oftalmolojik bulgular eşliğinde NF1 tanısının konulmasını ve persistan hipotansiyon ile izole metanefrin yüksekliği şeklinde atipik seyir gösteren feokromositoma birlikteliğini ortaya koyarak, NF1 hastalarında alışılmadık klinik ve biyokimyasal prezentasyonlara dikkat çekmektir. Ayrıca, literatürde daha önce bildirilmemiş patojenik bir NF1 frameshift mutasyonunun tanımlanmasıyla genotip–fenotip ilişkisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Olgu Sunumu

Bulgular: 58 yaşında bilinen tip 2 diyabeti olan erkek hasta rutin diyabet kontrolü amacıyla kliniğimize başvurdu. Hastanın paroksizmal ya da sürekli hipertansiyon öyküsü yoktu; kan basıncı ölçümleri tekrarlayan şekilde yaklaşık 90/50 mmHg olarak saptandı. Feokromositomaya özgü baş ağrısı, çarpıntı ve terleme gibi klasik semptomlar izlenmedi. Fizik muayenede yaygın multiple kutanöz nörofibromlar, sağ kalça bölgesinde yaklaşık 10 cm çapında dev pleksiform nörofibrom (giant nörofibrom), aksiller çillenme ve kafe-au-lait makülleri dikkati çekti. Oftalmolojik değerlendirmede bilateral Lisch nodülleri saptandı. Bu klinik ve oftalmolojik bulgular doğrultusunda hastaya nörofibromatozis tip 1 (NF1) tanısı konuldu. Biyokimyasal incelemede plazmada izole metanefrin yüksekliği saptanırken, diğer katekolamin düzeyleri normal sınırlarda saptandı. Görüntülemeye sol adrenal bezde kitle lezyonu izlendi. Hastaya sol adrenalectomi uygulandı ve histopatolojik inceleme feokromositoma ile uyumlu bulundu. Genetik analizde NF1 geninde daha önce literatürde bildirilmemiş heterozigot frameshift mutasyon (c.3322dup p.(Thr1108AsnfsTer9)) saptandı ve patojenik olarak değerlendirildi.

Sonuç: Bu olgu, NF1 ilişkili feokromositomanın persistan hipotansiyon ve izole metanefrin yüksekliği ile atipik şekilde prezente olabileceğini göstermektedir.

Hipertansiyonun olmaması feokromositoma tanısını dışlamamalıdır. Ayrıca tanımlanan yeni NF1 frameshift mutasyonu, hastalığın genotip–fenotip spektrumuna katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Nörofibromatozis tip 1, feokromositoma, hipotansiyon, metanefrin, NF1 mutasyonu

SS 14

Pankreas Kanseri: Epidemiyoloji, Moleküler Patogenez, Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımlarının Derlemesi

Mert Ali Mandollu, Nizar Zengin, Resul Ekrem Akdaş, İrem Kaya, Bediha Nur Kutluata, Muhammed Aker, Berzan Işık, Alperen Taha Sevim, Kenan Sakıncı, Ahmet Kadir Arslan

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Malatya

*Sorumlu yazar e-mail: ahmetkadirarslan@gmail.com

Amaç: Bu derleme, 2023–2025 yılları arasında yayımlanan literatür temel alınarak pankreas duktal adenokarsinomu (PDAC) başta olmak üzere pankreas kanserinin epidemiyolojisi, moleküler patogenez, tanısal yaklaşımları ve güncel tedavi seçeneklerini sistematik biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: PubMed veri tabanında 2023–2025 tarihleri arasında yayımlanan, PDAC epidemiyolojisi, KRAS mutasyonu, yeni nesil dizileme (NGS), likit biyopsi ve sistemik tedavileri kapsayan hakemli araştırma ve derleme makaleleri taranmıştır.

Bulgular: PDAC, pankreas kanserinin %85–90'ını oluşturmakta ve beş yıllık genel sağkalım oranı %12'nin altında seyretmektedir; tanı anında hastaların yalnızca %15–20'si cerrahi rezeksiyona adaydır. Moleküler düzeyde KRAS mutasyonları vakaların ~%90'ında saptanmakta ve temel onkogenik sürücü olma özelliğini korumaktadır. Ben-Ammar ve ark., KRAS yabani tip (wild-type) tümörü olan hastalarda belirgin olarak daha uzun medyan genel sağkalım (50,8'e karşı 21,1 ay) ve FGFR2, BRAF(V600E), NTRK füzyonları gibi eyleme dönüştürülebilir moleküler değişikliklerin daha yüksek prevalansı saptamıştır. Tanısal alanda, Pan ve ark., EUS-FNA/FNB örneklerinin NGS için yeterliliğini PDAC'ta %92,0 olarak bildirmiş; elde edilen örneklerde KRAS, TP53, CDKN2A ve SMAD4 mutasyon prevalansları sırasıyla %87,4, %62,6, %20,6 ve %19,4 olarak raporlanmıştır. KRAS mutasyonu tespitinin Idylla tekniğiyle tanısal duyarlılığı %98,6'ya ulaşmakta ve ek biyopsi gereksinimini azaltmaktadır. Likit biyopsi alanında ctDNA ve ekzozom bazlı yöntemler erken tarama ve tedavi yanıtının izlenmesinde potansiyel göstermektedir; yapay zekâ destekli çoklu-omik entegrasyon ise tanısal hassasiyeti artırma yönünde araştırılmaktadır. Tedavide FOLFIRINOX ve gemcitabin/nab-paklitaksel birinci basamak standartlar olmayı sürdürmektedir. KRAS G12 mutasyon dozajını tümör çapı ve CA 19-9 ile birleştiren prognostik skorlama sistemleri, preoperatif sağkalım tahminini anlamlı biçimde iyileştirmektedir. Homolog rekombinasyon defektli olgularda BRCA1/2 ve ATM mutasyonlarına yönelik PARP inhibitörleri ve platin bazlı rejimler ise kişiselleştirilmiş tedavide giderek daha fazla yer bulmaktadır.

Sonuç: Güncel literatür, NGS tabanlı moleküler profillemenin rutin tanı sürecine entegrasyonunun, likit biyopsi teknolojilerinin olgunlaşmasının ve KRAS mutasyon durumuna göre bireyselleştirilmiş sistemik tedavi planlamasının PDAC yönetimini köklü biçimde dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte erken evre tarama protokollerinin geliştirilmesi ve immünoterapi direncinin aşılması, alanın öncelikli araştırma gündemi olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas duktal adenokarsinomu, KRAS mutasyonu, likit biyopsi

SS 15

Akut periferik arteriyel emboli nedeniyle embolektomi uygulanan hastaların klinik özellikleri ve erken dönem sonuçları: tek merkez retrospektif olgu serisi

Helin Kılıç¹, Mine Aşkar², Gizem Özdemir³, Süveybe Cinkara⁴, Melike Karalar⁵, Şevval Taşcan⁶, İbrahim Ünsal⁷, Ömer Faruk Çelik⁸, Baran İspir⁹, Azat Öncel¹⁰

İNönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya

kilichelinn@gmail.com

Özet

Giriş: Akut periferik arteriyel emboliler, ekstremitte kaybı ve fonksiyonel sekel açısından önemli morbidite nedenleri arasında yer almaktadır. Erken tanı ve hızlı revaskülarizasyon, ekstremitte sağkalımı ve klinik prognoz üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmada, akut periferik arteriyel emboli nedeniyle embolektomi uygulanan hastaların klinik özellikleri, etiyolojik dağılımı, tutulum bölgeleri ve erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. **Gereç ve Yöntem:** Bu tek merkezli retrospektif olgu serisinde, akut periferik arteriyel emboli nedeniyle cerrahi embolektomi uygulanan 16 hasta değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, komorbiditeleri, olası emboli kaynakları, arteriyel tutulum lokalizasyonları ve erken dönem klinik sonuçları incelendi. Sekel, amputasyon ve komplikasyon gelişimi kaydedildi. Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak sunuldu. Grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U ve Fisher exact testleri kullanıldı. **Bulgular:** Hastaların ortalama yaşı 60.0±18.3 yıl olup, 8'i erkekti. En sık komorbiditeler hipertansiyon ve sigara kullanımıydı. Etiyolojik değerlendirmede ateroskleroz, atriyal fibrilasyon ve miyokard infarktüsü öyküsü en sık saptanan faktörlerdi. Tutulum lokalizasyonu açısından femoral arter belirgin şekilde ön plandaydı. Beş hastada dijital subtraksiyon anjiyografisi gereksinimi oldu. Erken dönem izlemde sekel beş hastada, amputasyon bir hastada ve komplikasyon bir hastada izlendi. Sekel, amputasyon veya komplikasyon gelişen hastalarda yaş ve sigara kullanım oranı daha yüksek olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. **Sonuç:** Akut periferik arteriyel embolilerde femoral arter tutulumu baskındır ve etiyolojide ateroskleroz ile kardiyembolik kaynaklar önemli yer tutmaktadır. Sekel oranının dikkat çekici düzeyde olması, erken tanı, hızlı cerrahi müdahale ve risk faktörlerinin ayrıntılı değerlendirilmesinin önemini göstermektedir. Küçük örneklem nedeniyle anlamlı prediktör saptanamamış olsa da atriyal fibrilasyon, ateroskleroz ve sigara kullanımı klinik açıdan dikkatle ele alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Akut arteriyel emboli, embolektomi, atriyal fibrilasyon, femoral arter, ekstremitte iskemisi, sekel.

Danışman Öğretim Üyesi: Cihan Yetiş

SS 16

TIP Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 Öğrencilerinin Epilepsi Farkındalığı
İnce Perihan * , Karabulut Sümeyye*, Atlas Aysima*, Aydın Zeren*, Abıka Hanifi Berati*,
Koldaş Semanur*, Tümer Eray*, Tamer Münevver*, Öner Musa Mehmet Can
*İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Malatya
** İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Nöroloji, Malatya
DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ebru Algül

Giriş ve Amaç: Epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktivite sonucu ortaya çıkan, tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir nörolojik hastalıktır. Nöbetler; bilinç değişikliği, kasılmalar ve davranışsal değişikliklerle kendini gösterebilir. Toplumda ve sağlık eğitiminin erken dönemindeki bireylerde epilepsiye yönelik yanlış inanışlar ve eksik bilgiler, hastaya müdahalede hatalara yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin (henüz formal epilepsi eğitimi almamış gruplar) epilepsi hakkındaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışma, tıp fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasına dayanmaktadır. Toplam 102 öğrenci (51 Dönem 1, 51 Dönem 2) çalışmaya katılmıştır. Katılımcılara epilepsiye ilişkin doğru/yanlış ve “bilgim yok” seçeneklerinden oluşan ifadeler yöneltilmiştir. Anket sonuçları yüzdelik dağılımlar şeklinde analiz edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların büyük bir kısmı epilepsiye ilişkin bazı temel bilgileri doğru yanıtlamıştır. Epilepsinin bulaşıcı olmadığı (%83,3), nöbet sonrası bilinç bulanıklığının görülebileceği (%83,3) ve parlak ışığın nöbeti tetikleyebileceği (%84,3) doğru olarak bilinmektedir. Ayrıca, her nöbette çığlık atılmayacağı (%85,3) bilgisi de yaygın olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, bazı konularda belirgin bilgi eksiklikleri ve kararsızlıklar saptanmıştır. Epilepsinin genetik olup olmadığı konusunda katılımcıların %41,2’si “bilgim yok” yanıtını vermiştir. Nöbet süresi ve bilinç durumu gibi klinik özellikler hakkında da önemli düzeyde belirsizlik bulunmaktadır. En dikkat çekici bulgu ise nöbet anı yönetimine ilişkin yanlış inanışların yaygın olmasıdır. Katılımcıların %45,1’i nöbet geçiren bireyin el ve ayaklarının sabitlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, %15,7’si ağza bir cisim yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu bulgular, yanlış ve potansiyel olarak zararlı müdahalelerin önemli ölçüde benimsendiğini göstermektedir.

Sunum: Bu çalışma, tıp fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencilerinde epilepsiye ilişkin temel teorik bilginin kısmen mevcut olduğunu, ancak nöbet anı yönetimi ve ilk yardım uygulamaları konusunda ciddi bilgi eksiklikleri bulunduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle yanlış müdahale eğilimlerinin yaygın olması, erken dönemde verilecek eğitimin önemini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, epilepsi farkındalığının artırılması ve doğru ilk yardım uygulamalarının öğretilmesi amacıyla, tıp eğitiminin erken dönemlerinde hedefe yönelik eğitim programlarının planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Farkındalık, Nöbet, İlk Yardım

SS 17

Yeni tanı prostat kanseri hastalarında Ga-68 PSMA PET/BT tutulumu ile Gleason skoru ve serum total PSA düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Vedat Subaşı, Damla Karademir, Ebrar Tuğba Baz, Fatma Ünal, Gülnihal Çevlik, Sema Danış, Senar Ateş, Abdülselem Kaplan, Ayşe Ebrar Selçuk, Melisa Esertaş, Rojgöl Aktaş

Prostat kanseri, erkeklerde sık görülen malignitelerden biri olup, tanı ve evrelemede biyokimyasal, histopatolojik ve görüntüleme yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde yeni tanı almış prostat kanseri hastalarında Ga-68 PSMA PET/BT ile elde edilen SUVmax değerleri ile histopatolojik Gleason skoru (ISUP grade) ve serum total PSA düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Etik kurul onayı sonrasında, 31.07.2025–02.01.2026 tarihleri arasında merkezimizde takip edilen ve histopatolojik olarak prostat kanseri tanısı almış 18 yaş üzeri 93 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların ISUP grade, serum PSA ve primer tümöre ait SUVmax değerleri kaydedildi. Sürekli değişkenlerin dağılımı Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile değerlendirildi. Parametrik varsayımlar sağlanmadığı için değişkenler arası ilişkiler Spearman korelasyon analizi ile incelendi ve $p \leq 0,05$ anlamlı kabul edildi. Analiz sonucunda, PSA ile ISUP grade arasında zayıf-orta düzeyde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı ($r=0,293$; $p=0,005$). ISUP grade ile SUVmax arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki izlenmekle birlikte istatistiksel anlamlılık saptanmadı ($r=0,198$; $p=0,058$). PSA ile SUVmax arasında da zayıf düzeyde pozitif ancak anlamlı olmayan bir ilişki gözlemlendi ($r=0,178$; $p=0,089$). Sonuç olarak, elde ettiğimiz bulgular PSA'nın tümör derecesi ile ilişkisini desteklemektedir. SUVmax'ın tümör biyolojisini yansıtmaya potansiyeli bulunmakla birlikte, tek başına tümör agresifliğini değerlendirmede sınırlı kalabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle klinik değerlendirmede parametrelerin birlikte ele alınmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, PSMA PET/BT, SUVmax, PSA, Gleason skoru

SS 18

Büyük dil modellerinin tıp eğitimi sınavlarındaki performansı, tek merkez kesitsel çalışma

Muhammed Enes AVLAMAZ¹, Seda BAYRAM¹, İrem CANBAZ¹, Recep Arda DAŞ¹, Elifnur ERTENLİCE¹, Resul KURT¹, Elif UZUNPOLAT¹, Oğuzhan SÖNMEZ¹, Emir Can ŞIK¹, Meryem DALKIZAN¹, Dr. İnanç Doğan ÇİÇEK^{2*}

¹İNönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem II, Malatya

^{2*}İNönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Büyük dil modelleri, tıp eğitiminde bilgiye erişim, özetleme, açıklama ve sınava hazırlık amacıyla giderek daha sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada ChatGPT, Gemini ve Copilot modellerinin tıp fakültesi temel bilim sınavlarındaki çoktan seçmeli sorulara verdikleri yanıtların doğruluk düzeyleri ve bu performansın öğrenci başarısı ile ilişkisi değerlendirildi. Tek merkezli kesitsel tasarımdaki çalışmada, İNönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 eğitim yılı Dönem II soru havuzlarından elde edilen sorular incelendi. Ara sınavlar, final, bütünleme ve temel bilim dışı sorular ile cevabı veya branşı şüpheli olan sorular dışlandıktan sonra 393 soru analize alındı. Sorular üç modele aynı formatta yöneltildi; doğru yanıtlar 1, yanlış yanıtlar 0 olarak kodlandı. Model performansları kurul ve branş düzeyinde karşılaştırıldı; öğrencilerin kurul performansları ile model doğrulukları arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi. Genel doğruluk oranı Gemini için %96,44, ChatGPT için %88,80 ve Copilot için %85,24 olarak bulundu. Üç modelin doğrulukları arasındaki fark anlamlıydı; ancak ikili analizde ChatGPT ile Copilot arasında anlamlı fark saptanmadı. Branş ve kurul düzeyinde en dengeli performans Gemini’de izlendi. Öğrenci performansı ile ilişkide Copilot orta düzeyde pozitif korelasyon gösterirken, Gemini zayıf, ChatGPT ise çok zayıf negatif korelasyon gösterdi. Sonuç olarak, büyük dil modellerinin sınav başarısı modele, branşa ve kurul düzeyine göre değişmektedir. Bu modeller destekleyici eğitim aracı olarak kullanılabilir; ancak yanıtların uzman denetiminden geçirilmesi ve öğrencilere doğru kullanım eğitimi verilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Büyük dil modelleri, tıp eğitimi, yapay zekâ, sınav performansı, ChatGPT, Gemini

SS 19

Büyük dil modellerinin tıp eğitimi sınavlarındaki performansı, tek merkez kesitsel çalışma

Muhammed Enes AVLAMAZ¹, Seda BAYRAM¹, İrem CANBAZ¹, Recep Arda DAŞ¹, Elifnur ERTENLİCE¹, Resul KURT¹, Elif UZUNPOLAT¹, Oğuzhan SÖNMEZ¹, Emir Can ŞIK¹, Meryem DALKIZAN¹, Dr. İnanç Doğan ÇİÇEK^{2*}

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem II, Malatya

^{2*}İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Büyük dil modelleri, tıp eğitiminde bilgiye erişim, özetleme, açıklama ve sınava hazırlık amacıyla giderek daha sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada ChatGPT, Gemini ve Copilot modellerinin tıp fakültesi temel bilim sınavlarındaki çoktan seçmeli sorulara verdikleri yanıtların doğruluk düzeyleri ve bu performansın öğrenci başarısı ile ilişkisi değerlendirildi. Tek merkezli kesitsel tasarımdaki çalışmada, İNÖNÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 eğitim yılı Dönem II soru havuzlarından elde edilen sorular incelendi. Ara sınavlar, final, bütünleme ve temel bilim dışı sorular ile cevabı veya branşı şüpheli olan sorular dışlandıktan sonra 393 soru analize alındı. Sorular üç modele aynı formatta yöneltildi; doğru yanıtlar 1, yanlış yanıtlar 0 olarak kodlandı. Model performansları kurul ve branş düzeyinde karşılaştırıldı; öğrencilerin kurul performansları ile model doğrulukları arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi. Genel doğruluk oranı Gemini için %96,44, ChatGPT için %88,80 ve Copilot için %85,24 olarak bulundu. Üç modelin doğrulukları arasındaki fark anlamlıydı; ancak ikili analizde ChatGPT ile Copilot arasında anlamlı fark saptanmadı. Branş ve kurul düzeyinde en dengeli performans Gemini’de izlendi. Öğrenci performansı ile ilişkide Copilot orta düzeyde pozitif korelasyon gösterirken, Gemini zayıf, ChatGPT ise çok zayıf negatif korelasyon gösterdi. Sonuç olarak, büyük dil modellerinin sınav başarısı modele, branşa ve kurul düzeyine göre değişmektedir. Bu modeller destekleyici eğitim aracı olarak kullanılabilir; ancak yanıtların uzman denetiminden geçirilmesi ve öğrencilere doğru kullanım eğitimi verilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Büyük dil modelleri, tıp eğitimi, yapay zekâ, sınav performansı, ChatGPT, Gemini

SS 20

Tıp öğrencilerinde pnömotoraks farkındalık düzeyinin değerlendirilmesi

Murat Sarp Uraz, Hakan Ede, Bedriye Boyatan, Merve Gördağ, Seyid Balkaya, Eren Dağdelen, Eylül Doğru, , Lorin Çiftçi, Azra Demirci, Arif Eren Tekin

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; tıp fakültesi öğrencilerinin akciğer grafilerinde pnömotoraksı ayırt etme becerilerini değerlendirmek ve bu becerilerinin tıp eğitimi süreciyle olan ilişkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışma, Mart–Nisan 2026 tarihleri arasında gönüllü katılımı ile gerçekleştirildi. Ankete 2. Sınıftan 6. Sınıfa kadar toplam 151 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket formu kullanıldı. Anket, her biri akciğer grafisi içeren toplam 15 sorudan oluşmakta olup katılımcılardan her soru için “pnömotoraks var” veya “pnömotoraks yok” şeklinde yanıt vermeleri istendi. Elde edilen veriler sayısal olarak değerlendirilerek analiz edildi.

Bulgular:

Katılımcıların genel başarı ortalaması 69,84 olarak bulundu ve puanların 26 ile 100 arasında değiştiği görüldü. Sınıf düzeyine göre değerlendirildiğinde, klinik öncesi dönemde yer alan 2. Ve 3. Sınıf öğrencilerinde başarı oranlarının daha düşük olduğu dikkat çekti. Buna karşılık, klinik eğitimin başladığı 4. Sınıftan itibaren ortalama puanlarda belirgin bir artış gözlemlendi. 5. Ve 6. Sınıf öğrencilerinde ise bu artışın devam ettiği ve en yüksek başarı düzeyine ulaşıldığı görüldü. Sınıf düzeyine göre ortalama puanlar sırasıyla; 2. sınıfta 53,72 (n=43), 3. sınıfta 54,22 (n=23), 4. sınıfta 78,64 (n=28), 5. sınıfta 83,16 (n=38) ve 6. sınıfta 89,17 (n=18) olarak saptandı.

Sonuç:

Bu çalışmada elde edilen veriler, tıp fakültesi öğrencilerinin akciğer grafilerinde pnömotoraksı tanıma becerilerinin eğitim süreciyle birlikte belirgin şekilde geliştiği yönünde bulgular sunmaktadır. Özellikle klinik öncesi ve klinik dönem öğrencileri arasındaki fark, hasta ile entegre olmayan eğitim süreçlerinin tek başına yeterli olmayabileceğini göstermektedir. Sınıf düzeyine paralel olarak başarı ortalamalarında gözlenen artış ve en yüksek değerlerin 6. sınıfta saptanması, pnömotoraks tanısındaki başarının artan klinik deneyim ve süreklilik gösteren uygulama ile ilişkili olduğunu desteklemektedir.

SS 21

Tıp öğrencilerinde pnömotoraks farkındalık düzeyinin değerlendirilmesi

Murat Sarp Uraz, Hakan Ede, Bedriye Boyatan, Merve Gördağ, Seyid Balkaya, Eren Dağdelen, Eylül Doğru, , Lorin Çiftçi, Azra Demirci, Arif Eren Tekin

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; tıp fakültesi öğrencilerinin akciğer grafiğinde pnömotoraksı ayırt etme becerilerini değerlendirmek ve bu becerilerinin tıp eğitimi süreciyle olan ilişkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışma, Mart–Nisan 2026 tarihleri arasında gönüllü katılımı ile gerçekleştirildi. Ankete 2. Sınıftan 6. Sınıfa kadar toplam 151 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket formu kullanıldı. Anket, her biri akciğer grafisi içeren toplam 15 sorudan oluşmakta olup katılımcılardan her soru için “pnömotoraks var” veya “pnömotoraks yok” şeklinde yanıt vermeleri istendi. Elde edilen veriler sayısal olarak değerlendirilerek analiz edildi.

Bulgular:

Katılımcıların genel başarı ortalaması 69,84 olarak bulundu ve puanların 26 ile 100 arasında değiştiği görüldü. Sınıf düzeyine göre değerlendirildiğinde, klinik öncesi dönemde yer alan 2. Ve 3. Sınıf öğrencilerinde başarı oranlarının daha düşük olduğu dikkat çekti. Buna karşılık, klinik eğitimin başladığı 4. Sınıftan itibaren ortalama puanlarda belirgin bir artış gözlemlendi. 5. Ve 6. Sınıf öğrencilerinde ise bu artışın devam ettiği ve en yüksek başarı düzeyine ulaşıldığı görüldü. Sınıf düzeyine göre ortalama puanlar sırasıyla; 2. sınıfta 53,72 (n=43), 3. sınıfta 54,22 (n=23), 4. sınıfta 78,64 (n=28), 5. sınıfta 83,16 (n=38) ve 6. sınıfta 89,17 (n=18) olarak saptandı.

Sonuç:

Bu çalışmada elde edilen veriler, tıp fakültesi öğrencilerinin akciğer grafiğinde pnömotoraksı tanıma becerilerinin eğitim süreciyle birlikte belirgin şekilde geliştiği yönünde bulgular sunmaktadır. Özellikle klinik öncesi ve klinik dönem öğrencileri arasındaki fark, hasta ile entegre olmayan eğitim süreçlerinin tek başına yeterli olmayabileceğini göstermektedir. Sınıf düzeyine paralel olarak başarı ortalamalarında gözlenen artış ve en yüksek değerlerin 6. sınıfta saptanması, pnömotoraks tanısındaki başarının artan klinik deneyim ve süreklilik gösteren uygulama ile ilişkili olduğunu desteklemektedir.

SS 22

Tüm ekzon analizi yapılan bir hastanın varyantlarının değerlendirilmesi

Yusuf Cankurt^{*1}, Musa Erdem Yılmaz¹, Ahmet Cihan Aydoğan¹, Müserret Yüstra Özsoy¹, Emre Aydın¹, Ethem

Gündoğdu¹, Hatice Boncuk¹, Hiranur İnceyol¹, Eda Gül Bakır¹, Elif Zehra Cengiz¹, Cemal Ekici²

*cemal.ekici@inonu.edu.tr

¹İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Dönem II Türkçe/Malatya

²İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı/Malatya

26 yaşında kadın hastada primer amenore ve nötropeni şikayeti ile Tıbbi Genetik Polikliniğine başvurdu. Hastanın ayrıca çocukluktan beri bilateral işitme kaybı mevcut olup bu nedenle işitme cihazı kullanmaktaydı. Hasta 15 yaşından itibaren primer amenore nedeniyle izlenmektedir. Primer amenoreye yönelik yapılan genetik incelemede karyotip normal (46,XX) bulunmuş, Frajil X sendromundan şüphelenilmiş ve FMR1 geni tekrar sayısı normal saptanmıştır. Nötrofil sayısının düşük olması nedeniyle hematoloji tarafından lösemi açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla FISH ile yapılan MDS panelinde [Trizomi 8, Trizomi 17, Trizomi 7, 20q delesyonu, 17p delesyonu, 7q delesyonu ve 5q delesyonu] sonuç normal bulunmuştur. Daha sonra 140 genlik lösemi paneline somatik mutasyon analizi yapılmış ve bu inceleme de normal bulunmuştur. Aile öyküsünde anne ve babanın akraba olduğu (dayı-hala çocukları), sağlıklı bir kız kardeşi ve 16 yaşında MI nedeniyle vefat eden erkek kardeşi olduğu tespit edilmiştir.

Bu bulgular eşliğinde hastaya Tüm Ekzom Analizi (WES testi) çalışılmasına karar verildi. Analiz için 2 tüp EDTA'lı (mor kapaklı) kan alınmış ve DNA izolasyonu için Qiagen DNA izolasyon kiti kullanılmıştır. WES analizi için Illumina NEXTSEQ 2000 cihazı ve Illumina DNA Prep with Exome 2.5 Enrichment kiti kullanılmıştır. Kullanılan kit; insan genomundaki tüm ekzonları, ± 25 intronik bölgelerdeki baz değişikliklerini, tek nükleotid polimorfizmlerini ve 1000 nükleotit altında olan kopya sayısı değişikliklerini saptayabilmektedir. Varyant analizi için Genomize-SEQ arayüzü kullanılmıştır. İnceleme sonucunda 173.107 varyant ve 834 kopya sayısı değişikliği saptanmıştır. Bunlar arasında 2 patojen, 5 olası patojen, 15.480 VUS, 1.576 olası iyi huylu ve 156.044 iyi huylu varyant yer almıştır. Kopya sayısı değişikliklerinde ise 2 olası patojen, 795 VUS ve 37 iyi huylu varyant bulunmuştur. Ayrıca herhangi bir veri tabanında [ClinVar, Franklin, ACMG, VarSome gibi] 89 varyantın patojen veya olası patojen olarak en az bir kez literatürde yayımlanmış olduğu belirtilmiştir.

Hastanın fenotipi ve varyantlar çeşitli filtrelerden geçirildikten sonra HAX1 geninde (c.130-131insA, p.(W44Ter)) varyantı homozigot olarak saptanmıştır. Hastanın tanısı Kostmann sendromu olarak belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüm ekzom analizi, varyant, Kostmann sendromu

SS 23

Klinik Öncesi Tıp Öğrencilerinde Grup A Streptokok Prevelansının Araştırılması

Kevser Taşdemir¹, Şadican Köse¹, Fatma Rozerin Çen¹, Miraç Karaaltun¹, Melike Sekendiz¹, Mehmet Emin Kılınç¹, Arda Açıkgoz¹, Mehmet İbrahim Malkoç¹, Eren Özarslan¹, Şevval Sarı¹, Ruşen Yağmur Hazar², Elif Seren Tanrıverdi*²

¹İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya

*seren.tanriverdi@inonu.edu.tr

Özet

Bu çalışmada klinik öncesi tıp öğrencilerinde Grup A Streptokok (GAS) prevalansının belirlenmesi amaçlandı. Katılımcılara ait demografik ve klinik veriler (cinsiyet, üst solunum yolu enfeksiyonu varlığı, son 4 hafta içinde ÜSYE öyküsü, sigara kullanımı, yurtta kalıp kalmadığı ve kronik hastalık durumu) kaydedildi ve boğaz sürüntü örnekleri analiz edildi.

Toplamda üç ayrı dönemde 67 öğrenci değerlendirildi. Dönem 1’de 22 öğrencinin 2’sinde (%9,1), Dönem 2’de 22 öğrencinin 1’inde (%4,5), Dönem 3’te ise 23 öğrencinin 3’ünde (%13) GAS pozitifliği saptandı. Genel olarak toplam 67 öğrencinin 6’sında (%8,95) GAS pozitifliği bulundu. Dönemler arasında pozitiflik oranları farklılık göstermekle birlikte, örneklem sayısının sınırlı olması nedeniyle bu farkların istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p>0,05$). Risk faktörleri değerlendirildiğinde, GAS pozitifliği ile sigara kullanımı arasında belirgin bir ilişki saptanmadı. Buna karşılık, pozitif olguların büyük bir kısmının yurtta kaldığı gözlemlendi ve bu durum kalabalık yaşam koşullarının bulaş açısından rol oynayabileceğini düşündürdü. Ayrıca, GAS pozitif bireylerde son 4 hafta içinde üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsünün daha sık olduğu dikkati çekti. Kronik hastalık varlığı ise düşük sayıda gözlemlendiğinden anlamlı bir değerlendirme yapılamadı. Pozitif olguların sınırlı sayıda olması nedeniyle risk faktörleri ile anlamlı bir ilişki kurulamadı; ancak bazı pozitif bireylerde yakın zamanda ÜSYE öyküsü dikkat çekti.

Sonuç olarak, klinik öncesi tıp öğrencilerinde GAS taşıyıcılığı düşük-orta düzeyde saptanmış olup, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü ile ilişkisi daha geniş örneklemli çalışmalarla değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencileri, Grup A streptokok, kart test.

SS 24

Tıp Öğrencilerinin Yapay Zeka Dil Modellerinin Kullanımı Ve Etkileri

Ali Buğra Kılıncı¹, Elif Kılıç¹, Büşra Arpacı¹, Nazlıcan Kaşlı¹, Mehmet Furkan Tunç¹, Hayrunnisa Elçi¹, Zeynep Yağcı¹, Umut Aslan¹, Tuğra Yağız Aldeşer¹, Mehmet Özcan²

^{*1} İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

² İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Sorumlu yazar e-posta: dr.mehmetozcan@gmail.com

Bu çalışma, tıp öğrencilerinin yapay zeka (YZ) dil modellerini ne sıklıkla kullandıklarını, hangi amaçlarla tercih ettiklerini ve bu kullanımın akademik süreçlerine nasıl yansıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kesitsel olarak planlanan anket çalışması 63 tıp öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %63,5'i kadın olup örneklemin büyük kısmını 2. sınıf (%57,1) ve 3. sınıf (%33,3) öğrenciler oluşturmaktadır. Not ortalaması en sık 60–70 aralığında (%46) bildirilmiştir. Öğrencilerin ders çalışırken en çok başvurduğu yöntemlerin slayt okuma (%55,6) ve not çıkarma (%31,7) olduğu, yapay zekanın ise bu aşamada daha sınırlı kullanıldığı görülmektedir. Buna karşın YZ araçları özellikle anlaşılmayan konuları sormak (%65,1) ve açıklama almak (%61,9) için aktif biçimde kullanılmaktadır. Tıp eğitimi sırasında YZ kullanımı çoğunlukla “sık” (%52,4) olarak ifade edilirken, eğitim dışındaki kullanım daha çok “ara sıra” (%42,9) düzeyindedir. Öğrenciler YZ'nin en önemli katkılarını bilgiye hızlı erişim (%82,5) ve bilgiyi sade ve öz şekilde sunabilmesi (%61,9) olarak tanımlamaktadır. Öte yandan en dikkat çekici dezavantajın yanlış bilgiye maruz kalma riski (%61,9) olduğu, veri gizliliği (%25,4) ve bağımlılık (%30,2) konularının ise daha geri planda kaldığı görülmektedir. Katılımcıların %41,3'ünün elde ettikleri bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemesi önemli bir bulgu olarak öne çıkmaktadır. Buna rağmen öğrencilerin büyük çoğunluğu YZ'nin eğitimlerini desteklediğini (%96,8) ve günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını (%100) düşünmektedir. YZ ile konuyu tam öğrenme algısının orta-üst düzeyde yoğunlaştığı, akademik başarıya etkisinin ise genel olarak olumlu değerlendirildiği (%57,2) görülmektedir.

Sonuç olarak, YZ dil modelleri tıp öğrencilerinin eğitim sürecinde giderek daha fazla yer bulan, öğrenmeyi destekleyici araçlar olarak algılanmaktadır; ancak bu kullanımın bilinçli hale getirilmesi, özellikle doğruluk kontrolü ve güvenilirlik açısından kritik önem taşımaktadır.

SS 25

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Böbrek Taşı Risk Faktörleri ve Yaşam Tarzı Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Selim Yiğit Karakuş¹, Esen Kaşınray¹, Ahmet Taha Taşkesen¹, Metehan Aydoğan¹, BULUT DURAL²

¹ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya
² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya

Böbrek taşı hastalığı, yaşam tarzı, sıvı tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve aile öyküsü ile ilişkili sık görülen ürolojik hastalıklardan biridir. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinde böbrek taşı ile ilişkili olabilecek yaşam tarzı faktörlerinin ve cinsiyete göre dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Kesitsel tipte tasarlanan çalışmaya toplam 101 öğrenci dahil edildi. Katılımcıların cinsiyeti, günlük su tüketimi, çay/kahve tüketimi, idrar yapma sıklığı, ailede böbrek taşı öyküsü, sigara kullanımı, tuz tüketimi, fast food/yüksek sodyumlu gıda tüketimi, daha önce böbrek taşı tanısı alma ve taş nedeniyle operasyon geçirme durumları değerlendirildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanıldı.

Katılımcıların 51'i erkek, 50'si kadındı. Kadınlarda düşük su tüketimi oranı erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksekti (%78,0 vs. %51,0; p=0,005). Günlük ortalama su tüketimi de cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdi; kadınlarda 0–1 litre su tüketim oranı erkeklere kıyasla belirgin olarak daha yüksekti (%34,0 vs. %3,9; p=0,001). Ailede böbrek taşı öyküsü toplamda %32,7 oranında saptandı. Daha önce böbrek taşı tanısı alma oranı %5,9, böbrek taşı nedeniyle operasyon geçirme oranı ise %4,0 idi. Çay/kahve tüketimi, idrar yapma sıklığı, sigara kullanımı, tuz tüketimi, fast food tüketimi, taş tanısı ve taş operasyonu açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç olarak, bu çalışmada böbrek taşı risk faktörleri içinde özellikle düşük su tüketiminin kadın öğrencilerde daha belirgin olduğu görüldü. Öğrencilerde yeterli sıvı tüketimi konusunda farkındalık artırıcı eğitimlerin yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, su tüketimi, tıp öğrencileri, yaşam tarzı, risk faktörleri, üroloji

SS 26

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İdrar Yolu Enfeksiyonu Sıklığı, Semptomları ve İlişkili Davranışsal Faktörlerin Değerlendirilmesi

Hatice İrem Toprak¹, Yusuf Yılmaz¹, Hatice Apak¹, Betül Yılmaz¹, Arda Demirkol¹, BULUT DURAL²

¹ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya
² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya

İdrar yolu enfeksiyonu, özellikle genç erişkinlerde sık görülen ve yaşam kalitesini etkileyebilen önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinde idrar yolu enfeksiyonu sıklığının, enfeksiyonla ilişkili semptomların ve olası davranışsal faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Kesitsel tipte tasarlanan çalışmaya toplam 103 öğrenci dahil edildi. Katılımcıların son 12 ay içinde doktor tarafından idrar yolu enfeksiyonu tanısı alma durumu, son enfeksiyon atağı zamanı, enfeksiyon sırasında yaşanan semptomlar, cinsel aktivite durumu, cinsel ilişki sonrası idrar yapma alışkanlığı, günlük sıvı tüketimi, tuvalet temizliği yönü, son 6 ay içinde antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon şüphesinde başvuru davranışları değerlendirildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi, Mann–Whitney U testi ve bağımsız örneklem t-testi kullanıldı.

Son 12 ay içinde doktor tarafından idrar yolu enfeksiyonu tanısı alma oranı %76,2 olarak bulundu. En sık bildirilen semptom disüriydi (%32,3); bunu pollaküri (%14,1) ve alt karın ağrısı (%11,1) izledi. Katılımcıların %32,0'si cinsel olarak aktifti. Cinsel olarak aktif olan öğrencilerin yaş ortalaması aktif olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti ($28,66 \pm 7,40$ yıl vs. $22,79 \pm 3,37$ yıl; $p < 0,001$). Günlük sıvı tüketimi ile son 12 ay içinde idrar yolu enfeksiyonu tanısı alma durumu arasında anlamlı ilişki saptandı ($p = 0,006$). Son 6 ay içinde antibiyotik kullanım oranı %56,6 idi. İdrar yolu enfeksiyonu şüphesi olduğunda katılımcıların %58,0'i önce evde beklediğini, %38,0'i ise hemen doktora başvurduğunu belirtti.

Sonuç olarak, tıp fakültesi öğrencilerinde idrar yolu enfeksiyonu öyküsünün yüksek oranda bildirildiği, en sık semptomun disüri olduğu ve sıvı tüketimi ile enfeksiyon öyküsü arasında anlamlı ilişki bulunduğu görüldü. Öğrencilerde idrar yolu enfeksiyonlarından korunma, yeterli sıvı tüketimi ve uygun sağlık başvurusu konusunda farkındalık artırıcı eğitimlerin yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, disüri, sıvı tüketimi, tıp öğrencileri, antibiyotik kullanımı, üroloji

SS 27

Cinsel sağlık bilgi ve tutumlarının tıp öğrencilerinde değerlendirilmesi: akademik ilerleme ve klinik maruziyetin etkisi

Ahmet Arif Güler 1, Zilfinaz Sude Boyraz 1, Resul ÇİÇEK*2,

1Üniversite, Tıp Fakültesi, Malatya

2*Üniversite, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya

Cinsel sağlık eğitimi, tıp eğitiminin önemli ancak sıklıkla ihmal edilen bir bileşenidir. Tıp öğrencileri arasında bilgi düzeyi ve tutum farklılıkları, gelecekteki klinik yeterliliklerini etkileyebilir. Bu çalışmada tıp öğrencilerinin cinsel sağlık bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesi ve akademik ilerleme ile klinik maruziyetin bu parametreler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Kesitsel olarak tasarlanan bu çalışmaya farklı sınıflardan toplam 168 tıp öğrencisi dahil edildi. Katılımcılar prelinik (1–3. sınıf) ve klinik (4–6. sınıf) olarak gruplandırıldı. Veri toplamada CYBHB-Ö ve SA-SH-TR ölçekleri kullanıldı. İstatistiksel analizlerde Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis, Spearman korelasyon ve çok değişkenli regresyon analizleri uygulandı.

Sonuçlar, akademik yıl ilerledikçe bilgi düzeyinde anlamlı artış olduğunu gösterdi ($p<0.001$). Klinik öğrenciler prelinik öğrencilere göre daha yüksek bilgi skorlarına sahipti. Buna karşın tutum skorlarında anlamlı farklılık saptanmadı. Yaş ile bilgi arasında orta düzeyde pozitif korelasyon ($r=0.608$; $p<0.001$), bilgi ile tutum arasında ise zayıf ancak anlamlı ilişki bulundu ($r=0.228$; $p=0.003$). Çok değişkenli analizde akademik yıl ve tutum skoru bilgi düzeyinin bağımsız belirleyicileri olarak saptandı.

Sonuç olarak, tıp eğitimi sürecinde bilgi düzeyi artmasına rağmen tutumlarda benzer gelişim gözlenmemektedir. Bu durum, mevcut müfredatın bilişsel öğrenmeye odaklanırken tutum ve iletişim becerilerini yeterince geliştirmediğini düşündürmektedir. Cinsel sağlık eğitiminin multidisipliner ve uzunlamasına bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel sağlık, tıp öğrencileri, bilgi düzeyi, tutum, klinik maruziyet, tıp eğitimi

SS 28

Tıp fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS bilgi düzeyi ve stigma algılarının değerlendirilmesi

Yılmaz Z.B.¹, Biri A.Y.^{*1}, Akmeşe S.¹, Durak A.¹, Şahin R.¹, Tosun H.¹, Fırat Z.¹, Budak M.¹,
Yeşilyurt S.¹, Kurt O.¹,

^{*1}Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

***Sorumlu yazar e-mail:** burcin.yilmaz@inonu.edu.tr

Özet

Giriş ve Amaç: HIV/AIDS, geleceğin hekimi olan tıp fakültesi öğrencilerinin bilgi düzeyi ve damgalayıcı tutumlarını ele almayı gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma, tıp fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS bilgi düzeyi ve hastalığa yönelik tutumlarını belirlemek ve bu sonuçları yordayan bağımsız faktörleri saptamak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı (kesitsel) tipteki bu çalışma, Nisan–Mayıs 2026 tarihlerinde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören 1833 öğrenci evreninde yürütülmüştür. Sonlu evren formülü ile hesaplanan örneklem büyüklüğüne (n=318) yakın 296 öğrenciye çevrimiçi anket ile ulaşılmıştır. Literatür taranarak oluşturulan anket; sosyodemografik bilgi, 29 maddelik bilgi düzeyi (genel bilgi, bulaş yolları, risk grupları, korunma ve tedavi) ve 11 maddelik tutum (5’li Likert) bölümlerinden oluşmakta olup yüksek puan iyi bilgi ve olumlu tutumu yansıtmaktadır. Etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır. Veriler Student t testi, Pearson korelasyon ve çoklu lineer regresyon ile değerlendirilmiş, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 22,2±2,0 yıl olan katılımcıların %52,0’si kadındır. Toplam bilgi puanı 21,0±3,5, tutum puanı 37,6±6,9 saptanmıştır. Klinik dönem öğrencilerinin hem bilgi (p<0,001) hem tutum (p=0,021) puanları preklitik öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. Erkeklerin bilgi (p<0,001), kadınların ise tutum (p=0,034) puanı yüksek saptanmıştır. Çoklu regresyonda toplam bilgi puanını klinik dönem (β=0,417), HIV/AIDS eğitimi (β=0,172) ve kitap/dergi (β=0,143) olumlu; televizyon/radyo (β=-0,134) olumsuz yordamıştır (Düzeltilmiş R²=0,355). Tutum puanını erkek cinsiyet (β=-0,166) olumsuz; klinik dönem (β=0,158), internet/sosyal medya (β=0,125) ve tıp fakültesi eğitimi (β=0,123) olumlu yönde yordamıştır.

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS bilgi düzeyi ve tutumu eğitim süreciyle olumlu yönde gelişmekle birlikte, korunma ve tedavi alt boyutunda eksiklikler sürmekte, kitle iletişim araçları yanıltıcı bilgi kaynağı olabilmektedir. Müfredat içi HIV/AIDS eğitiminin güçlendirilmesi ve stigma azaltıcı uygulamaların erken dönemden itibaren entegre edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, tıp fakültesi öğrencileri, bilgi düzeyi, tutum, stigma

SS 29

Sağlık çalışanlarında respiratuvar sinsityal virüs (RSV) hastalığı ve RSV aşısına yönelik bilgi, tutum ve davranışların değerlendirilmesi

Zeynep Çelik¹, Anıl Çağlar Dursun², Ilgın Duman³, Melisa Metin⁴, Gülsüm Sayıcı⁵, Ekrem Buğra Tunç⁶, Metehan Görgülü⁷, Hamid Korkmaz⁸, Muhammet Mert Berçin⁹, Yusuf Tanrıser¹⁰, Zeynep Yağmur Erden¹¹

Sorumlu yazar e-mail: celik.zeynep@inonu.edu.tr

Giriş

Respiratuvar sinsityal virüs (RSV), özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen önemli bir patojendir. Son yıllarda geliştirilen RSV aşısı, hastalığın önlenmesinde yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Sağlık çalışanlarının RSV ve aşısı konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları, aşılamaya uygulamalarının başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışma, sağlık çalışanlarının RSV hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Bulgular

Çalışmaya 299 sağlık çalışanı katılmış olup, katılımcıların %43,8'i doktor, %32,1'i hemşire ve %24,1'i intörn doktor olarak belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun RSV'nin bir solunum yolu virüsü olduğu, damlacık ve temas yoluyla bulaştığı, mevsimsel özellik gösterdiği ve özellikle yaşlı ile kronik hastalığı olan bireylerde ciddi sonuçlara yol açabileceği bilgilerine doğru yanıt verdiği gözlenmiştir. Bununla birlikte, RSV'nin yalnızca çocukları etkilediği ve antibiyotiklerle tedavi edilebileceği gibi yanlış inanışların katılımcıların bir kısmında devam ettiği saptanmıştır. Meslek gruplarına göre bilgi skorları incelendiğinde doktorların $11,56 \pm 2,32$ ile yüksek, intörn doktorların $7,42 \pm 4,67$ ile orta ve hemşirelerin $5,36 \pm 4,78$ ile düşük-orta düzeyde bilgiye sahip olduğu belirlenmiş olup, mesleki eğitim düzeyi arttıkça bilgi skorunun yükseldiği görülmüştür. Katılımcıların aşısıya yönelik tutumları incelendiğinde büyük çoğunluğun aşıların halk sağlığı açısından önemli olduğunu kabul ettiği, ancak RSV aşısının yeni geliştirilmiş olması nedeniyle güvenlik ve etkinlik konusunda bazı tereddütler taşıdığı belirlenmiştir. RSV aşısı önerme davranışları değerlendirildiğinde, katılımcıların aşısı en sık 60 yaş üstü bireylere ve kronik hastalığı bulunan orta yaş grubuna önerdiği, gebelere yönelik öneri oranlarının ise daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların aşısı önermeme nedenleri arasında bilgi eksikliği, güvenlik endişesi ve etkinlik konusundaki belirsizliklerin ön planda olduğu belirlenmiştir.

Sonuç

Çalışmamızda sağlık çalışanları arasında RSV bilgi düzeyinin mesleğe göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Özellikle hemşire ve intörn gruplara yönelik eğitimlerin artırılması, RSV aşısına yönelik güvenin güçlendirilmesine ve aşılamaya oranlarının artırılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Aşı, Bağışıklama, Rsv, Virüs

SS 30

Sağlık çalışanlarında respiratuvar sinsityal virüs (RSV) hastalığı ve RSV aşısına yönelik bilgi, tutum ve davranışların değerlendirilmesi

Zeynep Çelik¹, Anıl Çağlar Dursun², Ilgın Duman³, Melisa Metin⁴, Gülsüm Sayıcı⁵, Ekrem Buğra Tunç⁶, Metehan Görgülü⁷, Hamid Korkmaz⁸, Muhammet Mert Berçin⁹, Yusuf Tanrıser¹⁰, Zeynep Yağmur Erden¹¹

Sorumlu yazar e-mail: celik.zeynep@inonu.edu.tr

Giriş

Respiratuvar sinsityal virüs (RSV), özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen önemli bir patojendir. Son yıllarda geliştirilen RSV aşısı, hastalığın önlenmesinde yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Sağlık çalışanlarının RSV ve aşısı konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları, aşılama uygulamalarının başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışma, sağlık çalışanlarının RSV hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Bulgular

Çalışmaya 299 sağlık çalışanı katılmış olup, katılımcıların %43,8'i doktor, %32,1'i hemşire ve %24,1'i intörn doktor olarak belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun RSV'nin bir solunum yolu virüsü olduğu, damlacık ve temas yoluyla bulaştığı, mevsimsel özellik gösterdiği ve özellikle yaşlı ile kronik hastalığı olan bireylerde ciddi sonuçlara yol açabileceği bilgilerine doğru yanıt verdiği gözlenmiştir. Bununla birlikte, RSV'nin yalnızca çocukları etkilediği ve antibiyotiklerle tedavi edilebileceği gibi yanlış inanışların katılımcıların bir kısmında devam ettiği saptanmıştır. Meslek gruplarına göre bilgi skorları incelendiğinde doktorların $11,56 \pm 2,32$ ile yüksek, intörn doktorların $7,42 \pm 4,67$ ile orta ve hemşirelerin $5,36 \pm 4,78$ ile düşük-orta düzeyde bilgiye sahip olduğu belirlenmiş olup, mesleki eğitim düzeyi arttıkça bilgi skorunun yükseldiği görülmüştür. Katılımcıların aşıya yönelik tutumları incelendiğinde büyük çoğunluğun aşıların halk sağlığı açısından önemli olduğunu kabul ettiği, ancak RSV aşısının yeni geliştirilmiş olması nedeniyle güvenlik ve etkinlik konusunda bazı tereddütler taşıdığı belirlenmiştir. RSV aşısı önerme davranışları değerlendirildiğinde, katılımcıların aşığı en sık 60 yaş üstü bireylere ve kronik hastalığı bulunan orta yaş grubuna önerdiği, gebelere yönelik öneri oranlarının ise daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların aşığı önermeme nedenleri arasında bilgi eksikliği, güvenlik endişesi ve etkinlik konusundaki belirsizliklerin ön planda olduğu belirlenmiştir.

Sonuç

Çalışmamızda sağlık çalışanları arasında RSV bilgi düzeyinin mesleğe göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Özellikle hemşire ve intörn gruplara yönelik eğitimlerin artırılması, RSV aşısına yönelik güvenin güçlendirilmesine ve aşılama oranlarının artırılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Aşı, Bağışıklama, Rsv, Virüs

SS 31

Subdural hematomlu hastaların demografik özellikleri ve klinik seyirlerinin değerlendirilmesi

Zeynep Tekedereli¹, Muhammed Maruf Ali¹, Raed Lababidi¹, Merve Ayhan¹, Aayh Alhammadi¹, Abd Alraheem Asmael Abu Abd Allah², Enes İnan², Ramazan Paşahan²

¹İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İngilizce Programı Dönem II, Malatya, Türkiye

² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Sorumlu Yazar: Muhammed Maruf ALİ.; e-mail: muali4563@gmail.com

Subdural hematom, özellikle ileri yaş hastalarda sık görülen ve klinik spektrumu geniş olan önemli bir intrakraniyal patolojidir. Bu çalışmada, subdural hematom tanısı ile takip edilen hastaların demografik özellikleri, başvuru nedenleri, Glasgow Koma Skalası (GKS) skorları ve hastanede yatış süreleri değerlendirilmiştir.

Retrospektif olarak gerçekleştirilen çalışmaya toplam 93 hasta dahil edilmiştir. Hastalar yaş, başvuru şikayeti, GKS skoru ve yatış süresi açısından incelenmiştir. GKS skorları 13–15 (hafif), 9–12 (orta) ve ≤8 (ağır) olarak sınıflandırılmıştır.

Bulgulara göre hastaların büyük çoğunluğunu ileri yaş grubu (özellikle 76–90 yaş) oluşturmaktadır. GKS değerlendirmesinde hastaların çoğunun hafif grupta (13–15) yer aldığı, daha az sayıda hastanın orta ve ağır grupta bulunduğu görülmüştür. Hastanede yatış süreleri geniş bir aralıkta dağılım göstermiş olup, kısa süreli yatışlar daha sık izlenmiştir. Bununla birlikte düşük GKS skoruna sahip hastalarda yatış süresinin belirgin şekilde uzadığı saptanmıştır. GKS ile yatış süresi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, GKS'nin subdural hematomlu hastalarda klinik seyir ve prognozu öngörmede önemli bir belirteç olduğu, özellikle ileri yaş hastalarda erken tanı ve uygun yönetimin kritik öneme sahip olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: subdural hematom, Glasgow Koma Skalası, yaş dağılımı, yatış süresi, prognoz

SS 32

2021–2026 yılları arasında anevrizmal subaraknoid kanamalı hastaların epidemiyolojik bulguları

Danışman: Doç.Dr.Bora Tetik²

Nehir KARTAL¹, Ceyda DURUKAN¹, Defne Deniz DİNÇ¹, Selen İnci BAYRAMOĞLU¹, Şevval İrem ŞİMŞEK¹, Hatice Kübra SAKA¹, Ayşegül ERAYMAN¹, Hilal BALIN¹, Mehmet Deniz ALTINTAŞ¹

*¹ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

*² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Malatya

drboratetik@hotmail.com

Özet: Bu çalışma, 2021–2026 yılları arasında kliniğimizde anevrizmal subaraknoid kanama (aSAK) tanısıyla takip edilen hastaların epidemiyolojik özelliklerini geriye dönük olarak incelemiştir. Toplam 535 vaka analiz edilmiş; yıllık vaka dağılımı, kanama durumu, mortalite ve anevrizma lokalizasyonu ilişkisi değerlendirilmiştir.

Gereç ve yöntem: Ocak 2021–Mart 2026 tarihleri arasında dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar kanama durumuna göre kanamış, kanamamış ve tanısız olarak sınıflandırılmıştır. Anevrizma lokalizasyonu DSA raporlarından elde edilmiş; lokalizasyon bilgisi olan 242 vaka (%45.2) ilgili analize dahil edilmiştir. Mortalite, exitus (EX) kaydına göre belirlenmiştir.

Bulgular: Yıllık analizde en yüksek vaka sayısı 2022 yılında (n=139), en düşük 2023 yılında (n=66) tespit edilmiştir. Genel mortalite %11.8 (63/535) olup kanamış hastalarda bu oran %30.3 (47/155) ile yaklaşık 2.5 kat daha yüksek seyretmiştir. Lokalizasyon analizi yapılabilen 242 vakada en sık lokalizasyon A. COM A (n=71, %29.3) olup mortalite %29.6 olarak bulunmuştur. Posterior dolaşım anevrizmaları (Baziller Tepe %42.9, PICA/Vertebral %40.0, ICA Diğer %60.0) düşük vaka sayısına karşın belirgin yüksek mortalite ile seyretmiştir.

Tartışma ve sonuç: Ön Komünikan Arter (A. COM A) anevrizmaları serimizde en sık görülen lokalizasyon olup yüksek rüptür oranı (%88.7) ve %29.6 mortalite ile öne çıkmaktadır. Posterior dolaşım anevrizmaları, düşük vaka sayısına karşın belirgin yüksek mortalite ile seyretmiş; bu bulgu literatür verileriyle uyumludur. Yıllık analizde 2022 en kalabalık yıl (n=139) olarak dikkat çekerken, en düşük mortalite 2023 yılında (%6.1) gözlemlenmiştir. Kanamış hastalardaki mortalite (%30.3), erken endovasküler veya cerrahi girişimin hayatta kalım üzerindeki kritik önemini vurgulamaktadır. Bu verilerin prospektif çalışmalarla desteklenmesi planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serebral anevrizma, lokalizasyon, mortalite, subaraknoid kanama, dijital substraksiyon anjiyografi

SS 33

**Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Serum Demir, Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin ve RDW Düzeyleri**

Büşra Yıldırım¹, Bartu Reçber¹, Sıdar Çatak¹, Şevval Güner¹, Tuğçe Durak¹, Mehmet Kesentaş¹,
Nursinem Ok¹, Muhammed Avcı¹, Zeynep Nadire Koçak¹, Prof.Dr. M. Çağatay Taşkapın²

¹İNönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II Öğrencileri, Malatya

²İNönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Malatya

01240101025@ogr.inonu.edu.tr

Demir yaşam için esansiyel bir elementtir. DNA, RNA ve protein sentezi, oksijen taşınması, elektron transportu, hücre solunumu, pek çok enzimin yapı ve fonksiyonuna katılmak gibi görevleri vardır. Oksido-redüksiyon reaksiyonlarına katılan bir eser elementtir. Protein kompleksleri olan ferritin ve hemosiderin demirin depo şekilleridir. Demir üst ince barsak sisteminde (duodenum) aktif transportla absorbe edilir. Demir absorpsiyonun arttıran ve azaltan pek çok faktör vardır. Emilen demir ferroportin ile plazmadaki transferrine yüklenir. Hepsidin demir dengesinin ana düzenleyicisidir. Hepsidinin fazla yapımı ile ciddi demir eksikliği hepsidin eksikliği olduğunda da ağır demir birikimi olur.

Demir eksikliği anemisi dünyada en sık görülen hastalıklardan birisidir. Dünya popülasyonunun % 10-30'unda olduğu öne sürülmektedir. En sık görülen hematolojik hastalıktır. En sık süt çocuklarında, ekonomik şartları kötü olanlarda, gebelerde, kadınlarda, düzenli kan bağışı yapanlarda, yaşlılarda görülür. Demir eksikliği tanısı laboratuvar testleri ile kolayca konulmaktadır.

Demir eksikliğinde halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, baş ağrısı, çok uyuma, kil, toprak, buz gibi maddeleri yeme arzusu, disfaji, iştahsızlık, bulantı, kabızlık gibi GİS semptomları, amenore, metroraji, gelişme geriliği, saç dökülmesi, cildin kuru olması, dilde ağrı, tırnak kırılması gibi bulgular görülebilir. Laboratuvar bulguları olarak; serum demir, total demir bağlama kapasitesi, ferritin, yüzde satürasyon, hemogram parametrelerine bakılabilir. Bu klasik parametrelerin dışında serum transferrin reseptör ölçümü, eritrosit protoporfirin düzeyi gibi çok fazla çalışılacak tetkik vardır.

Çalışmamızın amacı; İ.Ü Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim dalı) tarafından takip edilen demir eksikliği anemili hastaların serum demir, total demir bağlama kapasitesi, ferritin, RDW düzeylerini incelemek ve bu parametreleri sağlıklı bireylerle kıyaslamaktır. Çalışmamızın sonucunda hastalarda serum demir ve ferritin düzeylerinin düşük, demir bağlama kapasitesi ve RDW düzeylerinin ise yüksek olduğu (sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında) izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, RDW

Prof.Dr. M. Çağatay Taşkapın (Danışman Öğretim Üyesi)

SS 34

**Metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığında aterosklerotik riskin belirlenmesinde
aterojenik plazma indeksinin yeri**

Cemil Mungan¹, Ahsen Taşcan¹, Aslı Su Okuducu¹, Cemre Boyraz¹, Ceyda Güzelen¹, Kayra Efehan Yapar¹,

Muhammed Taha Ateş¹, Onur Elmas¹, Umut Can Özdemir¹, Esra Tunç², Cuma Mertoğlu²

^{*1} İnönü üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya

^{*2} İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya

drcumamert@hotmail.com

Giriş: Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığı (MAFLD), kardiyovasküler risk ile yakından ilişkili yaygın bir metabolik hastalıktır. Aterojenik plazma indeksi (AIP), dislipidemi ve aterosklerotik riski yansıtan pratik bir biyobelirteçtir. Bu çalışma, MAFLD ile AIP arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Materyal ve Metot: Laboratuvar bilgi sistemi kayıtları incelenmiş ve son 5 yıl içinde (26 Mart 2021 – 26 Mart 2026) polikliniğe başvuran ve MAFLD (n=38; 22 erkek, 16 kadın) tanısı alan 18 yaş ve üzeri hastalar ile genel tıbbi muayene (n=38; 19 erkek, 19 kadın) amacıyla polikliniğe başvuran sağlıklı bireylerin ilk laboratuvar test sonuçları (tekrarlanan testler hariç) değerlendirilmiştir.

Bulgular: MAFLD grubunda kolesterol, trigliserit, AST, ALT, LDL, AST/ALT ve AIP ($p<0.001$) değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek iken HDL ($p<0.05$) düzeyi ise daha düşüktü. Yapılan korelasyon analizinde AIP değeri ile AST ($r=0.515$, $p<0.001$) ve ALT ($r=0.499$, $p<0.001$) arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü, AST/ALT ($r=-0.324$, $p=0.004$) oranı ile zayıf-orta düzeyde negatif yönlü, yaş ($r=0.393$, $p<0.001$) ile ise orta düzeyde pozitif yönlü korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Bu bulgular, MAFLD ile aterojenik lipid profili arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve artmış aterosklerotik kardiyovasküler risk ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, MAFLD hastalarında kardiyovasküler risk faktörlerinin erken dönemde tanınması ve yönetimi büyük önem taşımaktadır. AIP, pratik ve kolay uygulanabilir bir belirteç olarak bu hastalarda risk değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığı, aterojenik plazma indeksi, ateroskleroz

SS 35

Organ nakli sonrası yaşamda en belirgin değişim alanlarının değerlendirilmesi

Berfin Çeliköz¹, Azra Gül Demirkaya¹, Betül Elif Yıldırım¹, Berfin Andan¹, Muhammet Furkan
Karaaslan¹, Mert Okan Özgel¹, Kübra Kılıç¹, Berk Cucu¹, Yasin Dalda²

¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 2, Malatya

²¹İNÖNÜ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Özet

Bu çalışma, karaciğer nakli operasyonu geçirmiş 100 hastanın post-operatif dönemdeki yaşam deneyimlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara yöneltilen “Organ nakli sonrası hayatınızda en çok değişen şey hangisi oldu?” sorusuna verilen yanıtlar, sürecin hastalar üzerindeki bütüncül etkisini ortaya koymaktadır.

Anket verilerine göre, katılımcıların %48’i nakil sonrası en belirgin değişimin psikolojik durumlarında yaşandığını ifade etmiştir. Bu sonuç, cerrahi başarının ötesinde, organ naklinin birey üzerinde yarattığı emosyonel ve ruhsal etkinin ne kadar baskın olduğunu göstermektedir. Fiziksel sağlıktaki değişim %32’lik bir oranla ikinci sırada yer alırken; sosyal hayat ve günlük aktiviteler üzerindeki değişimler daha düşük oranlarda kalmıştır.

Bu veriler değerlendirildiğinde; başarılı bir transplantasyon sürecinin sadece biyolojik parametrelerle (karaciğer fonksiyon testleri, sağkalım vb.) sınırlı kalmaması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Hastaların yaklaşık yarısının en büyük değişimi psikolojik alanda tecrübe etmesi, klinik takip protokollerinde psikososyal destek ve rehabilitasyon süreçlerinin en az medikal tedavi kadar kritik bir bileşen olduğunu kanıtlamaktadır. Sonuç olarak, hasta odaklı bir bakım yaklaşımı için nakil sonrası süreçte multidisipliner bir izlem stratejisinin benimsenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer Nakli, Psikoloji, Organ

SS 36

Tıp fakültesi öğrencileri üzerinde otizm spektrumunun araştırılması

Alper Semi İnce

Ahmet Niyazi Bakır, Yusuf Kerem İNAN, Rateb Ammurioglu, Oğuz Asaf Paluluoğlu, Psikolog
Hüseyin Gürer, Biyoistatistik ABD Dr. Ahmet Kadir Aslan

Danışma öğretmen: Dr.Halil Düzova

İnönü üniversitesi tıp fakültesi fizyoloji ABD, halil.duzova@inonu.edu.tr

Otizm Spektrum Bozukluğu (**OSB**), psikolojide ve psikiyatride erken çocukluk döneminde başlayan, bireyin sosyal iletişim, davranış ve ilgi alanlarını etkileyen nörogelişimsel bir durum olarak tanımlanır. Bu çalışmada otizm spektrumuna yönelik yapılan anket sonuçları; testin alt gruplarına göre, cinsiyete göre ve klinik–preklinik dönemler arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma İnönü üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinde yapılmıştır. Toplam 272 kişi katılmıştır. Kullanılan anket OSA anketidir.

Çalışmada kullanılan veriler ölçme düzeylerine göre ortanca (min-max) ve sayı (yüzde) şeklinde özetlendi. Skorların normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Skorlar açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile incelendi. $p \leq 0.05$ istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Analizlerde IBM SPSS Statistics programı kullanılmıştır.

Elde edilen veriler incelendiğinde, genel AQ skor ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu dikkat çekmektedir. Alt grup analizleri, belirli alanlarda kadın katılımcıların erkeklere kıyasla daha yüksek belirti düzeylerine sahip olabileceğine işaret etmektedir($p=0.01$). Bunun yanı sıra, preklinik dönemdeki öğrencilerde otizm spektrumuna ilişkin özelliklerin, klinik dönemdeki öğrencilere göre daha belirgin olduğu gözlemlenmiştir.

Bu çalışma, tıp öğrencilerinde otizm spektrum özelliklerinin toplum ortalamasına kıyasla daha yüksek düzeyde olabileceğini göstermektedir. Bulgular, özellikle bazı alt gruplarda kadınlarda belirtilerin daha belirgin olduğunu ve preklinik dönemde bu belirtilerin klinik döneme göre daha sık görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum, eğitim süreci, farkındalık düzeyi ve sosyal etkileşim dinamiklerinin otizm spektrum özellikleri üzerindeki olası etkilerini düşündürmektedir. Elde edilen veriler, bu alanda yapılacak daha geniş örneklemli ve çok merkezli çalışmalar için yol gösterici niteliktedir. Ancak bu farklılıkların doğrudan otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili olmaktan ziyade, katılımcıların sosyodemografik özellikleri, eğitim süreçleri ve çevresel etkenlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bulgular, sonuçların yorumlanmasında çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Otizm spektrumu, öğrenci, anket

Polikistik over sendromu (PKOS) hastası kadınlarda yeme bozukluğu ölçümü

Elif Coşkun¹, Asiye Amber Kantemur¹, Yaren Yağmur Torun¹, Ebrar Gürbüz¹

Senem Arda Düz²

İpek Balıkcı³

Danışman: Halil Düzova⁴

halil.duzova@inonu.edu.tr

¹İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri

²İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

³İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD

⁴İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD

Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda hiperandrojenizm, ovulatuvar disfonksiyon ve polikistik over morfolojisi ile karakterize, prevalansı yaklaşık %6–10 arasında değişen yaygın bir endokrin bozukluktur. Bu çalışmanın amacı, PKOS’lu kadınlarda yeme davranışları ile beden algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi polikliniğine başvuran ve Rotterdam tanı kriterlerine göre polikistik over sendromu tanısı konulmuş 80 kadın hasta üzerinde yürütülmüş olup veriler anket yöntemiyle toplanmış; kısıtlı yeme, beden şekli ve vücut ağırlığına ilişkin endişe, beden memnuniyetsizliği, tıkanırcasına yeme ve arınma davranışlarını değerlendiren ölçekler kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 26.0 programı ile analiz edilmiş; nitel değişkenler sayı ve yüzde ile, nicel değişkenler ortalama±standart sapma ve medyan (minimum-maksimum) değerleri ile özetlenmiştir. Değişkenler arası ilişkiler Spearman rho korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiş ve p<0.05 düzeyi istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Bulgular incelendiğinde, beden memnuniyetsizliği (3.46±2.27) ve beden şekli ile vücut ağırlığına ilişkin endişe (3.09±2.13) ortalamalarının diğer değişkenlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca kısıtlı yeme ile beden şekli ve ağırlık endişesi (r=0.420, p<0.001) ve beden memnuniyetsizliği (r=0.253, p=0.023) arasında; beden memnuniyetsizliği ile tıkanırcasına yeme (r=0.303, p=0.006) ve tıkanırcasına yeme ile arınma davranışı (r=0.385, p<0.001) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişkiler saptanmıştır.

Sonuç olarak, PCOS’lu bireylerde beden algısına ilişkin olumsuzlukların yeme davranışları ile ilişkili olduğu ve bu ilişkinin klinik değerlendirme ile tedavi süreçlerinde göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: PCOS, yeme davranışları, beden algısı, beden memnuniyetsizliği, kısıtlı yeme, tıkanırcasına yeme, arınma davranışı, korelasyon analizi

SS 38

Kronik çözünebilir kahve tüketiminin sıçanlarda bilişsel fonksiyonlar, anksiyete benzeri davranışlar ve nörotrofik faktörler üzerindeki doz-cevap ilişkisinin incelenmesi

Sare Yön¹, Ahmad Sewar Alhasan Alosman¹, Enes Esen¹, Mustafa Umur Tunçer¹, Kevser Tanbek²

¹ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İngilizce Programı Dönem II, Malatya, Türkiye

² İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Sorumlu Yazar: Kevser TANBEK, Dr.; e-mail: kevser.tanbek@inonu.edu.tr

Dünya genelinde günlük olarak yaklaşık 2 milyar fincan tüketilmekte olan kahve en yaygın kullanılan psikoaktif maddelerin başında gelmektedir. Güvenli kabul edilen günlük kahve tüketiminin bilişsel ve davranışsal etkileri arasındaki doz-cevap ilişkisi yeterince aydınlatılmamıştır. Literatürde düşük-orta dozların uyanıklık ve hafızada iyileşme sağladığı bilinmekle birlikte, farklı tüketim seviyelerinin kronik etkilerini karşılaştıran kontrollü çalışmalar eksiktir. Bu çalışmada, kronik farklı dozlarda çözünebilir kahve tüketiminin sıçanlarda öğrenme-bellek, anksiyete benzeri davranışlar ile beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve sinir büyüme faktörü (NGF) düzeyleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Çalışma, İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu'nun 2026-2-2 nolu kararı ile onaylandı. Wistar albino erkek sıçanlar (n=40) dört gruba ayrıldı: kontrol, 2 fincan, 4 fincan ve 5 fincan kahveye eşdeğer çözünebilir kahve çözeltileri 8 hafta boyunca oral gavaj ile uygulandı. Sekiz hafta sonunda Morris Water Maze (MWM) ile öğrenme/bellek, açık alan testi ile lokomotor aktivite ve anksiyete değerlendirildi. Beyin dokularında BDNF ve NGF düzeyleri ölçüldü.

MWM'de 2 ve 4 fincan gruplarında yön bulma süresi kontrole göre anlamlı derecede azaldı ($p<0.05$); buna karşın 5 fincan grubunda bu süre anlamlı şekilde uzadı ($p<0.05$). Açık alan testinde 5 fincan grubunda geçiş süresi anlamlı derecede kısaldı ve anksiyete benzeri davranışlarda artış gözlemlendi. Beyin dokusu analizinde BDNF ve NGF düzeyleri 5 fincan grubunda diğer gruplara kıyasla anlamlı derecede düşük bulundu ($p<0.05$).

Düşük-orta doz kronik kahve tüketimi (2-4 fincan/gün) bilişsel performansı iyileştirirken, yüksek doz (5 fincan/gün) nörotrofik faktörleri baskılayarak öğrenme bozukluğuna ve artmış anksiyete benzeri davranışlara yol açmaktadır. Bulgular, günlük güvenli kabul edilen miktarların etkilerinin doğrusal olmadığını ve aşırı tüketimin nörodavranışsal riskler taşıyabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik kahve tüketimi, Bilişsel Fonksiyonlar, BDNF, NGF, Anksiyete

SS 39

Steril Eldiven Takma Eğitim Videolarının Niteliksel Analizi Ve Teknik Yeterliliği

İbrahim Topçu¹, Haydar Albayrak², Ömer Polat², Onur Dablan², Esmâ Ecem Yıldız², Arif Alkiş², İlknur Bayutmuş², Abdülhamit Önat², Arda Karaeminoğulları², Ayşenur Dünder², Hayrunnisa Çelik²

¹ İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD, Malatya

² İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

Sorumlu yazar e mail: onurdablan12345@gmail.com

Özet

Steril eldivenler, cerrahi operasyonlar ve girişimsel işlemler sırasında hasta ile sağlık çalışanı arasında koruyucu bir bariyer oluşturarak enfeksiyon riskini azaltan temel tıbbi ekipmanlardır. Bu çalışmada, YouTube platformunda yer alan steril eldiven giyme eğitim videolarının bilimsel doğruluğu, öğretimsel yeterliliği ve steril eldiven giyme kurallarına uyumu değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 8 Şubat 2026 tarihinde YouTube’da “eldiven giyme” ve “surgical sterile glove donning” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış, 1 dakikadan uzun, reklam içermeyen ve eğitim amaçlı hazırlanmış toplam 100 Türkçe ve İngilizce video çalışmaya dahil edilmiştir. Videolar, 9 değerlendirici tarafından Global Quality Score (GQS), JAMA Benchmark Criteria, Modified DISCERN ve 18 maddelik steril eldiven giyme prosedür kontrol listesi kullanılarak analiz edilmiştir. Değerlendirme sonucunda, videoların eldiven bütünlüğünün korunması, paket açılımı ve eldivenin kontaminasyonsuz giyilmesi gibi teknik uygulama basamaklarında yüksek başarı gösterdiği; ilk ve ikinci elin steril şekilde giyilmesi ile iç yüzey temas kurallarına %93’ün üzerinde uyum sağlandığı saptanmıştır. Buna karşın, hazırlık ve hata yönetimi basamaklarında belirgin eksiklikler olduğu görülmüş; takıların çıkarılması kuralının %86,3, kontaminasyon durumunda uygulanması gereken prosedürlerin ise %80,9 oranında ihmal edildiği belirlenmiştir. Ayrıca GQS ve Modified DISCERN skorları, videoların teknik uygulama açısından yeterli olmakla birlikte akademik güvenilirlik ve bütüncül eğitim içeriği bakımından orta-düşük düzeyde kaldığını göstermiştir. Sonuç olarak, YouTube’daki steril eldiven giyme eğitim videolarının teknik uygulamayı göstermede başarılı olduğu, ancak sterilite hazırlığı, el hijyeni ve kontaminasyon yönetimi gibi kritik aşamalarda yetersizlikler içerdiği görülmüş; eğitim materyallerinin bu eksiklikleri giderecek şekilde standardize edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Steril eldiven giyme, Youtube, JAMA Benchmark