-5 学年_____学期_____班级_____学号_____姓名_____

密 封 线

考生答题不得超过此线

德 宏 职 业 学 院

2025 年 5 月 2024 级专科婴幼儿托育服务与管理班

《婴幼儿伤害预防与处理》期末试卷

B 卷

本试卷共 4 页，考生在作答前应先检查是否有缺页、白页、以防漏答。查对无误后，请先填写考生信息，再答卷。

一、单选题 （请选出一个正确答案填入答题卡内，每题 1 分，共 100 分）

1.婴幼儿发生晕厥后，应采用何种体位()

A.平卧位　　B.侧卧位

C.俯卧位　　D.膝胸卧位

E.任一卧位均可

2.下列属于假性晕厥的是（）

A.　心律失常的晕厥　　B.脑缺血的晕厥

C.低血糖晕厥　　D.低血压的晕厥

E.迷走神经性晕厥

3.天天，男，3 岁，早晨未吃早饭，在活动后突然四肢瘫软，倒地，发生低血糖晕厥，下列救治措施错误的是()

A.监测血糖　　B.给予含糖食物或饮料

C.　边救治边通知家长　　D.平卧位并松解衣裤

E.不做任何检查立即进行心肺复苏

4.如果婴幼儿中暑，可让婴幼儿喝一些（），或口服淡盐水等，帮助要幼儿缓解症状。

A.含盐清凉饮料　B.热茶　　C.咖啡　　D.可可　　E.以上都不行

5.将婴幼儿移至（），解开其衣扣，让其躺下休息，是中暑的处理的步骤之一。

A.病床上　B.阴凉通风处　　C.屋内　D.院内　E.以上对不对

6.婴儿海姆立克急救法施救者用（）冲击婴儿（）的部位。

A.掌根部、两肩胛骨之间　　B.指尖、两肩胛骨之间

C.D.掌根部、肩胛骨　　D.指尖、肩胛骨

7.食物中毒的特点包括（）

A.发病与食物有关　　B.潜伏期短、呈暴发性

C.中毒婴幼儿表现相似　　D.无人与人之间垂直传播

E.以上都是

8.发芽土豆中往往产生（　），故食用不当易造成食物中毒。

A 龙葵素　　B.氰苷

C.皂素　　D.维生素

E 以上都是

9.食物中毒的症状有（）。

A 恶心、呕吐　　B.腹痛

C.腹泻　　D.发热

E 以上都是

10..以下属于食物中毒的紧急救治方法的是（）。

A 催吐　　B.洗胃

C.导泻　　D.解毒

E.以上都是

11.催吐法通常在食入毒物（）小时内，且无明显呕吐症状，可采用催吐法。

A.1-2　　B.2-4　　C.4-6　　D.6-8　　E.8-10

22.若婴幼儿食物中毒已经昏迷禁止（）

A.洗胃　　B.催吐

C.解毒　　D.补液　　E.以上都不是

13.若婴幼儿食入毒物超过（）小时，且精神尚好，则可服用泻药。

A.1　　B.2　　C.3　D.4　　E.5

14.如果婴幼儿在炎热的环境中突发惊厥，托育机构人员首先应（）。

A 就地让婴幼儿侧卧位休息　　B.联系婴幼儿家长

C.将婴幼儿转移到阴凉通风处　D.就地对婴幼儿进行评估　　E.拨打 120 急救电话

15.当婴幼儿发生惊厥时，应该立即让婴幼儿保持（）。

A.侧卧位　　B.俯卧位　C.坐位　D.仰卧位　　E.任意体位

16.婴幼儿惊厥发作时，表现出的常见体征不包括（）。

A.唾液增多、流口水或口吐白沫　　B.口角、眼角抽动

C.整个身体强直痉李、抽动　　D.呼吸停止或心脏停跳　　E.大小便失禁

17.夏天户外游戏时，毛毛突然出现惊厥症状倒在炎热的运动场上。这时，在一旁的老师首先应该做的是（）。

A.立即给毛毛喂水　　B.立即将毛毛转移到阴凉处

C.立即让毛毛原地侧卧休息　D.立即掐毛毛人中穴并大声呼喊

E.拨打 120 急救电话

18.当婴幼儿惊厥控制后时，下列救助措施正确的是（）。

A.用力按住婴幼儿痉挛的四肢　　B.给婴幼儿喂水　　C.用手抠婴幼儿喉咙

D.让婴幼儿保持仰卧，开放气道，保护婴幼儿不受伤　E.松解衣服和裤带

19.下列关于热性惊厥的表述中，正确的是()。

A.曾经发生过热性惊厥的婴幼儿，一般不会再次发作　B.偶发的热性惊厥一般对婴幼儿的身体和健康没有影响　C.婴幼儿发生热性惊厥时应及时喂服退热药，降温处理

D.热性惊厥是 6 岁以后儿童常见的急症

20.7.婴幼儿惊厥发作的常见体征不包括（）

A.短暂意识丧失　　B.短暂呼吸困难或停止

C.双眼球上翻　　D.血流不止　　E.全身抽搐

21．小于 1 岁婴儿发生气道异物急救时可以叩击背部（）次，再按压胸部（）次。
A.2、2　B.3、3　C.4、4　D.5、5　E.6、6
22．1 岁以下婴儿出现气道异物梗阻时，可以用（）进行急救
A．立位腹部冲击法　B．倒吊从背部拍打　C．仰卧腹部冲击发
D．拍背压胸法　E．观察即可
23．1 岁以上幼儿胸外按压和人工呼吸比例为（）
A．15;2　B．30:2　C．10:2　D．20:2　E．30:3
24.婴儿心肺复苏时，胸外按压与人工呼吸比为（）
A．单人 30:2，双人 15:2　B．单人 15:2，双人 30:2　C．单（双）人均 30:2
D．单（双）人均 15:2　E．单人 30:4，双人 15:2
25．心脏骤停的表现不包括（）。
A．突然意识丧失　B．大动脉搏动消失　C．呼吸停止
D．血压下降　E．双侧瞳孔散大
26.婴幼儿溺水的主要地点发生在（）
A.游泳池　B.江、河、湖、海等自然水体　C.家中脸盆、水缸及浴缸
D.水渠　E.鱼塘
27.婴幼儿急救原则不包括溺水的高发年龄是（）。
A.中年人　B.5—10 岁儿童　C.10-14 岁儿童
D.1-4 岁儿童　E.青年人
28.婴幼儿跌落发生的诱因有（）
A.婴幼儿被防置于没有护栏的床上　B.窗台防置有可攀爬的物品
C．大人没有给予正确的辅助姿势　D.以上全都是
29.溺水对人体脏器的损害主要是由（）引起的。
A.缺氧　B.休克　C.心血管损伤
D.肌肉痉挛　E.四肢僵硬
30.溺水主要影响的器官包括（）
A.肺　B.脑　C.肾脏　D.心脏　E.以上都是
31.下列哪项不是溺水征象（）。
A.低着头，嘴巴在水面上或头向后倾斜，嘴巴张开　B.强力呼吸或喘气　C.眼神空洞，精神无法集中或双眼闭合　D．试图将脑袋向后翻转身体　E.面色红润，眼神灵活
32.乐乐，2 岁，开水烫伤双手，局部肿胀明显，有大小不等水疱，创面红润、潮湿，并伴有剧痛，此时烫伤深度为（）
A.III°　B.深 II°　C.浅 II°
D.深 I°　E.I°
33.加压包扎止血时候，压迫伤口的敷料应超过伤口周边至少（）厘米。
A.1　B.2　C.3　D.4　E.5
34.下面哪种包扎方法应用于肢体粗细不等处？（）
A.环形包扎法　B.螺旋包扎法　C.螺旋反折包扎法
D.“8”字包扎法　E.回返包扎法
35.婴幼儿溺水进行早期复苏的急救顺序是（）
A.A-B-C　B.C-B-A　C.C-A-B　D.以上均可　E.以上均不正确
36.婴幼儿轻微切割伤可通过局部压迫（）分钟，或使用创口贴，就能够有效止血。
A.2—3　B.3—5　C.5—6
D.5—8　E.5—10
37.如果婴幼儿溺水时，无呼吸，应先进行（）次人工呼吸
A.2-5　B.3-4　C.1-2　D.2-3　E.5-6
38.关于婴幼儿溺水的急救说法正确的是（）
A.按压比开放气道更重要　B.无论双人还是单人施救按压通气比都是 30:2
C.心脏按压深度为胸廓前后径的 1/3　D.按压频率应大于 100 次/分
E.可以持续按压而不进行人工通气
39.婴幼儿药物中毒预防措施不正确的是()。
A 受善放置药物，把药物放在婴幼儿不易找到的地方
B.用过的药瓶装消毒剂、农药、化学试剂及其他不能食用的物品
婴幼儿在父母指导下服用药物
D.喂药前按医嘱并认真核对药瓶标签、用量、服用方法
E 对变质、标签不清楚的药物切勿服用
40．婴幼儿常见药物中毒的现场救护处理原则正确的是()
A．找到药物后尽快丢弃，防止婴幼儿再次误服　B.神志不清者饮用大量冷开水
C,所有误服药物中毒者均需快速催吐　D.婴幼儿嗜睡或昏迷应取坐位，确保呼吸道通畅
E.突发抽搐的婴幼儿应在牙齿中间放软的东西如毛巾，防止舌咬伤
41.婴幼儿跌落出现，为减少出血、肿胀、疼痛，可以在（）进行局部冷敷或冰敷
A.伤后 12 小时内　B.伤后 12 小时后　C.伤后 24 小时内
D.伤后 24 小时后　E.伤后 48 小时内
42.有关骨折临时固定的叙述，错误的是（）
A.处理顺序是止血、包扎、再固定　B.先临时固定再抗休克
C.夹板长度必须超过骨折的上下两个关节　D.夹板与皮肤间要加衬垫
E.随时观察末梢循环情况
43.最常见的婴幼儿中毒途径是（）
A 消化道　B 呼吸道　C.皮肤黏膜　D.血管　E.肾
44.婴幼儿误服药物主要有（）
A.感冒药　B.镇静催眠药　C.抗精神类药物　D.降压药　E.以上都是
45.婴幼儿药物中毒时，神经系统主要表现为（）。
A.嘴唇及全身麻木　B.恶心、呕吐　C.心悸、面色苍白　D.耳聋、耳鸣
E.以上都不是
46.狗咬伤后注射疫苗的最佳时间是（）
A.1 小时后　B.12 小时　C.24 小时　D.48 小时　E.越早越好
47.若误服药物超过 2 小时应（）
A.大量饮水　B.催吐　C.继续观察　D．立即就医　E.以上都不对
48.家里婴幼儿被狗咬伤，第一步正确的救治是（）
A.先用 75%酒精擦拭伤口　B.用肥皂水和自来水冲洗伤口至少 30 分钟

C.用注射用水冲洗 5 分钟　D.包扎止血防止出血过多

49.一氧化碳是一种（）

A.　有煤烟味的气体　　B.无色、无臭、无刺激性气体　　C.刺激性较强的气体

D.有氨臭味的气体　E.以上都不是

50.关于婴幼儿一氧化碳中毒预防正确的是（）

A.　定期检查管道是否漏气　B.冬季取暖时，应保持室内良好通风

C.定期检查液化气或天然气的阀门是否关闭　D.定期检查烟囱、排风口

E.以上都正确

51.婴幼儿猫狗抓咬伤，冲洗时用急水冲洗至少（）

A.10　　B.20　　C.30　D.40　　E.50

52.婴幼儿一氧化碳中毒时，下列处理方法正确的是（）

A.开放气道　　B.立即开窗通风

C.吸氧　　D.高压氧　　E.对症治疗

53.现场急救被蛇咬伤的婴幼儿，下列哪项措施不正确

A.避免奔跑　　B.现场立即绑扎伤肢近心端　　C.立即用清水冲洗伤口

D.伤肢抬高制动　　E.必要时可吸出毒液

54.毒蛇咬伤绑扎伤肢应每隔（）分钟松绑一次

A.5　　B.10　　C.15　　D.20　　E.25

55.预防蜈蚣咬伤，一下哪项是错误的？（）

A.室内防潮，保持清洁干燥　　B.户外活动穿深色短袖

C.撒生石灰阻止其爬行　　D.做好防护

56.一氧化碳一般经哪种途径进人人体致中毒？()

A.皮肤黏膜　　B.消化道　C.呼吸道　　D.血管　　E.毛发

57.有关一氧化碳中毒，下列说法正确的是（)。

A 氧与血红蛋白的亲和力比一氧化碳与血红蛋白的亲和力大 200-300 倍

B.一氧化碳是一种无色无刺激、有煤烟味的气体

C 碳氧血红蛋白不仅不能携带氧，而且影响氧合血红蛋白的解离

D.一氧化碳中毒时会刺激呼吸造成过度通气

E 一氧化碳可促进细胞内氧的弥散促进细胞呼吸

58.根据血液中碳氧血红蛋白浓度分型，中度一氧化碳中毒婴幼儿的碳氧血红蛋白浓度为()

A.10%-20%　B.20%-30%　C.30%-50%　　D.50%-60%　E.60%-70%

59.预防蚊虫叮咬最经济、最安全的方法是（）

A.喷花露水　B.点蚊香液　　C.使用点蚊拍　D.佩戴驱蚊手环　E.挂蚊帐、装纱窗

60.婴幼儿毛虫咬伤，首先应该（）

A.肥皂水冲洗　　B.清水冲洗　　C.清楚毒毛　　D.冰敷　　E.涂抹药膏

61.一氧化碳中毒婴幼儿最有效的治疗方法是()。

A.吸氧　B.脱水疗法　C.血液灌流　　D.地西泮　E.纠正水、电解质平衡

62.蜂蜇伤是被（）蜇伤，毒液注入人体，或伴刺留皮内所致

A.蜂头　　B.蜂嘴　　C.蜂鼻　　D.蜂尾　　E.蜂刺

63.轻度一氧化碳中毒主要表现为（）

A.头晕、心慌、全身乏力　　B.多汗、烦躁　C.全身抽动

D.大小便失禁　E.以上都不是

64.中毒一氧化碳中毒的典型表现是（）。

A.头晕头痛　B.口唇呈樱桃红色　C.多汗、烦躁　D.大小便失禁　E.以上都不是

65.根据血液中碳氧血红蛋白浓度分型，中度一氧化碳中毒婴幼儿的碳氧血红蛋白浓度为()

A.10%-30%　B.20%-30%　C.30%-50%　　D.50%-60%　E.60%-70%

66.一氧化塘中毒较重的婴幼儿，应保持其（）

A.仰卧位　　B.侧卧位　　C.端坐位　　D.俯卧位　　E.以上都不是

67.婴幼儿异物入眼的正确处理方法是（）

A.用手揉眼睛　　B.翻开上下眼睑，用湿棉花或干净手帕拭出异物

C.翻开上下眼睑，用温开水冲洗　　D.闭上眼睛

E.立即送医院处理

68.豆类误入耳道，可往耳道内滴入（），再找合适机会取出

A.温水　B.温热的油剂　C.滴耳液　D.　酒精　E.食醋

69.婴幼儿外耳道异物处理不当导致外耳道感染，应（）

A.消毒减轻感染　　B.涂药膏减轻疼痛

C.及时医院就诊　　D.滴入滴耳液

70.婴幼儿一氧化碳中毒后，什么情况下立即送医？

A.轻度中毒的婴幼儿　B.中度中毒的婴幼儿

C.中毒程度较重的婴幼儿　D.已经昏迷的婴幼儿　　E.以上都不是

71．判断动脉搏动和呼吸的时间应该为（）秒。

A．2-4　　B．5-10　　C．6-8

D．7-10　　E．6-10

72．呼吸、心跳骤停（）秒，婴幼儿瞳孔开始扩大，伴有对光反射消失。

A．10-20　　B．20-30　　C．30-40

D．40-50　　E．50-60

73．心肺复苏的原则是（）

A．越早实施越好　　B．4-6 分钟后实施更好　　C．越快实施越好

D．越慢实施越好　　E．以上都不对

74．婴幼儿颈动脉定位方法为（）

A.环状软骨旁开约 1 横指　　B.环状软骨旁开约 2 横指

C.环状软骨旁开约 3 横指　　D.环状软骨旁开约 4 横指

E.以上都不对

75．心肺复苏时，胸外按压的频率是

A．6-80 次/分钟　　B．80-100 次/分钟　　C．90-100 次/分钟

D．100-120/分钟　　E．120-140 次/分钟

76.对中毒严重、休克的婴幼儿，照护者应怎么做？()

A 催吐　　B.拨打 120 急救电话、保持呼吸道通畅
C.服用泻药　　D.多饮水
E.以上都是

77.婴幼儿食物中毒的预防措施有（）
A.饭菜现做现吃　B.豆浆彻底煮开再吃
C.不食用发芽的马铃薯　D.婴幼儿不食用腌制食物　E.以上都是

78.花生、玉米发霉后会产生（）
A 龙葵素　　B.氰苷
C.黄曲霉素　　D.维生素　E 以上都是

79.婴幼儿食物中毒的典型症状有（ ）
A.恶心　B.腹痛、腹泻　C.　呕吐
D.发热　　E.以上都是

80.婴幼儿跌落伤出现血肿可以（）热敷，促进血液循环
A.伤后 24 小时内　　B.伤后 24 小时后　　C.伤后 24-48 小时
D.伤后 48 小时内　　E.伤后 48 小时后

81．中国 1—14 岁儿童的首要死亡原因是（）
A．意外伤害　　B．肿瘤
C．传染病　　D．白血病
E．呼吸道感染

82．眼内异物处理不包括
A．吹　　B．冲　　C．浸　D．试　　E．揉

83．婴儿心肺复苏按压深度约为（）厘米。
A．2　B．3　C．4　D．5　E．6

84．幼儿胸外心脏按压深度约（）厘米。
A．2　B．3　C．4　D．5　E．6

85．婴儿开放气道时候，应该使耳垂和下颌角连线与地面成（）角。
A．20°　B．30°　C．40°　D．50°　E．60°

86．幼儿开放气道时候，应该使耳垂和下颌角连线与地面成（）角。
A．20°　B．30°　C．40°　D．50°　E．60°

87.怀疑婴幼儿颈椎有损伤的，可采用（）来打开气道
A.仰额举颏法　B.压额抬颏法　C.压额抬颈法　D.双手抬颌法　E.以上都不对

88．行心肺复苏急救时，中途进行人员更换时，中断时间不可超过（）秒。
A．5　B．10　C．15　D．20　E．25

89．心肺复苏时，按压与放松时间比例为（）
A．1:1　B．1:2　C．1:3　D．2:5　E．3:5

90．对婴幼儿吹气用力不可过猛，以免（）
A．肺泡破裂　B．呼吸过度　c．肺脏破裂
D．呼吸无力　E．以上都不是

91.下面关于婴幼儿惊厥的预防搭施中，表冰不正确的是（）
A.婴幼儿发热时，应避免体温升高过快，这可以减少惊厥发作
B.教育婴幼儿保护头部，一旦在头部外伤后有异常表现应立即送医
C 应该为婴幼儿提供烧熟煮透的食物，避免寄生虫残留进入体内
D.避免婴幼儿发高热就可以预防惊厥的发生
E.热性惊厥控制不好容易转变为癫

92.婴幼儿惊厥持续状态是指惊厥持续（）以上，或两次发作简写意识不能完全恢复，为惊厥危重型。
A.5 分钟　B.10 分钟　C.20 分钟　D.30 分钟　E.60 分钟

93.热性惊厥多发于（）的婴幼儿。
A.小于 6 个月　B.小于 3 个月　C.6 个月至 4 岁
D.6 岁以上　E.以上都不是

94.婴幼儿惊厥每次持续大多在（）。
A.5-10 分钟　B.10-15 分钟　C.15-20 分钟　D.20-25 分钟　E.25-30 分钟

95. 婴幼儿降温后若手脚冰凉时可放置热水袋于脚下，但热水袋温度以（）℃为宜，防止烫伤。
A.40　B.50　C.60　D.70　E.80

96.婴幼儿呼吸、心跳骤停最常见的三种发病机制不包括（）
A．急性心肌梗死　B．缺氧　C．心肌缺血
D．心律失常　E．以上都不对

97.心跳停止（）分钟，脑微循环的自动调节功能丧。
A．0-1　B．1-2　c．2-3
D．3-4　E．4-5

98.一般认为，在常温下呼吸、心跳停止（）分钟
A．1-2　B．2-4　C．4-6
D．6-8　E．以上均不是

99.呼吸、心跳停止后，（）成为唯一的功能途径。
A．葡萄糖有氧酵解　B．蛋白质分解　C 脂肪分解
D．葡萄糖无氧酵解　E．以上都是

100.呼吸、心跳骤停需立即进行（）
A．海姆立克急救　B．呼救　C．评估
D.人工呼吸　E．心肺复苏