Big Idea

Projeto: Vigilância epidemiológica — epizootias em primatas não humanos (PNH)
Equipe: Daniela Freitas, Eliane Pereira e Gustavo Duarte
Aula 8 — Big Idea e Storytelling com Dados · big_idea.pdf

1. Problema

As epizootias em primatas são um alerta precoce da febre amarela, mas é difícil enxergar onde e quando elas se concentram ao longo dos anos.

Pergunta principal: como o número de epizootias em PNH mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos?

Fonte dos dados: Ministério da Saúde — base fa_epizpnh_1994-2026.csv (base tratada: dados_tratados.csv, 2.637 registros).

2. Público

O público principal são gestores e profissionais de saúde. Estudantes e o público em geral também usam o Dashboard, conforme o planejamento analítico.

Público	O que é importante destacar
Gestores e profissionais de saúde (principal)	Onde e em que época do ano os registros se concentram, para apoiar a decisão sobre onde acompanhar com mais atenção e o que investigar.
Estudantes	Descobertas e comparações, com explicações acessíveis.
Público em geral	Transparência: o que os dados mostram e o que não mostram.

Termos que precisam ser explicados: epizootia (ocorrência de doença ou morte em animais), PNH (primatas não humanos), macrorregião, pico, sazonalidade e semana (**SE_OCOR**).

3. Mensagem central (Big Idea)

> **As epizootias em primatas se concentram em poucos picos, cada um quase todo em uma única macrorregião (Sudeste ou Sul) e sobretudo entre outubro e abril. Esses padrões indicam onde e quando investigar, mas não explicam suas causas.**

Versão curta: as epizootias em primatas se concentram em poucos picos, e cada pico em uma região.

A mensagem é clara, específica ao problema, relevante, fundamentada nas evidências abaixo, memorável (versão curta) e responsável, porque declara que os dados não explicam as causas.

4. Evidências que sustentam a mensagem

Evidência	Resultado	Função na narrativa
Evolução por ano	2017 foi o ano de pico, com 869 registros (cerca de 33% da base), ≈108% acima do segundo maior ano (2020, com 418).	Mostrar como os registros mudaram.
Cinco anos com mais registros	2017 (869), 2020 (418), 2018 (405), 2021 (281) e 2009 (155) somam 2.128 dos 2.637 registros (80,70%).	Mostrar que os registros se concentram em poucos picos.
Ano × macrorregião	Em cada um desses anos, uma macrorregião reúne de cerca de 89% a 99% dos registros: SE em 2017 (781 de 869) e 2018 (400 de 405); S em 2009 (152 de 155), 2020 (385 de 418) e 2021 (249 de 281).	Mostrar onde cada pico se concentrou.
Sazonalidade	Janeiro lidera (562), seguido de fevereiro (423). Junho (40), julho (49) e agosto (33) ficam abaixo de 50. O padrão aparece também nos anos de pico.	Mostrar quando os registros se concentram.
Resultados que complicam a história	Em 2025 o pico volta com SE (86) e CO (38). Todos os 48 registros do NE estão em 2017.	Não escolher apenas o que confirma a hipótese.

5. Limitações relevantes

- A base registra epizootias **notificadas**, não a ocorrência real. Poucos registros em N (49) e NE (48) podem refletir menos notificação, e os dados não permitem saber.
- A base não tem população, área nem esforço de vigilância, então não permite calcular taxas nem explicar por que uma região tem mais registros.
- A base não tem fatores bióticos ou ambientais, então não permite afirmar as causas dos picos.
- Não há registros em 2004–2006 e 2010–2013, e 2026 vai só até 13/05/2026.
- 22 registros não têm data e 13 não têm mês, e ficam fora das análises de tempo.
- A coluna **UF_OCOR** tem 1 registro com “pr” em minúsculo, separado de “PR”.