

PRE- AND POST-OPERATIVE INSTRUCTIONS FOR GYNECOLOGICAL SURGERY

Please read the following pre- and post-operative instructions carefully. These guidelines are designed to help you prepare for your procedure and support a safe and smooth recovery. If you have any questions,

- You will be given instructions about fasting prior to the procedure.
- Do not eat 10 - 8 hours prior to surgery including all kinds of food, chewing gum and sweets.
- If you have diabetes or any other medical problem, further instructions will be given to you about your medications by the anesthesiologist.
- You may resume sexual intercourse when bleeding has fully stopped.
- You may bath or shower as normal the following day of surgery.
- In case of laparoscopy, you can expect some swelling or bruising at the wound site(s). This is not unusual and there will be some discomfort and tenderness where the incision(s) have been made. You will have some discomfort in your abdomen or occasionally in your shoulder for the first day or two. You may need to take a simple painkiller such as paracetamol. Your abdomen may seem a little swollen but this will settle.

How will you feel afterwards?

- You may feel some pain for some period, but painkillers will be offered if you need them.
- You need to be comfortable before you can be discharged.
- You can expect some vaginal bleeding.

What happens after the procedure?

- You will be able to go home when you meet the discharge criteria. This is usually a few hours after the procedure.
- You will be monitored in recovery room for some time by the recovery nurse.
- The surgeon will visit you prior to discharge to discuss about the surgery findings and further plan of care.
- As you will still be under the influence of the anesthesia, please note that you will not be able to drive back alone. A responsible adult needs to collect you and stay with you for a 24 hour period after the procedure.

Aftercare

- Allow yourself 24 hours to get over the effects of the anesthesia. Avoid driving during this time. You may feel tired for a few days.
- If you have any discomfort, paracetamol or a similar painkiller can be taken.
- Any vaginal bleeding will gradually stop over the next week or so.
- It is important to use sanitary towels not tampons until and bleeding has stopped to avoid the risk of infection.

Follow up

- You may be given a follow-up appointment to see the gynecologist approximately 2-6 weeks following the procedure. However, the consultant may write to you with the results.
- If you have increased pain, excessive discharge, raised temperature, prolonged or heavy bleeding, you should inform the surgeon.
- In case of laparoscopy, if you experience any of the following problems during the first week, you should seek medical advice.
 - a. Increased abdominal pain, redness, swelling or discharge of the wound(s).
 - b. Persistent bleeding from the wound(s).
 - c. Difficulty in passing urine.
 - d. High temperature.
- Symptoms vary from one patient to another, and you will be advised of any follow-up arrangements before you leave the center.

تعليمات ما قبل وما بعد الجراحة النسائية

يرجى قراءة تعليمات ما قبل وما بعد العملية بعناية صممت هذه الإرشادات لمساعدتكم على الاستعداد للإجراء ودعم تعافى آمن وسلس. في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع الطبيب أو فريق الرعاية.

- سيتم إعطاؤك تعليمات حول الصيام قبل إجراء العملية الجراحية.
- يجب عدم تناول الطعام قبل 10 إلى 8 ساعات من العملية الجراحية ويشمل ذلك جميع أنواع الأطعمة والعلكة والحلويات.
- إذا كنت مصابة بمرض السكري أو أي مشكلة طبية أخرى، فسيتم إعطاؤك تعليمات إضافية حول الأدوية من قبل أخصائي التخدير.
- سيتوقف النزيف المهبلي - إن وجد - تدريجياً خلال أسبوع أو نحو ذلك.
- من المهم استخدام القوط النسائية الصحية وليس السدادات القطنية حتى يتوقف النزيف لتجنب خطر الإصابة بالعدوى.
- يمكنك العودة إلى ممارسة العلاقة الزوجية عند توقف النزيف.
- يمكنك الاستحمام كالمعتاد في اليوم التالي.
- في حالة إجراء جراحة البطن بالمنظار، فمن المتوقع حدوث بعض التورم أو الكدمات في التالي من العملية. الجرح وهو أمر عادي. كما سيحدث بعض الانزعاج والألم في مكان إجراء الشق الجراحي أو الشقوق الجراحية. وقد تعاني من بعض الانزعاج في بطنك أو في بعض الأحيان في كتفك في اليوم الأول أو الثاني. قد تحتاجين إلى تناول دواء بسيط مسكن للألم مثل الباراسيتامول وقد يبدو بطنك منتفخاً قليلاً، لكنه سيعود إلى ما كان عليه.

كيف ستشعرين بعد العملية؟

- قد تعاني من ألم شبيه بألم الدورة الشهرية، ولكن سيتم إعطاؤك الأدوية المسكنة للألم عند الحاجة.
- يجب أن تشعرى بالراحة قبل تخريجك من المستشفى.
- من المتوقع أن يحدث بعض التزيف من المهبل.

ماذا سيحدث بعد العملية الجراحية؟

- يمكنك العودة إلى المنزل عندما يتم استيفاء معايير التخريج من المستشفى، ويكون ذلك عادة بعد ساعات قليلة من إجراء العملية.
- ستتم مراقبتك في غرفة الإفاقة لبعض الوقت من قبل الممرضة المتخصصة.
- سوف يقوم الطبيب بزيارتك قبل التخريج المناقشة نتائج العملية والخطة التالية للرعاية الصحية.
- بسبب استخدام المخدر خلال العملية، الجراحية ننصحك بعدم الذهاب إلى المنزل بمفردك، يجب على أحد الأشخاص البالغين المسؤولين أن يأخذك من المستشفى وأن يبقى معك لمدة 24 ساعة بعد العملية.

الرعاية خلال فترة النقاهة

- انتظري فترة 24 ساعة حتى يزول تأثير المخدر. تجنبي قيادة السيارة خلال هذه الفترة وقد تشعرين بالتعب البضعة أيام.
- عند الشعور بأي ألم يمكنك أن تأخذي الباراسيتامول أو أي دواء مماثل مسكن للألم.

المتابعة

- قد يتم تحديد موعد للمتابعة مع طبيب النسائية بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع تقريباً من العملية الجراحية. ومع ذلك سيعلمك الطبيب الاستشاري عند إرسال النتائج.
- إذا كنت تعاني من زيادة الألم أو خروج إفرازات كريهة أو ارتفاع درجة الحرارة أو نزيف مستمر أو شديد، فلا بد من إبلاغ الطبيب الجراح.
- في حالة إجراء جراحة البطن بالمنظار، فليكن استشارة الطبيب إذا واجهت أيًا من المشاكل التالية خلال الأسبوع الأول:
 - زيادة ألم البطن أو الاحمرار أو التورم أو خروج إفرازات من الجرح أو الجروح.
 - تزييف مستمر من الجرح أو الجروح.
 - صعوبة في التبول.
 - ارتفاع درجة الحرارة.
- تختلف الأعراض من مريضة لأخرى وسيتم إعلامك بتعليمات المتابعة اللازمة قبل مغادرة المركز.