

تعليمات ما بعد التلقيح داخل الرحم

التلقيح داخل الرحم هو أحد الإجراءات العلاجية الخصوبة، ويتم فيه إدخال الحيوانات المنوية المَحْضَرَّة في المختبر مباشرة إلى داخل الرحم في وقت الإباضة للمساعدة على زيادة فرص حدوث الحمل. يُرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل الإجراء.

الأدوية

- إذا تم وصف هرمون البروجيستيرون لك، يرجى البدء بنفس يوم الإجراء (المررة واحدة) وأتبعي تعليمات الطبيب.

الألم

- قد تشعرين بتقلصات خفيفة لمدة حوالي 48 ساعة بعد الإجراء.

النزيف

- قد يحدث نزول بسيط لبعض قطرات الدم نتيجة لملامسة عنق الرحم أثناء الإجراء، ويُعد ذلك أمراً طبيعياً.
- قد تشعرين بالبلل عند النهوض بعض الحفن نتيجة نزول بعض إفرازات عنق الرحم أو السائل المستخدم لمساعدة إدخال جهاز الفحص. هذا طبيعي ولا علاقة له بالسائل المنوي.

الأنشطة

- يفضل الاستلقاء على الظهر والراحة لمدة 10 دقائق بعد الإجراء.
- يمكنك استئناف الأنشطة اليومية الطبيعية بنفس يوم الإجراء.
- للمريضات اللواتي استخدمن إبر التنشيط العلاجية: تجنبني التمارين الشاقة، رفع أو دفع أو سحب الأشياء الثقيلة لمدة 3-5 أيام.
- يُنصح بممارسة الجماع في مساء يوم الإجراء وحسب الرغبة، إلا إذا نصحك الطبيب بخلاف ذلك وفقاً لخطة العلاج (مثل بروتوكولات ترجيح جنس الجنين).

تذكير

- يرجى إبلاغ العيادة إذا بدأ النزيف قبل موعد اختبار الحمل، علماً بأنها ليست حالة طارئة.
- لا تنسي أخذ نموذج طلب اختبار الحمل.
- إذا تم إجراء العملية تحت التخدير (مثلاً بسبب رغبة المريضة أو حالات طبية مثل التشنج المهبلي)، فسيتم تزويدك بتعليمات خاصة قبل وبعد العملية من فريق التمريض.

متى يجب طلب الرعاية الطبية العاجلة

- يرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية أو زيارة قسم الطوارئ إذا واجهت أحد الأعراض التالية:
- نزيف مهبطي شديد خلال أول 48 ساعة من الإجراء.
- ألم بطني شديد.
- ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 38°م).

بنون - الأحساء
055 270 1553

بنون - الرياض
011 444 8080

بنون - جدة
012 680 0800

بعد انتهاء ساعات عمل المركز، يمكنكم التواصل مع المنسقات/ الطبيب المعالج.

POST-PROCEDURE INSTRUCTIONS: INTRAUTERINE INSEMINATION (IUI)

Intrauterine Insemination (IUI) is a fertility treatment in which prepared sperm is placed directly inside the uterus around the time of ovulation to improve the chances of pregnancy. Please read the following instructions carefully before your procedure.

Pain

- You may experience mild cramping for about 48 hours after the procedure.

Bleeding

- Some spotting may occur due to cervical manipulation.
- You may notice some vaginal wetness after the procedure due to cervical secretions or the lubricant used. This is normal and not related to the semen.

Activities

- You should rest for 10 minutes after the procedure.
- You may resume normal daily activities on the same day.
- For patients on ovarian stimulation:** Avoid strenuous exercise, lifting, pushing, or pulling heavy objects for 3-5 days.
- It is recommended to have intercourse on the evening of the procedure and as desired, unless advised otherwise by your doctor (for specific treatment protocols, such as gender differentiation).

Medications

- If progesterone hormone was prescribed, start on the same night of the procedure (once) and follow doctor's instructions.

Reminder

- Kindly inform the clinic if you started bleeding before your pregnancy test date, however, please note that it's not an emergency.
- Don't forget to take your pregnancy test order form.
- If the procedure is performed under anesthesia (e.g. due to patient preference or medical conditions such as vaginismus), specific pre- and post-procedure instructions will be provided to you by the nursing team.

When to Seek Urgent Medical Attention

Please contact your healthcare provider or visit the emergency department if you experience any of the below:

- Heavy vaginal bleeding within the first 48 hours of procedure.
- Severe abdominal pain.
- Fever (temperature above 38°C).



Bnoon - Jeddah
012 680 0800



Bnoon - Riyadh
011 444 8080



Bnoon - Al Ahsa
055 270 1553

After the official working hours, you can contact Bnoon coordinators / treating physician.