

Taller 4 – Regresión Logística

Cartografía Geotécnica Asignatura

Dubán Uribe Góez

Autor

Edier Vicente Aristizábal Giraldo

Docente



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín Facultad
de Minas**

2025-1

Semestre

Análisis Comparativo de Modelos de Regresión Logística para la Susceptibilidad a Movimientos en Masa

Introducción

Con el objetivo de modelar la susceptibilidad a movimientos en masa, se construyeron y evaluaron tres modelos de regresión logística, cada uno con diferentes combinaciones de variables explicativas. A continuación, se presenta un análisis comparativo de estos modelos para determinar cuál ofrece un mejor ajuste y mayor capacidad explicativa de la realidad.

Descripción de los Modelos Evaluados

Modelo	Variables Incluidas	Tipo de Variables
Modelo 1	Pendiente, Aspectos, Elevación, Flujo	Continuas
Modelo 2	Pendiente, Aspectos, Elevación	Continuas
Modelo 3	Categorica + Continuas	Categorica + Continuas

Resultados estadísticos

Indicador	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Log-Likelihood	-5,934,800	-5,907,300	-5,937,900
Pseudo R ²	0.03999	0.04444	0.03948
Número de Observaciones	36,180,897	36,180,897	36,180,897
Convergencia	Sí	Sí	Sí

Todas las variables significativas ($p < 0.05$)	Sí	Sí	Sí
---	----	----	----

Interpretación de resultados

El **Modelo 2** muestra el mejor desempeño estadístico y explicativo, por las siguientes razones:

Mayor valor de Pseudo R^2 (0.04444), lo que indica una mayor proporción de la variabilidad explicada por el modelo.

Mejor Log-Likelihood (-5,907,300), que representa un mejor ajuste general del modelo a los datos observados.

La inclusión de la **variable categórica de Cobertura del Suelo** proporciona una interpretación más rica del fenómeno, incorporando factores ecológicos y antrópicos, además de los geofísicos.

Todas las variables son estadísticamente significativas, lo que respalda la validez del modelo.




Figura 1. Modelo 2 regresión logística

Conclusión

El mapa final probablemente se ve así porque tiene una variable categórica (cobertura) entonces se sectoriza, cosa que no pasaría si todas fueran continuas