
Family A, H2-2E defaults, p_idle = 0
marker: o n=4, s n=6, ^ n=8
Hellinger fidelity F_H (ideal vs noisy)
n_2q (ZZPhase count)
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0
50
100
150
200
250


Family B1 (n <= 8), H2-2E defaults, p_idle = 0
grey line joins the pipelines of one circuit
F_H (vs P0ref noise-free output)
n_2q (ZZPhase count)
barenco_tof_3
tof_3
mod5_4
qft_4
tof_4
barenco_tof_4
hwb6
P0ref
P0
P1
P2
P3
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
25
50
75
100
125
150
175


per circuit, same noise; dotted = equal
F_H (P2, PyZX teleport_reduce + P0)
F_H (P0, pytket level 2)
A, n = 4
A, n = 6
A, n = 8
B1 (n = 5, 7)
tof_3
barenco_tof_3
mod5_4
qft_4
tof_4
barenco_tof_4
hwb6
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00

P0ref
P0
P1
P2
P3
fit exp(-a n2q), a = 5.14e-04
fit exp(-(a n2q + b n1q)), n1q = 1.28 n2q