BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
LẦN 2
Môn thi: VẬT LÍ
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: ..... **Mã đề: 0233**

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. **[HOCMAI]** Trong y học hạt nhân, có trường hợp cần chiếu tia phóng xạ vào khối u trong cơ thể. Để tia phóng xạ chiếu từ bên ngoài vào được khối u trong cơ thể, người ta thường sử dụng tia gamma. Lý do chủ yếu là vì

A. tia gamma có năng lượng nhỏ.
B. tia gamma có khả năng đâm xuyên mạnh.
C. tia gamma không làm tổn thương các mô lành.
D. có thể dễ dàng điều khiển được đường đi của tia gamma bằng từ trường.

Câu 2. **[HOCMAI]** Những quá trình chuyển thể nào sau đây thu nhiệt lượng?

A. Nóng chảy và ngưng tụ. **B.** Nóng chảy và sôi. **C.** Đông đặc và ngưng tụ. **D.** Đông đặc và sôi.

Câu 3. **[HOCMAI]** Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện không đổi ở trong từ trường đều

A. có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây.
B. song song với đoạn dây dẫn.
C. cùng chiều với cảm ứng từ.
D. nằm trong mặt phẳng chứa dây dẫn và cảm ứng từ.

Câu 4. **[HOCMAI]** Hai vật X và Y tiếp xúc với nhau và nhiệt lượng tự truyền từ vật X sang vật Y. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nội năng của vật X luôn lớn hơn vật Y.
B. Vật X chứa nhiều nhiệt lượng hơn vật Y.
C. Nhiệt độ ban đầu của vật X cao hơn của vật Y.

D. Vật X chứa ít nhiệt lượng hơn vật Y.

Câu 5. **[HOCMAI]** Biểu hiện cụ thể của từ trường là sự xuất hiện của

A. lực điện tác dụng lên thanh kim loại đứng yên đặt trong nó.

B. lực từ tác dụng lên điện tích đứng yên đặt trong nó.

C. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.

D. lực điện tác dụng lên các điện tích đứng yên đặt trong nó.

Câu 6. **[HOCMAI]** Một khối chất mà các phân tử tạo nên nó dao động quanh vị trí cân bằng thì khối chất đó

A. ở thể lỏng hoặc khí. **B.** ở thể rắn hoặc lỏng. **C.** ở thể rắn hoặc khí. **D.** chỉ ở thể rắn.

Câu 7. **[HOCMAI]** Một khối khí lí tưởng xác định được nén đẳng áp. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhiệt độ của khối khí giảm.

B. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử trong khối khí không đổi.

C. Động năng trung bình của các phân tử trong khối khí tăng.

D. Mật độ phân tử của khối khí giảm.

Câu 8. **[HOCMAI]** Hai khối khí lí tưởng có cùng số mol, ở cùng nhiệt độ. Khối khí 1 có áp suất lớn hơn khối khí 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thể tích của khối khí 1 lớn hơn của khối khí 2.

B. Thể tích của khối khí 1 nhỏ hơn của khối khí 2.

C. Thể tích của hai khối khí bằng nhau.

D. Khối khí nào có khối lượng mol lớn hơn thì thể tích lớn hơn.

Câu 9. **[HOCMAI]** Làm lạnh một lượng khí lí tưởng trong bình kín có thể tích không đổi. Nội năng của lượng khí

A. không đổi vì thể tích khí không đổi. **B.** tăng do nhận công.

C. giảm do sinh công. **D.** giảm do tỏa nhiệt lượng.

Câu 10. **[HOCMAI]** Phát biểu nào sau đây là đúng về các phân tử của một lượng khí lí tưởng trong

một bình kín có nhiệt độ không đổi?

A. Vận tốc trung bình của các phân tử bằng không.

B. Trong khoảng thời gian giữa hai lần va chạm liên tiếp, tốc độ của phân tử giảm dần.

C. Các phân tử đẩy nhau khi đến gần thành bình.

D. Sau mỗi va chạm vào thành bình, phân tử chuyển động nhanh dần.

Câu 11. [HOCMAI] Một khối khí lí tưởng nhận nhiệt lượng và thực hiện hai quá trình biến đổi trạng thái độc lập. Quá trình (1) có áp suất không đổi; quá trình (2) có thể tích không đổi, không sinh công. Độ tăng nhiệt độ ở hai quá trình đều bằng nhau. Trong cả hai quá trình, khối khí đều không tỏa nhiệt lượng. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhiệt lượng khối khí nhận được ở quá trình (2) nhỏ hơn ở quá trình (1).

B. Động năng trung bình của các phân tử trong khối khí ở cuối quá trình (1) lớn hơn ở cuối quá trình (2).

C. Độ tăng nội năng của khối khí ở quá trình (1) nhỏ hơn ở quá trình (2).

D. Độ tăng động năng trung bình của các phân tử trong khối khí ở quá trình (1) lớn hơn ở quá trình (2).

Câu 12. [HOCMAI] Hai hạt nhân M và N có cùng số nucleon. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân M lớn hơn của hạt nhân N thì

A. hạt nhân N bền vững hơn hạt nhân M.

B. độ hụt khối của hạt nhân M nhỏ hơn của hạt nhân N.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D. hạt nhân M bền vững hơn hạt nhân N.

Câu 13. [HOCMAI] Hai vật rắn M và N được làm từ hai chất khác nhau, khối lượng của vật M lớn hơn của vật N. Hai vật nhận được nhiệt lượng bằng nhau, không tỏa nhiệt lượng và không chuyển thể. Độ tăng nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhiệt độ ban đầu của vật M cao hơn nhiệt độ ban đầu của vật N.

B. Nhiệt độ ban đầu của hai vật bằng nhau.

C. Nhiệt dung riêng của vật M nhỏ hơn nhiệt dung riêng của vật N.

D. Nhiệt dung riêng của vật M lớn hơn nhiệt dung riêng của vật N.

Câu 14. [HOCMAI] Khi nói về đặc điểm của dòng điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tần số của dòng điện xoay chiều thay đổi liên tục theo thời gian.

B. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện biến thiên điều hòa.

C. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện được xác định dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

D. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện luôn nhỏ hơn giá trị hiệu dụng.

Câu 15. [HOCMAI] Khi đưa một cực của thanh nam châm ra xa một vòng dây dẫn kín, từ thông qua vòng dây biến thiên. Dòng điện cảm ứng sinh ra trong vòng dây có chiều sao cho từ trường của nó có tác dụng

A. đẩy nam châm.
B. hút nam châm.
C. làm từ thông qua vòng dây bằng không.
D. làm giảm từ thông qua vòng dây.

Câu 16. [HOCMAI] Một hạt tích điện chuyển động tròn đều trong từ trường đều chỉ do tác dụng của lực từ. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Gia tốc của hạt không đổi.
B. Lực từ sinh công âm.
C. Lực từ làm thay đổi vận tốc của hạt.
D. Động lượng của hạt không đổi.

Câu 17. [HOCMAI] Trong y học hạt nhân, có những trường hợp phải đưa một đồng vị phóng xạ vào cơ thể người. Trong cơ thể, hằng số phóng xạ của đồng vị này


A. nhỏ hơn so với khi bảo quản trong bình chuyên dụng do nhiệt độ cơ thể cao hơn.
B. không đổi so với khi bảo quản trong bình chuyên dụng.
C. phụ thuộc vào phản ứng hóa học giữa đồng vị và các chất trong cơ thể.
D. lớn hơn so với khi bảo quản trong bình chuyên dụng do áp suất trong cơ thể lớn hơn.

Câu 18. [HOCMAI] Phát biểu nào sau đây là đúng về quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định?

A. Thể tích không đổi, nhiệt độ tăng thì áp suất của lượng khí giảm.
B. Áp suất và thể tích cùng giảm thì nhiệt độ của lượng khí giảm.
C. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm thì áp suất của lượng khí giảm.
D. Áp suất không đổi, nhiệt độ tăng thì thể tích của lượng khí giảm.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. [HOCMAI] Một thanh kim loại thẳng có khối lượng m, chiều dài ℓ và có thể trượt không ma sát trên hai ray dẫn điện song song (tạo với mặt phẳng ngang góc θ). Hệ thống đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng thẳng đứng lên trên tại nơi có gia tốc trọng trường là g (hình vẽ). Bỏ qua từ trường Trái Đất. Trong thanh có dòng điện không đổi I. Thanh đứng yên.



a) Nếu tăng cường độ dòng điện, thanh sẽ trượt xuống.
b) Lực từ tác dụng lên thanh kim loại có phương nằm ngang.
c) Độ lớn của lực từ tác dụng lên thanh kim loại là $F = BI\ell\sin\theta$.
d) Điều kiện để thanh cân bằng là $BI\ell = mg\tan\theta$.

Câu 2. [HOCMAI] Một xilanh cách nhiệt nằm ngang được chia thành hai ngăn kín bởi một pit-tông cách nhiệt có thể dịch chuyển không ma sát. Trong mỗi ngăn có một lượng khí lí tưởng xác định. Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng. Giả sử làm nóng khí ở ngăn 1 và pit-tông dịch chuyển về phía ngăn 2.

a) Nhiệt lượng mà khối khí ở ngăn 1 nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của nó.
b) Khối khí ở ngăn 2 nhận công.
c) Khối khí ở ngăn 1 bị nén, khối khí ở ngăn 2 dãn.
d) Nhiệt độ của khối khí ở ngăn 2 tăng.

Câu 3. [HOCMAI] Một nhóm học sinh tìm hiểu sự truyền nhiệt lượng giữa **hai lượng nước có khối lượng khác nhau**.

Nhóm đưa ra giả thuyết: *Nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp nước chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ ban đầu của hai khối nước, không phụ thuộc vào khối lượng của chúng.*

Họ dùng nhiệt lượng kế có que khuấy, nhiệt kế và làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết. Phần thí nghiệm kiểm tra *"nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp nước không phụ thuộc vào khối lượng của chúng"* gồm các bước chính sau: (1) Cho vào bình nhiệt lượng kế một lượng nước có khối lượng m_1 ở nhiệt

độ T_1 (nhiệt độ phòng) và một lượng nước có khối lượng m_2 ở nhiệt độ T_2 cao hơn nhiệt độ phòng. Đo nhiệt độ cân bằng của hệ bằng nhiệt kế.

(2) Lặp lại bước (1) với các giá trị m_1 và m_2 khác nhau, giữ nguyên các giá trị T_1 và T_2.

a) Độ giảm nội năng của khối nước nóng bằng độ tăng nội năng của khối nước lạnh.

b) Gọi c là nhiệt dung riêng của nước, T là nhiệt độ cân bằng của hệ, nếu bỏ qua hao phí nhiệt lượng thì phương trình cân bằng nhiệt là. $m_2c(T_2-T)=m_1c(T-T_1)$ (*)

c) Ở bước (1), nhiệt độ cân bằng đo được bằng nhiệt kế lớn hơn giá trị T tính theo công thức (*)

.

d) Giả thuyết của nhóm học sinh cho rằng *"nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp nước không phụ thuộc vào khối lượng của chúng"* là sai.

Câu 4. **[HOCMAI]** Từ các kết quả quan trắc, người ta đưa ra giả thuyết: Tại tâm một ngôi sao có nhiệt độ rất cao, đã xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo thành hạt nhân helium và giải phóng năng lượng.

a) Nếu giả thuyết là đúng thì năng lượng tỏa ra phải tương ứng với phần khối lượng bị giảm đi trong phản ứng.

b) Phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo thành helium đã được sử dụng trong lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân.

c) Phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

d) Phản ứng tổng hợp hạt nhân nói trên là nguồn năng lượng của ngôi sao.

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian ở các câu từ câu 1 đến câu 6)

Nội dung câu 1 và 2: Để xác định độ lớn cảm ứng từ của từ trường Trái Đất, một nhóm học sinh dùng một khung dây dẫn phẳng hình vuông gồm 102 vòng dây, diện tích mỗi vòng là $409,\text{cm}^2$. Ban đầu, mặt phẳng khung dây vuông góc với thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất. Cho khung dây quay đều với tốc độ góc là $14,26,\text{rad/s}$ quanh trục thẳng đứng nằm trong mặt phẳng khung dây, đi qua tâm và vuông góc với cạnh của khung. Trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng hiệu dụng là $1,21,\text{mV}$. Tại nơi làm thí nghiệm, từ trường Trái Đất được coi là đều, các đường sức từ hướng chếch xuống dưới và hợp với phương ngang một góc là $35,0^\circ$.

Câu 1. **[HOCMAI]** Độ lớn cảm ứng từ của từ trường Trái Đất bằng bao nhiêu microtesla (μT) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 2. [HOCMAI] Từ thông cực đại qua khung dây có độ lớn bằng bao nhiêu miliweber (mWb) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Nội dung câu 3 và 4: Một xilanh nằm ngang, chứa một lượng khí lí tưởng xác định. Khí trong xilanh được ngăn cách với không khí bên ngoài bởi một pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát. Ban đầu, khí ở nhiệt độ $T_1 = 303,\text{K}$, pit-tông nằm cân bằng cách đáy xilanh $45,0,\text{cm}$. Truyền nhiệt lượng cho khối khí sao cho pit-tông dịch chuyển đến vị trí cách đáy xilanh $55,0,\text{cm}$ thì dừng lại. Lúc đó, nhiệt độ khối khí là T_2. Biết áp suất khí quyển là $p_0 = 1,00 \cdot 10^5,\text{Pa}$.

Câu 3. [HOCMAI] Nhiệt độ T_2 là $x \cdot 10^3,\text{K}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 4. [HOCMAI] Dịch chuyển pit-tông về vị trí ban đầu sao cho nhiệt độ của khối khí lúc này là T_2 và áp suất của khối khí là $y \cdot 10^5,\text{Pa}$. Tìm y (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Nội dung câu 5 và 6: Người ta khảo sát những nét vẽ bằng than củi do người Anasazi vẽ vào thời kỳ xảy ra một vụ "nổ siêu tân tinh". Vụ nổ này tạo ra một lượng lớn đồng vị phóng xạ cobalt 56. Biết chu kì bán rã của cobalt 56 và carbon 14 lần lượt là $77,1$ ngày và 5730 năm.

Câu 5. [HOCMAI] Sau 365 ngày kể từ khi xảy ra vụ nổ, lượng cobalt 56 giảm bao nhiêu phần trăm so với lượng ban đầu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 6. [HOCMAI] Gọi H_0 và H là độ phóng xạ của carbon 14 trong những nét vẽ khi được vẽ và

khi được khảo sát. Từ khi vẽ đến khi $\frac{H}{H_0} = 0,8893$ là $z \cdot 10^3$ năm. Tìm z (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.