DRA. DUNIA VERONA
cirurgia plástica
CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527

ORIENTAÇÕES PÓS-PROCEDIMENTO

Bioestimulador

Massageie a região em movimentos circulares e ascendentes por 5 minutos, 3 vezes ao dia, durante 5 dias. Use creme hidratante para diminuir o atrito durante a massagem.

Em caso de dor local leve: dipirona 1 g ou paracetamol 750 mg, dose única, seguindo a prescrição médica.

Evite anti-inflamatórios por 7 dias.

Em caso de roxo (hematoma): aplique Hirudoid 500 gel, Trombofob ou Traumeel creme 2 a 3 vezes ao dia, até melhorar. Use filtro solar FPS 30 ou mais sobre o hematoma.

Os produtos que você usa no dia a dia estão liberados.

AVISE O CONSULTÓRIO

Em caso de dor intensa ou de áreas roxas (equimoses) muito grandes.

Dúvidas? Fale comigo pelo WhatsApp (21) 97440-2673.

Rua Farme de Amoedo, 75 · sala 302 · Ipanema · Rio de Janeiro – RJ · 22420-020
(21) 97440-2673 · @duniaverona
draduniaverona@gmail.com · duniaverona.com.br